

FMI, Info, Anul I
Logică matematică și computațională

Examen

23.01.2020

Nume: _____

Prenume: _____

Grupa: _____

Partea I. Probleme cu rezolvare clasică

(P1) [1,5 puncte] Să se arate sintactic că pentru orice formule φ și ψ , avem

$$\vdash \varphi \rightarrow (\neg\varphi \rightarrow \psi).$$

(P2) [1,5 puncte] Fie $e : V \rightarrow \{0, 1\}$ o evaluare și $\Gamma := \{\psi \in Form \mid e \models \psi\}$.

(i) Demonstrați că:

(a) Γ este consistentă.

(b) Pentru orice formulă φ , avem $\varphi \in \Gamma$ sau $\neg\varphi \in \Gamma$.

(c) Pentru orice formulă φ , dacă $\Gamma \models \varphi$, atunci $\varphi \in \Gamma$.

(ii) Găsiți toate modelele lui Γ .

(P3) [1 punct] Să se demonstreze că pentru orice \mathcal{L} -structură \mathcal{A} și orice interpretări $e_1, e_2 : V \rightarrow A$, pentru orice termen t ,

dacă $e_1(v) = e_2(v)$ pentru orice variabilă $v \in Var(t)$, atunci $t^{\mathcal{A}}(e_1) = t^{\mathcal{A}}(e_2)$.

Partea II. Probleme de tip grilă

(P4) [1 răspuns corect] Reamintim că $V = \{v_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ este mulțimea variabilelor din logica propozițională. Fie $W := \{v_{2n} \mid n \in \mathbb{N}\}$.

Care dintre afirmațiile de mai jos sunt adevărate?

- ☐ A: $W \subseteq \mathbb{N}$.
- ☐ B: $W \subseteq \mathbb{N}$ și $V \subseteq \mathbb{N}$.
- ☐ C: Există o bijecție $f : \mathbb{N} \rightarrow V$ și nu există o bijecție $g : \mathbb{N} \rightarrow W$.
- ☐ D: $W \subseteq V$ sau $W \subseteq \mathbb{N}$.
- ☐ E: Niciuna dintre celelalte afirmații nu este adevărată.

(P5) [2 răspunsuri corecte] Fie următoarea formulă în limbajul logicii propoziționale:

$$\neg(\neg\varphi \wedge \neg\psi) \rightarrow ((\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi)$$

Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate?

- ☐ A: Dacă $e^+(\varphi) = 0$ și $e^+(\psi) = 1$, atunci $e^+(\neg(\neg\varphi \wedge \neg\psi) \rightarrow ((\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi)) = 1 \rightarrow e^+(\chi)$.
- ☐ B: Formula este o tautologie dacă $\chi := \neg\neg\varphi \rightarrow \varphi$.
- ☐ C: Dacă $e^+(\varphi) = 1$, $e^+(\chi) = 0$ și $e^+(\psi) = 1$, atunci $e^+(\neg(\neg\varphi \wedge \neg\psi) \rightarrow ((\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi)) = 1$.
- ☐ D: Formula este o tautologie.
- ☐ E: Toate afirmațiile de mai sus sunt false.

(P6) [2 răspunsuri corecte] Fie următoarea formulă în limbajul logicii propoziționale:

$$\neg(\neg\varphi \wedge \neg\psi) \rightarrow (\varphi \vee \psi)$$

Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate?

- ☐ A: $e^+(\neg(\neg\varphi \wedge \neg\psi) \rightarrow (\varphi \vee \psi)) = e^+((\neg\neg\varphi \rightarrow \varphi) \leftrightarrow ((\varphi \rightarrow \psi) \leftrightarrow (\neg\varphi \vee \psi)))$.
- ☐ B: $e^+(\neg(\neg\varphi \wedge \neg\psi) \rightarrow (\varphi \vee \psi)) = e^+(\neg\varphi \rightarrow \varphi)$.
- ☐ C: $e^+(\neg(\neg\varphi \wedge \neg\psi) \rightarrow (\varphi \vee \psi)) = e^+(\varphi \rightarrow \neg\varphi)$.
- ☐ D: $e^+(\neg(\neg\varphi \wedge \neg\psi) \rightarrow (\varphi \vee \psi)) = e^+(\varphi \wedge \neg\varphi)$.
- ☐ E: $e^+(\neg(\neg\varphi \wedge \neg\psi) \rightarrow (\varphi \vee \psi)) = e^+(\neg(\neg\varphi \vee \neg\psi) \rightarrow (\varphi \wedge \psi))$.

(P7) [1 răspuns corect] Fie următoarea formulă în limbajul logicii propoziționale:

$$\neg(\neg\varphi \wedge \neg\psi) \rightarrow (\varphi \vee \psi)$$

Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate?

- ☐ A: Dacă $e^+(\neg(\neg\varphi \wedge \neg\psi)) = 1$, atunci $e^+(\varphi) = e^+(\psi) = 1$.
- ☐ B: Dacă $e^+(\neg\varphi \wedge \neg\psi) = 0$, atunci $e^+(\varphi) = 1$ și $e^+(\psi) = 0$.
- ☐ C: $e^+(\varphi) = 0$ și $e^+(\psi) = 1$, dacă $e^+(\varphi \vee \psi) = 1$.
- ☐ D: $e^+(\varphi) = 1$ și $e^+(\psi) = 0$ numai dacă $e^+(\neg\varphi \wedge \neg\psi) = 0$.
- ☐ E: $e^+(\varphi) = 1$ și $e^+(\psi) = 1$ dacă și numai dacă $e^+(\varphi \vee \psi) = 1$.

(P8) [1 răspuns corect] Fie următoarea demonstrație formală:

- | | | | |
|-----|--|--|---|
| (1) | $\{\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi), \psi, \varphi\}$ | $\vdash \varphi$ | ? |
| (2) | $\{\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi), \psi, \varphi\}$ | $\vdash \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)$ | ? |
| (3) | $\{\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi), \psi, \varphi\}$ | $\vdash \psi \rightarrow \chi$ | ? |
| (4) | $\{\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi), \psi, \varphi\}$ | $\vdash \psi$ | ? |
| (5) | $\{\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi), \psi, \varphi\}$ | $\vdash \chi$ | ? |
| (6) | $\{\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi), \psi\}$ | $\vdash \varphi \rightarrow \chi$ | ? |
| (7) | $\{\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)\}$ | $\vdash \psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi)$ | ? |
| (8) | | $\vdash (\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)) \rightarrow (\psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi))$ | ? |

Aşa cum se vede, am eliminat regulile de deducţie folosite. Care dintre următoarele este şirul corect şi complet de reguli care ar face demonstraţia corectă?

- A: P1.40(ii), P1.40(ii), MP(1,2), P1.40(ii), MP(3,4), TD, TD, TD.
□ B: TD, TD, MP(1,2), TD, MP(3,4), P1.40(ii), P1.40(ii), P1.40(ii).
□ C: P1.40(ii), P1.40(ii), MP(1,2), P1.40(ii), MP(3), TD, TD, TD.
□ D: P1.40(ii), P1.40(ii), MP(1), P1.40(ii), MP(3), TD, TD, TD.
□ E: TD, TD, MP(1,2), TD, MP(3), P1.40(ii), P1.40(ii), P1.40(ii).

(P9) [1 răspuns corect] Fie următoarea demonstraţie formală:

- | | | | |
|------|---|--|---------------------------------|
| (1) | $\{\psi \rightarrow \neg\varphi, \varphi\}$ | $\vdash \psi \rightarrow \neg\varphi$ | Propoziţia 1.40.(ii) |
| (2) | $\{\psi \rightarrow \neg\varphi, \varphi\}$ | $\vdash \mathbf{X}$ | Propoziţia 1.40.(ii) |
| (3) | $\{\psi \rightarrow \neg\varphi, \varphi\}$ | $\vdash (\psi \rightarrow \neg\varphi) \rightarrow (\neg\neg\varphi \rightarrow \neg\psi)$ | (S5.3) Reciproca axiomei 3 |
| (4) | $\{\psi \rightarrow \neg\varphi, \varphi\}$ | $\vdash \neg\neg\varphi \rightarrow \neg\psi$ | (MP): (1), (3) |
| (5) | $\{\psi \rightarrow \neg\varphi, \varphi\}$ | $\vdash \mathbf{Y}$ | (S5.2).(ii) |
| (6) | $\{\psi \rightarrow \neg\varphi, \varphi\}$ | $\vdash \varphi \rightarrow \neg\psi$ | Propoziţia 1.51 pentru (5), (4) |
| (7) | $\{\psi \rightarrow \neg\varphi, \varphi\}$ | $\vdash \neg\psi$ | (MP): (2), (6) |
| (8) | \mathbf{Z} | $\vdash \varphi \rightarrow \neg\psi$ | Teorema deducţiei |
| (9) | | $\vdash (\psi \rightarrow \neg\varphi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \neg\psi)$ | Teorema deducţiei |
| (10) | | $\vdash \neg(\varphi \rightarrow \neg\psi) \rightarrow \neg(\psi \rightarrow \neg\varphi)$ | (S5.3) |
| (11) | | $\vdash \mathbf{Q}$ | Definiţia lui “ \wedge ”. |

Cu ce formule sau mulţimi de formule ar trebui înlocuite \mathbf{X} , \mathbf{Y} , \mathbf{Z} , \mathbf{Q} pentru a obţine o demonstraţie corectă?

- A: $\mathbf{X} = \varphi$, $\mathbf{Y} = \varphi \rightarrow \neg\neg\varphi$, $\mathbf{Z} = \{\psi \rightarrow \neg\varphi\}$, $\mathbf{Q} = (\varphi \wedge \psi) \rightarrow (\psi \wedge \varphi)$.
□ B: $\mathbf{X} = \psi$, $\mathbf{Y} = \neg\neg\varphi \rightarrow \varphi$, $\mathbf{Z} = \{\psi \rightarrow \neg\varphi\}$, $\mathbf{Q} = (\varphi \vee \psi) \rightarrow (\psi \vee \varphi)$.
□ C: $\mathbf{X} = \varphi$, $\mathbf{Y} = \varphi \rightarrow \neg\neg\varphi$, $\mathbf{Z} = \{\psi \rightarrow \neg\varphi\}$, $\mathbf{Q} = (\varphi \vee \psi) \rightarrow (\psi \vee \varphi)$.
□ D: $\mathbf{X} = \varphi$, $\mathbf{Y} = \varphi \rightarrow \neg\varphi$, $\mathbf{Z} = \{\psi \rightarrow \neg\varphi\}$, $\mathbf{Q} = (\varphi \wedge \psi) \rightarrow (\psi \wedge \varphi)$.
□ E: $\mathbf{X} = \psi$, $\mathbf{Y} = \neg\neg\varphi \rightarrow \neg\varphi$, $\mathbf{Z} = \{\psi \rightarrow \neg\varphi\}$, $\mathbf{Q} = (\varphi \wedge \psi) \rightarrow (\psi \wedge \varphi)$.

(P10) [2 răspunsuri corecte] Fie următoarea formulă:

$$\varphi := (v_1 \rightarrow \neg(v_2 \rightarrow v_1)) \rightarrow (\neg v_2 \wedge v_1)$$

Care dintre următoarele sunt echivalente cu φ ?

- A: $\neg(\neg v_1 \vee (v_2 \wedge \neg v_1)) \vee \neg(v_2 \vee \neg v_1)$.
□ B: $\neg(\neg v_1 \vee (v_2 \wedge \neg v_1)) \vee \neg(v_2 \wedge \neg v_1)$.
□ C: $\neg(\neg v_1 \vee \neg(v_2 \vee \neg v_1)) \vee \neg(v_2 \vee \neg v_1)$.
□ D: $(v_1 \rightarrow (\neg v_1 \rightarrow \neg v_2)) \rightarrow (\neg v_2 \wedge v_1)$.
□ E: $(v_1 \rightarrow v_2) \rightarrow \neg(v_1 \rightarrow \neg(v_2 \rightarrow v_1))$.

(P11) [2 răspunsuri corecte] Fie următoarea formulă:

$$\varphi := (v_1 \rightarrow \neg(v_2 \rightarrow v_1)) \rightarrow (\neg v_2 \wedge v_1)$$

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

- ☐ A: $v_1 \vee (\neg v_2 \wedge v_1)$ este FND a formulei.
- ☐ B: v_1 este FND a formulei.
- ☐ C: $(v_1 \wedge \neg v_1 \wedge v_2) \vee (\neg v_2 \wedge v_1)$ este FND a formulei.
- ☐ D: $\neg v_2 \wedge v_1$ este FNC și FND a formulei.
- ☐ E: $\neg v_1 \vee (v_2 \wedge v_1) \vee (\neg v_2 \wedge v_1)$ este FND a formulei.

(P12) [1 răspuns corect] Fie următoarea formulă:

$$\varphi := (v_1 \rightarrow \neg(v_2 \rightarrow v_1)) \rightarrow (\neg v_2 \wedge v_1)$$

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

- ☐ A: $v_1 \wedge (\neg v_2 \vee v_1)$ este FNC a formulei.
- ☐ B: $v_1 \vee (\neg v_2 \wedge v_1)$ este FNC a formulei.
- ☐ C: $(v_1 \wedge \neg v_2) \vee (\neg v_2 \wedge v_1)$ este FND a formulei.
- ☐ D: $(v_1 \wedge v_2) \vee (v_1 \wedge v_1) \vee (\neg v_2 \wedge v_1)$ este FND a formulei.
- ☐ E: $(v_1 \wedge v_2) \vee v_1 \vee (\neg v_2 \wedge v_1)$ este FND a formulei.

(P13) [1 răspuns corect] Fie următoarea formulă:

$$\psi := v_3 \rightarrow (\neg v_1 \leftrightarrow v_2)$$

Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate: (Hint: Folosiți funcția booleană asociată formulei ψ)

- ☐ A: $(\neg v_1 \vee \neg v_2 \vee \neg v_3) \wedge (v_1 \vee v_2 \vee \neg v_3)$ este FNC a formulei.
- ☐ B: $(v_1 \vee v_2 \vee v_3) \wedge (v_1 \vee v_2 \vee \neg v_3)$ este FNC a formulei.
- ☐ C: $(\neg v_1 \vee v_2 \vee v_3) \wedge (\neg v_1 \vee \neg v_2 \vee v_3)$ este FNC a formulei.
- ☐ D: $(v_1 \vee \neg v_2 \vee \neg v_3) \wedge (v_1 \vee v_2 \vee \neg v_3)$ este FNC a formulei.
- ☐ E: $(\neg v_1 \vee \neg v_2 \vee \neg v_3) \wedge (\neg v_1 \vee v_2 \vee v_3)$ este FNC a formulei.

(P14) [2 răspunsuri corecte] Fie următoarea mulțime de clauze:

$$\mathcal{S} = \{\{\neg v_2, v_3\}, \{v_1, v_2, \neg v_4\}, \{v_1, \neg v_2, \neg v_3, \neg v_4\}, \{v_1, v_4\}, \{\neg v_1\}\}$$

Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate:

- ☐ A: $\{v_4 \rightarrow (v_1 \vee v_2), (v_2 \wedge v_3 \wedge v_4) \rightarrow v_1, v_1 \vee v_4\} \models (v_2 \rightarrow v_3) \rightarrow v_1$.
- ☐ B: $\{v_4 \rightarrow (v_1 \vee v_2), (v_2 \wedge v_3 \wedge v_4) \rightarrow v_1, v_1 \vee v_4\} \models (v_2 \rightarrow v_3) \wedge \neg v_1$.
- ☐ C: \mathcal{S} este inconsistentă.
- ☐ D: \mathcal{S} este consistentă.
- ☐ E: \mathcal{S} nu este nici inconsistentă, nici consistentă.

(P15) [2 răspunsuri corecte] Fie următoarea mulțime de clauze:

$$\mathcal{S} = \{C_1 = \{v_0, v_4\}, C_2 = \{\neg v_1, \neg v_2, v_0\}, C_3 = \{\neg v_4, v_0, v_1\}, C_4 = \{\neg v_0, v_3\}\}$$

Care dintre următoarele sunt derivări corecte prin rezoluție?

- ☐ A: $C_5 = \{v_3, v_4\}$ (rezolvent al C_1, C_4), $C_6 = \{v_0, v_1, v_3\}$ (rezolvent al C_3, C_5).
- ☐ B: $C_5 = \{v_0, v_1\}$ (rezolvent al C_1, C_3).
- ☐ C: $C_5 = \{v_3, v_4\}$ (rezolvent al C_1, C_4), $C_6 = \{v_0, v_3\}$ (rezolvent al C_5, C_1).

□ D: $C_5 = \{v_0, v_1, v_4, \neg v_4\}$ (rezolvent al C_1, C_3).

□ E: $C_5 = \{v_0, \neg v_2, \neg v_4\}$ (rezolvent al C_2, C_3), $C_6 = \{\neg v_3, \neg v_2, \neg v_4\}$ (rezolvent al C_5, C_4).

(P16) [1 răspuns corect] Fie următoarea mulțime de clauze:

$$\mathcal{S} = \{\{\neg v_2, v_3\}, \{v_1, v_2, \neg v_4\}, \{v_1, \neg v_2, \neg v_3, \neg v_4\}, \{v_1, v_4\}, \{\neg v_1\}\}$$

Aplicând algoritmul Davis-Putnam pentru intrarea \mathcal{S} și alegând succesiv $x_1 := v_1$, $x_2 := v_2$, obținem:

□ A: $\mathcal{S}_3 = \{\{v_4\}, \{\neg v_4, v_3\}, \{\neg v_3, \neg v_4\}\}$.

□ B: $\mathcal{S}_3 = \{\{v_4\}, \{\neg v_4\}\}$.

□ C: $\mathcal{S}_3 = \{\{\neg v_4\}, \{\neg v_4, v_3\}, \{\neg v_3, \neg v_4\}\}$.

□ D: $\mathcal{S}_3 = \{\{v_4\}, \{\neg v_4, v_3\}, \{\neg v_3, v_4\}\}$.

□ E: $\mathcal{S}_3 = \{\square\}$.

(P17) [2 răspunsuri corecte] Fie următoarea mulțime de clauze:

$$\mathcal{S} = \{\{\neg v_2, v_3\}, \{v_1, v_2, \neg v_4\}, \{v_1, \neg v_2, \neg v_3, \neg v_4\}, \{v_1, v_4\}, \{\neg v_1\}\}$$

Aplicând algoritmul Davis-Putnam pentru intrarea \mathcal{S} și alegând succesiv $x_1 := v_1$, $x_2 := v_2$, $x_3 := v_3$ obținem:

□ A: $U_3 = \{\{\neg v_4\}\}$.

□ B: $U_3 = \{\{v_4\}\}$.

□ C: $U_3 = \{\{\neg v_4, v_3\}\}$.

□ D: $U_3 = \{\square\}$.

□ E: $\mathcal{S}_4 = \{\{v_4\}, \{\neg v_4\}\}$.

(P18) [2 răspunsuri corecte] Fie $\mathcal{L}_{ar} = (\dot{<}, \dot{+}, \dot{\times}, \dot{S}, \dot{0})$, \mathcal{L}_{ar} -structura $\mathcal{N} := (\mathbb{N}, <, +, \cdot, S, 0)$ și $e : V \rightarrow \mathbb{N}$ o evaluare arbitrară și $\dot{2} := \dot{S}\dot{S}\dot{0}$, $\varphi := x \dot{<} \dot{2}$ și $\psi := \neg(x \dot{<} \dot{2})$.

Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate:

□ A: $\mathcal{N} \models \forall x \varphi[e]$.

□ B: $\mathcal{N} \models \forall x (\varphi \vee \psi)[e]$.

□ C: $\mathcal{N} \models (\forall x \varphi \vee \forall x \neg \varphi)[e]$.

□ D: $\mathcal{N} \models \forall x (\perp \rightarrow \varphi)[e]$.

□ E: $\mathcal{N} \models (\exists x \varphi \wedge \neg \exists x \psi)[e]$

(P19) [2 răspunsuri corecte] Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate (pentru orice limbaj \mathcal{L} de ordinul I și orice formule φ, ψ ale lui \mathcal{L}):

□ A: $\exists x (\varphi \wedge \psi) \models \exists x \varphi \vee \exists x \psi$, pentru orice variabilă x .

□ B: $\exists x (\varphi \wedge \psi) \models \varphi \wedge \exists x \psi$, pentru orice variabilă $x \notin FV(\varphi)$.

□ C: $\exists x (\varphi \wedge \psi) \models \varphi \wedge \exists x \psi$, pentru orice variabilă $x \notin FV(\psi)$.

□ D: $\exists x (\varphi \wedge \psi) \models \exists x \varphi \wedge \exists x \psi$, pentru orice variabilă x

□ E: $\exists x (\varphi \rightarrow \psi) \models \varphi \rightarrow \exists x \psi$, pentru orice variabilă $x \notin FV(\psi)$.

(P20) [2 răspunsuri corecte] Fie \mathcal{L} un limbaj de ordinul întâi care conține

- două simboluri de relații unare S, T și un simbol de relație binară R ;
- un simbol de operație unară f și un simbol de operație binară g ;
- trei simboluri de constante a, b, c .

Fie următoarea formulă în \mathcal{L} :

$$\varphi_1 = \neg\forall y(g(y, t) = b) \wedge \neg\exists x(f(x) = a)$$

Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate:

- ☐ A: $\forall x\exists y(\neg(g(y, t) = b) \wedge \neg(f(x) = a))$ este formă prenex a φ_1 .
- ☐ B: $\exists y\forall x(\neg(g(y, t) = b) \wedge \neg(f(x) = a))$ este formă prenex a φ_1 .
- ☐ C: $\exists x\forall y(\neg(g(y, t) = b) \wedge \neg(f(x) = a))$ este formă prenex a φ_1 .
- ☐ D: $\forall x\forall y(\neg(g(y, t) = b) \wedge \neg(f(x) = a))$ este formă prenex a φ_1 .
- ☐ E: $\exists x\exists y(\neg(g(y, t) = b) \wedge \neg(f(x) = a))$ este formă prenex a φ_1 .

(P21) [2 răspunsuri corecte] Fie următoarea formulă în \mathcal{L} :

$$\varphi_2 = (\exists u S(u) \rightarrow \neg\exists z\neg T(z)) \rightarrow \exists v(R(c, v) \rightarrow R(z, v))$$

Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate:

- ☐ A: $\exists v\exists u\exists y((S(u) \rightarrow \neg\neg T(y)) \rightarrow (R(c, v) \rightarrow R(z, v)))$ este formă prenex a φ_2 .
- ☐ B: $\exists k\exists v\exists u((S(u) \rightarrow \neg\neg T(k)) \rightarrow (R(c, v) \rightarrow R(z, v)))$ este formă prenex a φ_2 .
- ☐ C: $\exists v\exists u\exists y((R(c, v) \wedge \neg R(z, v)) \rightarrow (S(u) \wedge T(y)))$ este formă prenex a φ_2 .
- ☐ D: $\exists v\forall u\forall y((S(u) \rightarrow \neg\neg T(y)) \rightarrow (R(c, v) \rightarrow R(z, v)))$ este formă prenex a φ_2 .
- ☐ E: $\forall u\forall z\exists vy((S(u) \rightarrow \neg\neg T(z)) \rightarrow (R(c, v) \rightarrow R(z, v)))$ este formă prenex a φ_2 .

(P22) [2 răspunsuri corecte] Fie următoarea formulă în \mathcal{L} :

$$\varphi_3 = \neg\exists z(f(z) = c) \vee \neg\forall x(g(x, b) = a)$$

Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate:

- ☐ A: $\forall z\exists x((\neg(f(z) = c) \vee \neg(g(x, b) = a))$ este formă prenex a φ_3 .
- ☐ B: $\exists x\forall z((\neg(f(z) = c) \vee \neg(g(x, b) = a))$ este formă prenex a φ_3 .
- ☐ C: $\forall z\exists x\neg((f(z) = c) \vee \neg(g(x, b) = a))$ este formă prenex a φ_3 .
- ☐ D: $\forall z\exists x\neg((f(z) = c) \vee (g(x, b) = a))$ este formă prenex a φ_3 .
- ☐ E: $\exists x\forall z\neg((f(z) = c) \vee (g(x, b) = a))$ este formă prenex a φ_3 .

(P23) [1 răspuns corect] Fie următoarea formulă în \mathcal{L} :

$$\varphi_4 = (\forall x R(x, u) \vee \forall x S(x)) \rightarrow \neg(\exists z T(z) \rightarrow \neg\exists y\neg R(y))$$

Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate:

- ☐ A: $\exists v\exists x\exists z\exists y((R(v, u) \vee S(x)) \rightarrow \neg(T(z) \rightarrow R(y)))$ este formă prenex a φ_4 .
- ☐ B: $\forall v\forall x\exists z\exists y((R(v, u) \vee S(x)) \rightarrow \neg(T(z) \rightarrow R(y)))$ este formă prenex a φ_4 .
- ☐ C: $\exists v\exists x\forall z\exists y((R(v, u) \vee S(x)) \rightarrow \neg(T(z) \rightarrow R(y)))$ este formă prenex a φ_4 .
- ☐ D: $\exists v\exists x\forall z\forall y((R(v, u) \vee S(x)) \rightarrow \neg(T(z) \rightarrow R(y)))$ este formă prenex a φ_4 .
- ☐ E: $\exists v\exists x\exists z\exists y((R(v, u) \vee S(x)) \rightarrow (\neg T(z) \rightarrow R(y)))$ este formă prenex a φ_4 .