

# 1 Calcul numeric

**Problema 1.1.** (a) Scrieți formula de interpolare Hermite pentru  $f \in C^4[-1, 1]$  și nodurile  $x_0 = -1$  simplu,  $x_1 = 0$  dublu și  $x_2 = 1$  simplu.

(b) Determinați o formulă de cuadratură de tip interpolator integrând formula precedentă termen cu termen.

(c) Transformați formula precedentă într-o formulă pe  $[a, b]$ . Este aceasta o formulă cunoscută?

**Problema 1.2.** Să se aplice metoda lui Newton ecuației  $\sin x = 0$  pe  $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ , dacă  $x_0$  este soluția nenulă a ecuației  $\operatorname{tg} x = 2x$ . Ce ar trebui să se întâmple și ce se întâmplă în realitate?

## 2 Calcul numeric

**Problema 2.1.** Considerăm formula de cuadratură de tipul

$$\int_0^\infty e^{-x} f(x) dx = af(0) + bf(c) + R(f)$$

- (a) Determinați  $a, b, c$  astfel încât formula să aibă gradul de exactitate  $d = 2$ . Puteți identifica formula astfel obținută? (Indicație:  $\Gamma(n+1) = n!$ ).
- (b) Fie  $p_2(x) = (H_2 f)(x, 0, 2, 2)$  polinomul de interpolare Hermite corespunzător funcției  $f$  și nodurilor  $x = 0$ , simplu și  $x = 2$ , dublu. Calculați  $\int_0^\infty e^{-x} p_2(x) dx$  și comparați cu rezultatul de la punctul (a).
- (c) Obțineți restul  $R(f)$  sub forma

$$R(f) = \text{const} \cdot f'''(\xi), \quad \xi > 0.$$

**Problema 2.2.** O analiză de tip element finit a sarcinii pe o structură ne conduce la următorul sistem

$$\begin{bmatrix} \alpha & 0 & 0 & 0 & \beta & -\beta \\ 0 & \alpha & 0 & -\beta & 0 & -\beta \\ 0 & 0 & \alpha & \beta & \beta & 0 \\ 0 & -\beta & \beta & \gamma & 0 & 0 \\ \beta & 0 & \beta & 0 & \gamma & 0 \\ -\beta & -\beta & 0 & 0 & 0 & \gamma \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} 15 \\ 0 \\ -15 \\ 0 \\ 25 \\ 0 \end{bmatrix},$$

unde  $\alpha = 482317$ ,  $\beta = 2196.05$  și  $\gamma = 6708.43$ . Aici  $x_1, x_2, x_3$  reprezintă deplasări laterale, iar  $x_4, x_5, x_6$  reprezintă deplasări rotaționale (tridimensionale) corespunzând forței aplicate (membrul drept).

1. Determinați  $x$ .
2. Cât de precise sunt calculele? Presupunem întâi date exacte, apoi  $\|\Delta A\|/\|A\| = 5 \times 10^{-7}$ .

### 3 Calcul numeric

**Problema 3.1.** (a) Determinați forma Newton a polinomului de interpolare  $p$  ce interpolează  $f$  în  $x = 0$  și  $x = 1$  și  $f'$  în  $x = 0$ . Exprimați eroarea cu ajutorul unei derivate de ordin corespunzător a lui  $f$  (presupusă continuă pe  $[0, 1]$ ).

(b) Folosind rezultatul de la (a), deduceți o formulă de cuadratură de tipul

$$\int_0^1 f(x)dx = a_0 f(0) + a_1 f(1) + b_0 f'(0) + R(f)$$

Determinați  $a_0$ ,  $a_1$ ,  $b_0$  și  $R(f)$ .

(c) Transformați formula de la (b) într-o formulă cu rest pentru  $\int_c^{c+h} y(t)dt$ , unde  $h > 0$ .

**Problema 3.2.** Să se genereze un spline cubic parametric care să treacă prin punctele date  $P_i(x_i, y_i)$ ,  $i = \overline{1, n}$ . Punctele se vor citi cu `ginput`.

## 4 Calcul numeric

**Problema 4.1.** (a) Se consideră o formulă de cuadratură de tipul

$$\int_0^1 f(x)dx = \alpha f(x_1) + \beta[f(1) - f(0)] + R(f). \quad (1)$$

Să se determine  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $x_1$  astfel încât gradul de exactitate să fie cât mai mare posibil. Care este gradul de exactitate maxim care se poate atinge?

- (b) Utilizați interpolarea și teorema lui Peano pentru a obține o margine a lui  $|R(f)|$  în funcție de  $\|f^{(r)}\|_\infty = \max_{0 \leq x \leq 1} |f^{(r)}(x)|$ , pentru un  $r$  adecvat.
- (c) Adaptați (1), inclusiv delimitarea pentru  $|R(f)|$ , pentru a obține o integrală de forma  $\int_c^{c+h} f(t)dt$ , unde  $c$  este o constantă și  $h > 0$ .
- (d) Aplicați rezultatul de la (c) pentru a obține o formulă de cuadratură repetată pentru  $\int_a^b f(t)dt$ , subdivizând  $[a, b]$  în  $n$  subintervale de lungime totală  $h = \frac{b-a}{n}$ . Găsiți o margine a erorii totale.

**Problema 4.2.** Presiunea  $P$  a vaporilor de apă (în bari) ca funcție de temperatură  $T$  (în grade C) este

$T$	0	10	20	30
$P(T)$	0.006107	0.012277	0.023378	0.04243
$T$	40	50	60	80
$P(T)$	0.073774	0.12338	0.19924	0.31166
$T$	80	90	100	
$P(T)$	0.47364	0.70112	1.01325	

Interpolați aceste date cu un spline cubic. Se știe că  $P(5) = 0.008721$ ,  $P(45) = 0.095848$ , and  $P(95) = 0.84528$ . Cât de bine interpolează  $S$  în aceste puncte? Reprezentați grafic  $S$  ca o funcție de  $T$ . Calculați integrala presiunii de la 0 la 100.

## 5 Calcul numeric

**Problema 5.1.** (a) Construiți prin metoda coeficienților nedeterminați o formulă de cuadratură de tipul

$$\int_0^1 f(x)dx = -\alpha f'(0) + \beta f\left(\frac{1}{2}\right) + \alpha f'(1) + R(f)$$

care are grad maxim de exactitate.

- (b) Care este gradul exact de exactitate al formulei de la punctul (a)?
- (c) Utilizați nucleul lui Peano al funcționalei  $Q$  pentru a exprima  $R(f)$  în funcție de o derivată adecvată, folosind rezultatul de la (b).
- (d) Transformați formula de la punctul (a) într-una potrivită pentru a evalua  $\int_c^{c+h} g(t)dt$  și apoi obțineți formula repetată corespunzătoare pentru  $\int_a^b g(t)dt$ , utilizând  $n$  subintervale de lungime egală și deduceți restul. Interpretați rezultatul.

**Problema 5.2.** (a) Implementați în MATLAB metoda lui Newton pentru ecuații scalare cu rădăcini multiple.

- (b) Studiați comportarea metodei lui Newton și a metodei secantei pentru funcția

$$f(x) = \operatorname{sgn}(x - a)\sqrt{|x - a|}.$$

## 6 Calcul numeric

**Problema 6.1.** Fie

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b, \quad x_k = a + kh, \quad h = \frac{b-a}{n}$$

o diviziune a intervalului  $[a, b]$  în  $n$  subintervale egale.

(a) Deduceți o formulă de cuadratură elementară pentru integrala  $\int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x)dx$  (inclusiv restul), aproximând  $f$  printr-un polinom de interpolare Hermite  $(H_3 f)(x; x_k, x_k, x_{k+1}, x_{k+1})$  și apoi integrând pe  $[x_k, x_{k+1}]$ . Interpretați rezultatul.

(b) Deduceți din formula de la (a) o formulă repetată de cuadratură (cu rest), pentru integrala  $\int_a^b f(x)dx$ .

**Problema 6.2.** Rezolvați ecuația lui Kepler

$$f(x) = x - \varepsilon \sin x - \eta = 0, \quad 0 < |\varepsilon| < 1, \quad \eta \in \mathbb{R},$$

unde  $\varepsilon$  și  $\eta$  sunt parametrii.

## 7 Calcul numeric

**Problema 7.1.** (a) Fie  $L_n(f; x)$  polinomul de interpolare de grad  $\leq n$  corespunzător funcției  $f(x) = e^x$  și punctelor  $x_i = i/n$ ,  $i = 0, 1, 2, \dots, n$ . Deduceți o margine superioară pentru

$$\max_{0 \leq x \leq 1} |e^x - (L_n f)(x)| = \max_{0 \leq x \leq 1} |(R_n f)(x)|$$

și determinați cel mai mic  $n$  ce garantează o eroare mai mică decât  $10^{-6}$  pe  $[0, 1]$ .

*Indicație.* Arătați întâi că pentru orice  $i$ ,  $0 \leq i \leq n$  are loc

$$\max_{0 \leq x \leq 1} \left| \left( x - \frac{i}{n} \right) \left( x - \frac{n-i}{n} \right) \right| \leq \frac{1}{4}.$$

(b) Rezolvați problema analoagă pentru polinomul Taylor de grad  $n$

$$(T_n f)(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!},$$

și comparați rezultatul cu cel de la (a).

**Problema 7.2.** Rezolvați sistemul

$$9x^2 + 36y^2 + 4z^2 - 36 = 0$$

$$x^2 - 2y^2 - 20z = 0$$

$$x^2 - y^2 + z^2 = 0$$

*Indicație:* Sunt patru soluții. Valori bune de pornire

$$\begin{bmatrix} \pm 1 & \pm 1 & 0 \end{bmatrix}^T.$$

## 8 Calcul numeric

**Problema 8.1.** (a) Dându-se  $f \in C[a, b]$ , găsiți  $\widehat{s}_1(f; \cdot) \in S_1^0(\Delta)$  astfel încât

$$\int_a^b [f(x) - \widehat{s}_1(f; x)]^2 dx \rightarrow \min$$

utilizând baza B-splinelor de gradul întâi. Ce puteți spune despre problema analoagă discretă?

(b) Implementați soluția de la punctul (a) în MATLAB.



## 9 Calcul numeric

**Problema 9.1.** (a) Pentru un polinom de interpolare de grad II cu noduri echidistante  $x_0, x_1 = x_0 + h, x_2 = x_0 + 2h$ , deduceți o margine superioară  $\|R_2 f\|_\infty$  în funcție de  $\|f'''\|_\infty$  și  $h$ .

(b) Comparați marginea obținută la (a) cu cea analoagă pentru trei puncte Cebîșev din  $[x_0, x_2]$ .

**Problema 9.2.** Fie funcția  $f(x_1, x_2, x_3) = 5x_1^3 - x_2^2 - e^{x_3} - 8x_1 - 2x_2 + x_3$ . Să se determine un punct staționar al ei.

## 10 Calcul numeric

**Problema 10.1.** (a) Presupunem că funcția  $f(x) = \ln(2+x)$ ,  $x \in [-1, 1]$  este interpolată printr-un polinom  $L_n f$  în punctele Cebîșev  $x_k = \cos\left(\frac{2k+1}{2n+2}\pi\right)$ ,  $k = \overline{0, n}$ . Deduceți o margine a erorii maxime,  $\|R_n f\|_\infty$ .

(b) Comparați rezultatul de la (a) cu marginea superioară  $\|R_n^T f\|_\infty$  a restului polinomului de interpolare Taylor al lui  $f$ .

**Problema 10.2.** Inversați funcția specială

$$\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt$$

rezolvând ecuația  $y = \operatorname{erf}(x)$  în raport cu  $x$  folosind metoda lui Newton,  $-1 \leq y \leq 1$ .

## 11 Calcul numeric

**Problema 11.1.** Fie  $f(t) = \arccos t$ ,  $t \in [-1, 1]$ . Determinați aproximația continuă în sensul celor mai mici pătrate  $\widehat{\varphi} \in P_n$  a lui  $f$  relativ la ponderea  $w(t) = (1 - t^2)^{-\frac{1}{2}}$ , adică, găsiți soluția  $\varphi = \widehat{\varphi}$  a problemei

$$\min \left\{ \int_{-1}^1 [f(t) - \varphi(t)]^2 \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}} : \varphi \in P_n \right\}.$$

( $\varphi$  se va exprima în baza formată de polinoamele Cebîșev de speța I,  $\pi_j(t) = T_j(t)$ .)

**Problema 11.2.** Studiul transportului neutronului într-o vergea (vezi G. M. Wing: *An Introduction to Transport Theory*, Wiley, New York, 1962) conduce la o ecuație transcendentă care are rădăcini legate de lungimile critice. Pentru o vergea de lungime  $\ell$  ecuația este

$$\cot(\ell x) = \frac{x^2 - 1}{2x}.$$

Faceți un grafic al funcțiilor  $\cot(\ell x)$  și  $\frac{x^2-1}{2x}$  pentru a vă face o idee asupra poziției rădăcinilor. Pentru  $\ell = 1, 2$  determinați cele mai mici trei rădăcini pozitive.

## 12 Calcul numeric

**Problema 12.1.** Implementați un algoritm  $O(n)$  pentru rezolvarea unui sistem tridiagonal prin descompunere LUP.

**Problema 12.2.** Deduceți formulele de derivare numerică

$$\begin{aligned}f'(x) &= \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} + R(h), \\f''(x) &= \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2} + R(h),\end{aligned}$$

presupunând că  $f$  este continuu diferențiabilă de câte ori este necesar.

**Problema 12.3.** Se consideră problema bilocală

$$y''(x) - p(x)y'(x) - q(x)y(x) = r(x), \quad x \in [a, b]$$

cu condițiile pe frontieră  $y(a) = \alpha$ ,  $y(b) = \beta$ . Presupunem că  $q(x) \geq \underline{q} > 0$ . Pentru a rezolva problema numeric o vom discretiza, căutând aproximațiile pe grila uniformă  $x_i = a + ih$ ,  $i = 0, \dots, N-1$ , unde  $h = (b-a)/(N+1)$ . Definim  $p_i = p(x_i)$ ,  $q_i = q(x_i)$ ,  $r_i = r(x_i)$  and  $y_i \approx y(x_i)$ . Utilizând formulele din problema 12.2 și ținând cont că  $y_0 = \alpha$  și  $y_{N+1} = \beta$ , se obține un sistem liniar tridiagonal.

- (a) Scrieți sistemul obținut prin discretizare și studiați proprietățile lui.
- (b) Scrieți o funcție MATLAB pentru rezolvarea problemei cu valori pe frontieră date, folosind ideea de mai sus și funcția din problema 12.1.

## 13 Calcul numeric

**Problema 13.1.** Implementați un algoritm  $O(n)$  pentru rezolvarea unui sistem tridiagonal cu matrice SPD prin descompunere Cholesky.

**Problema 13.2.** Deduceți formulele de derivare numerică

$$\begin{aligned}f'(x) &= \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} + R(h), \\f''(x) &= \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2} + R(h),\end{aligned}$$

presupunând că  $f$  este continuu diferentiabilă de câte ori este necesar.

**Problema 13.3.** Se consideră problema bilocală (ecuația Poisson unidimensională)

$$-\frac{d^2v(x)}{dx^2} = f, \quad 0 < x < 1,$$

cu condițiile pe frontieră  $v(0) = v(1) = 0$ . Pentru a rezolva problema numeric o vom discretiza, căutând aproximațiile pe grila uniformă  $x_i = a + ih$ ,  $i = 0, \dots, N-1$ , unde  $h = (b-a)/(N+1)$ ,  $[a, b] = [0, 1]$ . Definim  $y_i \approx y(x_i)$ . Utilizând formulele din problema 13.2 (una din ele) și ținând cont că  $y_0 = 0$  și  $y_{N+1} = 0$ , se obține un sistem liniar tridiagonal.

- (a) Scrieți sistemul obținut prin discretizare și studiați proprietățile lui.
- (b) Scrieți o funcție MATLAB pentru rezolvarea problemei cu valori pe frontieră date, folosind ideea de mai sus și funcția din problema 13.1.

## 14 Calcul numeric

**Problema 14.1.** Considerăm ecuația lui Kepler,

$$f(x) = 0, \quad f(x) = x - \varepsilon \sin x - \eta, \quad 0 < |\varepsilon| < 1, \quad \eta \in \mathbb{R},$$

unde  $\varepsilon, \eta$  sunt parametrii.

- (a) Arătați că, pentru orice  $\varepsilon, \eta$  există exact o rădăcină reală  $\alpha = \alpha(\varepsilon, \eta)$  și că

$$\eta - |\varepsilon| \leq \alpha(\varepsilon, \eta) \leq \eta + |\varepsilon|.$$

- (b) Scriind ecuația sub forma unei probleme de punct fix

$$x = \varphi(x), \quad \varphi(x) = \varepsilon \sin x + \eta$$

arătați că metoda aproximațiilor succesive  $x_{n+1} = \varphi(x_n)$  converge pentru orice valoare de pornire arbitrară  $x_0$ .

- (c) Fie  $m$  un întreg astfel încât  $m\pi < \eta < (m+1)\pi$ . Arătați că metoda lui Newton cu valoarea de pornire

$$x_0 = \begin{cases} (m+1)\pi, & \text{dacă } (-1)^m \varepsilon > 0; \\ m\pi, & \text{altfel.} \end{cases}$$

converge (monoton) către  $\alpha(\varepsilon, \eta)$ .

- (d) Estimați constanta de eroare asimptotică  $c$  a metodei lui Newton.

**Problema 14.2.** Scrieți o funcție MATLAB ce calculează coeficienții unui spline cubic periodic de clasă  $C^2[a, b]$ . Aceasta înseamnă că datele de intrare verifică  $f_n = f_1$  și interpolantul trebuie să fie periodic, de perioadă  $x_n - x_1$ . Realizarea condițiilor la capete este mai simplu de impus dacă adăugăm două puncte suplimentare  $x_0 = x_1 - \Delta x_{n-1}$  și  $x_{n+1} = x_n + \Delta x_1$ , unde spline-ul are valorile  $f_0 = f_{n-1}$  și respectiv  $f_{n+1} = f_2$ .

## 15 Calcul numeric

**Problema 15.1.** (a) Deduceți o metodă iterativă ce utilizează numai adunări (sau scăderi) și înmulțiri pentru calculul inversului  $\frac{1}{a}$  al unui număr pozitiv  $a$ .

(b) Pentru ce valori de pornire  $x_0$  algoritmul de la (a) converge? Ce se întâmplă dacă  $x_0 < 0$ ?

(c) Deoarece în aritmetica în virgulă flotantă binară este suficient să găsim inversul semnificantului, presupunem că  $1 \leq a < 2$ , sau după creșterea exponentului cu o unitate  $\frac{1}{2} \leq a < 1$ . Arătați că în acest ultim caz

$$\left| x_{n+1} - \frac{1}{a} \right| < \left| x_n - \frac{1}{a} \right|^2.$$

(d) Utilizați rezultatul de la (c) pentru a estima câte iterații sunt necesare pentru a obține  $\frac{1}{a}$  cu o eroare mai mică decât  $2^{-48}$ , dacă se ia  $x_0 = \frac{3}{2}$ .

**Problema 15.2.** Să se reprezinte grafic o cubică parametrică care trece prin două puncte date și are în acele puncte tangente date.

## 16 Calcul numeric

**Problema 16.1.** (a) Deduceți iterația care rezultă aplicând metoda lui Newton funcției  $f(x) := x^3 - a = 0$  pentru a calcula rădăcina cubică  $\alpha = a^{\frac{1}{3}}$  a lui  $a > 0$ .

(b) Considerați ecuația echivalentă  $f_\lambda(x) = 0$ , unde  $f_\lambda(x) = x^{3-\lambda} - ax^{-\lambda}$  și determinați  $\lambda$ , astfel încât metoda lui Newton să convergă cubic. Scrieți iterația obținută în cea mai simplă formă.

**Problema 16.2.** Pentru o funcție dată  $f$  și o mulțime de noduri,  $x_i$ , date să se determine un spline cubic  $S_3f$  ce verifică

$$\begin{aligned}(S_3f)(x_i) &= f(x_i), \\ (S_3f)'(x_i) &= f'(x_i), \quad i = \overline{1, n}.\end{aligned}$$

Să se reprezinte grafic  $S_3f$  și spline-ul natural  $S_3f_N$  ce verifică  $(S_3f_N)(x_i) = f(x_i)$ . (pe același grafic).



## 17 Calcul numeric

**Problema 17.1.** Arătați că

$$x_{n+1} = \frac{x_n(x_n^2 + 3a)}{3x_n^2 + a}$$

este o metodă de calcul al lui  $\alpha = \sqrt{a}$ , care converge cubic către  $\alpha$  (pentru un  $x_0$  potrivit). Determinați constanta de eroare asimptotică.

**Problema 17.2.** Scrieți o funcție MATLAB pentru inversarea unei matrice Vandermonde utilizând proprietățile polinoamelor Lagrange fundamentale.

## 18 Calcul numeric

**Problema 18.1.** Se consideră iterația de tip punct fix

$$x_{n+1} = \varphi(x_n), \quad n \in \mathbb{N}$$

unde

$$\varphi(x) = Ax + Bx^2 + Cx^3.$$

- (a) Dându-se un număr pozitiv  $\alpha$ , să se determine constantele  $A, B, C$ , astfel ca iterația să convergă local către  $1/\alpha$  cu ordinul  $p = 3$ . (Se obține astfel o metodă cu convergență cubică pentru calculul inversului  $1/\alpha$  a lui  $\alpha$ , care utilizează doar adunări, scăderi și înmulțiri).
- (b) Determinați condiții asupra erorii inițiale  $\varepsilon_0 = x_0 - \frac{1}{\alpha}$ , astfel ca iterația să convergă.

**Problema 18.2.** În literatura de specialitate (J. Crank, G. Park: Evaluation of the diffusion coefficient for  $\text{CHCl}_3$  in polystyrene from simple absorption experiments, *Trans. Faraday Soc.* **45**(1949), pp. 240-249) se dă o metodă de deducere a coeficientului de difuzie a cloroformului în polistiren din măsurătorile de absorbție. Utilizând mai multe ipoteze, autorii ajung la cantitatea

$$\widehat{D}(C_0) = \frac{1}{C_0} \int_0^{C_0} D(C) dC,$$

care poate fi măsurată pentru diverse valori ale lui  $C_0$ . Derivarea în raport cu  $C_0$  ne dă o expresie a lui  $D$  în funcție de cantitatea

$$\frac{d}{dC_0} [C_0 \widehat{D}(C_0)].$$

Utilizând datele

$C_0$	5.0	7.5	9.9	12.9
$\widehat{D}(C_0)$	0.0240	0.0437	0.0797	0.1710
$C_0$	13.2	15.1	16.3	16.8
$\widehat{D}(C_0)$	0.1990	0.3260	0.8460	0.9720

aproximați  $D$  pentru fiecare valoare a lui  $C_0$  diferențiind spline-ul corespunzător. (Indicație:  $\widehat{D}(C_0) + C_0 \frac{\widehat{D}(C_0)}{dC_0} = D(C_0)$ ).

## 19 Calcul numeric

**Problema 19.1.** (a) Găsiți polinomul de cea mai bună aproximare de gradul al doilea pentru funcția  $f(x) = \cos x$  în  $L_w^2[a, b]$ , unde  $w(x) = e^{-x}$ ,  $a = 0$ ,  $b = \infty$ .

1. Stabiliți o formulă de cuadratură de forma

$$\int_0^\infty e^{-x} f(x) dx = A_1 f(x_1) + A_2 f(x_2) + R(f),$$

care să aibă grad maxim de exactitate.

**Problema 19.2.** Calculați inversa unei matrice date rezolvând un set de sisteme convenabile și utilizând descompunerea LUP.

## 20 Calcul numeric

**Problema 20.1.** (a) Găsiți polinomul de cea mai bună aproximare de gradul întâi pentru funcția  $f(x) = e^{\sqrt{x}}$  în  $L_w^2[a, b]$ , unde  $w(x) = \sqrt{x}$ ,  $a = 0$ ,  $b = 1$ .

(b) Stabiliți o formulă de cuadratură de forma

$$\int_0^1 \sqrt{x} f(x) dx = A_1 f(x_1) + R(f),$$

care să aibă grad maxim de exactitate.

**Problema 20.2.** Căutăm parametrii  $\alpha$ ,  $\beta$  și  $\gamma$  ai modelului

$$f(x) = \alpha e^{\beta x} + \gamma x$$

interpolând punctele  $(1, 10)$ ,  $(2, 12)$  și  $(3, 18)$ . Utilizați metoda lui Newton pentru a găsi parametrii cu trei cifre corecte.

## 21 Calcul numeric

**Problema 21.1.** Considerăm formula de cuadratură de tipul

$$\int_0^\infty e^{-x} f(x) dx = af(0) + bf(c) + R(f)$$

- (a) Determinați  $a, b, c$  astfel încât formula să aibă gradul de exactitate  $d = 2$ . Puteți identifica formula astfel obținută? (Indicație:  $\Gamma(n+1) = n!$ ).
- (b) Fie  $p_2(x) = (H_2 f)(x, 0, 2, 2)$  polinomul de interpolare Hermite corespunzător funcției  $f$  și nodurilor  $x = 0$ , simplu și  $x = 2$ , dublu. Calculați  $\int_0^\infty e^{-x} p_2(x) dx$  și comparați cu rezultatul de la punctul (a).
- (c) Obțineți restul  $R(f)$  sub forma

$$R(f) = \text{const} \cdot f'''(\xi), \quad \xi > 0.$$

**Problema 21.2.** Datele următoare dau absorbția luminii  $A$  ca funcție de lungimea de undă  $\lambda$  pentru un obturator vanadyl D-tartrat.

$\lambda$	> 3125	> 3250	3375	> 3500	3625	> 3750
$A(\lambda)$	0.700	0.572	0.400	0.382	0.449	0.560
$\lambda$	3875	> 4000	4125	> 4250	4375	
$A(\lambda)$	0.769	0.836	0.750	0.530	0.315	
$\lambda$	> 4500	4625	> 4750	4875	> 5000	
$A(\lambda)$	0.170	0.144	0.183	0.252	0.350	

Utilizați un spline cubic pentru a interpola punctele marcate cu (>). Studiați efectele scalării și translației variabilei independente  $x = \lambda$  (lungimea de undă) în cazurile:

- (a) se iau datele așa cum sunt;
- (b) se înlocuiește  $x$  cu  $x/1000$ ;
- (c) se înlocuiește  $x$  cu  $(x - 4000)/1000$ ;

În fiecare caz evaluați spline-ul cubic pentru lungimile de undă nemarcate. Cum sunt valorile aproximative comparativ cu valorile din tabelă? Afectează scalările și translațiile precizia lui  $S$ ?

## 22 Calcul numeric

**Problema 22.1.** (a) Determinați forma Newton a polinomului de interpolare  $p$  ce interpolează  $f$  în  $x = 0$  și  $x = 1$  și  $f'$  în  $x = 0$ . Exprimați eroarea cu ajutorul unei derivate de ordin corespunzător a lui  $f$  (presupusă continuă pe  $[0, 1]$ ).

(b) Folosind rezultatul de la (a), deduceți o formulă de cuadratură de tipul

$$\int_0^1 f(x)dx = a_0 f(0) + a_1 f(1) + b_0 f'(0) + R(f)$$

Determinați  $a_0$ ,  $a_1$ ,  $b_0$  și  $R(f)$ .

(c) Transformați formula de la (b) într-o formulă cu rest pentru  $\int_c^{c+h} y(t)dt$ , unde  $h > 0$ .

**Problema 22.2.** În unele probleme de distribuție a temperaturii este necesar să se găsească rădăcinile pozitive ale ecuației

$$2xJ_1(x) - J_0(x) = 0,$$

unde  $J_0(x)$  și  $J_1(x)$  sunt funcțiile Bessel de speța I de ordinul 0 și 1. Calculați cele mai mici trei rădăcini pozitive.

## 23 Calcul numeric

**Problema 23.1.** Fie  $p(t)$  un polinom monic de gradul  $n$ . Fie  $x \in \mathbb{C}^n$  și definim

$$f_\nu(x) = p[x_1, x_2, \dots, x_\nu], \quad \nu = 1, 2, \dots, n,$$

ca fiind diferența divizată a lui  $p$  relativ la coordonatele  $x_\mu$  ale lui  $x$ . Considerăm sistemul de ecuații

$$f(x) = 0, \quad [f(x)]^T = [f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)].$$

- (a) Fie  $\alpha^T = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n]$  zerourile lui  $p$ . Arătați că  $\alpha$  este, exceptând o permutare a componentelor, soluția unică a lui  $f(x) = 0$ .

(Indicație. Folosiți forma Newton a polinomului de interpolare).

- (b) Arătați că

$$\frac{\partial}{\partial x_0} g[x_0, x_1, \dots, x_n] = g[x_0, x_0, x_1, \dots, x_n]$$

presupunând că  $g$  este o funcție diferențiabilă în  $x_0$ . Ce se poate spune despre derivatele parțiale în raport cu celelalte variabile?

- (c) Descrieți aplicarea metodei lui Newton sistemului de ecuații neliniare  $f(x) = 0$ , dat la punctul (a).
- (d) Discutați în ce măsură procedura de la (a) și (c) este valabilă pentru funcții  $p$  nepolinomiale.

**Problema 23.2.** Generați o formulă de cuadratură de forma

$$\int_{-1}^1 \frac{f(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx = \sum_{k=1}^{10} w_k f(x_k) + R(f)$$

care să aibă grad maxim de exactitate. Folosiți formula pentru a aproxima integralele

$$\int_{-1}^1 \frac{\cos(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx \quad \text{și} \quad \int_{-1}^1 \frac{\cos(x^2)}{\sqrt{1-x^2}} dx.$$

## 24 Calcul numeric

**Problema 24.1.** Evaluați  $\int_0^1 \frac{\sin x}{\sqrt{x}} dx$  utilizând o cuadratură adaptivă

- (a) rezolvând problema așa cum este enunțată;
- (b) utilizând o tehnică de dezvoltare în serie;
- (c) utilizând o schimbare de variabilă.

Comparați rezultatele.

**Problema 24.2.** Dându-se  $f \in C^2[0, h]$ ,  $h > 0$  să se determine un polinom de grad minim  $B$  astfel încât

$$\begin{cases} B(0) = f(0) \\ B'(h) = f'(h). \end{cases} \quad (2)$$

Să se dea expresia restului.



## 25 Calcul numeric

**Problema 25.1.** Pentru un întreg  $n \geq 1$ , se consideră ecuația

$$f(x) = 0, \quad f(x) = x^{n+1} - b^n x + ab^n, \quad a > 0, \quad b > 0.$$

- (a) Demonstrați că ecuația are exact două rădăcini distincte pozitive dacă și numai dacă

$$a < \frac{n}{(n+1)^{1+\frac{1}{n}}} b.$$

(*Indicație.* Analizați convexitatea lui  $f$ .)

- (b) Presupunând că au loc condițiile de la (a), arătați că metoda lui Newton converge către cea mai mică rădăcină pozitivă, când se pornește cu  $x_0 = a$  și către cea mai mare, când  $x_0 = b$ .

**Problema 25.2.** (a) Care este valoarea exactă a lui

$$\int_0^{4\pi} \cos^2 x \, dx$$

- (b) Ce se întâmplă dacă se calculează cu o cuadratură adaptivă? Ce este greșit?
- (c) Cum evită funcția MATLAB `quad` această dificultate?
- (d) Calculați integrala folosind o cuadratură gaussiană și metoda lui Romberg.

## 26 Calcul numeric

**Problema 26.1.** Fie  $f$  o funcție dată pe  $[0, 1]$  ce satisface  $f(0) = 0$ ,  $f(1) = 1$ .

- (a) Reduceți problema aproximării lui  $f$  pe  $[0, 1]$  în sensul celor mai mici pătrate (continuu, cu ponderea  $w(t) = 1$ ) printr-un polinom de grad II  $p$  ce satisface  $p(0) = 0$ ,  $p(1) = 1$  la o problemă de aproximare în sensul celor mai mici celor mai mici pătrate fără restricții (pentru o funcție diferită).
- (b) Aplicați rezultatul de la (a) lui  $f(t) = t^r$ ,  $r > 2$ . Reprezentați pe același grafic aproximanta și funcția exactă pentru  $r = 3$ .

**Problema 26.2.** Funcția  $y(x) = e^{-x^2} \int_0^x e^{t^2} dt$  se numește integrala lui Dawson. Tabelați această funcție pentru  $x = 0, 0.1, \dots, 0.5$ . Pentru a evita evaluările de funcții nenecesare, descompuneți integrala într-o sumă de integrale pe subintervale.

## 27 Calcul numeric

**Problema 27.1.** Fie

$$s_1(x) = 1 + c(x+1)^3, \quad -1 \leq x \leq 0,$$

unde  $c$  este un parametru real.

Determinați  $s_2(x)$  pe  $0 \leq x \leq 1$  astfel încât

$$s(x) := \begin{cases} s_1(x) & \text{if } -1 \leq x \leq 0 \\ s_2(x) & \text{if } 0 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

să fie un spline cubic natural pe  $[-1, 1]$  cu nodurile  $-1, 0, 1$ . Cât trebuie ales  $c$  dacă se dorește ca  $s(1) = -1$ ?

**Problema 27.2.** În încercarea de a rezolva ecuația transferului radiativ în atmosfere semiinfinite, se întâlnește ecuația neliniară

$$\omega_0 = \frac{2k}{\ln[(1+k)/(1-k)]},$$

unde numărul  $\omega_0 \in (0, 1)$  se numește albedo. Arătați că pentru  $\omega_0$  fixat, dacă  $k$  este o rădăcină, la fel este și  $-k$  și că există o singură rădăcină  $k \in (0, 1)$ . Pentru  $\omega_0 = 0.25, 0.50, 0.75$  găsiți rădăcinile pozitive corespunzătoare.

## 28 Calcul numeric

**Problema 28.1.** Dându-se relația de recurență

$$\pi_{k+1}(t) = (t - \alpha_k)\pi_k - \beta_k\pi_{k-1}(t), \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

pentru polinoame ortogonale (monice)  $\{\pi_j(\cdot; d\lambda)\}$  și definind  $\beta_0 = \int_{\mathbb{R}} d\lambda(t)$  arătați că  $\|\pi_k\|^2 = \beta_0\beta_1 \dots \beta_k$ ,  $k = 0, 1, 2, \dots$ . Cum poate fi exploatat acest lucru într-o implementare practică a aproximării în sensul celor mai mici pătrate relativă la un sistem ortogonal?

**Problema 28.2.** Factorul de concentrare geometrică  $C$  într-un model de colectare a energiei solare (L. Vant-Hull, A. Hildebrandt: Solar thermal power systems based on optical transmissions, *Solar Energy*, 18(1976), pp. 31-40) satisface

$$C = \frac{\pi (h/\cos A)^2 f}{\frac{1}{2}\pi D^2 \left(1 + \sin A - \frac{1}{2}\cos A\right)}.$$

Scalați problema pentru a evita polii. Găsiți cea mai mică rădăcină pozitivă  $A$  dacă  $h = 300$ ,  $C = 1200$ ,  $f = 0.8$  și  $D = 14$ .

## 29 Calcul numeric

**Problema 29.1.** (a) Utilizați interpolarea Hermite pentru a găsi un polinom de grad minim ce satisface

$$p(-1) = p'(-1) = 0, \quad p(0) = 1, \quad p(1) = p'(1) = 0.$$

Simplificați expresia lui  $p$  cât mai mult posibil.

(b) Presupunem că polinomul  $p$  de la (a) este utilizat pentru a aproxima funcția  $f(x) = [\cos(\pi x/2)]^2$  pe  $-1 \leq x \leq 1$ .

(b<sub>1</sub>) Exprimați eroarea  $(Rf)(x) = f(x) - p(x)$  (pentru un  $x \in [-1, 1]$  fixat) în funcție de o derivată corespunzătoare a lui  $f$ .

(b<sub>2</sub>) Găsiți o margine superioară a lui  $|(Rf)(x)|$  (pentru un  $x \in [-1, 1]$  fixat).

(b<sub>3</sub>) Estimați  $\max_{-1 \leq x \leq 1} |(Rf)(x)|$ .

**Problema 29.2.** Pentru curgerea turbulentă a unui fluid într-o conductă netedă, ecuația

$$1 = \sqrt{c_f} \left( -0.4 + 1.74 \ln \left( \text{Re} \sqrt{c_f} \right) \right)$$

modelează relația dintre factorul de frecare  $c_f$  și numărul lui Reynolds  $\text{Re}$ . Calculați  $c_f$  pentru  $\text{Re} = 10^4, 10^5, 10^6$ .

## 30 Calcul numeric

**Problema 30.1.** (a) Implementați metoda falsei poziții în MATLAB.

- (b) Considerăm o distribuție de probabilitate *continuă*, pentru care  $F$  (cdf) este disponibilă. Scrieți o funcție MATLAB ce calculează o cuantilă de ordin  $\alpha$  a acestei distribuții utilizând metoda falsei poziții. Atenție:  $F$  poate depinde de un număr variabil de parametrii.

**Problema 30.2.** Deduceți o formulă de cuadratură Gauss-Lobatto de forma

$$\int_{-1}^1 f(x)dx = w_1 f(-1) + w_2 f(x_1) + w_3 f(x_2) + w_4 f(1) + R(f).$$

Ce devine formula pentru un interval oarecare  $[a, b]$ ? Unde utilizează funcția MATLAB `quadl` această formulă?

## 31 Calcul numeric

**Problema 31.1.** Arătați că integrala polinomului de interpolare Hermite  $P$  cu nodurile duble 0 și  $h$  este

$$\int_0^h P(s)ds = h \frac{f(h) + f(0)}{2} - h^2 \frac{f'(h) - f'(0)}{12}.$$

Care este eroarea care se comite dacă se aproximează  $\int_0^h f(x)dx$  cu integrala polinomului de interpolare Hermite?

**Problema 31.2.** Fie forma pătratică  $z = ax^2 + bxy + cy^2 + dx + ey + f$ . Ecuația se poate normaliza, împărțind cu un coeficient nenul (de exemplu  $f \neq 0$ ). Mulțimile  $\{(x, y) : z = 0\}$  se numesc secțiuni conice. Ele se pot vizualiza cu funcția `contour`. Planetele au orbite eliptice. Iată 10 observații ale pozițiilor unei planete

$x$	1.02	.95	.87	.77	.67	.56	.44	.30	.16	.01
$y$	0.39	.32	.27	.22	.18	.15	.13	.12	.13	.15

- Determinați coeficienții formei pătratice care aproximează aceste date în sensul celor mai mici pătrate luând un coeficient egal cu 1 și rezolvând sistemul supradeterminat  $10 \times 5$ . Desenați orbita și cele 10 puncte date.
- Această problemă este aproape deficientă de rang. Pentru a vedea efectul perturbați datele ușor adăugând fiecărei coordonate de punct un număr aleator distribuit uniform în intervalul  $[-0.005, 0.005]$ . Calculați noii coeficienți pentru datele perturbate. Desenați orbita nouă pe același grafic cu cea veche. Comentați pe marginea diferențelor între coeficienți și orbite.

## 32 Calcul numeric

**Problema 32.1.** Deduceți o formulă de cuadratură de tip Gauss-Radau de forma

$$\int_0^1 f(x)dx = Af(0) + w_1f(x_1) + w_2f(x_2) + R(f).$$

**Problema 32.2.** Ecuația ce determină încărcarea critică pentru coloanele cu capitel îngroșat este dată în S. Timoshenko, *Theory of Elastic Stability*, McGraw Hill, New York, 1961. Valori potrivite ale parametrilor fizici pentru experimentele realizate de Timoshenko conduc la problema

$$\frac{1}{180} = \left( \frac{1 - \cos \frac{\pi}{10}}{\cos \frac{\pi}{10} - \cos z} \right) \frac{\sin z}{z}$$

și se dorește cea mai mică rădăcină pozitivă. Faceți o schiță a graficului pentru a vă face o idee asupra locației rădăcinii. Scalați pentru a evita dificultățile legate de poli și singularitatea aparentă în 0 și apoi calculați rădăcina.



## 33 Calcul numeric

**Problema 33.1.** Deduceți o formulă de cuadratură de tip Gauss-Radau de forma

$$\int_0^\infty e^{-x} f(x) dx = Af(0) + w_1 f(x_1) + w_2 f(x_2) + R(f).$$

**Problema 33.2.** Energia potențială a două sau mai multe molecule ce interacționează se numește energie de interacțiune van der Waal. Un calcul teoretic pentru doi atomi de heliu are energiile  $V(r)$  pentru diferite valori de distanțe internucleare  $r$  date mai jos. Energia se manifestă repulsiv ( $V > 0$ ) pentru  $r$  mic și atractiv ( $V < 0$ ) pentru valori mai mari ale lui  $r$ .

$r$ (bohr)	4.6	4.8	5.0	5.1	5.2
$V(r)$	32.11	9.0	-3.52	-7.11	-9.22
$r$ (bohr)	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7
$V(r)$	-10.74	-11.57	-11.95	-12.00	-11.73
$r$ (bohr)	5.8	5.9	6.0	6.5	7.0
$V(r)$	-11.23	-10.71	-10.13	-7.15	-4.77
$r$ (bohr)	7.5	8.0	9.0	10.0	
$V(r)$	-3.17	-2.14	-1.03	-0.54	

Să se aproximeze  $S(r)$  utilizând un spline cubic și să se reprezinte grafic. Aproximați derivata de ordinul I a lui  $V$  pe întregul domeniu de valori tabelate și  $\int_5^9 V(r) dr$ .

## 34 Calcul numeric

**Problema 34.1.** Presupunem că (1)  $\xi$  este un punct fix al funcției  $g$ , (2)  $g$  este de două ori continuu derivabilă într-o vecinătate a lui  $\xi$ , și (3)  $g'(\xi) \neq 1$ . Considerăm metoda iterativă definită prin:

$$z_{i+1} = g(g(z_i)) - \frac{[g(g(z_i)) - g(z_i)]^2}{g(g(z_i)) - 2g(z_i) + z_i}.$$

- (a) Dezvoltând  $g(z_i)$  și  $g(g(z_i))$  cu formula lui Taylor în jurul lui  $\xi$ , arătați că
  - (a1)  $\xi$  este limita lui  $(z_n)$ .
  - (a2) Convergența este pătratică.
- (b) Implementați această metodă în MATLAB.
- (c) Utilizați funcția MATLAB de la punctul precedent pentru a găsi o rădăcină reală a ecuației  $x^3 - x - 1 = 0$ .

## 35 Calcul numeric

**Problema 35.1.** O populație este guvernată de capacitatea variabilă a mediului de a o susține. Un model simplu este dat de ecuația diferențială

$$P'(t) = kP(t) \left[ M \left( 1 - r \cos \frac{\pi}{6} t \right) - P(t) \right],$$

unde  $t$  este timpul măsurat în luni,  $P(t)$  este populația la momentul  $t$ , iar ceilalți parametri sunt constante cunoscute. Această ecuație are soluția

$$P(t) = \frac{P(0)F(t)}{1 + kP(0) \int_0^t F(s) \mathrm{d} s},$$

unde

$$F(t) = \exp \left[ kM \left( t - \frac{6r}{\pi} \sin \frac{\pi t}{6} \right) \right].$$

Presupunând că  $k = 0.001$ ,  $M = 1000$ ,  $r = 0.3$ ,  $P(0) = 250$  calculați  $P(t)$  pentru  $t = 0, 3, 6, 9, \dots, 36$ .

**Problema 35.2.** Pentru  $f \in C^6[-1, 1]$ , găsiți o formulă de cuadratură de forma

$$\int_{-1}^1 |x| f(x) dx = A_1 f(x_1) + A_2 f(x_2) + A_3 f(x_3) + R_3(f)$$

care să aibă grad maxim de exactitate.

## 36 Calcul numeric

**Problema 36.1.** Fie matricea

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -5 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 10 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & -6 \end{bmatrix}$$

și vectorii

$$b_1 = \begin{bmatrix} 7 & 2 & 13 & -4 \end{bmatrix}^T$$

$$b_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^T$$

$$b_3 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 5 \end{bmatrix}^T$$

$$b_4 = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}^T.$$

Să se rezolve sistemele  $Ax = b_i$ ,  $i = \overline{1, 4}$  eficient.

**Problema 36.2.** (a) Arătați că iterația Newton

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left( x_n + \frac{a}{x_n} \right), \quad a > 0$$

pentru calculul rădăcinii pătrate  $\alpha = \sqrt{a}$  satisface

$$\frac{x_{n+1} - \alpha}{(x_n - \alpha)^2} = \frac{1}{2x_n}$$

Obțineți de aici eroarea asimptotică.

(b) Care este formula analoagă pentru rădăcina cubică?

## 37 Calcul numeric

**Problema 37.1.** Să se rezolve sistemul

$$\begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 & 4 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 4 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 4 & -1 \\ 4 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 4 \\ -1 & 4 & -1 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

cu metodele Jacobi si Gauss-Seidel. Câți pași sunt necesari? Care este condiția de oprire?

**Problema 37.2.** Se consideră metoda lui Newton

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left( x_n + \frac{a}{x_n} \right), \quad a > 0$$

pentru calculul rădăcinii pătrate  $\alpha = \sqrt{a}$ . Fie  $d_n = x_{n+1} - x_n$ .

(a) Arătați că

$$x_n = \frac{a}{d_n + \sqrt{d_n^2 + a}}$$

(b) Utilizați (a) pentru a arăta că

$$|d_{n+1}| = \frac{d_n^2}{2\sqrt{d_n^2 + a}}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Discutați semnificația acestui rezultat pentru comportarea globală a iterației Newton în acest caz.

(c) Arătați că, numărul de cifre corecte se dublează (practic) la fiecare pas.

(Indicație. Punem  $x_n = \sqrt{a}(1 + \delta)$  și calculăm  $x_{n+1}$ ).

## 38 Calcul numeric

**Problema 38.1.** Fie  $f(x) = x^{10} - 10x^8 + 33x^6 - 40x^4 + 16x^2$ .

- (a) Utilizați `ezplot` (sau `plot`) pentru a reprezenta  $f(x)$  pe  $[-2, 2]$ .
- (b) Utilizați toolbox-ul Symbolic sau Maple pentru a găsi o expresie analitică a integralei  $\int_{-2}^2 f(x) dx$ .
- (c) Ce se întâmplă dacă definiți

$$F = \text{inline}('x^{10} - 10 * x^8 + 33 * x^6 - 40 * x^4 + 16 * x^2')$$

și utilizați o cuadratură adaptivă? De ce?

- (d) Cum evitați dificultatea? Justificați?
- (e) Ce se întâmplă dacă calculați cu metoda lui Romberg?

**Problema 38.2.** Considerăm ecuația algebrică

$$x^n + ax - 1 = 0, \quad a > 0, \quad n \geq 2.$$

- (a) Arătați că ecuația are exact o rădăcină pozitivă  $\xi(a)$ .
- (b) Obțineți o formulă pentru  $(\text{cond}\xi)(a)$ .
- (c) Obțineți margini superioare și inferioare pentru  $(\text{cond}\xi)(a)$ .

## 39 Calcul numeric

**Problema 39.1.** (a) Construiți o formulă Newton-Cotes cu ponderi

$$\int_0^1 f(x)x^\alpha dx = a_0f(0) + a_1f(1) + R(f), \quad \alpha > -1.$$

Explicați de ce formula are sens.

(b) Deduceți o expresie a erorii  $R(f)$  în funcție de o derivată adecvată a lui  $f$ .

(c) Din formulele de la (a) și (b) deduceți o formulă de integrare numerică pentru  $\int_0^h g(t)t^\alpha dt$  ( $h > 0$  mic) (inclusiv termenul rest).

**Problema 39.2.** Absorbția sunetului (la 20°, 40% umiditate) ca funcție de frecvența  $f$  este dată în tabela:

$f$	> 20	> 40	63	> 100	200
$A(f)$	0.008	0.030	0.070	0.151	0.359
$f$	> 400	800	> 1250	2000	> 4000
$A(f)$	0.592	0.935	1.477	2.870	9.618
$f$	10000	> 16000	> 40000	> 80000	
$A(f)$	53.478	122.278	429.310	850.536	

Utilizați un spline deBoor și punctele marcate cu (>) pentru a interpola în următoarele două moduri.

(a) se iau datele așa cum sunt;

(b)  $\log f$  în raport cu  $\log A(f)$ .

Care este mai bun? Reprezentați grafic varianta mai bună. Comparați valorile în punctele nemarcate cu valorile aproximative.

## 40 Calcul numeric

**Problema 40.1.** (a) Folosind interpolarea Newton, determinați un polinom de gradul  $p$  ce interpolează  $f$  în  $x = 0$ ,  $x = 1$  și  $f'$  în  $x = 1$ . Exprimați termenul rest în funcție de o derivată adecvată a lui  $f$  (presupusă a fi continuă pe  $[0, 1]$ ).

(b) folosind rezultatul de la (a), deduceți o formulă de integrare numerică de tipul

$$\int_0^1 f(x)dx = a_0 f(0) + a_1 f(1) + b_0 f'(1) + R(f)$$

Determinați  $a_0, a_1, b_0$  și  $R(f)$ .

(c) Transformați rezultatul de la (b) pentru a obține o formulă de integrare numerică (cu rest) pentru  $\int_c^{c+h} y(t)dt$ , unde  $h > 0$ .

**Problema 40.2.** Analiza ecuației lui Schrödinger pentru o particulă de masă  $m$  într-un potențial rectangular ne conduce la o mulțime discretă de valori ale energiei totale  $E$  care sunt soluțiile unei perechi de ecuații transcendente. Una dintre aceste ecuații este

$$\cot\left(\frac{\alpha}{h}\sqrt{2mV_0}\sqrt{E/V_0}\right) = \sqrt{\frac{E/V_0}{1 - E/V_0}},$$

unde

$$\bar{h} = \frac{h}{2\pi}, \quad h = 6.625 \times 10^{-27} \text{ erg} \cdot \text{sec},$$

este constanta lui Planck. Găsiți valorile lui  $E$  ce satisfac această ecuație. Utilizați datele următoare, care corespund unui model simplificat al atomului de hidrogen:

$$m = 9.109 \times 10^{-28} g$$

$$V_0 = 2.179 \times 10^{-11} \text{ erg}$$

$$a = 5.292 \times 10^{-9} \text{ cm}.$$

Pe unele mașini va fi nevoie să scalați unele variabile pentru a evita depășirea flotantă inferioară. Fiți atenți și la alegerea erorii dacă doriți un răspuns precis.



## 41 Calcul numeric

**Problema 41.1.** Estimați numărul de subintervale necesar pentru a calcula

$\int_0^1 e^{-x^2} dx$  cu 6 zecimale corecte (eroarea absolută  $\leq \frac{1}{2} \times 10^{-6}$ )

- (a) cu regula trapezelor;
- (b) cu formula repetată a lui Simpson.

**Problema 41.2.** Să se calculeze  $\sqrt{115}$  cu trei zecimale exacte folosind interpolarea Lagrange.

## 42 Calcul numeric

**Problema 42.1.** Generați 11 puncte luând  $t_k = (k - 1)/10$  și  $y_k = \operatorname{erf}(t_k)$ ,  $k = 1, \dots, 11$ .

- (a) Aproximați discret datele în sensul celor mai mici pătrate cu polinoame având gradul de la 1 la 10. Comparați aproximantele cu  $\operatorname{erf}(t)$  pentru valori ale lui  $t$  situate între punctele  $t_k$ . Cum depinde eroarea maximă de gradul polinomului?
- (b) Deoarece  $\operatorname{erf}(t)$  este o funcție pară în  $t$ , este rezonabil să se aproximeze datele printr-o combinație liniară de puteri impare ale lui  $t$ ,

$$\operatorname{erf}(t) \approx c_1 t + c_2 t^3 + \dots + c_n t^{2n-1}.$$

Cum depind erorile între punctele  $t_k$  de  $n$ ?

- (c) Polinoamele nu sunt aproximante bune pentru  $\operatorname{erf}(t)$ , deoarece sunt nemărginite, pe când  $\operatorname{erf}(t)$  tinde către 1 pentru  $t$  mare. Utilizând aceleași date, aproximați utilizând un model de forma

$$\operatorname{erf}(t) \approx c_1 + e^{-t^2} (c_2 + c_3 z + c_4 z^2 + c_5 z^3)$$

unde  $z = 1/(1 + t)$ . Cum sunt erorile în valori ale lui  $t$  situate între punctele  $t_k$ , comparativ cu modelul polynomial?

**Problema 42.2.** Pornind de la o ecuație convenabilă, deduceți o metodă de aproximare a lui  $\sqrt[3]{a}$ . Cum se alege valoarea de pornire? care este criteriul de oprire?

## 43 Calcul numeric

**Problema 43.1.** (a) Se consideră o formulă de cuadratură de tipul

$$\int_0^1 f(x)dx = \alpha f(x_1) + \beta[f(1) - f(0)] + R(f) \quad (3)$$

Determinați  $\alpha, \beta, x_1$  astfel încât gradul de exactitate să fie cât mai mare posibil. Cât este gradul maxim care se poate obține?

- (b) Utilizați teoria interpolării și teorema lui Peano pentru a obține o margine superioară a lui  $|R(f)|$  în funcție de  $\|f^{(r)}\|_\infty = \max_{0 \leq x \leq 1} |f^{(r)}(x)|$  pentru un  $r$  potrivit.
- (c) Adaptați (3), inclusiv marginea pentru  $|R(f)|$ , pentru a aproxima o integrală de forma  $\int_c^{c+h} f(t)dt$ , unde  $c$  este o constantă și  $h > 0$ .
- (d) Aplicați rezultatul de la (c) pentru a obține o formulă repetată pentru  $\int_a^b f(t)dt$  subdivizând  $[a, b]$  în  $n$  subintervale de lungime totală  $h = \frac{b-a}{n}$ . Găsiți o margine superioară a erorii totale.

**Problema 43.2.** Cartea P. Davis, J. Voge, *Propagation of Waves*, Pergamon Press, New York, 1969 conține o ecuație cubică pentru parametrul  $s$  în contextul corecției pentru curbura pământului în zona de interferență. Ecuația

$$s^3 - \frac{3}{2}s^2 - \frac{s}{2} \left( \frac{1+u}{v^2} - 1 \right) + \frac{1}{2v^2} = 0$$

depinde de doi parametri,  $u$  și  $v$ , care se obțin din înălțimile turnurilor, distanța între stații și raza pământului. Valorile reprezentative sunt  $v = 1/291$ ,  $u = 30$ . Rădăcina de interes este cea mai mică rădăcină, dar calculațiile pe toate. Valoarea funcției în cele mai mari două rădăcini este mare. Sunt ele imprecise?

## 44 Calcul numeric

**Problema 44.1.** Considerăm problema determinării unui polinom  $p \in \mathbb{P}_n$  astfel încât

$$p(x_0) = f(x_0), \quad p'(x_i) = f'_i, \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

unde  $x_i, i = 1, 2, \dots, n$  sunt noduri distincte. Această interpolare nu este nici Lagrange nici Hermite (de ce?). Arătați că problema are soluție unică și explicați cum se poate obține. Găsiți restul.

**Problema 44.2.** Ecuația temperaturii  $T$  pentru care otoluidina are o presiune de vaporizare de 500 mm Hg este

$$21.306 - \frac{3480.3}{T} - 5.081 \log_{10} T = 0.$$

Calculați toate rădăcinile.

## 45 Calcul numeric

**Problema 45.1.** (a) Determinați un spline pătratic  $s_2(x)$  pe  $[-1, 1]$  cu un singur nod  $x = 0$  astfel ca  $s_2(x) = 0$  pe  $[-1, 0]$  și  $s_2(1) = 1$ .

(b) Se consideră funcția  $s(x)$  de forma

$$s(x) = c_0 + c_1x + c_2x^2 + c_3s_2(x), \quad c_i = \text{const}$$

unde  $s_2(x)$  a fost definit la (a). Ce fel de funcție este  $s$ ? Determinați  $s$  astfel ca

$$s(-1) = f_{-1}, \quad s(0) = f_0, \quad s'(0) = f'_0, \quad s(1) = f_1$$

unde  $f_i = f(i)$ ,  $f'_i = f'(i)$ ,  $i = -1, 0, 1$ .

(c) Ce formula de cuadratură se obține dacă se aproximează  $\int_{-1}^1 f(x)dx$  prin  $\int_{-1}^1 s(x)dx$ , cu  $s$  obținut la (b)?

**Problema 45.2.** Un fir cu greutatea de 0.7708689229 kg/m este suspendat între două turnuri de înălțimi egale, la același nivel la o distanță de 152.4 m. Dacă încovoierea firului este de 15.24 m, determinați tensiunea maximă în fir. Ecuațiile de rezolvat sunt

$$c + 15.24 = c \cosh \frac{152.4}{2c}$$
$$T = 0.7708689229(c + 15.24).$$

## 46 Calcul numeric

**Problema 46.1.** Se consideră datele  $f(0) = 5$ ,  $f(1) = 3$ ,  $f(3) = 5$ ,  $f(4) = 12$ .

- (a) Utilizați forma Newton pentru a obține polinomul de interpolare corespunzător  $L_3f$ .
- (b) Datele sugerează că  $f$  are un minim între  $x = 1$  și  $x = 3$ . Găsiți o valoare aproximativă a punctului de minim  $x_{min}$ .

**Problema 46.2.** Problema aceasta se referă la răcirea unei sfere. Presupunem că sfera este de rază  $a$  și temperatura ei inițială este  $V$ . Ea se răcește după legea lui Newton cu conductivitatea  $k$ , constanta  $\varepsilon$  și difuzia  $h^2$  după ce a fost pusă să se răcească la aer la temperatura de  $0^\circ \text{C}$ . Se poate arăta că temperatura  $\theta(r, t)$  la momentul de timp  $t > 0$  și raza  $r$  este

$$\theta(r, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{A_n}{r} e^{-\gamma_n^2 h^2 t} \sin \gamma_n r.$$

Aici,  $\gamma_n$  sunt rădăcinile pozitive ale ecuației

$$\gamma_n \cos \gamma_n a - \left( \frac{1}{a} - \frac{\varepsilon}{k} \right) \sin \gamma_n a = 0$$

și

$$A_n = \frac{2\gamma_n V}{[\gamma_n a - \cos \gamma_n a \sin \gamma_n a]} \int_0^a r \sin \gamma_n r dr.$$

Pentru o sferă de oțel răcită la aer la  $0^\circ \text{C}$ , presupunem că temperatura inițială este  $V = 100^\circ \text{C}$  și că raza este  $a = 0.30m$ . Constantele corespunzătoare sunt  $h^2 = 1.73 \times 10^{-5}$ ,  $\varepsilon = 20$  și  $k = 60$ . Găsiți cele trei cele mai mici valori ale lui  $\gamma_n a$  și utilizați-le pentru a calcula  $A_1$ ,  $A_2$  și  $A_3$ . Aproximați temperatura pentru  $r = 0.25$ , pentru  $t = 10^k$  secunde,  $k = 2, 3, 4, 5$ .

## 47 Calcul numeric

**Problema 47.1.** Fie  $f$  o funcție definită pe  $[0, 3]$  despre care se știe că

$$f(0) = 1, \quad f(1) = 2, \quad f'(1) = -1, \quad f(3) = f'(3) = 0.$$

- (a) Estimați  $f(2)$  folosind interpolarea Hermite.
- (b) Estimați eroarea maximă posibilă a rezultatului de la (a) dacă se știe, în plus, că  $f \in C^5[0, 3]$  și  $|f^{(5)}(x)| \leq M$  pe  $[0, 3]$ . Exprimați răspunsul în funcție de  $M$ .

**Problema 47.2.** Să se rezolve sistemul

$$2x^2 - x + y^2 - z = 0$$

$$32x^2 - y^2 + 20z = 0$$

$$y^2 - 14xz = 0$$

cu o precizie de  $10^{-4}$ , în vecinătatea punctului  $(0.5, 1, 0)$ .

## 48 Calcul numeric

**Problema 48.1.** (a) Utilizați metoda coeficienților nedeterminați pentru a construi o formulă de cuadratură de tipul

$$\int_0^1 f(x)dx = af(0) + bf(1) + cf''(\gamma) + R(f)$$

cu gradul maxim de exactitate  $d$ , nedeterminatele fiind  $a, b, c$  și  $\gamma$ .

(b) Arătați că nucleul lui  $K_d$  al restului formulei obținute la (a) are semn constant și exprimați restul sub forma

$$R(f) = e_{d+1}f^{(d+1)}(\xi), \quad 0 < \xi < 1.$$

**Problema 48.2.** Rezolvați sistemul

$$a_{11}x_1 \sin \theta + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 \cos \theta = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 \cos \theta + a_{23}x_3 = b_2$$

$$a_{31}x_1 \cos \theta + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 \sin \theta = b_3$$

$$a_{41}x_1 + a_{42}x_2 \sin \theta + a_{43}x_3 = b_4$$

cu necunoscutele  $x_1, x_2, x_3$  și  $\theta$ .



## 49 Calcul numeric

**Problema 49.1.** Intr-o tabelă cu funcții Bessel

$$J_0(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos(x \sin \theta) d\theta,$$

unde  $x$  este incrementat cu pasul  $h$ , cât de mic trebuie să fie ales  $h$  pentru ca tabela să fie „interpolabilă liniar” cu o eroare mai mică decât  $10^{-6}$  în modul? (Adică, dacă interpolăm liniar între două noduri consecutive tabelate, modulul erorii să fie mai mic decât valoarea dată.)

**Problema 49.2.** Un mediu semi-infinit este încălzit uniform la temperatura inițială  $T_0 = 70^\circ F$ . La momentul  $t > 0$ , un flux de căldură cu densitatea constantă  $q = 300$  Btu/hr sq ft este menținut pe suprafața  $x = 0$ . Cunoscând conductivitatea termică  $k = 1.0$  Btu/hr/ft/ $^\circ F$  și difuzivitatea termică  $\alpha = 0.04$  sq ft/hr, temperatura rezultată  $T(x, t)$  este dată de

$$T(x, t) = T_0 + \frac{q}{k} \left[ 2\sqrt{\frac{\alpha t}{\pi}} e^{-x^2/4\alpha t} - x \left( 1 - \operatorname{erf} \left( \frac{x}{2\sqrt{\alpha t}} \right) \right) \right],$$

unde

$$\operatorname{erf}(y) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^y e^{-z^2} dz$$

este funcția specială de eroare, disponibilă în MATLAB și alte pachete. Găsiți timpul  $t$  necesar pentru ca temperatura la distanțele  $x = 0.1, 0.2, \dots, 0.5$  să atingă o valoare de  $T = 100^\circ F$ . Utilizați o eroare absolută de  $10^{-8}$  și o eroare relativă de  $10^{-6}$ .

## 50 Calcul numeric

**Problema 50.1** (Alegerea valorii de pornire pentru metoda lui Newton). .  
Dacă  $f(a)f(b) < 0$  și  $f'(x)$  și  $f''(x)$  asunt nenule și își păstrează semnul pe  $[a, b]$ , atunci alegând aproximația inițială  $x_0 \in [a, b]$  astfel încât

$$f(x_0)f''(x_0) > 0, \quad (4)$$

este posibil, utilizând metoda lui Newton, să se calculeze rădăcina unică  $\xi$  a lui  $f(x) = 0$  cu orice precizie. ( $f \in C^2[a, b]$ ).

**Problema 50.2.** Calculați integrala

$$\int_0^{\pi} \frac{dx}{4 + \sin 20x}$$

cu aceeași metodă pe întreg intervalul și pe un interval mai mic, exploatând periodicitatea. Care metodă este mai bună? Considerați următoarele metode:

- (a) o cuadratură adaptivă ;
- (b) metoda lui Romberg.
- (c) o cuadratură gaussiană.

## 51 Calcul numeric

**Problema 51.1.** Să se arate că pentru polinomul de interpolare Hermite cu noduri duble avem

$$(H_{2m+1}f)(x) = \sum_{k=0}^m h_{k0}(x)f(x_k) + \sum_{k=0}^m h_{k1}(x)f'(x_k),$$

unde

$$\begin{aligned} h_{k0}(x) &= [1 - 2(x - x_k)l'_k(x_k)]l_k^2(x) \\ h_{k1}(x) &= (x - x_k)l_k^2(x), \end{aligned}$$

iar  $l_k$  sunt polinoamele fundamentale Lagrange.

**Problema 51.2.** Funcția Bessel de ordinul zero  $J_0(x)$  se poate calcula cu formula

$$J_0(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos(x \sin \theta) d\theta.$$

Utilizați formula pentru a evalua  $J_0(x)$  pentru  $x = 1.0, 2.0, 3.0$ . comparați rezultatul obținut cu cel furnizat de MATLAB.

## 52 Calcul numeric

**Problema 52.1.** Pentru ecuația  $f(x) = 0$  definim

$$\begin{aligned} y^{[0]}(x) &= x \\ y^{[1]}(x) &= \frac{1}{f'(x)} \\ &\dots \\ y^{[m]}(x) &= \frac{1}{f'(x)} \frac{d}{dx} y^{[m-1]}(x), \quad m = 2, 3, \dots \end{aligned}$$

Considerăm iterația definită de funcția

$$\varphi_r(x) := \sum_{m=0}^r (-1)^m \frac{y^{[m]}(x)}{m!} [f(x)]^m$$

Dacă  $r = 1$  se obține metoda lui Newton. Arătați că  $\varphi_r(x)$  definește o iterație  $x_{n+1} = \varphi_r(x_n)$ ,  $n = 0, 1, 2, \dots$  ce converge local cu ordinul exact  $p = r + 1$  către o rădăcină  $\alpha$  a ecuației dacă  $y^{[r+1]}(\alpha)f'(\alpha) \neq 0$ .

**Problema 52.2.** O sferă de rază  $R$  plutește pe jumătate scufundată într-un lichid. Dacă este împinsă în jos până când planul diametral este la distanța  $p$  ( $0 < p \leq R$ ) sub suprafața lichidului și apoi este eliberată, perioada vibrației care se produce astfel este

$$T = 8R \sqrt{\frac{R}{g(6R^2 - p^2)}} \int_0^{2\pi} \frac{dt}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 t}},$$

unde  $k^2 = p^2/(6R^2 - p^2)$  și  $g = 10\text{m/s}^2$ . Pentru  $R = 1$  și  $p = 0.5, 0.75, 1.0$  găsiți  $T$ .

## 53 Calcul numeric

**Problema 53.1.** Fie  $\alpha$  un zero simplu al lui  $f$  și  $f \in C^p$  în vecinătatea lui  $\alpha$ , unde  $p \geq 3$ . Arătați că: dacă  $f''(\alpha) = \dots = f^{(p-1)}(\alpha) = 0$ ,  $f^{(p)}(\alpha) \neq 0$ , atunci metoda lui Newton aplicată lui  $f(x) = 0$  converge local către  $\alpha$  cu ordinul  $p$ . Determinați constanta de eroare asimptotică.

**Problema 53.2.** Evaluați  $\int_0^1 \frac{\exp(x)}{\sqrt{x}} dx$  utilizând o cuadratură adaptivă

- (a) rezolvând problema așa cum este enunțată;
- (b) utilizând o tehnică de dezvoltare în serie;
- (c) utilizând o schimbare de variabilă.

Comparați rezultatele.

## 54 Calcul numeric

**Problema 54.1.** Iterația

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n) - \frac{1}{2}f''(x_n)\frac{f(x_n)}{f'(x_n)}}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

pentru rezolvarea ecuației  $f(x) = 0$  se numește metoda lui Halley.

(a) Arătați că metoda se poate obține aplicând metoda lui Newton ecuației  $g(x) = 0$ ,  $g(x) = f(x)/\sqrt{f'(x)}$ .

(b) Presupunând că  $\alpha$  este o rădăcină simplă a ecuației și  $x_n \rightarrow \alpha$  când  $n \rightarrow \infty$ , arătați că ordinul exact de convergență este  $p = 3$ , înafară de cazul când

$$(Sf)(x) := \frac{f'''(x)}{f'(x)} - \frac{3}{2} \left( \frac{f''(x)}{f'(x)} \right)^2$$

se anulează în  $x = \alpha$  și atunci ordinul de convergență poate fi mai mare decât 3.

(c) Cum arată metoda lui Halley pentru ecuația  $f(x) = x^\lambda - a$ ,  $a > 0$ ?

**Problema 54.2.** Utilizați o cuadratură adaptivă cu diverse toleranțe pentru a aproxima  $\pi$  prin

$$\pi = \int_{-1}^1 \frac{2}{1+x^2} dx.$$

Cum variază precizia și numărul de evaluări de funcție odată cu toleranța?

## 55 Calcul numeric

**Problema 55.1.** Arătați că dacă  $A$  este strict diagonal dominantă pe linii sau pe coloane, atunci metoda lui Jacobi este convergentă.

**Problema 55.2.** Utilizați Maple sau toolbox-ul Symbolic pentru a găsi valoarea exactă a

$$\int_0^1 \frac{x^4(1-x)^4}{1+x^2} dx.$$

- (a) De ce aproximare faimoasă vă amintește această integrală?
- (b) Prezintă evaluarea numerică a acestei integrale cu o cuadratură adaptivă dificultăți?

## 56 Calcul numeric

**Problema 56.1.** Se consideră următoarea metodă de rezolvare a ecuației  $f(x) = 0$ :

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_0)}.$$

Să se determine ordinul de convergența și eroarea asimptotică.

**Problema 56.2.** Integrala exponențială

$$E_1(x) = \int_1^{\infty} e^{-tx} \frac{dx}{x}, \quad t > 0,$$

apare în studiul transferului radiativ și în teoria transportului. Integrala se transformă succesiv

$$\begin{aligned} E_1(t) &= \int_1^{\infty} e^{-x} \frac{dx}{x} + \int_t^1 e^{-x} \frac{dx}{x} \\ &= - \left\{ \int_1^{\infty} e^{-x} \frac{dx}{x} - \int_0^1 (1 - e^{-x}) \frac{dx}{x} \right\} \\ &\quad + \int_t^1 \frac{dx}{x} + \int_0^t (1 - e^{-x}) \frac{dx}{x}. \end{aligned}$$

Expresia dintre acolade are valoarea aproximativă  $\gamma = 0.5772156649015329$  (constanta lui Euler). Al doilea termen se integrează analitic la  $-\ln t$ . Deci,

$$E_1(t) = -\gamma - \ln t + \int_0^t (1 - e^{-x}) \frac{dx}{x}.$$

Evaluați  $E_1(t)$  pentru  $t = 1.0, 2.0, 3.0$ . Apare vreo dificultate datorită comportării integrandului în  $x = 0$ ?



## 57 Calcul numeric

**Problema 57.1.** Fie  $p > 1$ . Se consideră şirurile

$$x_n = \sqrt{\underbrace{p + \sqrt{p + \dots \sqrt{p}}}_{n \text{ ori}}}$$

şi

$$y_n = \frac{1}{\underbrace{p + \frac{1}{p + \frac{1}{p + \dots}}}_{n \text{ ori}}},$$

Demonstraţi convergenţa lor şi determinaţi limitele folosind metoda aproximaţiilor succesive.

**Problema 57.2.** Potenţialul în interiorul cercului unitate datorat unui potenţial dat pe frontieră,  $f(\theta)$ , este dat de integrala lui Poisson

$$\varphi(r, \theta) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1 - r^2}{1 - 2r \cos(\theta - \theta') + r^2} f(\theta') d\theta'.$$

Pot să apară dificultăţi la evaluarea integrandului când  $r \rightarrow 1$ , deoarece pentru  $\theta' = \theta$ ,

$$\frac{1 - r^2}{1 - 2r \cos(\theta - \theta') + r^2} = \frac{1 + r}{1 - r}.$$

Problema nu este prea severă deoarece termenul este mare doar dacă  $r$  este foarte apropiat de 1, dar, în principiu, nu ar trebui să fie nici o problemă căci dacă  $r \rightarrow 1$ ,  $\varphi(r, \theta) \rightarrow f(\theta)$ . Observând că

$$1 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1 - r^2}{1 - 2r \cos(\theta - \theta') + r^2} d\theta',$$

se obţine forma

$$\varphi(r, \theta) = f(\theta) + \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1 - r^2}{1 - 2r \cos(\theta - \theta') + r^2} [f(\theta') - f(\theta)] d\theta',$$

care are proprietăţi numerice mai bune. Verificaţi aceasta evaluând  $\varphi(r, \theta)$  pentru  $r$  apropiat de 1 cu  $f(\theta) = \sin \theta$ . Soluţia analitică este  $\varphi(r, \theta) = \sin \theta$ .

## 58 Calcul numeric

**Problema 58.1.** Se consideră aproximația succesivă dată de funcția  $F(x) = x - f(x)f'(x)$ , unde  $f(r) = 0$  și  $f'(r) \neq 0$ . Impuneți condiții precise asupra lui  $f$  astfel ca metoda să convergă cel puțin cubic către  $r$  dacă se pornește suficient de aproape de  $r$ .

**Problema 58.2.** Fie funcția  $f : [-2, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = \frac{1}{(x+(1-x)^2)}$  și 20 de puncte echidistante pe domeniul de definiție. Să se aproximeze  $f$  printr-un polinom de grad 3 prin metoda celor mai mici pătrate și printr-un spline deBoor. Să se reprezinte pe două grafice funcția și fiecare din aproximate (cu `subplot`).

## 59 Calcul numeric

**Problema 59.1.** (a) Fie clasa  $\Phi_n$  de funcții de aproximare cu proprietățile date în continuare. Orice  $\varphi \in \Phi_n$  este definită pe un interval  $[a, b]$  simetric față de origine (i.e.  $a = -b$ ) și  $\varphi(t) \in \Phi_n$  implică  $\varphi(-t) \in \Phi_n$ . Fie  $d\lambda(t) = \omega(t)dt$ , cu  $\omega(t)$  funcție pară pe  $[a, b]$  (i.e.  $\omega(-t) = \omega(t)$ ). Arătați că dacă  $f$  este o funcție pară pe  $[a, b]$ , atunci și aproximanta sa în sensul celor mai mici pătrate  $\widehat{\varphi}_n \in \Phi_n$  este pară.

(b) Considerăm ”hat function”

$$f(t) = \begin{cases} 1-t, & t \in [0, 1] \\ 1+t, & t \in [-1, 0]. \end{cases}$$

Determinați aproximația sa în sensul celor mai mici pătrate pe  $[-1, 1]$  printr-o funcție quadratică. (Utilizați  $d\lambda(t) = dt$ ). Simplificați calculele utilizând (a). Determinați punctele în care eroarea se anulează.

**Problema 59.2.** Funcția beta este definită prin

$$B(z, w) = \int_0^1 t^{z-1}(1-t)^{w-1} dt.$$

Scrieți un fișier M `mybeta` care aproximează  $B(z, w)$  folosind o cuadratură adaptivă. Comparați funcția dumneavoastră cu funcția MATLAB `beta`.

## 60 Calcul numeric

**Problema 60.1.** Determinați aproximanta în sensul celor mai mici pătrate

$$\varphi(t) = \frac{c_1}{1+t} + \frac{c_2}{(1+t)^2}, \quad t \in [0, 1]$$

a funcției  $f(t) = e^{-t}$ , luând  $d\lambda(t) = dt$  on  $[0, 1]$ . Determinați numărul de condiționare  $\text{cond}_\infty A = \|A\|_\infty \|A^{-1}\|_\infty$  al matricei  $A$  a coeficienților ecuațiilor normale. Calculați eroarea  $f(t) - \varphi(t)$  în  $t = 0$ ,  $t = 1/2$ , și  $t = 1$ .

(Indicație: Integrala

$$\int_1^\infty t^{-m} e^{-xt} dt = E_m(x) = E_i(m, x)$$

se numește a „ $m$ -a integrală exponențială”. Exprimați rezultatul cu ajutorul acestei funcții)

**Problema 60.2.** Funcția  $\Gamma(x)$  se definește prin

$$\Gamma(x) = \int_0^\infty t^{x-1} e^{-t} dt.$$

Încercarea de evaluare numerică a acestei integrale cu o cuadratură este ineficientă și nefiabilă. Dificultățile sunt cauzate de intervalul infinit și de variațiile mari ale valorilor integrandului. Scrieți un fișier `M mygamma` care utilizează o cuadratură adaptivă pentru a calcula  $\Gamma(x)$ . Comparați funcția dumneavoastră cu funcția MATLAB `gamma`. Pentru ce valori ale lui  $x$  funcția dumneavoastră este rezonabil de rapidă și precisă? Pentru ce valori ale lui  $x$  devine lentă și imprecisă?

## 61 Calcul numeric

**Problema 61.1.** Determinați o formulă de cuadratură de forma

$$\int_1^2 (x^4 - 1)f(x)dx = A_1f(x_1) + A_2f(x_2) + A_3f(x_3) + R_3(f),$$

cu grad maxim de exactitate.

**Problema 61.2.** La realizarea titrării potențimetrice se obține o curbă a diferențelor de potențial în funcție de volumul de titrant adăugat. Tabela de mai jos dă măsurătorile pentru titrarea potențimetrică a soluției de  $\text{Fe}^{2+}$  cu soluția  $0.1095N \text{ Ce}^{4+}$  utilizând electrozi de platină și calomel.

Sol. adăugată (ml)	1.0	5.0	10.0	15.0	20.0	21.0	22.0
$E(mV)$	373	415	438	459	491	503	523
Sol. adăugată (ml)	22.5	22.6	22.7	22.8	22.9	23.0	23.1
$E(mV)$	543	550	557	565	575	590	620
Sol. adăugată (ml)	23.2	23.3	23.4	23.5	24.0	26.0	30.0
$E(mV)$	860	915	944	958	986	1067	1125

Calculați un spline cubic pentru aceste date (utilizând cam 15 puncte de interpolare). Reprezentați grafic spline-ul pe intervalul  $[0, 24]$ . Cât de bine se comportă? Problema fizică are un punct de inflexiune. Este acest lucru adevărat și pentru spline?

## 62 Calcul numeric

**Problema 62.1.** Să se determine un polinom de interpolare de grad minim care verifică:

$$\begin{aligned}P'(0) &= f'(0); \\ P(h) &= f(h), \quad h > 0, f \in C^2[0, h].\end{aligned}$$

Aceasta interpolare nu este nici Lagrange, nici Hermite. De ce? Determinați expresia restului.

**Problema 62.2.** Determinați o formulă de cuadratură de forma

$$\int_{-1}^1 \frac{f(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx = \sum_{k=1}^{10} A_k f(x_k) + R_3(f),$$

care să aibă grad maxim de exactitate. Să se aplice formula pentru a calcula

$$\int_{-1}^1 \frac{x e^{-x^2}}{\sqrt{1-x^2}} dx.$$

Verificare.

## 63 Calcul numeric

**Problema 63.1.** Determinați o formulă de cuadratură de forma

$$\int_0^1 xf(x)dx = A_1f(x_1) + A_2f(x_2) + R_2(f),$$

care să aibă grad maxim de exactitate.

**Problema 63.2.** Determinați toate rădăcinile ecuației

$$x^4 - x^3 + \frac{5}{4}x^2 - x + \frac{1}{4} = 0$$

cu metoda lui Newton. Atenție, ecuația are o rădăcină reală dublă și două complexe.

## 64 Calcul numeric

**Problema 64.1.** Concepeți o metodă pentru a calcula  $\sqrt[20]{a}$ ,  $a > 0$ , bazată pe metoda lui Newton. De ce o astfel de metodă este lent convergentă? Ce se poate face? Gândiți-vă și la o altă metodă.

**Problema 64.2.** Determinați lungimea arcului de curba parametrică

$$\begin{aligned}x(t) &= (1 - \cos(t)) \cos(t) \\y(t) &= (1 - \cos(t)) \sin(t), \quad t \in [0, 2\pi].\end{aligned}$$

folosind o cuadratură adaptivă și metoda lui Romberg. Indicație: formula este

$$\ell = \int_a^b \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt$$



## 65 Calcul numeric

**Problema 65.1.** Se consideră o metodă iterativă de forma

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{g'(x_n)}.$$

Se presupune că metoda converge către un zero simplu al lui  $f$ ,  $\xi$ , dar care nu este zero al lui  $g$ . Stabiliți o relație între  $f$  și  $g$  astfel încât ordinul de convergență al metodei să fie cel puțin 3.

**Problema 65.2.** Constanta lui Euler  $\gamma = 0.57721566490153286\dots$  se definește ca limita

$$\gamma = \lim_{n \rightarrow \infty} \gamma_n, \text{ unde } \gamma_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} - \ln n.$$

Presupunând că  $\gamma - \gamma_n \sim cn^{-d}$ ,  $n \rightarrow \infty$ , pentru constantele  $c$  și  $d$  strict pozitive, determinați  $c$  și  $d$  experimental pe calculator. (*Indicație:* logaritmați relația  $\gamma - \gamma_n \approx cn^{-d}$  și aplicați metoda celor mai mici pătrate).

## 66 Calcul numeric

**Problema 66.1.** (a) Se consideră funcția compusă  $h(t) = g(f(t))$ . Să se exprime condiționarea lui  $h$  în funcție de condiționarea lui  $g$  și  $f$ . Atenție la formulare — precizați în care puncte se vor evalua numerele de condiționare.

(b) Ilustrați (a) pentru  $h(t) = \frac{1+\sin t}{1-\sin t}$ ,  $t = \frac{\pi}{4}$ .

**Problema 66.2.** (a) Fie funcția  $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ ,  $f(z) = 1 + z^2 + e^z$ . Rezolvați în  $\mathbb{C}$  ecuația  $f(z) = 0$ , alegând ca valoare de pornire  $z_0 = -1 + 4i$ .

(b) Găsiți primele patru zerouri ale funcției  $f$  ordonate crescător după modulele valorilor complexe. Cum știți că acestea sunt într-adevăr primele patru zerouri și că nu ați omis niciunul?

(c) Să se rezolve sistemul

$$\begin{aligned}f_1(x, y) &= 1 + x^2 - y^2 + e^x \cos y = 0 \\f_2(x, y) &= 2xy + e^x \sin y = 0\end{aligned}$$

Utilizați valorile de pornire  $x_0 = -1$  și  $y_0 = 4$ . Este această problemă legată de problema de la punctul (a) și au ele aceeași comportare numerică? Explicați. (*Indicație:*  $e^{x+iy} = e^x (\cos y + i \sin y)$ )

## 67 Calcul numeric

**Problema 67.1.** Fie  $A, B \in \mathbb{C}^{m \times m}$ . Arătați că dacă  $I - B$  este singulară, există un vector  $x \in \mathbb{C}^m$ , astfel încât  $(I - B)x = 0$ . Deduceți de aici că  $\|B\| \geq 1$ , și deci dacă  $\|A\| \leq 1$  atunci  $I - A$  este nesingulară. Dacă  $\|A\| \leq 1$ , atunci

$$(I - A)^{-1} = I + A(I - A)^{-1}.$$

Deduceți de aici că

$$\|(I - A)^{-1}\| \leq \frac{1}{1 - \|A\|}.$$

**Problema 67.2.** Determinați un zero al funcției

$$f(x) = x^3 - \sinh x + 4x^2 + 6x + 9.$$

## 68 Calcul numeric

**Problema 68.1.** Fie  $A$  o matrice pătratică diagonal dominantă. Arătați că:

- (a)  $A$  este nesingulară.
- (b) metoda lui Jacobi pentru sistemul  $Ax = b$  converge pentru orice  $b$ .

**Problema 68.2.** Aproximați integralele

$$I_c = \int_0^1 \frac{\cos x}{\sqrt{x}} dx, \quad I_s = \int_0^1 \frac{\sin x}{\sqrt{x}} dx$$

cu o precizie dată:

- (a) utilizând o cuadratură adaptivă;
- (b) utilizând o cuadratură Gauss-Legendre, după ce s-a efectuat schimbarea de variabilă  $x = t^2$ ;
- (c) utilizând o cuadratură Gauss-Jacobi.

## 69 Calcul numeric

**Problema 69.1.** Stabiliți următoarea formulă pentru aproximarea lui  $f'(x)$

$$f'(x) \approx \frac{k^2 f(x+h) - h^2 f(x+k) + (h^2 - k^2)f(x)}{(k-h)kh},$$

- (a) utilizând formula lui Taylor pentru  $f(x+h)$  și  $f(x+k)$ ;
- (b) utilizând interpolarea Lagrange cu nodurile  $x$ ,  $x+h$ ,  $x+k$  și derivând rezultatul.

**Problema 69.2.** Programați și testați o rafinare a metodei secantei ce utilizează aproximarea lui  $f'(x)$  dată în problema precedentă. Adică, utilizați această aproximație a lui  $f'(x)$  în metoda lui Newton. Sunt necesare trei puncte de pornire: două pot fi arbitrare, iar al treilea se poate obține prin metoda secantei.

Aplicație pentru funcția  $f(x) = x^3 - 12x^2 + 3x + 1$ .

## 70 Calcul numeric

**Problema 70.1.** Se consideră formula de interpolare a lui Lagrange cu restul în forma Peano, pentru  $m = 1$ :

$$f(x) = (L_1 f)(x) + \int_a^b K_1(x, t) f''(t) dt, \quad f \in C^2[a, b].$$

- (a) Ce devine nucleul lui Peano  $K_1(x, t)$  dacă  $x \in (x_0, x_1)$ ? Deduceți existența unui  $\xi_x \in (x_0, x_1)$  astfel încât

$$(R_1 f)(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{2} f''(\xi_x).$$

- (b) Arătați că soluția unică a problemei cu valori pe frontieră: fiind dat  $g \in C[x_0, x_1]$ , găsiți  $u \in C^2[x_0, x_1]$  astfel încât

$$\begin{aligned} u''(x) &= g(x), & x \in (x_0, x_1) \\ u(x_0) &= 0 \\ u(x_1) &= 0 \end{aligned}$$

este dată de

$$u(x) = \int_{x_0}^{x_1} K_1(x, t) g(t) dt,$$

unde  $K_1(x, t)$  este nucleul lui Peano.

**Problema 70.2.** Se consideră sistemul neliniar

$$\begin{aligned} f_1(x, y, z) &\equiv x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0 \\ f_2(x, y, z) &\equiv 2x^2 + y^2 - 4z = 0 \\ f_3(x, y, z) &\equiv 3x^2 - 4y + z^2 = 0. \end{aligned}$$

Găsiți soluția sistemului situată în primul octant ( $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x > 0, y > 0, z > 0\}$ ).

## 71 Calcul numeric

**Problema 71.1.** Să se aproximeze volumul butoiului cu diametrele  $D$  și  $d$  și înălțime  $h$ . Justificați formula utilizată în practică

$$V \approx \frac{\pi h}{12} (d^2 + 2D^2).$$

*Indicație:* Aproximați conturul butoiului prin arce de parabolă (polinom de interpolare de gradul 2) și folosiți formula pentru volumul de rotație.

**Problema 71.2 (P).** Se consideră funcția  $f : [0, 5] \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$  și 4 noduri echidistante în intervalul  $[0, 5]$ . Să se aproximeze  $f(\pi)$ ,  $f'(\pi)$  și  $f''(\pi)$  prin:

- (a) un spline de tip Hermite;
- (b) un spline de tip deBoor;
- (c) un spline cu derivate secunde;

și să se reprezinte pe același grafic funcția și aproximantele.

## 72 Calcul numeric

**Problema 72.1.** Se consideră formulele Newton-Cotes închise

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{k=0}^m A_k f(x_k) + R(f),$$

unde

$$x_k = a + kh, \quad k = \overline{0, m}, \quad h = \frac{b-a}{m}.$$

(a) Demonstrați următoarele proprietăți ale coeficienților,  $k = \overline{0, m}$

$$\begin{aligned} A_k &= (-1)^{m-k} \frac{h}{k!(m-k)!} \int_0^m \frac{t^{[m+1]}}{t-k} dt, \\ A_k &= A_{m-k} \\ \sum_{k=0}^m A_k &= b-a. \end{aligned}$$

unde  $t^{[k]} = t(t-1)\dots(t-k+1)$ .

(b) Se consideră afirmația:  $A_k > 0$ ,  $k = \overline{0, m}$ . Ce se poate spune despre valoarea ei de adevăr? Demonstrați-o dacă este adevărată sau dați un contraexemplu dacă este falsă. (Indicație: calculați cantitățile

$$b_k = (-1)^{m-k} \frac{1}{k!(m-k)!} \int_0^m \frac{t^{[m+1]}}{t-k} dt,$$

care nu depind de  $a$  și  $b$ ).

**Problema 72.2.** Studiați comportarea polinomului de interpolare Hermite cu  $n$  noduri duble  $H_{2n+1}$  pentru funcția  $f: [-5, 5] \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$  și

(a)  $n$  noduri echidistante pe intervalul de definiție

(b)  $n$  noduri Cebîșev  $x_k = \cos \frac{2k-1}{2n} \pi$ ,  $k = \overline{1, n}$ .

(c)  $n$  noduri Cebîșev de forma  $x_k = \cos \frac{k-1}{n} \pi$ ,  $k = \overline{1, n+1}$ .

(Luați  $n = 10, 11$ )



## 73 Calcul numeric

**Problema 73.1.** Fie  $f \in C^6[-1, 1]$  și fie  $P \in \mathbb{P}_5$  polinomul de interpolare Hermite cu nodurile duble -1, 0, 1, adică  $P(x_i) = f(x_i)$ ,  $P'(x_i) = f'(x_i)$ ,  $x_i = -1, 0, 1$ .

(a) Arătați că

$$\int_{-1}^1 P(t)dt = \frac{7}{15}f(-1) + \frac{16}{15}f(0) + \frac{7}{15}f(1) + \frac{1}{15}f'(-1) - \frac{1}{15}f'(1).$$

(b) Folosind punctul (a) deduceți o formula de integrare numerică de forma

$$\int_{-1}^1 f(t)dt = \frac{7}{15}f(-1) + \frac{16}{15}f(0) + \frac{7}{15}f(1) + \frac{1}{15}f'(-1) - \frac{1}{15}f'(1) + R(f).$$

Deduceți expresia restului integrând restul formulei de interpolare Hermite.

(c) Arătați că nucleul lui Peano își păstrează semnul pe  $[-1, 1]$  și deduceți de aici expresia restului.

**Problema 73.2 (P).** Găsiți factorizarea QR a matricei

$$A = \begin{bmatrix} 9 & -6 \\ 12 & -8 \\ 0 & 20 \end{bmatrix}$$

și folosind aceasta găsiți soluția în sensul celor mai mici pătrate a sistemului liniar

$$\begin{aligned} 9x - 6y &= 300 \\ 12x - 8y &= 600 \\ 20y &= 900. \end{aligned}$$

## 74 Calcul numeric

**Problema 74.1.** Valorile funcției  $f : x \rightarrow \sin x$  sunt date în punctele  $x_i = i\pi/8$ , pentru toate valorile întregi ale lui  $i$ . Pentru un  $x \in \mathbb{R}$ , se calculează o aproximare  $u(x)$  a lui  $f(x)$  definind  $k = \left\lfloor \frac{8x}{\pi} \right\rfloor$  (partea întreagă), astfel încât  $x_k \leq x \leq x_{k+1}$  și apoi evaluând polinomul de interpolare Lagrange de gradul 5 cu nodurile  $(x_j, f(x_j))$ ,  $j = k - 2, \dots, k + 3$ . Arătați că pentru orice  $x$  real

$$|\sin x - u(x)| \leq \frac{225\pi^6}{16^6 \cdot 6!} < 0.00002.$$

**Problema 74.2 (P).** Dorim să calculăm

$$\int_0^1 x \sin \frac{1}{x} dx.$$

- (a) Incercați să obțineți valoarea „exactă” utilizând Symbolic Math Toolbox sau Maple.
- (b) Ce se întâmplă dacă utilizați o cuadratură adaptivă sau funcția MATLAB `quad`?
- (c) Cum puteți rezolva impedimentul de la punctul anterior? Calculați integrala cu o eroare absolută  $< 10^{-8}$ .

## 75 Calcul numeric

**Problema 75.1.** Calculați eroarea care se comite aplicând formula trapezului și formula elementară a lui Simpson la aproximarea  $\int_0^1 x^4 dx$  și  $\int_0^1 x^5 dx$ . Găsiți valoarea constantei  $C$  pentru care regula trapezului dă valoarea exactă la calculul integralei

$$\int_0^1 (x^5 - Cx^4) dx$$

și arătați că regula trapezului dă rezultate mai precise decât regula lui Simpson pentru  $\frac{15}{14} < C < \frac{85}{74}$ .

**Problema 75.2 (P).** Interpretați rezultatele următoarelor experimente numerice și trageți concluziile care se impun.

- (a) Fie  $p$  polinomul de grad 20 ce interpolează funcția  $f(x) = (1 - 6x^2)^{-1}$  în 21 de puncte echidistante din intervalul  $[-1, 1]$ . Includeți capetele printre noduri. Tabelați  $f(x)$ ,  $p(x)$  și  $f(x) - p(x)$  în 41 de puncte echidistante din interval.
- (b) Repetați experimentul utilizând noduri Cebîșev date de

$$x_i = \cos \frac{(i-1)\pi}{20}, \quad i = \overline{1, 21}.$$

- (c) Repetați experimentul cu un spline cubic natural și 21 de puncte echidistante.

## 76 Calcul numeric

**Problema 76.1.** Determinați formule de cuadratură de tip Gauss pentru ponderea  $w(t) = -\ln t$ ,  $[a, b] = [0, 1]$  și  $n = 1$  și  $n = 2$ . Pentru funcția  $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = \sqrt{x}/\ln(x)$ , determinați polinomul de cea mai bună aproximare de gradul al doilea în  $L_w^2[0, 1]$ .

**Problema 76.2.** Figura 1 arată o gridă cu zăbrele plană având 21 de membri (liniile numerotate) legate în 12 joncțiuni (cercurile numerotate). Încărcările indicate, în tone, se aplică joncțiunilor 2, 5, 6, 9, și 10 și dorim să determinăm forța rezultantă pe fiecare membru al grinzii.




Figura 1: Grinda plană

Pentru ca grinda să fie în echilibru static, rezultantele în fiecare joncțiune trebuie să fie nule. Astfel, putem determina forțele membre egalând forțele orizontale la stânga și la dreapta fiecărei joncțiuni și la fel, forțele verticale deasupra și dedesubtul fiecărei joncțiuni. Pentru cele 12 joncțiuni se obțin 24 de ecuații și 21 de necunoscute. Pentru ca grinda să fie determinată static, adică să existe soluție unică, presupunem că joncțiunea 1 este fixată rigid, atât orizontal cât și vertical și că joncțiunea 12 este fixată vertical. Descompunând forțele membre în componente verticale și orizontale și definind  $\alpha = 1/\sqrt{2}$ , obținem următorul sistem de ecuații pentru forțele membre  $f_i$ :

jonc. 2	$f_2 = f_6$ $f_3 = 10$	jonc. 3	$\alpha f_1 = f_4 + \alpha f_5$ $\alpha f_1 + f_3 + \alpha f_5 = 0$
jonc. 4	$f_4 = f_8$ $f_7 = 0$	jonc. 5	$\alpha f_5 + f_6 = \alpha f_9 + f_{10}$ $\alpha f_5 + f_7 + \alpha f_9 = 15$
jonc. 6	$f_{10} = f_{14}$ $f_{11} = 20$	jonc. 7	$f_8 + \alpha f_9 = f_{12} + \alpha f_{13}$ $\alpha f_9 + f_{11} + \alpha f_{13} = 0$
jonc. 8	$f_{12} = f_{16}$ $f_{15} = 0$	jonc. 9	$\alpha f_{13} + f_{14} = \alpha f_{17} + f_{18}$ $\alpha f_{13} + f_{15} + \alpha f_{17} = 25$
jonc. 10	$f_{18} = f_{21}$ $f_{19} = 30$	jonc. 11	$f_{16} + \alpha f_{17} = f_{20}$ $\alpha f_{17} + f_{19} + \alpha f_{20} = 0$
jonc. 12	$\alpha f_{20} + f_{21} = 0$		

## 77 Calcul numeric

**Problema 77.1.** Se consideră punctele de extrem ale polinomului Cebîșev de speța I  $T_n$ ,  $\eta_k = \cos \frac{k\pi}{n}$ ,  $k = \overline{0, n}$ .

(a) Arătați că

$$(f, g)_U = \frac{1}{2}f(\eta_0)g(\eta_0) + f(\eta_1)g(\eta_1) + \cdots + f(\eta_{n-1})g(\eta_{n-1}) + \frac{1}{2}f(\eta_n)g(\eta_n)$$

este un produs scalar discret.

(b) Arătați că polinoamele Cebîșev de speța I sunt ortogonale în raport cu produsul scalar  $(\cdot, \cdot)_U$ , adică

$$(T_i, T_j)_U = \begin{cases} 0, & i \neq j \\ \frac{n}{2}, & i = j \neq 0 \\ n, & i = j = 0 \end{cases}.$$

(c) Dați expresia coeficienților polinomului de cea mai bună aproximare în raport cu produsul scalar  $(\cdot, \cdot)_U$ .

**Problema 77.2.** Scrieți un program MATLAB de interpolare a unei funcții  $f$  cu funcții spline cubice pe un interval  $[a, b]$  considerând condiția de spline de Boor în punctul  $a$  ( $p_1(x) \equiv p_2(x)$ ) și spline cu derivate secunde în punctul  $b$  ( $s''(b) = f''(b)$ ). Aplicație: aproximați  $\sin x$  pe intervalul  $[0, 2\pi]$ .

## 78 Calcul numeric

**Problema 78.1.** Determinați o formulă de cuadratură de forma

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} f(x) dx = A_1 f(x_1) + A_2 f(x_2) + A_3 f(x_3) + R_3(f),$$

care să aibă grad maxim de exactitate. Care este eroarea dacă se aplică formula pentru a calcula

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} \sin x dx, \quad \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} \cos x dx.$$

**Problema 78.2.** Un model simplu al bătailor inimii umane este dat de

$$\begin{aligned} \varepsilon x' &= -(x^3 - Ax + c), \\ c' &= x, \end{aligned}$$

unde  $x$  este deplasarea de la echilibru a fibrei musculare,  $c(t)$  este concentrația unui control chimic, iar  $\varepsilon$  și  $A$  sunt constante pozitive. Se așteaptă ca soluțiile să fie periodice. Aceasta se poate vedea reprezentând soluția în planul fazelor ( $x$  pe abscisă,  $c$  pe ordonată), trebuind să se obțină o curbă închisă. Presupunem că  $\varepsilon = 1$  și  $A = 3$ .

- (a) Calculați  $x(t)$  și  $c(t)$ , pentru  $0 \leq t \leq 12$  și valorile inițiale  $x(0) = 0.1$ ,  $c(0) = 0.1$ . Reprezentați ieșirea în planul fazelor. Cam cât este perioada?
- (b) Repetați punctul (a) cu  $x(0) = 0.87$ ,  $c(0) = 2.1$ .

## 79 Calcul numeric

**Problema 79.1.** Găsiți o formula de cuadratură de forma

$$\int_{-1}^1 \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} f(x) dx = A_1 f(x_1) + A_2 f(x_2) + R(f)$$

care să aibă grad maxim de exactitate.

**Problema 79.2.** Ecuația atracteurului Lorenz

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= -ax + ay, \\ \frac{dy}{dt} &= bx - y - xz, \\ \frac{dz}{dt} &= -cz + xy\end{aligned}$$

are soluții haotice care sunt sensibil dependente de condițiile inițiale. Rezolvați numeric pentru  $a = 5$ ,  $b = 15$ ,  $c = 1$  cu condițiile inițiale

$$x(0) = 2, \quad y(0) = 6, \quad z(0) = 4, \quad t \in [0, 20],$$

cu toleranța  $T = 10^{-4}$ . Repetați pentru

(a)  $T = 10^{-5}$ ;

(b)  $x(0) = 2.1$ .

Comparați rezultatele cu cele obținute anterior. În fiecare caz reprezentați grafic.



## 80 Calcul numeric

**Problema 80.1.** Determinați o metodă Runge-Kutta de ordinul al doilea diferită de metoda lui Euler modificată și metoda lui Heun. Studiați consistența, stabilitatea și convergența acestei metode.

**Problema 80.2.** Determinați o formulă de cuadratură de forma

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} f(x) dx = \sum_{k=1}^n A_k f(x_k) + R_n(f),$$

care să aibă grad maxim de exactitate. Aplicați formula pentru a calcula

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} \sin x dx, \quad \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} \cos x dx.$$

cu o precizie dată.

## 81 Calcul numeric

**Problema 81.1.** (a) Arătați că polinoamele

$$V_n(t) = \frac{\cos \left[ \left( n + \frac{1}{2} \right) \theta \right]}{\cos \frac{1}{2} \theta},$$

unde  $\theta = \arccos t$ , sunt ortogonale pe intervalul  $[-1, 1]$  în raport cu ponderea  $w(t) = \sqrt{\frac{1+t}{1-t}}$ .

(b) Stabiliți relația de recurență  $V_{n+1}(t) = 2tV_n(t) - V_{n-1}(t)$ ,  $n \in \mathbb{N}^*$ .

(c) Găsiți o formulă de cuadratură cu două noduri bazată pe aceste polinoame ortogonale.




Figura 2: Ec. Bernoulli

**Problema 81.2.** Ecuația lui Bernoulli pentru fluxul de fluid într-un canal deschis cu o mică cocoasă este

$$\frac{Q^2}{2gb^2h_0^2 + h_0} + h_0 = \frac{Q^2}{2gb^2h^2 + h} + h + H$$

unde

$Q = 1.2m^3/s$  = rata de curgere a volumului

$g = 9.81m/s^2$  = accelerația gravitațională

$b = 1.8m$  = lățimea canalului

$h_0 = 0.6m$  = nivelul superior al apei

$H = 0.075m$  = înălțimea cocoșei

$h$  = nivelul apei deasupra cocoșei

Determinați  $h$ .

## 82 Calcul numeric

**Problema 82.1.** (a) Arătați că polinoamele

$$W_n(t) = \frac{\sin \left[ \left( n + \frac{1}{2} \right) \theta \right]}{\sin \frac{1}{2} \theta},$$

unde  $\theta = \arccos t$ , sunt ortogonale pe intervalul  $[-1, 1]$  în raport cu ponderea  $w(t) = \sqrt{\frac{1-t}{1+t}}$ .

(b) Stabiliți relația de recurență  $W_{n+1}(t) = 2tW_n(t) - W_{n-1}(t)$ ,  $n \in \mathbb{N}^*$ .

(c) Găsiți o formulă de cuadratură cu două noduri bazată pe aceste polinoame ortogonale.




Figura 3: Coloană de aluminiu

**Problema 82.2.** O coloană de aluminiu  $W310 \times 202$  (flanșă largă) este supusă unei încărcări excentrice axiale  $P$  ca în figura 3. Apăsarea maximă compresivă în coloană este dată de formula secantei:

$$\sigma_{\max} = \bar{\sigma} \left[ 1 + \frac{ec}{r^2} \sec \left( \frac{L}{2r} \sqrt{\frac{\bar{\sigma}}{E}} \right) \right]$$

unde

$$\bar{\sigma} = P/A = \text{apăsarea medie}$$

$$A = 25800 \text{ mm}^2 = \text{aria secțiunii coloanei}$$

$$e = 85 \text{ mm} = \text{excentricitatea încărcării}$$

$$c = 170 \text{ mm} = \text{semiadâncimea coloanei}$$

$$r = 142 \text{ mm} = \text{raza de rotație a secțiunii}$$

$$L = 7100 \text{ mm} = \text{lungimea coloanei}$$

$$E = 71 \times 10^9 \text{ Pa} = \text{modulul de elasticitate}$$

Determinați încărcarea maximă  $P$  pe care coloana o poate suporta, dacă apăsarea maximă nu poate depăși  $120 \times 10^6 \text{ Pa}$ .

## 83 Calcul numeric

**Problema 83.1.** Găsiți polinoamele ortogonale discrete de grad 0, 1 și 2, având ca suport mulțimea numerelor naturale, în raport cu ponderea  $w(k) = \frac{e^{-a}a^k}{k!}$ ,  $k \in \mathbb{N}$ ,  $a > 0$ . Găsiți aproximanta de grad I în sensul celor mai mici pătrate a funcției  $f(x) = e^x$  bazată pe aceste polinoame ortogonale.

**Problema 83.2.** Perioada unui pendul simplu de lungime  $L$  este  $\tau = \sqrt{\frac{L}{g}}h(\theta_0)$ , unde  $g$  este accelerația gravitațională,  $\theta_0$  reprezintă amplitudinea unghiulară, iar

$$h(\theta_0) = \int_0^{\pi/2} \frac{d\theta}{\sqrt{1 - \sin^2 \frac{\theta_0}{2} \sin^2 \theta}}.$$

Calculați  $h(15^\circ)$ ,  $h(30^\circ)$  și  $h(45^\circ)$  și comparați aceste valori cu  $h(0) = \pi/2$  (aproximarea utilizată pentru amplitudini mici).

## 84 Calcul numeric

**Problema 84.1.** Găsiți polinoamele ortogonale discrete de grad 0, 1 și 2, având ca suport mulțimea  $\{0, 1, \dots, N-1\}$ , în raport cu ponderea  $w(k) = 1$ ,  $k \in \mathbb{N}$ . Găsiți aproximanta de grad I în sensul celor mai mici pătrate a funcției  $f(x) = 2^x$  bazată pe aceste polinoame ortogonale, pentru  $N = 5$ .




Figura 4: Tensiune în cablu

**Problema 84.2.** Un cablu de oțel de lungime  $s$  este suspendat așa cum se arată în figura 4. Tensiunea de întindere maximă în cablu, care apare la suporturi (punctele de sprijin), este

$$\sigma_{\max} = \sigma_0 \cosh \beta$$

unde

$$\beta = \frac{\gamma L}{2\sigma_0}$$

$\sigma_0$  = tensiunea de întindere în O

$\gamma$  = greutatea cablului pe unitatea de volum

$L$  = întinderea orizontală a cablului

Raportul lungime-întindere este legat de  $\beta$  prin

$$\frac{s}{L} = \frac{1}{\beta} \sinh \beta$$

Determinați  $\sigma_{\max}$  dacă  $\gamma = 77 \times 10^3 \text{ N/m}^3$  (oțel),  $L = 1000 \text{ m}$  și  $s = 1100 \text{ m}$ .

## 85 Calcul numeric

**Problema 85.1.** Se consideră iterația

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)^2}{f(x_k + f(x_k)) - f(x_k)}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

pentru rezolvarea ecuației  $f(x) = 0$ . Explicați legătura cu iterația Newton și arătați că  $(x_k)$  converge pătratic dacă  $x_0$  este suficient de apropiată de soluție. Aplicați această metodă pentru  $f(x) = e^x - x - 2$  și verificați convergența pătratică pentru  $x_0 = 1$ . Experimentați și pentru  $x_0 = 10$  și  $x_0 = -10$  și explicați comportarea.

**Problema 85.2.** Formula lui Debye pentru capacitatea calorică  $C_V$  a unui solid este  $C_V = 9Nkg(u)$ , unde

$$g(u) = u^3 \int_0^{1/u} \frac{x^4 e^x}{(e^x - 1)^4} dx.$$

Termenii din această ecuație sunt

$N$  = numărul de particule din solid

$k$  = constanta lui Boltzmann

$u = T/D$

$T$  = temperatura absolută

$D$  = temperatura Debye

Calculați  $g(u)$  pentru  $u$  de la 0 la 1.0 din 0.05 în 0.05 și reprezentați rezultatul.



## 86    Calcul numeric

**Problema 86.1.** Să se determine aproximarea lui  $x^k$  de grad  $k - 1$  în sensul celor mai mici pătrate cu polinoame Cebîșev, pentru  $k = 1, \dots, 5$ . Să se verifice rezultatele teoretice cu rutinele de la laborator pentru aproximare continuă cu polinoame Cebîșev.

**Problema 86.2.** Un vârf de tensiune într-un circuit este provocat de un curent

$$i(t) = i_0 e^{-t/t_0} \sin(2t/t_0)$$

printr-un rezistor. Energia  $E$  disipată de rezistor este

$$E = \int_0^\infty R i^2(t) dt.$$

Determinați  $E$  cunoscând  $i_0 = 100A$ ,  $R = 0.5\Omega$  și  $t_0 = 0.01s$ .

## 87 Calcul numeric

**Problema 87.1.** Notând cu  $T(m)$  aproximația din formula repetată a trapezului pentru  $m$  subintervale

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{h}{2} [f(x_0) + 2f(x_1) + \cdots + 2f(x_{m-1}) + f(x_m)]$$

unde

$$h = \frac{b-a}{m}, \quad x_k = a + kh, \quad k = 0, \dots, m$$

și cu  $S(2m)$  aproximația din formula repetată a lui Simpson pentru  $m$  subintervale scrisă sub forma

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)dx \approx \frac{h}{3} [f(x_0) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + 4f(x_3) + \cdots \\ + 2f(x_{2m-2}) + 4f(x_{2m-1}) + f(x_{2m})] \end{aligned}$$

unde

$$h = \frac{b-a}{2m}, \quad x_k = a + kh, \quad k = 0, \dots, 2m,$$

arătați că

$$S(2m) = \frac{4}{3}T(2m) - \frac{1}{3}T(m)$$

și dacă  $f \in C^4[a, b]$ , atunci

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{T(m) - T(2m)}{T(2m) - T(4m)} = 4.$$

**Problema 87.2.** Tabela de mai jos arată coeficientul de frânare  $c_D$  al unei sfere în funcție numărul Reynolds  $Re$ . Utilizați un spline cubic natural pentru a determina  $c_D$  corespunzând  $Re = 5, 50, 500$  și  $5000$ . Indicație: Utilizați o scară log-log (logaritmați ambele coordonate).

$Re$	0.2	2	20	200	2000	20000
$c_D$	103	13.9	2.72	0.800	0.401	0.433

Aproximați derivata lui  $c_D$  în raport cu  $Re$  și reprezentați  $c_D$  și derivata pe același grafic.

## 88 Calcul numeric

**Problema 88.1.** Să se arate că regula repetată a trapezului cu  $m$  subintervale,  $T(m)$ , este exactă pentru polinoame trigonometrice al căror grad nu este multiplu de  $m$ . Ce rezultat dă regula trapezului dacă gradul este multiplu de  $m$ ? (Indicație: datorită liniarității este suficient să se verifice exactitatea pe intervalul  $[0, 2\pi]$  și funcțiile  $f(x) = \cos kx$  și  $f(x) = \sin kx$ , sau chiar pentru  $f(x) = e^{kix} = \cos kx + i \sin kx$ ).

**Problema 88.2.** Frecvențele naturale ale unui cantilever (grindă în consolă) uniform sunt legate de rădăcinile  $\beta_i$  ale ecuației de frecvență  $f(\beta) = \cosh \beta \cos \beta + 1 = 0$ , unde

$$\beta_i^4 = (2\pi f_i)^2 \frac{mL^3}{EI}$$

$f_i$  = a  $i$ -a frecvență naturală

$m$  = masa grinzii

$L$  = lungimea grinzii

$E$  = modulul de elasticitate

$I$  = momentul de inerție al secțiunii transversale

Determinați cele mai mici două frecvențe ale unei grinzi de  $0.9m$  lungime, cu o secțiune rectangulară cu lățimea de 25 mm și înălțimea de 2.5 mm. Densitatea oțelului este  $7850 \text{ kg/m}^3$  și  $E = 200 \text{ GPa}$ .

## 89 Calcul numeric

**Problema 89.1.** Determinați valorile lui  $c_j$ ,  $j = -1, 0, 1, 2$ , astfel încât formula de cuadratură

$$\int_0^1 f(x)dx \approx c_{-1}f(-1) + c_0f(0) + c_1f(1) + c_2f(2)$$

să fie exactă pentru orice polinom de gradul 3. Arătați că pentru aceste valori ale coeficienților  $c_j$  și pentru condiții adecvate asupra lui  $f$ ,

$$\left| \int_0^1 f(x)dx - c_{-1}f(-1) + c_0f(0) + c_1f(1) + c_2f(2) \right| \leq \frac{11}{720} M_4.$$

Impuneți condiții pentru validitatea acestei delimitări și dați o definiție a lui  $M_4$ .




Figura 5: Proiectil

**Problema 89.2.** Un proiectil este lansat din  $O$  cu viteza  $v$  la unghiul  $\theta$  cu orizontala. Ecuația parametrică a traiectoriei este

$$\begin{aligned} x &= (v \cos \theta) t \\ y &= -\frac{1}{2}gt^2 + (v \sin \theta) t, \end{aligned}$$

unde  $t$  este timpul măsurat de la lansare, iar  $g = 9.81m/s^2$  reprezintă accelerația gravitațională. Dacă proiectilul trebuie să atingă ținta la un unghi de  $45^\circ$  (figura 5), determinați  $v$ ,  $\theta$  și timpul de zbor.

## 90 Calcul numeric

**Problema 90.1.** Funcția  $H$  este definită prin

$$H(x) = \begin{cases} 1, & \text{dacă } x \in (0, 1] \\ -1, & \text{dacă } x \in [-1, 0]. \end{cases}$$

Construiți cea mai bună aproximație polinomială de grad 0, 1 și 2 în  $L_w^2[-1, 1]$ , pentru  $w(x) \equiv 1$ . Comparați cu rezultatul obținut de rutina de la laborator.




Figura 6: Satelit

**Problema 90.2.** Traectoria unui satelit care se rotește pe orbită în jurul Pământului este (figura 6)

$$R = \frac{C}{1 + e \sin(\theta + \alpha)}$$

unde  $(R, \theta)$  sunt coordonatele polare ale satelitului, iar  $C$ ,  $e$  și  $\alpha$  sunt constante ( $e$  se numește excentricitatea orbitei). Dacă satelitul a fost observat în următoarele trei poziții

$\theta$	$-30^\circ$	$0^\circ$	$30^\circ$
$R(km)$	6870	6728	6615

determinați cea mai mică rază  $R$  a traectoriei și valoarea corespunzătoare a lui  $\theta$ .

## 91 Calcul numeric

**Problema 91.1.** Determinați cea mai bună aproximație de grad 2 a lui  $f(t) = \frac{1}{t^2}$  din  $L_w^2(\mathbb{R})$ , pentru  $w(t) = |t|^{2\mu} e^{-t^2}$ ,  $\mu > -\frac{1}{2}$ . Determinați o formulă de cuadratură de forma

$$\int_{-\infty}^{\infty} |t|^{2\mu} e^{-t^2} f(t) dt = A_1 f(t_1) + A_2 f(t_2) + R(f)$$

care să aibă grad maxim de exactitate.

**Problema 91.2.** Viteza  $v$  a unei rachete Saturn V în zbor vertical în apropierea suprafeței Pământului poate fi aproximată prin

$$v = u \ln \frac{M_0}{M_0 - mt} - gt$$

unde

- $u = 2510 \text{ m/s}$  = viteza de expulzare relativă la rachetă
- $M_0 = 2.8 \times 10^6 \text{ kg}$  = masa rachetei la lansare
- $m = 13.3 \times 10^3 \text{ kg/s}$  = rata de consum a combustibilului
- $g = 9.81 \text{ m/s}^2$  = accelerația gravitațională
- $t$  = timpul măsurat de la lansare

Determinați momentul când racheta atinge viteza sunetului ( $335 \text{ m/s}$ ).

## 92 Calcul numeric

**Problema 92.1.** Determinați o formulă de cuadratură de forma

$$\int_0^\infty e^{-t^2} f(t) dt = A_1 f(t_1) + A_2 f(t_2) + R(f)$$

care să aibă grad maxim de exactitate. Determinați aproximația de grad 2 în medie pătratică pentru ponderea și intervalul de mai sus pentru  $f(t) = \sqrt{t}$ .

**Problema 92.2.** Aproximați funcția  $f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f(x) = \exp(x) |\operatorname{sech}(\sin 8x)|^{\exp(x)}$$

printr-un polinom de interpolare Lagrange de grad 150 cu noduri Cebîșev de speța a doua (extremele polinoamelor Cebîșev de speța I). Aproximați integrala lui  $f$  prin integrala polinomului de interpolare.

## 93 Calcul numeric

**Problema 93.1.** (a) Calculați

$$\int_{-1}^1 T_k(x) dx,$$

unde  $T_k$  este polinomul Cebîșev de speța I de grad  $k$ .

- (b) Folosiți rezultatul de la punctul anterior pentru a demonstra că integrala unui polinom de grad  $n$  exprimată sub forma unei serii Cebîșev este

$$\int_{-1}^1 \sum_{k=0}^n c_k T_k(x) dx = \sum_{\substack{k=0 \\ k \text{ par}}}^n \frac{2c_k}{1-k^2}.$$

- (c) Implementați ideea de la punctul (b) în MATLAB (folosiți rutinele de la laborator pentru calculul coeficienților  $c_k$ ) și utilizați-o la integrarea numerică a funcțiilor.
- (d) Utilizați rutina de la punctul (c) pentru a calcula

$$\int_{-1}^1 e^x \sin x^2 dx.$$



## 94 Calcul numeric

**Problema 94.1.** (a) Fie  $d\lambda$  o măsură simetrică pe  $[-a, a]$ ,  $0 < a \leq \infty$  și

$$\pi_{2k}(t; d\lambda) = \pi_k^+(t^2), \quad \pi_{2k+1}(t; d\lambda) = t\pi_k^-(t^2).$$

Arătați că  $\{\pi_k^+\}$  și  $\{\pi_k^-\}$  sunt polinoame ortogonale monice pe  $[0, a^2]$  în raport cu măsurile  $d\lambda^+(t) = t^{-1/2}w(t^{1/2})dt$  și respectiv  $d\lambda^-(t) = t^{+1/2}w(t^{1/2})dt$ .

(b) Aplicați acest rezultat la calculul polinoamelor ortogonale pe  $[0, 1]$  în raport cu ponderile  $w(t) = \sqrt{t}$  și  $w(t) = \frac{1}{\sqrt{t}}$ .

(c) Generați formulele de cuadratură de tip Gauss cu două noduri pentru aceste ponderi.

**Problema 94.2.** Un cablu de 15 m este suspendat în  $A$  și  $D$  și susține greutatea concentrată în  $B$  și  $C$  (vezi figura 7). Ecuațiile de echilibru vertical în joncțiunile  $B$  și  $C$  sunt

$$T(-\tan \theta_2 + \tan \theta_1) = 16$$

$$T(\tan \theta_3 + \tan \theta_2) = 20$$

unde  $T$  componenta orizontală a forței cablului (este aceeași în toate segmentele cablului). În plus, există două restricții geometrice impuse de pozițiile suporturilor:

$$-4 \sin \theta_1 - 6 \sin \theta_2 + 5 \sin \theta_3 = -3$$

$$4 \cos \theta_1 + 6 \cos \theta_2 + 5 \cos \theta_3 = 12.$$

Determinați unghiurile  $\theta_1$ ,  $\theta_2$  și  $\theta_3$ .




Figura 7: Problema 94.2

## 95 Calcul numeric

**Problema 95.1.** Se consideră ecuația

$$x = e^{-x}$$

- Arătați că există o rădăcină reală unică  $\alpha$  și determinați intervalul care o conține.
- Arătați că metoda aproximațiilor succesive  $x_n = e^{-x_n}$ ,  $n = 0, 1, 2, \dots$  converge local către  $\alpha$  și determinați constanta de eroare asimptotică.
- Ilustrați grafic faptul că iterația de la (b) converge global, adică pentru  $x_0 > 0$ , arbitrar. Demonstrați apoi convergența.
- O ecuație echivalentă este

$$x = \ln \frac{1}{x}.$$

Iterația  $x_n = \ln \frac{1}{x_n}$  converge local? Explicați.

**Problema 95.2 (P).** Considerăm următorul mod de ordonare a echipelor de fotbal american. Presupunem că avem 4 echipe, T1, T2, T3 și T4, iar rezultatul întâlnirilor directe este :

T1 bate T2 cu 4 puncte 21-17

- T3 bate T1 cu 8 puncte 27-18

- T1 bate T4 cu 6 puncte 16-10
- T4 bate T4 cu 3 puncte 10-7
- T2 bate T4 cu 7 puncte 17-10

Pentru a determina punctajul  $r_1, \dots, r_4$  al fiecărei echipe vom rezolva sistemul supradeterminat

$$r_1 - r_2 = 4,$$

$$r_3 - r_1 = 9,$$

$$r_1 - r_4 = 6,$$

$$r_3 - r_4 = 3,$$

$$r_2 - r_4 = 7$$

în sensul celor mai mici pătrate. Soluția nu este unică, deoarece dacă  $(r_1, \dots, r_4)^T$  este o soluție și dacă îi adunăm un vector constant arbitrar, de exemplu  $(1, \dots, 1)^T$  obținem un vector cu același reziduu. Arătați că dacă  $(r_1, \dots, r_4)^T$  este o soluție a sistemului în sensul celor mai mici pătrate, atunci și  $(r_1 + c, \dots, r_4 + c)^T$  este o soluție, pentru orice constantă  $c$ . Pentru a face ca soluția să fie unică, putem limita numărul total de puncte, de exemplu, la 20:

$$r_1 + r_2 + r_3 + r_4 = 20.$$

Determinați punctajele și normele reziduurilor, considerând întâi toate ecuațiile și apoi numai primele 5.

## 96 Calcul numeric

**Problema 96.1.** (a) Construiți formula Newton-Cotes cu ponderi

$$\int_0^1 f(x)x \ln \frac{1}{x} dx = a_0 f(0) + a_1 f(1) + R(f).$$

- (b) Găsiți o formulă Newton-Cotes pentru  $w(x) = 1$ , cu 5 noduri de forma  $t_k = \cos\left(\frac{k\pi}{n}\right)$ ,  $k = 0..n$  (pe  $[-1, 1]$ ).

**Problema 96.2** (P). John Machin (1680-1752) a descoperit următoarea expresie pentru  $\pi$ :

$$\pi = 16 \arctan \frac{1}{5} - 4 \arctan \frac{1}{239}. \quad (5)$$

- (a) Scrieți seria Maclaurin și polinomul lui Taylor  $T_n$  de grad  $n$  pentru  $\arctan x$  în jurul lui  $x = 0$ .
- (b) Aproximați  $\pi$  utilizând  $T_n$  și (5). Mai concret, utilizați aproximarea

$$\pi \approx P_n = 16T_n\left(\frac{1}{5}\right) - 4T_n\left(\frac{1}{239}\right).$$

- (c) Care este eroarea relativă în aproximarea de mai sus? Calculați  $\pi$  cu precizia eps (în MATLAB). Câte zecimale corecte se obțin pentru  $n = 9$ ?

## 97 Calcul numeric

**Problema 97.1.** (a) Fie  $w(t)$  o funcție pondere pară pe  $[a, b]$ ,  $a < b$ ,  $a+b = 0$ , adică  $w(-t) = w(t)$  pe  $[a, b]$ . Arătați că  $(-1)^n \pi_n(-t; w) = \pi_n(t, w)$ , adică polinomul ortogonal monic de grad  $n$  în raport cu ponderea  $w$  este par (impar) dacă  $n$  este par (impar).

(b) Arătați că formula gaussiană

$$\int_a^b f(t)w(t)dt = \sum_{\nu=1}^n w_\nu f(t_\nu) + R_n(f),$$

pentru o pondere  $w$  pară este simetrică, i.e.

$$t_{n+1-\nu} = -t_\nu, \quad w_{n+1-\nu} = w_\nu, \quad \nu = 1, \dots, n.$$

(c) Fie  $w$  funcția „pălarie”

$$w(t) = \begin{cases} 1+t, & \text{pentru } t \in [-1, 0] \\ 1-t, & \text{pentru } t \in [0, 1]. \end{cases}$$

Obțineți o formulă gaussiană cu două noduri  $\int_{-1}^1 f(t)w(t)dt = w_1 f(t_1) + w_2 f(t_2) + R_2(f)$  pentru ponderea de mai sus. Folosiți (a) și (b) pentru a simplifica calculele.

**Problema 97.2 (P).** Literele PostScript și TrueType se generează cu spline parametrice, utilizând doar câteva puncte pentru fiecare literă.

(a) Creați și imprimați litera de mână definită de următoarele date.

$t$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
$x$	3	1.75	0.90	0	0.50	1.50	3.25	4.25	4.25	3	3.75	6.00
$y$	4	1.60	0.50	0	1.00	0.50	0.50	2.25	4.00	4	4.25	4.25

(b) În același sistem de axe, desenați litera împreună cu litera de dimensiune dublă. (Comanda `2*x` va dubla dimensiunea fontului în direcția  $x$ ).

(c) Animați desenarea literei utilizând comanda `comet`.

(d) Creați și desenați o altă literă.

## 98 Calcul numeric

**Problema 98.1.** (a) Construiți o formulă de tip trapez

$$\int_0^h f(x)dx = af(0) + bf(h) + R(f)$$

care este exactă pentru  $f(x) = \cos x$  și  $f(x) = \sin x$ . Este formula exactă pentru constante?

(b) Arătați că are loc o formulă similară pentru  $\int_c^{c+h} g(t)dt$ .

**Problema 98.2 (P).** (a) Determinați matricea  $A = [a_{ij}]$  de dimensiune  $(m+1) \times (m+1)$ ,  $a_{ij} = (p_{m,i}, p_{m,j})$  a ecuațiilor normale relativ la baza Bernstein

$$p_{m,j}(t) = \binom{m}{j} t^j (1-t)^{m-j}, \quad j = \overline{0, m},$$

și funcția pondere  $w(t) \equiv 1$  pe  $[0, 1]$ .

(Indicație: utilizați funcția beta a lui Euler)

(b) Rezolvați sistemul de ecuații normale pentru  $m = 3 : 3 : 12$ , când funcția care urmează să fie aproximată este  $f(t) = 1$ . Care este soluția exactă? Afișați, pentru fiecare  $m$ , o estimatie a numărului de condiționare, vectorul coeficienților și eroarea asociată (modulul diferenței dintre valoarea calculată și cea exactă). Comentați rezultatul.

## 99 Calcul numeric

**Problema 99.1.** Dându-se o subdiviziune  $\Delta$  cu  $N$  subintervale egale a intervalului  $[0, 2\pi]$

$$0 = x_0 < x_1 < \dots < x_{N-1} < x_N = 2\pi, \quad x_k = kh, \quad h = 2\pi/N$$

și o funcție  $f$   $2\pi$ -periodică, construiți o formulă de cuadratură pentru al  $m$ -lea coeficient Fourier complex al lui  $f$

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) e^{-imx} dx,$$

aproximând  $f$  printr-un interpolant spline de gradul I din  $\mathbb{S}_1^0(\Delta)$ . Scrieți rezultatul sub forma unei formule a trapezului „modificate”. (Indicație: exprimați interpolantul în baza funcțiilor B-spline de gradul 1 (pălariile chinezești).)

**Problema 99.2 (P).** Presupunem că dorim să aproximăm funcția

$$f(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t \leq 1 \\ 0, & t > 1 \end{cases}$$

pe semiaxa pozitivă  $\mathbb{R}_+$  printr-o combinație liniară de exponențiale  $\pi_j(t) = e^{-jt}$ ,  $j = 1, 2, \dots, n$ , în sensul celor mai mici pătrate (continuu, cu ponderea 1).

- (a) Deduceți ecuațiile normale. Ce legătură are matricea cu matricea Hilbert?
- (b) Utilizați Matlab pentru a rezolva ecuațiile normale pentru  $n = 1, 2, \dots, 8$ . Listați  $n$ , numărul de condiționare al matricei în norma euclidiană și soluția. Reprezentați pe același grafic aproximanta și funcția exactă pentru  $1 \leq n \leq 4$ .

## 100 Calcul numeric

**Problema 100.1.** Se consideră ecuația  $x = \cos x$ .

- (a) Arătați grafic că are o rădăcină pozitivă unică  $\alpha$ . Indicați, aproximativ, unde este situată.
- (b) Demonstrați convergența locală a iterației  $x_{n+1} = \cos x_n$ .
- (c) Pentru iterația de la (b) demonstrați că dacă  $x_n \in [0, \frac{\pi}{2}]$ , atunci

$$|x_{n+1} - \alpha| < \sin \frac{\alpha + \pi/2}{2} |x_n - \alpha|.$$

În particular, are loc convergența globală pe  $[0, \frac{\pi}{2}]$ .

- (d) Arătați că metoda lui Newton aplicată ecuației  $f(x) = 0$ ,  $f(x) = x - \cos x$ , converge global pe  $[0, \frac{\pi}{2}]$ .

**Problema 100.2 (P).** Fie  $f(x) = \frac{1}{1-\pi x}$  și  $f_i = f(ih)$ ,  $i = -2, -1, 0, 1, 2$ . Cu ajutorul diferențelor finite regressive

$$\begin{aligned} \nabla f_1 &= f_1 - f_0, \quad \nabla^2 f_1 = f_1 - 2f_0 + f_{-1} \\ \nabla^3 f_2 &= f_2 - 3f_1 + 3f_0 - f_{-1}, \quad \nabla^4 f_2 = f_2 - 4f_1 + 6f_0 - 4f_{-1} + f_{-2}, \end{aligned}$$

definim

$$e_n(h) = f^{(n)}(0) - \frac{1}{h^n} \nabla^n f_{[\frac{n+1}{2}]}, \quad n = 1, 2, 3, 4.$$

Încercați să determinați ordinul de convergență a lui  $e_n(h)$  când  $h \rightarrow \infty$  afișând pentru  $n = 1, \dots, 4$

$$e_n(h_k) \text{ și } r_k := \frac{e_n(h_k)}{e_n(h_{k-1})}, \quad k = 1, 2, \dots, 10,$$

unde  $h_k = \frac{1}{4}2^{-k}$ ,  $k \geq 0$ . Comentați rezultatele.



## 101 Calcul numeric

**Problema 101.1.** Arătați că dacă funcția  $g$  interpolează funcția  $f$  în  $x_0, x_1, \dots, x_{n-1}$  și  $h$  interpolează  $f$  în  $x_1, x_2, \dots, x_n$ , atunci

$$g(x) + \frac{x_0 - x}{x_n - x_0} [g(x) - h(x)] \quad (6)$$

interpolează  $f$  în  $x_0, x_1, \dots, x_{n-1}, x_n$ . Dați un exemplu de funcții  $g$  și  $h$  și combinație (6) cu această proprietate.

**Problema 101.2 (P).** Pentru  $p \in \mathbb{N}$  fie

$$I_p = \int_0^1 (1-t)^p f(t) dt.$$

Comparați regula trapezelor cu  $n$  subintervale cu cuadratura Gauss-Jacobi cu  $n$  puncte pe  $[0, 1]$  cu parametrii  $\alpha = p, \beta = 0$ . Luați de exemplu  $f(t) = \tan t$  și  $p = 5 : 5 : 20$  și  $n = 10 : 10 : 50$  în cazul metodei trapezelor și  $n = 2 : 2 : 10$  pentru cuadratura Gauss.

## 102 Calcul numeric

**Problema 102.1.** Fie  $f(x) = e^x$ .

(a) Arătați că

$$f[t, t+1, \dots, t+n] = \frac{(e-1)^n}{n!} e^t.$$

(b) Din formula de medie pentru diferențe divizate se știe că

$$f[0, 1, \dots, n] = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}, \quad \xi \in (0, n).$$

Utilizați rezultatul de la (a) pentru a determina  $\xi$ . Este localizat la stânga sau la dreapta mijlocului  $n/2$ ?

**Problema 102.2 (P).** Pentru  $n \geq 2$  întreg, considerăm ecuația

$$\frac{x + x^{-1}}{x^n + x^{-n}} = \frac{1}{n}.$$

(a) Scrieți ecuația sub forma unei ecuații polinomiale echivalente  $p_n(x) = 0$ .

(b) Utilizați regula lui Descartes (aplicată lui  $p_n(x) = 0$ ) pentru a arăta că există exact două rădăcini pozitive, una în  $(0, 1)$ , alta în  $(1, 1)$ . Ce legătură este între ele? Se notează cea mai mare rădăcină cu  $\alpha_n$  ( $n > 1$ ). Se știe că (*nu trebuie să demonstrați aceasta*)

$$1 < \alpha_{n+1} < \alpha_n < 3, \quad n = 2, 3, 4, \dots$$

(c) Scrieți și executați un program care aplică metoda lui Newton (ecuației  $p_n(x) = 0$ ) pentru a calcula  $\alpha_n$ ,  $n = 2, 3, \dots, 20$ , cu șase zecimale exacte, utilizând valoarea inițială 3 pentru  $\alpha_2$  și valoarea inițială  $\alpha_n$  pentru  $\alpha_{n+1}$  ( $n \geq 2$ ). (Justificați aceste alegeri.) Pentru fiecare  $n$ , determinați numărul de iterații necesare.

## 103 Calcul numeric

**Problema 103.1.** Fie  $f$  o func(t)ie arbitrară continuă pe  $[0, 1]$  ce satisface

$$f(x) + f(1 - x) = 1, \quad x \in [0, 1].$$

- (a) Arătați că  $\int_0^1 f(x)dx = \frac{1}{2}$ .
- (b) Arătați că formula repetată a trapezului pentru a calcula  $\int_0^1 f(x)dx$  este exactă.
- (c) Arătați, cu cât mai puține calcule, că formula repetată a lui Simpson și formulele simetrice mai generale sunt de asemenea exacte.

**Problema 103.2 (P).** Se consideră ecuația

$$x = e^{-x}.$$

- (a) Implementați iterația cu punct fix  $x_n = e^{-x_n}$ , pornind cu  $x_0 = 1$  și oprind după primul  $n$  pentru care  $x_{n+1}$  coincide cu  $x_n$  în limita preciziei mașinii. Listați această valoare a lui  $n$  și  $x_{n+1}$  corespunzător.
- (b) Dacă ecuația este înmulțită cu  $\omega$  ( $\neq 0$  și  $\neq 1$ ) și  $x$  este adăugat la ambii membri, se obține ecuația echivalentă

$$x = \frac{\omega e^{-x} + x}{1 + \omega}.$$

Ce condiții trebuie puse asupra lui  $\omega$  pentru ca iterația cu punct fix pentru această ecuație să convergă mai rapid decât iterația de la (a)? În această condiție apare și rădăcina  $\alpha$  a ecuației

- (c) Care este valoarea optimă a lui  $\omega$ ? Verificați pe calculator într-o manieră analoagă cu cea de la (a).

## 104 Calcul numeric

**Problema 104.1.** Se consideră ecuația lui Lambert  $xe^x = a$  pentru valori reale ale lui  $x$  și  $a$ .

- (a) Arătați grafic că ecuația are exact o rădăcină  $\xi(a) \geq 0$  dacă  $a \geq 0$ , exact două rădăcini  $\xi_2(a) < \xi_1(a) < 0$  dacă  $-1/e < a < 0$ , o rădăcină dublă  $-1$  dacă  $a = -1/e$  și nici o rădăcină dacă  $a < -1/e$ .
- (b) Discutați condiționarea lui  $\xi(a)$ ,  $\xi_1(a)$ ,  $\xi_2(a)$  când  $a$  variază în intervalele respective.

**Problema 104.2 (P).** Constanta Littlewood–Salem–Izumi,  $\alpha_0$ , definită ca soluția unică în intervalul  $0 < \alpha < 1$  a ecuației

$$\int_0^{3\pi/2} \frac{\cos t}{t^\alpha} dt = 0,$$

prezintă interes în teoria seriilor trigonometrice. Utilizați metoda lui Newton în combinație cu o cuadratură Gauss-Jacobi pentru a calcula  $\alpha_0$ .

## 105 Calcul numeric

**Problema 105.1** (Euler, 1734). Fie  $x_k = 10^k$ ,  $k = 0, 1, 2, \dots$  și  $f(x) = \log_{10} x$ .

(a) Arătați că

$$f[x_0, \dots, x_n] = \frac{(-1)^{n-1}}{10^{n(n-1)/2} (10^n - 1)}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

(Indicație: demonstrați prin inducție după  $n$  rezultatul mai general

$$f[x_r, \dots, x_{r+n}] = \frac{(-1)^{n-1}}{10^{rn+n(n-1)/2} (10^n - 1)}, \quad r \geq 0.)$$

(b) Utilizați formula lui Newton pentru a determina  $p_n(x) = (L_n f)(x; x_0, x_1, \dots, x_n)$ . Arătați că  $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n(x)$  există, pentru  $x \in [1, 10)$ . Este limita egală cu  $\log_{10}(x)$ ? Verificați pentru  $x = 9$ .

**Problema 105.2** (P). Ecuația

$$f(x) = x \tan x - 1 = 0;$$

are o infinitate de rădăcini,  $\alpha_n$ , câte una în fiecare interval  $[n\pi, (n + \frac{1}{2})\pi]$ ,  $n = 0, 1, 2, \dots$

- (a) Arătați existența rădăcinilor pe cale grafică.
- (b) Arătați că cea mai mică rădăcină pozitivă  $\alpha_0$  se poate obține cu metoda lui Newton pornind cu  $x_0 = \frac{\pi}{4}$ .
- (c) Arătați că metoda lui Newton cu valoarea de pornire  $x_0 = (n + \frac{1}{4})\pi$  converge monoton descrescător către  $\alpha_n$  dacă  $n \geq 1$ .
- (d) Dezvoltând  $\alpha_n$  (formal) după puterile inverse ale lui  $\pi n$

$$\alpha_n = n\pi + c_0 + c_1 (\pi n)^{-1} + c_2 (\pi n)^{-2} + c_3 (\pi n)^{-3} + \dots$$

determinați  $c_0, c_1, c_2, \dots, c_9$ . (Indicație: Utilizați comanda Maple **series**.)

- (e) Utilizați metoda lui Newton pentru a calcula  $\alpha_n$  pentru  $n = 1 : 10$  și comparați rezultatele cu aproximația furnizată de dezvoltarea de la (d).

## 106 Calcul numeric

**Problema 106.1.** (a) Deduceți relația de recurență cu trei termeni

$$\begin{aligned}\sqrt{\beta_{k+1}}\tilde{\pi}_{k+1}(t) &= (t - \alpha_k)\tilde{\pi}_k(t) - \sqrt{\beta_k}\tilde{\pi}_{k-1}(t), & k = 0, 1, 2, \dots \\ \tilde{\pi}_{-1}(t) &= 0, & \tilde{\pi}_0(t) = \frac{1}{\sqrt{\beta_0}}\end{aligned}$$

pentru polinoamele ortonormale  $\tilde{\pi}_k(t) = \pi_k(t) / \|\pi_k\|$ ,  $k = 0, 1, 2, \dots$

(b) Utilizați rezultatul de la (a) pentru a deduce formula *Christoffel–Darboux*

$$\sum_{k=0}^n \tilde{\pi}_k(x)\tilde{\pi}_k(t) = \sqrt{\beta_{n+1}} \frac{\tilde{\pi}_{n+1}(x)\tilde{\pi}_n(t) - \tilde{\pi}_n(x)\tilde{\pi}_{n+1}(t)}{x - t}.$$

**Problema 106.2** (P). Funcțiile Bessel  $J_n$  se definesc prin

$$J_n(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos(x \sin \theta - n\theta) d\theta.$$

Arătați că  $|J_n(x)| \leq 1$ .

(a) Se știe că  $J_{n+1}(x) = 2nx^{-1}J_n(x) - J_{n-1}(x)$ . Utilizați această relație pentru a calcula  $J_0(1)$ ,  $J_1(1)$ ,  $\dots$ ,  $J_{20}(1)$ , pornind de la valorile cunoscute  $J_0(1) \approx 0.7651976865$  și  $J_1(1) \approx 0.4400505857$ . Țineți cont de faptul că inegalitatea  $|J_n(x)| \leq 1$  este încălcată.

(b) O altă relație de recurență este  $J_{n-1}(x) = 2nx^{-1}J_n(x) - J_{n+1}(x)$ . Pornind de la valorile cunoscute  $J_{20}(1) \approx 3.873503009 \times 10^{-25}$  și  $J_{19}(1) \approx 1.548478441 \times 10^{-23}$ , utilizați această relație pentru a calcula  $J_{18}(1)$ ,  $J_{17}(1)$ ,  $\dots$ ,  $J_1(1)$ ,  $J_0(1)$ . Analizați rezultatele.

## 107 Calcul numeric

**Problema 107.1.** Dându-se numărul natural  $n$ , fie  $\xi = \xi(a)$  rădăcina pozitivă unică a ecuației  $x^n = ae^{-x}$  ( $a > 0$ ). Determinați condiționarea în funcție de  $a$ ; simplificați rezultatul cât mai mult posibil. În particular, arătați că  $(\text{cond } \xi)(a) < 1/n$ .

**Problema 107.2 (P).** *Funcția lui Lebesgue* pentru sistemul de noduri  $(x_j)_{j=0, \overline{m}}$  din  $[a, b]$  se definește prin

$$\lambda(x) = \sum_{j=0}^m |\ell_j(x)|,$$

unde  $\ell_j$  sunt polinoamele fundamentale Lagrange, iar cantitatea

$$\Lambda = \sup_{x \in [a, b]} \lambda(x)$$

se numește *constantă lui Lebesgue*.

- (a) Să se rezezeze grafic  $\lambda(x)$  și să se calculeze  $\Lambda$  pentru noduri echidistante în  $[-1, 1]$  și  $m = 4, 8, 12, 30$ .
- (b) Să se rezezeze grafic  $\lambda(x)$  și să se calculeze  $\Lambda$  pentru noduri Cebîșev de speța a doua în  $[-1, 1]$  și  $m = 4, 8, 12, 100$ .
- (c) Comentați rezultatele obținute.

## 108 Calcul numeric

**Problema 108.1.** Fie  $f(x) = (1+a)^x$ ;  $|a| < 1$ . Arătați că  $(L_n f)(x; 0, 1, \dots, n)$  este trunchierea (suma parțială) a seriei binomiale a lui  $f$  la  $n+1$  termeni. (Indicație: utilizați forma Newton a polinomului de interpolare.)

**Problema 108.2** (P). Nu există nici o metodă elegantă de a calcula

$$I = \int_0^{\pi/2} \ln \sin x dx.$$

Metoda “forței brute” împarte integrala în trei părți: de la  $x = 0$  la 0.01, de la 0.01 la 0.2 și de la  $x = 0.2$  to  $\pi/2$ . Pentru prima parte utilizăm aproximarea  $\sin x \approx x$ , care ne permite să obținem integrala analitic. Celelalte părți se pot calcula cu o cuadratură Gauss–Legendre. Utilizați această metodă pentru a aproxima  $I$  cu șase zecimale.



## 109 Calcul numeric

**Problema 109.1.** (a) (T) Metoda lui Newton se poate aplica și pentru funcții complexe utilizând valori de pornire complexe și aritmetică complexă. De asemenea, se poate aplica și ecuației  $f(z) = g(x, y) + ih(x, y)$ , unde  $f(z)$  este o funcție analitică în variabila complexă  $z = x + iy$  ( $x$  și  $y$  reale) și  $g(x, y)$  și  $h(x, y)$  sunt funcții reale de variabilele  $x$  și  $y$ . Derivata  $f'(z)$  este dată de  $f'(z) = g_x + ih_x = h_y - ig_y$ , datorită condițiilor Cauchy-Riemann  $g_x = h_y$  și  $h_x = -g_y$ . Semnificația notațiilor este  $g_x = \frac{\partial g}{\partial x}$ ,  $g_y = \frac{\partial g}{\partial y}$ ,  $h_x = \frac{\partial h}{\partial x}$ ,  $h_y = \frac{\partial h}{\partial y}$ . Arătați că metoda lui Newton

$$z_{n+1} = z_n - \frac{f(z_n)}{f'(z_n)}$$

se poate scrie sub forma

$$x_{n+1} = x_n - \frac{gh_y - hg_y}{g_x h_y - g_y h_x}, \quad y_{n+1} = y_n - \frac{hg_x - gh_x}{g_x h_y - g_y h_x}.$$

Toate funcțiile se evaluează în  $z_n = x_n + iy_n$ .

(b) (P) Determinați rădăcinile complexe ale ecuațiilor

$$\begin{aligned} z^3 - z - 1 &= 0, & z^4 - 2z^3 - 2iz^2 + 4iz &= 0, \\ 2z^3 - 6(1+i) - 6(1-i) &= 0, & z &= e^z, \end{aligned}$$

aplicând direct metoda lui Newton și folosind punctul (a).

## 110 Calcul numeric

**Problema 110.1.** Arătați că dacă  $A$  este simetrică și admite o factorizare  $LU$ , atunci  $A$  are o factorizare  $A = LDL^T$ , unde  $D$  este diagonală. Este rezultatul valabil pentru o matrice hermitiană? Deduceți de aici existența factorizării Cholesky dacă  $A$  este simetrică (hermitiană) și pozitiv definită.

**Problema 110.2 (P).** O grindă uniformă formează arcul de cantilever (grindă încastrată)  $AB$  (figura 8). Se poate arăta că deplasamentul vertical al lui  $A$  datorat forței  $P$  este

$$\delta_A = \frac{Pb^3}{EI} C\left(\frac{h}{b}\right),$$

unde  $EI$  este rigiditatea grindei și

$$C\left(\frac{h}{b}\right) = \int_0^1 z^2 \sqrt{1 + \left(\frac{2h}{b}z\right)^2} dz.$$

Scrieți un program care calculează  $C(h/b)$  pentru orice valoare dată a lui  $h/b$ . Utilizați programul pentru a calcula  $C(0.5)$ ,  $C(1.0)$  și  $C(2.0)$ .




Figura 8: Cantilever semiparabolic

## 111 Calcul numeric

**Problema 111.1.** Se consideră sistemul

$$\begin{bmatrix} A & 0 \\ B & C \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b \\ d \end{bmatrix}.$$

Arătați cum se poate rezolva sistemul mai eficient utilizând submatrice în locul sistemului întreg. Dați o estimare a costurilor în ambele abordări (submatrice și global). Dați un exemplu numeric când toate submatricele sunt  $2 \times 2$ .

**Problema 111.2 (P).** Aproximați

$$\int_1^\pi \frac{\ln x}{x^2 - 2x + 2} dx$$

cu 8 zecimale exacte folosind o cuadratură Gauss-Legendre. Aproximați

$$\int_0^{\pi/2} \frac{dx}{\sqrt{\sin x}}$$

cu 9 zecimale exacte, folosind o cuadratură Gauss-Cebîșev.

## 112 Calcul numeric

**Problema 112.1.** (a) Utilizați formula  $T_j(x) = \cos(j \arccos x)$  pentru polinoame Cebîșev și arătați că

$$\begin{aligned} \int T_j(x) dx &= \frac{1}{2} \left[ \frac{\cos((j+1) \arccos x)}{j+1} - \frac{\cos((j-1) \arccos x)}{j-1} \right] + C \\ &= \frac{1}{2} \left[ \frac{T_{j+1}(x)}{j+1} - \frac{T_{j-1}(x)}{j-1} \right] + C, \quad j = 2, 3, \dots, \end{aligned}$$

unde  $C$  este o constantă arbitrară.

- (b) Fie  $p(x) = \sum_{j=0}^n a_j T_j(x)$ . Utilizați partea (a) împreună cu relațiile  $T_0(x) = 1$ ,  $T_1(x) = x$ ,  $T_2(x) = 2x^2 - 1$  pentru a determina coeficienții  $A_0, \dots, A_n, A_{n+1}$  astfel încât  $\int p(x) dx = \sum_{j=0}^{n+1} A_j T_j(x)$ , adică exprimați  $A_0, \dots, A_n, A_{n+1}$  în funcție de  $a_0, \dots, a_n$ . (Notă: coeficientul  $A_0$  poate fi arbitrar, pentru a ține cont de constanta arbitrară din integrala nedefinită.)
- (c) Fie acum  $q(x) = \sum_{j=0}^{n+1} A_j T_j(x)$ . Inversând procesul de la punctul (b), determinați coeficienții  $a_0, \dots, a_n$  astfel încât  $q'(x) = \sum_{j=0}^n a_j T_j(x)$ , adică exprimați  $a_0, \dots, a_n$  în funcție de  $A_0, \dots, A_n, A_{n+1}$ . *Indicație:* lucrați de la indici mari spre indici mici, exprimând  $a_n$  în funcție de  $A_{n+1}$ , apoi exprimând  $a_{n-1}$  în funcție de  $A_n$ , apoi  $a_{j-1}$  în funcție de  $A_j$  și  $a_{j+1}$ ,  $j = n-1, \dots, 1$ .

**Problema 112.2 (P).** Calculați  $\text{cond}_2(H_n)$  pentru  $n = 10 : 10 : 100$ .

## 113 Calcul numeric

**Problema 113.1.** (a) Utilizând formula lui Taylor deduceți aproximarea

$$f'(x) \approx \frac{1}{2h} [-3f(x) + 4f(x+h) - f(x+2h)]$$

și termenul rest.

(b) Deduceți o aproximare pentru  $f'(x)$  cu eroarea  $O(h^4)$  folosind formula lui Taylor și extrapolarea Richardson.

**Problema 113.2 (P).** Scrieți o funcție `CubeRoot(x)` pentru calculul lui  $\sqrt[3]{x}$  pentru  $x$  real utilizând algoritmul următor. La început, reduceți argumentul  $x$  determinând un număr real  $r$  și un întreg  $m$  astfel încât  $x = 2^{3m}r$  cu  $\frac{1}{8} \leq r < 1$ . Apoi, calculați  $x_2$  utilizând patru iterații ale metodei lui Newton cu

$$x_{n+1} = \frac{2}{3} \left( x_n + \frac{r}{2x_n^2} \right)$$

cu valoarea de pornire specială

$$x_0 = 2.502926 - \frac{8.045125(r + 0.3877552)}{(r + 4.612244)(r + 0.3877552) - 0.3598496}.$$

Setați  $\sqrt[3]{x} \approx 2^m x_4$ . Testați pentru diverse valori ale lui  $x$ .

## 114 Calcul numeric

**Problema 114.1.** Se consideră aproximarea

$$f''(x) \approx Af(x) + Bf(x+h) + Cf(x+2h).$$

Determinați coeficienții  $A$ ,  $B$  și  $C$  astfel încât gradul de exactitate să fie maxim și determinați eroarea.

**Problema 114.2** (P). Scrieți o rutină ce calculează tangenta lui  $x$  în radiani, utilizând algoritmul de mai jos. Testați rutina obținută pentru mai multe valori ale lui  $x$ . Întâi, argumentul  $x$  se reduce la  $|x| \leq \pi/2$  adăugând sau scăzând multipli de  $\pi$ . Dacă  $0 \leq |x| \leq 1.7 \times 10^{-9}$ , punem  $\tan x \approx x$ . Dacă  $|x| > \pi/4$ , facem  $u = \pi/2 - x$ ; altfel, setăm  $u = x$ . Calculăm acum aproximația

$$\tan u \approx u \left( \frac{135135 - 17336.106u^2 + 379.23564u^4 - 1.0118625u^6}{135135 - 62381.106u^2 + 3154.9377u^4 + 28.17694u^6} \right)$$

În final, dacă  $|x| > \pi/4$ , punem  $\tan x \approx 1/\tan u$ ; dacă  $|x| \leq \pi/4$ , facem  $\tan x \approx \tan u$ . Notă: Acest algoritm se obține din „raționale telescopate” și fracții continue gaussiene pentru funcția tangentă.

## 115 Calcul numeric

**Problema 115.1.** Presupunem că se dau valorile lui  $f$  și  $f'$  în punctele  $x_0 - h$  și  $x_0 + h$  și că dorim să aproximăm  $f'(x_0)$ . Găsiți coeficienții  $\alpha$  și  $\beta$  astfel încât aproximația

$$f'(x_0) \approx \alpha \frac{f'(x_0 + h) + f'(x_0 - h)}{2} + \beta \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h}$$

să aibă precizia  $O(h^4)$ . *Indicație:* Combinați dezvoltările Taylor ale lui  $f(x_0 + h)$ ,  $f(x_0 - h)$ ,  $f'(x_0 + h)$ ,  $f'(x_0 - h)$  și eliminați termenul dominant al erorii.

**Problema 115.2.** Calculul unei aproximații a lui  $\sqrt{x^2 + y^2}$  se poate realiza cu algoritmul Moler-Morison

---

**Algorithm 1** Algoritmul Moler-Morison pentru calculul lui  $\sqrt{x^2 + y^2}$

---

```
function  $f(x, y)$ 
 $f \leftarrow \max(|x|, |y|)$ ;
 $a \leftarrow \min(|x|, |y|)$ ;
for  $n = 1$  to 3 do
     $b \leftarrow (a/f)^2$ ;
     $c \leftarrow b/(4 + b)$ ;
     $f \leftarrow f + 2cf$ ;
     $a \leftarrow ca$ ;
end for
return  $f$ 
end function
```

---

- (a) Implementați algoritmul în MATLAB și testați-l.
- (b) De ce nu s-a preferat o implementare „directă”? Justificați răspunsul cu exemple în MATLAB.
- (c) De ce se fac numai trei iterații? (Indicație: am putea itera până când  $2cf$  este suficient de mic și  $f$  nu se mai modifică.)
- (d) Folosiți rutina pentru calculul normei unui vector de dimensiune oarecare.

## 116 Calcul numeric

**Problema 116.1.** 1. Arătați că dacă  $x_i = a + ih$ ,  $i = 0, 1, \dots, n$  și  $h = (b - a)/n$ , atunci pentru orice  $x \in [a, b]$

$$\prod_{i=0}^n |x - x_i| \leq \frac{1}{4} h^{n+1} n!.$$

Indicație: Se arată că dacă  $x_j \leq x \leq x_{j+1}$

$$|x - x_j| |x - x_{j+1}| \leq \frac{h^2}{4}.$$

2. Dacă  $f \in C^{n+1}[a, b]$  și  $|f^{(n+1)}(x)| \leq M$  pe  $[a, b]$  și nodurile sunt echidistante

$$|(R_n f)(x)| \leq \frac{1}{4(n+1)} M h^{n+1},$$

unde  $h = (b - a)/n$ .

**Problema 116.2 (P).** Se consideră sistemul rar

$$\begin{bmatrix} 3 & -1 & & & & \\ -1 & 3 & -1 & & & \\ & -1 & 3 & -1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & -1 & 3 & -1 \\ & & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & \frac{1}{2} & & -1 & 3 & -1 \\ & \frac{1}{2} & & & -1 & 3 & -1 \\ & & & & & -1 & 3 \\ \frac{1}{2} & & & & & & \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ x_{n-2} \\ x_{n-1} \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.5 \\ 1.5 \\ 1.5 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 1.5 \\ 1.5 \\ 1.5 \end{bmatrix}$$

Soluția exactă este  $x = [1, 1, \dots, 1, 1]^T$ . Utilizați o metodă iterativă pentru a rezolva acest sistem pentru valori crescătoare ale lui  $n$ .



## 117 Calcul numeric

**Problema 117.1.** Fie  $A$  o matrice complexă nesingulară. Verificați că

$$\begin{bmatrix} A & A^* \\ -Ai & A^*i \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} A^{-1} & A^{-1}i \\ A^{*-1} & -A^{*-1}i \end{bmatrix},$$

unde  $A^*$  este transpusa conjugată a lui  $A$ .

**Problema 117.2 (P).** (a) Scrieți o funcție `SquareRoot(x)` pentru calculul lui  $\sqrt{x}$  pentru  $x$  pozitiv utilizând algoritmul următor. La început, reduceți argumentul  $x$  determinând un număr real  $r$  și un întreg  $m$  astfel încât  $x = 2^{2m}r$  cu  $\frac{1}{4} \leq r < 1$ . Apoi, calculați  $x_2$  utilizând trei iterații ale metodei lui Newton cu

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left( x_n + \frac{r}{x_n} \right)$$

cu valoarea de pornire specială

$$x_0 = 1.27235367 + 0.242693281r - \frac{1.02966039}{1+r}.$$

Apoi, setați  $\sqrt{x} \approx 2^m x_2$ . Testați acest algoritm pentru diverse valori ale lui  $x$ .

(b) Comparați experimental cu metoda cu ordinul de convergență 3 dată de

$$x_{n+1} = \frac{x_n(x_n^2 + 3r)}{3x_n^2 + r}.$$

Utilizați aceeași reducere a argumentului și aceeași aproximație inițială.

## 118 Calcul numeric

**Problema 118.1.** Fie  $X$  o matrice pătratică de forma

$$X = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$$

unde  $A$  și  $D$  sunt pătratice și  $A^{-1}$  există. Se știe că  $X^{-1}$  există dacă și numai dacă  $(D - CA^{-1}B)^{-1}$  există. Verificați că  $X^{-1}$  este dată de

$$X^{-1} = \begin{bmatrix} I & -A^{-1}B \\ 0 & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A^{-1} & 0 \\ 0 & (D - CA^{-1}B)^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & 0 \\ -CA^{-1} & I \end{bmatrix}.$$

Ca aplicație, calculați inversele matricelor

$$X = \left[ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right], X = \left[ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ [2] \end{bmatrix} \right]$$

**Problema 118.2** (P). Scrieți o rutină ce calculează  $\sin x$  pentru  $x$  în radiani, după algoritmul următor. Întâi, utilizând proprietățile funcției sinus, reduceți rangul astfel încât  $-\pi/2 \leq x \leq \pi/2$ . Apoi, dacă  $|x| < 10^{-8}$ , punem  $\sin x \approx x$ ; dacă  $|x| > \pi/6$ , punem  $u = x/3$ , calculăm  $\sin u$  după formula (7) de mai jos și apoi punem  $\sin x \approx (3 - 4\sin^2 u)\sin u$ ; dacă  $|x| \leq \pi/6$ , punem  $u = x$  și calculăm  $\sin u$  după cum urmează:

$$\sin u \approx u \left[ \frac{-\frac{479249}{11511339840}u^6 + \frac{34911}{7613320}u^4 - \frac{29593}{207636}u^2 + 1}{1 + \frac{1671}{69212}u^2 + \frac{97}{351384}u^4 + \frac{2623}{1644477120}u^6} \right]. \quad (7)$$

Testați rutina dumneavoastră. *Notă:* Aceasta este aproximarea rațională Padé pentru sinus.

## 119 Calcul numeric

**Problema 119.1.** Procedeul  $\Delta^2$  al lui Aitken este un instrument pentru accelerarea convergenței proceselor liniare și se definește prin

$$x'_n = x_n - \frac{(\Delta x_n)^2}{\Delta^2 x_n}, \quad (8)$$

unde  $\Delta x_n = x_{n+1} - x_n$  și  $\Delta^2 x_n = \Delta(\Delta x_n) = x_{n+2} - 2x_{n+1} + x_n$ . Fie  $(x_n)$  un șir ce converge liniar către  $\alpha$  cu constanta de eroare asimptotică  $c$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - \alpha}{x_n - \alpha} = c, \quad |c| < 1$$

și presupunem că  $x_n \neq \alpha$ ,  $\forall n$ .

- (a) Deduceți procedeul  $\Delta^2$  al lui Aitken, presupunând că două rapoarte consecutive în relația de mai sus (de exemplu, pentru  $n$  și  $n+1$ ) sunt egale cu  $c$ .
- (b) Arătați că șirul  $(x'_n)$  din (8) este bine definit pentru  $n$  suficient de mare.
- (c) Arătați că

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x'_n - \alpha}{x_n - \alpha} = 0,$$

adică convergența superliniară.

**Problema 119.2** (P, exponențiala). (a) Scrieți o rutină ce calculează  $e^x$  însumând  $n$  termeni ai seriei Taylor până când al  $(n+1)$ -lea termen  $t$  verifică  $|t| < \varepsilon$ ,  $\varepsilon$  dat. Utilizați  $1/e^x$  pentru valori negative ale lui  $x$ . Testați pentru valorile: 0, +1, -1, 0.5, -0.123, -25.5, -1776, 3.14159. Calculați eroarea absolută, eroarea relativă și  $n$  pentru fiecare caz, utilizând funcția exponențială din sistem pentru valoarea exactă. Nu însumați mai mult de 25 de termeni.

- (b) Calculul lui  $e^x$  se poate reduce la calculul lui  $e^u$  pentru  $|u| < (\ln 2)/2$ . Acest algoritm înlătură puterile lui 2 și calculează  $e^u$  într-un domeniu în care seria converge foarte repede. Se scrie

$$e^x = 2^m e^u,$$

unde  $m$  și  $u$  se calculează prin

$$\begin{aligned} z &\leftarrow x/\ln 2; & m &\leftarrow \text{integer}\left(z \pm \frac{1}{2}\right) \\ w &\leftarrow z - m; & u &\leftarrow w \ln 2 \end{aligned}$$

Aici semnul minus se utilizează dacă  $x < 0$  deoarece  $z < 0$ . Încorporați tehnica de reducere în cod.

- (c) Scrieți o rutină care utilizează reducerea de rang  $e^x = 2^m e^u$  și calculează  $e^u$  din partea pară a fracției continue gaussiene, adică,

$$e^u = \frac{s+u}{s-u} \text{ unde } s = 2 + u^2 \left( \frac{2520 + 28u^2}{15120 + 420u^2 + u^4} \right).$$

Testați pe datele date la punctul (a).

## 120 Calcul numeric

**Problema 120.1.** Să se stabilească formulele

$$\begin{aligned}f'(x) &= \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} + O(h^2) \\f''(x) &= \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2} + O(h^2)\end{aligned}$$

derivând formula de interpolare a lui Lagrange.

**Problema 120.2.** Se consideră problema cu valori pe frontieră

$$y'' = g(x, y, y'), \quad y(a) = \alpha, \quad y(b) = \beta. \quad (9)$$

Ea poate fi discretizată notând  $u_k = y(x_k)$  și înlocuind derivata întâi și a doua cu formulele din problema 120.1 relative la o grilă de puncte echidistante  $x_k = a + \frac{k}{n+1}h$ ,  $k = 0, 1, \dots, n, n+1$ ,  $h = \frac{b-a}{n+1}$ . Se ajunge la un sistem neliniar în necunoscutele  $u_k$ ,  $k = 1, \dots, n$ . Concepeți o metodă de rezolvare aproximativă a problemei (9) bazată pe metoda lui Newton. Aplicație: implementați metoda în MATLAB și rezolvați problema

$$y'' = yy', \quad y(0) = 0, y(1) = 1$$

pentru  $n = 10, 50, 100$  și precizia  $0.5e - 6$ . Cum verificați corectitudinea programului?

## 121 Calcul numeric

**Problema 121.1.** O formulă de cuadratură mai puțin cunoscută, datorată lui Simpson, este

$$\int_a^b f(x)dx = \frac{b-a}{8} \left[ f(a) + 3f\left(\frac{2a+b}{3}\right) + 3f\left(\frac{a+2b}{3}\right) + f(b) \right] + R(f).$$

- Deduceți coeficienții și termenul rest.
- Explicați de ce formula lui Simpson este preferată acestei formule.
- Deduceți formula compusă corespunzătoare.

**Problema 121.2.** Se consideră sistemul rar

$$\begin{bmatrix} 3 & -1 & & & & \\ -1 & 3 & -1 & & & \\ & -1 & 3 & -1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & -1 & 3 & -1 \\ & & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & & -1 & 3 & -1 \\ & & \frac{1}{2} & & & & \\ & & & \frac{1}{2} & & & \\ & & & & \frac{1}{2} & & \\ & & & & & \frac{1}{2} & \\ & & & & & & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ x_{n-2} \\ x_{n-1} \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.5 \\ 1.5 \\ 1.5 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 1.5 \\ 1.5 \\ 1.5 \end{bmatrix}$$

Soluția exactă este  $x = [1, 1, \dots, 1, 1]^T$ . Utilizați o metodă iterativă pentru a rezolva acest sistem pentru valori crescătoare ale lui  $n$ .

## 122 Calcul numeric

**Problema 122.1.** (a) Deduceți o formulă Newton-Cotes închisă cu cinci noduri echidistante pe  $[-1, 1]$ . Care este gradul de exactitate?

(b) Deduceți o formulă cu cinci noduri Cebîșev de speța a doua pe același interval. Comparați resturile.

**Problema 122.2** (P). Scrieți o rutină ce calculează  $\arcsin x$ , bazată pe algoritmul de mai jos, ce utilizează raționale telescopate pentru arcsinus. Dacă  $|x| < 10^{-8}$ , setați  $\arcsin x \approx x$ . Altfel, dacă  $0 \leq x \leq \frac{1}{2}$ , punem  $u = x$ ,  $a = 0$  și  $b = 1$ ; dacă  $\frac{1}{2} < x \leq \frac{1}{2}\sqrt{3}$  puneți  $u = 2x^2 - 1$ ,  $a = \pi/4$ , și  $b = 1/2$ ; dacă  $\frac{1}{2}\sqrt{3} < x \leq \frac{1}{2}\sqrt{2 + \sqrt{3}}$  setați  $u = 8x^4 - 8x^2 + 1$ ,  $a = 3\pi/8$ , și  $b = 1/4$ ; dacă  $\frac{1}{2}\sqrt{2 + \sqrt{3}} < x \leq 1$ , setați  $u = \sqrt{\frac{1}{2}(1 - x)}$ ,  $a = \pi/2$ , și  $b = -2$ . Apoi calculați aproximanta

$$\begin{aligned} \arcsin u \approx u \bigg( & 1.0 + \frac{1}{6}u^2 + 0.075u^4 + 0.04464286u^6 + 0.03038182u^8 \\ & + 0.022375u^{10} + 0.01731276u^{12} + 0.01433124u^{14} \\ & + 0.009342806u^{16} + 0.01835667u^{18} - 0.01186224u^{20} \\ & + 0.03162712u^{22} \bigg) \end{aligned}$$

În final, se pune  $\arcsin x \approx a + b \arcsin u$ . Testați rutina pentru diverse valori ale lui  $x$ .

## 123 Calcul numeric

**Problema 123.1.** Se consideră o formulă de cuadratură de forma

$$\int_0^1 x^\alpha f(x) dx \approx Af(0) + B \int_0^1 f(x) dx, \quad \alpha > -1, \alpha \neq 0.$$

- (a) Determinați  $A$  și  $B$  astfel încât formula să aibă gradul de exactitate  $d = 1$ .
- (b) Fie  $R(f)$  funcționala de eroare pentru regula determinată la punctul (a). Arătați că nucleul lui Peano  $K_1(t) = R_x((x-t)_+)$  este pozitiv definit pentru  $\alpha > 0$  și negativ definit pentru  $\alpha < 0$ .
- (c) Folosind rezultatele de la punctul (b), determinați constanta  $e_2$  din  $R(f) = e_2 f''(\xi)$ ,  $0 < \xi < 1$ .

**Problema 123.2 (P).** Scrieți o rutină care calculează  $\arctan x$  pentru  $x$  în radiani după cum urmează. Dacă  $0 \leq x \leq 1.7 \times 10^{-9}$ , punem  $\arctan x \approx x$ . Dacă  $1.7 \times 10^{-9} < x \leq 2 \times 10^{-2}$ , se utilizează seria trunchiată

$$\arctan x \approx x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{7}x^7.$$

Altfel, se pune  $y = x$ ,  $a = 0$  și  $b = 1$  dacă  $0 \leq x \leq 1$ ; se pune  $y = 1/x$ ,  $a = \pi/2$  și  $b = -1$  dacă  $1 < x$ . Apoi punem  $c = \pi/16$  și  $d = \tan c$  dacă  $0 \leq y \leq \sqrt{2} - 1$  și  $c = 3\pi/16$  și  $d = \tan c$  dacă  $\sqrt{2} - 1 < y \leq 1$ . Calculăm  $u = (y - d)/(1 + dy)$  și aproximarea

$$\arctan u \approx u \left( \frac{135135 + 171962.46u^2 + 52490.4832u^4 + 2218.1u^6}{135135 + 217007.46u^2 + 97799.3033u^4 + 10721.3745u^6} \right)$$

În final, punem  $\arctan x \approx a + b(c + \arctan u)$ . Notă: Acest algoritm utilizează „raționale telescopate” și fracții continue gaussiene.



## 124 Calcul numeric

**Problema 124.1.** Funcția

$$\lambda_n(x) = \sum_{i=0}^n |\ell_i(x)|$$

se numește funcția lui Lebesgue pentru interpolarea polinomială și nodurile distincte  $x_i$ ,  $i = 0, 1, \dots, n$ .

- (a) Dacă  $f_i = f(x_i)$  și  $f_i^* = f(x_i) + \varepsilon_i$ , unde  $|\varepsilon_i| \leq \varepsilon$ , arătați că  $|(L_n f^*)(x) - (L_n f)(x)| \leq \varepsilon \lambda_n(x)$ .
- (b) Arătați că  $\lambda_n(x_j) = 1$ ,  $j = 0, 1, \dots, n$ .
- (c) Pentru  $n = 2$  și trei puncte echidistante, arătați că  $\lambda_2(x) \leq 1.25$  pentru orice  $x$  situat între aceste puncte.
- (d) Calculați  $\lambda_2(x)$  pentru  $x_0 = 0$ ,  $x_1 = 1$ ,  $x_2 = p$ , unde  $p \gg 1$  și determinați  $\max_{1 \leq x \leq p} \lambda_2(x)$ . Cum crește acest maxim odată cu  $p$ ? *Indicație:* pentru a simplifica calculele, din (b) se obține că  $\lambda_2(x)$  trebuie să fie pe intervalul  $[1, p]$  de forma  $\lambda_2(x) = 1 + c(x-1)(p-x)$ , unde  $c$  este o constantă.

**Problema 124.2 (P).** Un model simplu de grindă supusă îndoirii la solicitări este dat de ecuația diferențială Euler-Bernoulli. Discretizarea cu elemente finite ne conduce la un sistem de ecuații liniare. Pe măsură ce dimensiunea discretizării scade, sistemul devine mai mare și mai prost condiționat.

Pentru o grindă fixată la ambele capete se obține sistemul bandă cu lățimea benzii 5:

$$\begin{bmatrix} 12 & -6 & \frac{4}{3} & & & & \\ -4 & 6 & -4 & 1 & & & \\ 1 & -4 & 6 & -4 & 1 & & \\ & 1 & -4 & 6 & -4 & 1 & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & 1 & -4 & 6 & -4 & 1 \\ & & & & 1 & -4 & 6 & -4 & 1 \\ & & & & & 1 & -4 & 6 & -4 \\ & & & & & & \frac{4}{3} & 6 & -12 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \\ \vdots \\ y_{n-3} \\ y_{n-2} \\ y_{n-1} \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \\ \vdots \\ b_{n-3} \\ b_{n-2} \\ b_{n-1} \\ b_n \end{bmatrix}.$$

Membrul drept reprezintă forțele aplicate grinzii. Alegeți-l astfel ca să avem o soluție cunoscută, cum ar fi o încovoiere la mijlocul grinzii. Utilizând o metodă iterativă rezolvați repetat sistemul pentru valori crescătoare ale lui  $n$ . Crește eroarea când  $n$  crește? Calculați numărul de condiționare al matricei pentru a explica ce se întâmplă.

## 125 Calcul numeric

**Problema 125.1.** (a) Dându-se o funcție  $g(x, y)$  definită pe  $[0, 1] \times [0, 1]$ , să se determine un „polinom biliniar”  $p(x, y) = a + bx + cy + dxy$  astfel încât  $p$  să reproducă valorile lui  $g$  pe colțurile pătratului unitate.

(b) Utilizați (a) pentru a obține o formulă de cubatură pentru  $\int_0^1 \int_0^1 g(x, y) dx dy$  în care intervin valorile lui  $g$  pe cele patru colțuri ale pătratului. La ce formulă se ajunge dacă  $g$  depinde numai de  $x$  nu și de  $y$ ?

(c) Utilizați (b) pentru a obține o formulă de cubatură repetată în care intervin valorile  $g_{ij} = g(ih, jh)$ ,  $i, j = 0, 1, \dots, n$ , unde  $h = 1/n$ .

**Problema 125.2** (P). Scrieți o rutină pentru calculul lui  $\ln x$  cu ajutorul algoritmului descris în continuare și bazat pe „raționale telescopate” și fracții continue gaussiene și testați pentru câteva valori ale lui  $x$ . Verificați dacă  $x = 1$  și returnați zero în caz afirmativ. Reduceți rangul lui  $x$  determinând  $n$  și  $r$  astfel încât  $x = r \times 2^n$  cu  $\frac{1}{2} \leq r < 1$ . Apoi, puneți  $u = (r - \sqrt{2}/2)/(r + \sqrt{2}/2)$  și calculați  $\ln[(1+u)/(1-u)]$  cu aproximarea

$$\ln \frac{1+u}{1-u} \approx u \left( \frac{20790 - 21545.27u^2 + 4223.9187u^4}{10395 - 14237.635u^2 + 4778.8377u^4 - 230.41913u^6} \right)$$

valabilă pentru  $|u| < 3 - 2\sqrt{2}$ . În final, se pune

$$\ln x \approx \left( n - \frac{1}{2} \right) \ln 2 + \ln \frac{1+u}{1-u}.$$

## 126 Calcul numeric

**Problema 126.1.** Se consideră intervalul  $[a, b] = [-1, 1]$  și subdiviziunea sa  $\Delta : x_1 = -1 < x_2 = 0 < x_3 = 1$  și fie  $f(x) = \cos \frac{\pi}{2}x$ ,  $x \in [-1, 1]$ .

- (a) Determinați spline-ul cubic natural al lui  $f$  pe  $\Delta$ .
- (b) Ilustrați teorema de minimalitate pentru funcții spline naturale, alegând  $g(x) = (L_2 f)(x; -1, 0, 1)$  și  $g(x) = f(x)$ .
- (d) Aceeași problemă pentru interpolantul cubic natural  $f$  pe  $\Delta'$  și alegerile  $g(x) = (L_3 f)(x; -1, 0, 1, 1)^1$  și  $g(x) = f(x)$ .

**Problema 126.2 (P).** O matrice în forma Hessenberg superioară este o matrice de forma

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ & a_{32} & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ & & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & & a_{nn-1} & a_{nn} \end{bmatrix}.$$

Scrieți o procedură eficientă pentru rezolvarea unui astfel de sistem și testați-o pentru un sistem cu cel puțin 20 de ecuații.

---

<sup>1</sup>de fapt este un interpolant Hermite cu nodul dublu 1 și nodurile -1 și 0 simple.

## 127 Calcul numeric

**Problema 127.1.** (a) Să se arate că șirul dat prin relația de recurență

$$x_{n+1} = x_n + (2 - e^{x_n}) \frac{x_n - x_{n-1}}{e^{x_n} - e^{x_{n-1}}}, x_0 = 0, x_1 = 1$$

este convergent și să se determine limita sa.

(b) Iterația din metoda secantei se poate scrie și sub forma

$$x_{n+1} = \frac{x_{n-1}f(x_n) - x_nf(x_{n-1})}{f(x_n) - f(x_{n-1})}.$$

Din punct de vedere al erorii, care formă este mai bună în programe, forma aceasta sau forma clasică? Justificați riguros răspunsul.

**Problema 127.2 (P).** Un model simplu de grindă supusă îndoirii la solicitări este dat de ecuația diferențială Euler-Bernoulli. Discretizarea cu elemente finite ne conduce la un sistem de ecuații liniare. Pe măsură ce dimensiunea discretizării scade, sistemul devine mai mare și mai prost condiționat. Sistemul liniar pentru un cantilever (grindă în consolă) cu condiții libere la un capăt este

$$\begin{bmatrix} 12 & -6 & \frac{4}{3} & & & & & & \\ -4 & 6 & -4 & 1 & & & & & \\ 1 & -4 & 6 & -4 & 1 & & & & \\ & 1 & -4 & 6 & -4 & 1 & & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & & \\ & & & 1 & -4 & 6 & -4 & 1 & \\ & & & & 1 & -4 & 6 & -4 & 1 \\ & & & & & 1 & -\frac{93}{25} & \frac{111}{25} & -\frac{43}{25} \\ & & & & & & \frac{12}{25} & \frac{24}{25} & \frac{12}{25} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \\ \vdots \\ y_{n-3} \\ y_{n-2} \\ y_{n-1} \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \\ \vdots \\ b_{n-3} \\ b_{n-2} \\ b_{n-1} \\ b_n \end{bmatrix}.$$

Membrul drept reprezintă forțele aplicate grinzii. Alegeți-l astfel ca să avem o soluție cunoscută, cum ar fi o încovoiere la mijlocul grinzii. Utilizând o metodă directă rezolvați repetat sistemul pentru valori crescătoare ale lui  $n$ . Crește eroarea când  $n$  crește? Calculați numărul de condiționare al matricei pentru a explica ce se întâmplă. Se poate aplica o metodă iterativă staționară?

## 128 Calcul numeric

**Problema 128.1.** Se consideră formula trapezelor „cu valori medii”,

$$\int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{2} \left[ \frac{1}{\varepsilon} \int_0^\varepsilon f(x) dx + \frac{1}{\varepsilon} \int_{1-\varepsilon}^1 f(x) dx \right] + R(f), \quad 0 < \varepsilon < 2.$$

- (a) Determinați gradul de exactitate al formulei.
- (b) Exprimați restul cu teorema lui Peano în ipoteza că  $f \in C^2[0, 1]$ .
- (c) Arătați că nucleul lui Peano păstrează semn constant și exprimați restul sub forma  $R(f) = C f''(\tau)$ ,  $\tau \in (0, 1)$ .
- (d) Considerați (și explicați) cazurile limită  $\varepsilon \searrow 0$  și  $\varepsilon \rightarrow \frac{1}{2}$ .

**Problema 128.2 (P).** Să se rezolve sistemul neliniar

$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 5 \\ e^x + xy - xz = 1 \end{cases}$$

cu metoda lui Newton.

## 129 Calcul numeric

**Problema 129.1** (P). (a) Ce se întâmplă dacă aplicăm metoda lui Newton funcției  $f(x) = \arctan x$  cu  $x_0 = 2$ ? Pentru ce valori de pornire metoda converge?

(b) În metoda lui Newton se avansează de la  $x$  la  $x-h$ , unde  $h = f(x)/f'(x)$ . O rafinare ușor de programat este următoarea: dacă  $|f(x-h)|$  nu este mai mic decât  $|f(x)|$ , atunci valoarea lui  $h$  se respinge și se utilizează valoarea  $h/2$ . Testați această rafinare.

**Problema 129.2.** Găsiți o formulă de cuadratură de forma

$$\int_{-2}^2 |x|f(x)dx = Af(-1) + B(f(0) + Cf(1) + R(f).$$

## 130 Calcul numeric

**Problema 130.1 (P).** (a) Se consideră ecuația  $e^{-x^2} = \cos x + 1$  pe  $[0, 4]$ .  
Ce se întâmplă dacă se aplică metoda lui Newton cu  $x_0 = 0$  și  $x_0 = 1$ ?

(b) Găsiți rădăcina ecuației  $\frac{1}{2}x^2 + x + 1 - e^x = 0$  cu metoda lui Newton și  $x_0 = 1$ . Remarcați convergența lentă, explicați fenomenul și găsiți un remediu.

**Problema 130.2.** Deduceți o formulă de integrare numerică de forma

$$\int_{x_{n-1}}^{x_{n+1}} f(x)dx = Af(x_n) + Bf'(x_{n-1}) + Cf''(x_{n+1}) + R(f)$$

unde punctele  $x_{n-1}$ ,  $x_n$ ,  $x_{n+1}$  sunt echidistate cu distanța dintre ele  $h$ . Formula va avea grad de exactitate cât mai mare posibil. Indicație: Considerați

$$\int_{-h}^h f(x)dx = Af(0) + Bf'(-h) + Cf''(h) + R(f).$$



## 131 Calcul numeric

**Problema 131.1** (P). Utilizați formule de cuadratură de tip Gauss pentru a verifica numeric formulele:

$$\int_0^1 \frac{\log(1-x)}{x} dx = -\frac{\pi^2}{6}, \quad \int_0^1 \frac{\log(1+x)}{x} dx = \frac{\pi^2}{12}$$

$$\int_0^1 \frac{\ln(1+x^2)}{x} dx = \frac{\pi^2}{24}.$$

**Problema 131.2.** Fie  $\Delta : a = x_1 < x_2 < x_3 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$  o diviziune a lui  $[a, b]$  în  $n - 1$  subintervale. Presupunem că se dau valorile  $f_i = f(x_i)$  ale funcției  $f$  în punctele  $x_i$ ,  $i = 1, 2, \dots, n$ . În această problemă  $s \in \mathbb{S}_2^1$  va fi un spline quadratic (de gradul II) care interpolează  $f$  pe  $\Delta$ , adică  $s(x_i) = f_i$ ,  $i = 1, 2, \dots, n$ .

- (a) Explicați de ce este nevoie de o condiție suplimentară pentru a determina  $s$  unic.
- (b) Definim  $m_i = s'(x_i)$ ,  $i = 1, 2, \dots, n - 1$ . Determinați  $p_i := s|_{[x_i, x_{i+1}]}$ ,  $i = 1, 2, \dots, n - 1$  în funcție de  $f_i, f_{i+1}$  și  $m_i$ .
- (c) Presupunem că  $m_1 = f'(a)$ . (Conform lui (a), aceasta determină  $s$  unic.) Arătați cum pot fi calculate  $m_2, m_3, \dots, m_{n-1}$ .

## 132 Calcul numeric

**Problema 132.1.** Fie

$$\Delta : a = x_1 < x_2 < x_3 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b.$$

Considerăm problema următoare: dându-se  $n-1$  numere  $f_\nu$  și  $n-1$  puncte  $\xi_k$  cu  $x_\nu < \xi_\nu < x_{\nu+1}$  ( $\nu = 1, 2, \dots, n-1$ ) determinați o funcție spline  $s \in \mathbb{S}_1^0(\Delta)$  cu proprietățile

$$s(\xi_\nu) = f_\nu, \quad \nu = 1, 2, \dots, n-1, \quad s(x_1) = s(x_n).$$

Reprezentând  $s$  în baza B-splinelor de grad 1,  $B_1, B_2, \dots, B_n$ , determinați structura sistemului liniar care dă coeficienții  $c_j$  ai lui  $s(x) = \sum_{j=1}^n c_j B_j(x)$ . Descrieți modul de rezolvare eficientă a sistemului.

**Problema 132.2 (P).** Fie

$$\omega_n(x) = \prod_{k=0}^n (x - k),$$

$M_n$  și  $m_n$  cel mai mare și cel mai mic maxim relativ al lui  $|\omega_n(x)|$ . Pentru  $n = 5 : 5 : 30$ , calculați  $M_n$ ,  $m_n$  și  $M_n/m_n$ , utilizând metoda lui Newton și afișați și numărul maxim de iterații.

## 133 Calcul numeric

**Problema 133.1.** Aproximând derivatele prin diferențe centrate

$$f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} + O(h^2)$$
$$f''(x) = \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2} + O(h^2)$$

și considerând o grilă uniformă,  $x_k = \frac{k}{n+1}$ ,  $k = 0, 1, \dots, n, n+1$ , să se rezolve problema bilocală

$$y'' - y = 0, \quad y(0) = 0, \quad y(1) = 1$$

prin reducere la un sistem liniar, alegând  $n = 10, 100, 1000, 10000$

- (a) cu o metodă directă;
- (b) cu o metodă iterativă.

## 134 Calcul numeric

**Problema 134.1.** Se consideră problema bilocală

$$\begin{aligned}y'' + \sin y &= 0, & x &\in \left[0, \frac{\pi}{4}\right] \\ y(0) &= 0, & y\left(\frac{\pi}{4}\right) &= 1.\end{aligned}$$

care descrie mișcarea unghiulară a unui pendul.

(a) Aproximând derivatele prin diferențe centrate

$$\begin{aligned}f'(x) &= \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} + O(h^2) \\ f''(x) &= \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2} + O(h^2)\end{aligned}$$

și considerând o grilă uniformă,  $x_k = \frac{k}{n+1}$ ,  $k = 0, 1, \dots, n, n+1$ , să se dea un algoritm de rezolvare a problemei bilocale de mai sus prin metoda aproximațiilor succesive. (Indicație: utilizați faptul că o matrice simetrică tridiagonală  $A$  de dimensiune  $n \times n$  cu  $-2$  pe diagonală principală și  $-1$  pe diagonalele adiacente are o inversă ce satisface  $\|A^{-1}\|_{\infty} \leq (n+1)^2/8$ .

(b) Implementați algoritmul de la (a) în MATLAB.

## 135 Calcul numeric

**Problema 135.1.** Se consideră problema bilocală

$$\begin{aligned}y'' + \sin y &= 0, & x &\in \left[0, \frac{\pi}{4}\right] \\ y(0) &= 0, & y\left(\frac{\pi}{4}\right) &= 1.\end{aligned}$$

care descrie mișcarea unghiulară a unui pendul.

(a) Aproximând derivatele prin diferențe centrate

$$\begin{aligned}f'(x) &= \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} + O(h^2) \\ f''(x) &= \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2} + O(h^2)\end{aligned}$$

și considerând o grilă uniformă,  $x_k = \frac{k}{n+1}$ ,  $k = 0, 1, \dots, n, n+1$ , să se dea un algoritm de rezolvare a problemei bilocale de mai sus prin metoda lui Newton.

(b) Implementați algoritmul de la (a) în MATLAB.

## 136 Calcul numeric

**Problema 136.1** (P). Se consideră problema bilocală

$$\begin{aligned}y'' + \sin y &= 0, & x &\in \left[0, \frac{\pi}{4}\right] \\ y(0) &= 0, & y\left(\frac{\pi}{4}\right) &= 1.\end{aligned}$$

care descrie mișcarea unghiulară a unui pendul.

- (a) Utilizând integratorul MATLAB `ode45` calculați soluția  $u(x; s)$  a problemei Cauchy

$$\begin{aligned}u'' + \sin u &= 0, & x &\in \left[0, \frac{\pi}{4}\right] \\ u(0) &= 0, & u'(0) &= s.\end{aligned}$$

pentru  $s = 0.2 : 0.2 : 2$ .

- (b) Scrieți cod MATLAB care aplică metoda înjumătățirii cu toleranța  $0.5e - 12$  ecuației  $f(s) = 0$ ,  $f(s) = u(1; s) - 1$ . Utilizați graficele de la punctul (a) pentru a alege valorile de pornire  $s_0$  și  $s_1$  astfel ca  $f(s_0) < 0$ ,  $f(s_1) > 0$ . Afișați numărul de înjumătățiri și valoarea lui  $s$  astfel obținută.
- (c) Obțineți soluția  $y(x) = u(x; s)$  a problemei cu valori pe frontieră și reprezentați-o grafic.

**Problema 136.2.** Presupunând că  $f$  este o funcție cu o comportare bună, discutați modul în care integralele următoare se pot aproxima prin cuadraturi gaussiene standard (adică cu intervale și ponderi canonice).

- (a)  $\int_a^b f(x)dx$ ,  $a < b$ .
- (b)  $\int_1^\infty e^{-ax} f(x)dx$ ,  $a > 0$ .
- (c)  $\int_{-\infty}^\infty e^{-(ax^2+bx)} f(x)dx$ ,  $a > 0$ . (Indicație: completați un pătrat perfect la exponent)
- (d)  $\int_0^\infty \frac{e^{-xt}}{y+t} dt$ ,  $x > 0$ ,  $y > 0$ . Este aproximarea obținută prea mare sau prea mică? Explicați.

## 137 Calcul numeric

**Problema 137.1.** (a) Determinați un spline quadratic  $s_2(x)$  pe  $[-1, 1]$  cu un singur nod în  $x = 0$  astfel ca  $s_2(x) \equiv 0$  pe  $[-1, 0]$  și  $s_2(1) = 1$ .

(b) Se consideră o funcție de forma

$$s(x) = c_0 + c_1x + c_2x^2 + c_3s_2(x),$$

unde  $c_i$  sunt constante și  $s_2(x)$  este definită la punctul (a). Ce fel de funcție este  $s$ ? Determinați  $s$  astfel încât

$$s(-1) = f_{-1}, \quad s(0) = f_0, \quad s'(0) = f'_0, \quad s(1) = f_1,$$

unde  $f$  este o funcție definită pe  $[-1, 1]$ , iar  $f_{-1} = f(-1)$ ,  $f_0 = f(0)$ ,  $f'_0 = f'(0)$ ,  $f_1 = f(1)$ .

(c) Ce formulă de cuadratură se obține dacă se aproximează  $\int_{-1}^1 f(x)dx$  prin  $\int_{-1}^1 s(x)dx$ , unde  $s$  este funcția de la punctul (b).

**Problema 137.2.** Modelul lui Kepler pentru orbite planetare se bazează pe ecuația

$$M = E - e \sin E,$$

unde  $M$  este anomalia medie,  $E$  este anomalia excentrică, iar  $e$  este excentricitatea orbitei. Luați  $M = 24.851090$  și  $e = 0.1$ .

(a) Rezolvați ecuația de mai sus cu necunoscuta  $E$  folosind metoda lui Newton, metoda secantei și metoda aproximațiilor succesive.

(b) Se cunoaște o formulă exactă pentru  $E$

$$E = M + 2 \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m} J_m(me) \sin(mM),$$

unde  $J_m$  este funcția Bessel de speța I de ordin  $m$ . Utilizați formula de mai sus și funcția MATLAB `besselj(m,x)` pentru a calcula  $E$ . Câți termeni sunt necesari? Cum este valoarea lui  $E$  calculată în acest mod față de valoarea obținută din ecuație.

## 138 Calcul numeric

**Problema 138.1.** Fie  $E$  o funcțională liniară cu  $\text{Ker} E = d$ . Arătați că nucleul lui Peano  $K_r(t)$ ,  $r \leq d$ , al lui  $E$  se anulează pentru orice  $t \notin [a, b]$ , unde  $[a, b]$  este intervalul pe care sunt definite funcțiile cărora li se aplică  $E$ .

**Problema 138.2 (P).** Rețelele de utilități trebuie să evite înghețarea conductelor de apă. Dacă presupunem condiții uniforme de sol, temperatura  $T(x, t)$  la adâncimea  $x$  față de suprafață și momentul  $t$  după o răcire bruscă este aproximată prin ecuația

$$\frac{T(x, t) - T_s}{T_i - T_s} = \text{erf}\left(\frac{x}{2\sqrt{\alpha t}}\right).$$

Aici  $T_s$  este temperatura constantă de la suprafață,  $T_i$  este temperatura inițială a solului înainte de răcirea bruscă, iar  $\alpha$  este conductivitatea termică a solului. Dacă  $x$  este măsurat în metri și  $t$  în secunde, atunci  $\alpha = 0.138 \cdot 10^{-6} m^2/s$ . Fie  $T_i = 20^\circ C$ ,  $T_s = -15^\circ C$ . Determinați la ce adâncime trebuie îngropată conducta pentru ca să nu înghețe după cel puțin 60 de zile de expunere la aceste condiții. Care este adâncimea pentru o iarnă întreagă (în condiții de climă temperată)?



## 139 Calcul numeric

**Problema 139.1.** Arătați că o funcțională liniară ce satisface  $Ef = e_{r+1}f^{(r+1)}(\bar{t})$ ,  $\bar{t} \in [a, b]$ ,  $e_{r+1} \neq 0$ , pentru orice  $f \in C^{r+1}[a, b]$ , este în mod necesar definită de ordinul  $r$  dacă are nucleul Peano  $K_r$  continuu.

**Problema 139.2** (P). Iată 25 de observații,  $y_k$ , luate în 25 de puncte echidistante  $t$

t = 1:25

y = [ 5.0291 6.5099 5.3666 4.1272 4.2948  
6.1261 12.5140 10.0502 9.1614 7.5677  
7.2920 10.0357 11.0708 13.4045 12.8415  
11.9666 11.0765 11.7774 14.5701 17.0440  
17.0398 15.9069 15.4850 15.5112 17.6572]

- (a) Neteziți datele cu o dreaptă,  $y(t) = \beta_1 + \beta_2 t$  și afișați reziduurile  $y(t_k) - y_k$ . Se observă că o dată are reziduu mai mare decât altele. Aceasta este o valoare ilegală (outlier).
- (b) Eliminați outlier-ul și refaceți netezirea. Afișați din nou reziduurile. Se observă vreun anumit șablon al reziduurilor?
- (c) Neteziți din nou, cu outlier-ul exclus, cu un model de forma

$$y(t) = \beta_1 + \beta_2 t + \beta_3 \sin t.$$

- (d) Evaluați ultima netezire pe o grilă (diviziune) mai fină a intervalului  $[0, 26]$ . Afișați curba cu stilul de linie '-' și datele cu 'o', Outlier-ul se va marca cu '\*'.

## 140    Calcul numeric

**Problema 140.1.** Fie  $E$  o funcțională liniară care se anulează pentru polinoame de grad  $d$ . Arătați că nici unul din nucleele Peano  $K_0, K_1, \dots, K_{d-1}$  nu poate fi definit (adică, nu poate păstra semn constant).

**Problema 140.2 (P).** Un ax metalic circular este utilizat la transmiterea energiei. Se știe că la anumite viteze unghiulare critice  $\omega$ , orice trepidație a axului va cauza deformări sau curbări. Aceasta este o situație periculoasă deoarece axul se poate distruge sub acțiunea forței centrifuge mari. Pentru a găsi viteza unghiulară critică  $\omega$ , trebuie să determinăm întâi numărul  $x$  care satisface ecuația

$$\tan x + \tanh x = 0.$$

Rezolvați ecuația.

## 141 Calcul numeric

**Problema 141.1.** (a) Găsiți o formulă de tipul

$$\int_0^1 \sqrt{x} f(x) dx = a_1 f(0) + a_2 \int_0^1 f(x) dx + R(f),$$

unde  $f \in C^2[0, 1]$ .

(b) Dacă  $f$  este doar de clasă  $C^1[0, 1]$

b1. Deduceți o reprezentare adecvată de tip Peano a lui  $R(f)$ .

b2. Obțineți o estimare de forma  $|Ef| \leq c_0 \|f'\|_\infty$ .

**Problema 141.2** (P). Aproximați arcsin pe intervalul  $\left[-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right]$  printr-un polinom de interpolare de grad 15. Determinați precizia aproximării teoretic și prin teste numerice. Utilizați noduri echidistante. Scrieți o funcție pentru arcsin folosind polinomul de la punctul precedent. Utilizați formula

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cos \theta = \sqrt{1 - \sin^2 \theta}$$

dacă  $|x| > 1/\sqrt{2}$ .

## 142 Calcul numeric

**Problema 142.1.** Deduceți o metodă de rezolvare numerică a ecuației  $f(x) = 0$ , bazată pe interpolarea Lagrange inversă de ordinul II. (Indicație: Fie  $g$  inversa lui  $f$ .  $f(\alpha) = 0 \implies \alpha = g(0)$ , și se aproximează  $g(0)$  prin polinomul de interpolare Lagrange de grad II,  $(L_2g)(0)$ , de preferat în forma Newton.

**Problema 142.2.** (a) Implementați algoritmul Van Wijngaarden-Dekker-Brent în MATLAB. Ce legătură este cu problema precedentă?

(b) Rezolvați ecuațiile  $\sin \pi x = 0$  și  $J_0(x) = 0$ , unde  $J_0$  este funcția Bessel de speța I și ordinul 0 (`besselj(0,x)` în MATLAB) pe intervalul  $[0, \pi]$  utilizând metoda lui Newton și metoda de la (a). Ce se observă?

## 143 Calcul numeric

**Problema 143.1.** Determinați  $A, B, C, D$  astfel încât formula

$$\int_{-h}^h f(t)dt = Af(-h) + Bf(0) + Cf(h) - hDf'(h) + R(f)$$

să aibă grad de exactitate cât mai mare posibil. Dați expresia restului în acest caz.

**Problema 143.2 (P).** (a) Implementați metoda hibridă Newton-înjumătățire în MATLAB.

- (b) Rezolvați ecuațiile  $\sin 2\pi x = 0$  și  $J_0(x) = 0$  pentru  $x_0 = \frac{501\pi}{1000}$ , unde  $J_0$  este funcția Bessel de speța I și ordinul 0 (`besselj(0,x)` în MATLAB) cu metoda lui Newton și apoi cu metoda de la punctul (a). Comentați comportarea metodelor și avantajele și dezavantajele fiecăreia pentru problemele rezolvate aici.