



BENEFICIOS

- Induce la generación de nuevas raíces.
- Facilita el rápido establecimiento del cultivo después del trasplante o siembra.
- Mejora el aprovechamiento del agua y de los nutrientes.

¿QUÉ HACE?

Induce el crecimiento y desarrollo de nuevas raíces manteniendo la estabilidad por periodos prolongados, sin restricciones para su desempeño y de manera segura.

¿CÓMO LO HACE?

Solanáceas
(Chile, tomate, tomate de cáscara, pimiento, berenjena)
Cucurbitáceas
(Sandía, melón, calabaza, pepino)
Crucíferas
(Col, brócoli, coliflor)

Aporta un adecuado balance hormonal y fósforo de acción inmediata sobre la raíz, además, los ácidos **ECCA Carboxy**® promueven la biosíntesis de auxina en cantidades suficientes para mantener la estimulación del desarrollo de nuevas raíces. **RadiGrow**® brinda seguridad de respuesta por un periodo prolongado en cualquier etapa fenológica del cultivo.

INCOMPATIBILIDAD

En caso de **Maltrataza de bulbo** con otros productos, se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad.

CULTIVO	DOSIS	APLICACIONES/USOS
Solanáceas (Chile, tomate, tomate de cáscara, pimiento, berenjena)	1 a 2 L/ha	1 a 2 aplicaciones al trasplante y a un intervalo de 10 días. Fortalece el cultivo con tallos gruesos y buena área foliar.
Cucurbitáceas (Sandía, melón, calabaza, pepino)	1 a 2 L/ha	1 a 2 aplicaciones al trasplante y a un intervalo de 10 días. Fortalece el cultivo con tallos gruesos y buena área foliar.
Crucíferas (Col, brócoli, coliflor)	1 a 2 L/ha	1 a 2 aplicaciones al trasplante y a un intervalo de 10 días. Fortalece el cultivo con tallos gruesos y buena área foliar.
Maltrataza de bulbo	1 a 2 L/ha	1 a 2 aplicaciones al trasplante y a un intervalo de 10 días. Fortalece el cultivo con tallos gruesos y buena área foliar.
Berries (Arándano, frambuesa, zarzamora)	1 a 2 L/ha	Aplicación a inicio de desarrollo vegetativo. 1 a 2 aplicaciones durante el periodo de cortes con un intervalo de 20 días.
Fresa	1 a 2 L/ha	Aplicación a inicio de desarrollo vegetativo. 1 a 2 aplicaciones durante el periodo de cortes con un intervalo de 20 días.
Papaya	2 a 3 L/ha	Aplicación al trasplante. 2 a 3 aplicaciones distribuidas en el periodo de cortes en intervalos de 15 días.
Banano	2 a 3 L/ha	Aplicación al inicio del desarrollo vegetativo o inicio de desarrollos de nuevos vástagos.
Ornamentales, flores de corte	1 a 2 L/ha	Aplicación al trasplante, establecimiento del cultivo o al iniciar el desarrollo vegetativo.
Frutales templados (Manzano, vid, durazno)	1 a 3 L/ha	Aplicación al inicio y en pleno desarrollo vegetativo. Aplicación a 45 días después de cosecha para apoyar el almacén de reservas en raíces antes de dormancia.
Frutales tropicales (Cítricos, piña, mango, cacao, Aguacate)	1 a 3 L/ha	Aplicación en pleno desarrollo vegetativo, cuando es esperada la mayor emisión de raíces durante el ciclo.

RECOMENDACIONES DE USO

RadiGrow® es de uso generalizado en todo tipo de cultivo y puede aplicarse a través del sistema de riego por goteo, microaspersión o por *drench* dirigido a la base del tallo de la planta. Agitar antes de abrir. Se recomienda realizar una premezcla en la mitad del volumen a inyectar y completar. Inyectar en el tercio medio del tiempo de riego.