

¿QUÉ HACE?

Induce la brotación de yemas en frutales, en ramas del año anterior que permanecerían dormantes o se retrasarían en brotar. Esto permite un desarrollo del frutal más uniforme facilitando su manejo; así mismo, favorece un desarrollo vegetativo y fructífero más equilibrado.

¿CÓMO LO HACE?

Aporta los nutrientes clave para el proceso de reactivación de las yemas, así como coadyuvantes que facilitan el ingreso y aumentan la biodisponibilidad de los mismos, en los sitios específicos de acción que inducen la brotación y fortalecen el desarrollo inicial de los brotes.

INCOMPATIBILIDAD

Sólo deberá mezclarse con productos registrados en los cultivos autorizados. No es compatible con carbonatos, fosfatos y evitar altas concentraciones de sulfatos.

DOSIS

BENEFICIOS

- Incrementa la proporción de yemas brotadas en frutales.
- Facilita y hace más oportunas las prácticas de manejo del frutal.
- Favorece un mejor desarrollo de brotes y fructificaciones.
- Ambientalmente seguro y con mínimo riesgo de toxicidad por exposición al producto.

RECOMENDACIONES DE USO

Brot Start[®] es para uso en frutales caducifolios de climas templados. Se aplica por aspersión dirigida a todas las ramas del árbol o al follaje con suficiente volumen de agua para asegurar buen cubrimiento.

CULTIVO	DOSIS	APLICACIONES/OBSERVACIONES
Manzano y Nogal	20-40 L /ha	Se aplica 2 a 4 semanas previas al finalizar dormancia.
Berries (zarzamora, arándano y frambuesa)	10 a 30 L/ha	Se aplica 2 a 4 semanas previas al finalizar dormancia.