



Fecha de Revisión: 24-01-23 Fecha de Elaboración: 27-09-22 Versión 2.0

Feromona de Confusión Sexual para Control de Gusano Barrenador del Ruezno en Nogal



¿QUÉ HACE?

Controla gusano barrenador del ruezno, impidiendo la copula entre hembra y macho reduciendo las oviposturas.

¿CÓMO LO HACE?

El dispensador de **ISOMATE HSW Flex** libera feromona sexual en el área a tratar para afectar la conducta normal del insecto, alterando sus receptores lo que ocasiona el fracaso de los machos en la localización de la hembra. Esto tiene como consecuencia que se evite la reproducción.

BENEFICIOS

- Control de las poblaciones de gusano barrenador del ruezno (Cydia caryana).
- Disminución en la cantidad de aplicaciones de insecticidas.
- No hay riesgo de intoxicación.
- Sin desarrollo de resistencia.
- Reducción en costos de control.
- No daña fauna benéfica.
- Previene pérdidas económicas ocasionadas por daño de gusano barrenador del ruezno.
- Reducción de compactación de suelo por menor paso de maquinaria para aplicación de insecticidas.

RECOMENDACIONES DE USO

Abra el paquete con los dispensadores que deberán colocarse en ramas del tercio superior del dosel, preferentemente de uno a dos metros por debajo de la altura máxima de los árboles. Reparta los dispensadores proporcionalmente en cada hectárea, de acuerdo con la dosis seleccionada. Para el control de altas poblaciones de palomilla cuando se use ISOMATE HSW Flex, es recomendable la aplicación suplementaria de insecticidas registrados.

Este producto solo deberá aplicarse en el tratamiento contra el "Gusano barrenador del ruezno" en el cultivo de nogal.

DOSIS

	CULTIVO	PLAGA			
CU		NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTIFICO	DOSIS	OBSERVACIONES
	logal (SL)	Gusano barrenador del ruezno	Cydia caryana	70 a 150 dispensadores / ha si hay antecedentes de infestación leve a moderada. 150 a 300 dispensadores / ha si hay antecedentes de infestación alta.	Colocar los dispensadores al momento de capturar el primer adulto en la trampa con feromona.