

**Integrantes:** Andrés M. Hense, Victoria Espil**Ejercicio 14.a** Especificar los siguientes problemas:

- Dado un número entero positivo, obtener la suma de sus factores primos.

Respuesta

```

proc sumaFactoresPrimos (in n:  $\mathbb{Z}$  ,out result:  $\mathbb{Z}$ ) {
  Pre { $n > 0$ }
  Post {
     $result = \sum_{i=2}^n \text{if } esPrimo(i) \text{ then } i \text{ else } 0 \text{ fi}$ 
  }
}

```

Notar que si $n < 2$ entonces la sumatoria devolvera 0, por definición de como se comportan las sumatorias.

Ejercicio 15.f Especificar los siguientes problemas sobre secuencias:

- Dadas dos secuencias s y t , devolver su *intersección*, es decir, una secuencia con todos los elementos que aparecen en ambas. Si un mismo elemento tiene repetidos, la secuencia retornada debe contener la cantidad mínima de apariciones entre s y t .

Respuesta

```

proc interseccion (in l : seq( $\mathbb{Z}$ ) ,in m : seq( $\mathbb{Z}$ ) ,out res : seq( $\mathbb{Z}$ )) {
  Pre {True}
  Post {
    perteneceAAmbos(l, m, res)
     $\wedge_L$ 
    mismaCantRep(l, m, res)
  }
}

pred perteneceAAmbos(l, m, res : seq( $\mathbb{Z}$ )) {
   $res \in l \wedge res \in m$ 
}

pred mismaCantRep(l, m, res : seq( $\mathbb{Z}$ )) {
   $(\forall j : \mathbb{Z})(0 \leq j < |res|) \rightarrow_L cantRep(res, res[j]) = minRep(l, m, res[j])$ 
}

aux minRep(l, m : seq( $\mathbb{Z}$ ) ,n :  $\mathbb{Z}$ ) :  $\mathbb{Z}$  {
  if cantRep(l, res[j]) < cantRep(m, res[j]) then cantRep(l, res[j]) else cantRep(m, res[j]) fi
}

aux cantRep(l: seq( $\mathbb{Z}$ ), n :  $\mathbb{Z}$ ) {
   $\sum_{i=0}^{|l|-1} \text{if } l[i] = n \text{ then } 1 \text{ else } 0 \text{ fi}$ 
}

```

Ejercicio 22.a Especificar los siguientes problemas de modificación de secuencias:

- **proc primosHermanos**(inout $l : seq\langle \mathbb{Z} \rangle$), que dada una secuencia de enteros mayores a dos, reemplaza dichos valores por el número primo menor más cercano. Por ejemplo, si $l = \langle 6, 5, 9, 14 \rangle$, luego de aplicar **primosHermanos**(l), $l = \langle 5, 5, 7, 13 \rangle$

Respuesta

```

proc primosHermanos(inout  $l : seq\langle \mathbb{Z} \rangle$ ) {
  Pre {  $l = l_0 \wedge$ 
     $(\forall i : \mathbb{Z})(i \in l \rightarrow_L i > 2)$  }
  Post {
     $|l_0| = |l|$ 
     $\wedge_L$ 
     $(\forall i : \mathbb{Z})(0 \leq i < |l_0|) \rightarrow_L l_0[i] = menorPrimoCerc(l[i])$ 
  }
}

aux menorPrimoCerc( $l : seq\langle \mathbb{Z} \rangle$ ) :  $\mathbb{Z}$  {
  apalala
}

```