

Matemáticas III

Mínimos cuadrados

Factorización QR

Semana 09

Hermes Pantoja Carhuavilca

(hpantoja@utec.edu.pe)

Brigida Molina Carabaño

(bmolina@utec.edu.pe)

Rósulo Pérez Cupe

(rperezc@utec.edu.pe)

Asistente: Victor Anhuaman

(vanhuaman@utec.edu.pe)



Temas

1 Ajuste por mínimos cuadrados

2 Factorización QR

Objetivo

Aproximar funciones utilizando el método de mínimos cuadrados, así como también la descomposición QR.

A photograph of a modern, multi-story building with a blue tint overlay. The building has a grid-like facade with many windows and balconies. The text '1 AJUSTE POR MÍNIMOS CUADRADOS' is overlaid on the image. The building is located in an urban setting, with other buildings visible in the background.

1

AJUSTE POR
MÍNIMOS
CUADRADOS



UTEC

Logros

- 1 Aproxima las funciones utilizando el método de los mínimos cuadrados.
- 2 Resuelve el problema de mínimos cuadrados mediante ecuaciones normales.
- 3 Realiza la descomposición QR de una matriz.


Formalización de Contenidos

El ajuste de curva permite expresar un conjunto de puntos de datos discretos como una función continua. Generalmente los datos son experimentales, que pueden tener una cantidad significativa de error y no es necesario encontrar una función que pase por todos los puntos discretos.



Ajuste lineal por Mínimos Cuadrados

- 1 Ajustar a una recta un conjunto de datos (pares ordenados)
 $(x_1; y_1), (x_2; y_2), (x_3; y_3), \dots, (x_n; y_n)$



a_0 : y- intersección (Desconocido)

a_1 : Pendiente (Desconocido)

$$e_i = y_i - a_0 - a_1 x_i$$

Error cometido para
el i-ésimo punto

- 2 Minimizar el error para obtener un mejor ajuste lineal (encontrar a_0 y a_1). Para ello minimizamos la suma de los cuadrados de los errores cometidos.

Continuación...

Consideremos las expresiones

$$S_r = \sum_{i=1}^n e_i^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - a_1 x_i - a_0)^2$$

Determinar a_0 y a_1 minimizando S_r .

Derivamos S_r con respecto a a_0 y a_1 e igualando a cero.

$$\frac{\partial S_r}{\partial a_0} = -2 \sum_{i=1}^n (y_i - a_1 x_i - a_0) = 0$$

$$\frac{\partial S_r}{\partial a_1} = -2 \sum_{i=1}^n (y_i - a_1 x_i - a_0) x_i = 0$$

Continuación...

Despejando convenientemente y considerando las variables a_0 y a_1 siendo el resto de elementos conocido, tenemos planteado **las ecuaciones normales**:

$$\begin{cases} na_0 + \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) a_1 &= \sum_{i=1}^n y_i \\ \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) a_0 + \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) a_1 &= \left(\sum_{i=1}^n x_i y_i \right) \end{cases}$$

Al resolver el sistema anterior obtenemos los coeficientes a_0 y a_1

Bondad del ajuste lineal

Consideremos las expresiones

$$S_r = \sum_{i=1}^n e_i^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - ax_i - b)^2 \qquad S_t = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2$$

Donde \bar{x} e \bar{y} son las medias de x e y respectivamente. Entonces

$$r^2 = \frac{S_t - S_r}{S_t}$$

o en términos de la nube de puntos

$$r = \frac{n \sum_{i=1}^n x_i y_i - \sum_{i=1}^n x_i \sum_{i=1}^n y_i}{\sqrt{n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2} \sqrt{n \sum_{i=1}^n y_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n y_i \right)^2}}$$

Bondad del ajuste lineal

- A la cantidad r^2 se le conoce como **coeficiente de Determinación**.
- Siendo r el **coeficiente de Correlación**.
- Un ajuste perfecto ocurre cuando se cumple $r^2 = r = 1$.
- El coeficiente r^2 determina la calidad del ajuste, algunos autores sugieren que debe ser mayor a 0.7.

Actividad 1

Halle la recta que mejor se ajusta a los siguientes datos (mostrados en la tabla), determinando asimismo la calidad del ajuste

Tiempo (s)	0	3	4	7	9
Distancia (m)	0	30	60	90	120

Consideremos $x_i = \text{Tiempo}$ e $y_i = \text{Distancia}$.

Desarrollo

Según las necesidades del cálculo elaboramos la siguiente tabla

x_i	y_i	x_i^2	y_i^2	$x_i y_i$	$(y_i - \bar{y})^2$	y	e_i^2
0	0	0	0	0	3600	-1.707	2.9149
3	30	9	900	90	900	38.537	72.873
4	60	16	3600	240	0	51.951	64.783
7	90	49	8100	630	900	92.195	4.8186
9	120	81	14400	1080	3600	119.02	0.9518
23	300	155	27000	2040	9000		146.34

En la última fila de la tabla se tiene la suma de las respectivas columnas, las cuales utilizamos para determinar n , \bar{y} , a , b , S_t , S_r y r^2 [ejercicio].

De la tabla tenemos:

$$n = 5, \quad \sum_{i=1}^5 x_i = 23, \quad \sum_{i=1}^5 y_i = 300, \quad \sum_{i=1}^5 x_i^2 = 155, \quad \sum_{i=1}^5 x_i y_i = 2040$$

De donde formamos la ecuación normal:

$$\begin{cases} na_0 + \left(\sum_{i=1}^5 x_i \right) a_1 &= \sum_{i=1}^5 y_i \\ \left(\sum_{i=1}^5 x_i \right) a_0 + \left(\sum_{i=1}^5 x_i^2 \right) a_1 &= \sum_{i=1}^5 x_i y_i \end{cases}$$

Es decir:

$$\begin{cases} 5a_0 + 23a_1 = 300 \\ 23a_0 + 155a_1 = 2040 \end{cases}$$

Resolviendo obtenemos:

$$a_1 = 13.41463415 \quad ; \quad a_0 = -1.707317073$$

Cálculo de los parámetros

$$n = 5$$

$$\bar{y} = 60$$

$$a_1 = 13.41463415$$

$$a_0 = -1.707317073$$

$$S_t = 9000$$

$$S_r = 146.34$$

en consecuencia, la recta ajustada por mínimos cuadrados sería

$$y = 13.41463415x - 1.707317073$$

y el coeficiente de determinación

$$r^2 = 0.983739837.$$



2

FACTORIZACIÓN QR

UTEC

Formalización de Contenidos

Factorización QR por Gram-Schmidt

La descomposición QR (Llamado también factorización QR) de una matriz es una descomposición de una matriz en una matriz ortogonal y una matriz triangular superior. Una descomposición QR de una matriz real A (no necesariamente cuadrada) es una descomposición de A como

$$A = QR$$

donde Q es una matriz ortogonal ($Q^T Q = I$) del mismo tamaño que A , las columnas de Q son ortonormales, y R es una matriz triangular superior. Si A es una matriz cuadrada y no singular, entonces ésta factorización es única.

Procedimiento

Entonces,

$$A = [a_1 | a_2 | \dots | a_n]$$

$$u_1 = a_1, \quad q_1 = \frac{u_1}{|u_1|}$$

$$u_2 = a_2 - (a_2 \cdot q_1) \cdot q_1, \quad q_2 = \frac{u_2}{|u_2|}$$

$$u_{k+1} = a_{k+1} - (a_{k+1} \cdot q_1)q_1 - \dots - (a_{k+1} \cdot q_k)q_k, \quad q_{k+1} = \frac{u_{k+1}}{|u_{k+1}|}$$

Continuación...

El resultado de la factorización es:

$$A = [a_1 | a_2 | \dots | a_n] = [q_1 | q_2 | \dots | q_n] \begin{bmatrix} a_1 \cdot q_1 & a_2 \cdot q_1 & \dots & a_n \cdot q_1 \\ 0 & a_2 \cdot q_2 & \dots & a_n \cdot q_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_n \cdot q_n \end{bmatrix} = QR$$

Actividad 2

P1

Hallar la factorización QR de la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Solución

Con los vectores $a_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $a_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

Luego:

Continuación...

$$u_1 = a_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad q_1 = \frac{u_1}{|u_1|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{bmatrix}$$
$$u_2 = a_2 - (a_2 \cdot q_1)q_1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ 1 \end{bmatrix} \quad q_2 = \frac{u_2}{|u_2|} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} \end{bmatrix}$$

Continuación...

Así

$$Q = [q_1 \mid q_2] = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{bmatrix}$$

$$R = \begin{bmatrix} a_1 \cdot q_1 & a_2 \cdot q_1 \\ 0 & a_2 \cdot q_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{3}{\sqrt{6}} \end{bmatrix}$$

Por lo tanto:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{2}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{3}{\sqrt{6}} \end{bmatrix}$$

Actividad 3

El nivel del agua en el mar de Lima esta principalmente determinado por la marea. Se han tomado las siguientes medidas

t	0	2	4	6	8	10
h(t)	1	1.6	1.4	0.6	0.2	0.8

Con t medido en horas,



Continuación...

- 1 Halle la recta $h_1(t) = a_1 + a_0t$ que mejor ajuste a los datos por mínimos cuadrados
- 2 Determinar el **Coeficiente de Determinación** e indicar que tan buen ajuste es.

Continuación...

Utilice la descomposicion QR(usar Matlab), para resolverlo.
Ajuste los datos anteriores a la siguiente forma:

Caso 1:

$$h_1(t) = a_1 + a_0 t$$

Caso 2:

$$h_2(t) = a_0 + a_1 \text{sen}(\pi t/6) + a_2 \text{cos}(\pi t/6)$$

Del sistema matricial $Xa = y$, descomponer X en QR

Continuación...

- 1 Hallar la suma de elementos de la primera fila de R , para los casos 1 y 2.
- 2 Hallar: $a_1 \times a_0$, para el caso 1.
- 3 Hallar X del sistema matricial $Xa = y$, para los casos 1 y 2
- 4 Hallar la suma de elementos de la primera fila de Q , para los casos 1 y 2
- 5 Hallar $a_0 + a_1 + a_2$, para el caso 2.

**Gracias por su
atención**

