

## Actividad 3. Algunas distribuciones


Andrés Villarreal González

2024-08-09

### Pregunta 1

1. Graficar una distribución Normal con media 10, y desviación estándar 2


```
miu = 10
sigma = 2
x = seq(miu - 4*sigma, miu + 4*sigma, 0.01)
y = dnorm(x,miu, sigma)
plot(x,y, type = "l", col = "red", main = "Normal(2,10)")
```



### Pregunta 2

2. Graficar una distribución T Student con 12 grados de libertad

```
gl = 12 # Grados de Libertad
sigma = sqrt(gl/(gl-2))
x = seq(-4*sigma, 4*sigma, 0.01)
y = dt(x,gl)
plot(x,y, type = "l", col = "blue", main = "T Student con gl = 12")
```




### Pregunta 3

3. Gráfique la distribución Chi-cuadrada con 8 grados de libertad.

```
gl = 8
sigma = sqrt(2*gl)
x = seq( 0, miu + 8*sigma, 0.01)
y = dchisq(x,gl)
plot(x,y, type = "l", col = "green", main = "Chi2 con gl = 8")
```


### Chi2 con gl = 8



### Pregunta 4

4. Graficar una distribución F con  $v_1 = 9$ ,  $v_2 = 13$

```
v1 = 9
v2 = 13
miu = v2/(v2-2)
sigma = sqrt(2)*v2*sqrt(v2+v1-2)/(sqrt(v2-4)*(v2-2)*sqrt(v1))
x = seq( 0, miu + 8*sigma, 0.01)
y = df(x,v1, v2)
plot(x,y, type = "l", col = "red", main = "F con v1 = 9, v2 = 13")
```



### Pregunta 5

5. Si  $Z$  es una variable aleatoria que se distribuye normalmente con media 0 y desviación estándar 1, hallar los procedimientos de:
- a)  $P(Z > 0.7) = 0.2419637$
  - b)  $P(Z < 0.7) = 0.7580363$
  - c)  $P(Z = 0.7) = 0$
  - d) Hallar el valor de  $Z$  que tiene al 45% de los demás valores inferiores a ese valor.

```
1- pnorm(0.7)
```

```
## [1] 0.2419637
```

```
pnorm(0.7)
```

```
## [1] 0.7580363
```

```
pnorm(0.7)-pnorm(0.7)
```

```
## [1] 0
```

```
qnorm(0.45)
```

```
## [1] -0.1256613
```

## Pregunta 6

6. Hallar el procedimiento para verificar los siguientes resultados si se sabe que X se distribuye normalmente con una media de 100 y desviación estándar de 7.

- a)  $P(X < 87) = 0.031645$
- b)  $P(X > 87) = 0.968354$
- c)  $P(87 < X < 110) = 0.89179$

```
miu = 100
sigma = 7

pnorm(87,miu,sigma)
## [1] 0.03164542
1-pnorm(87,miu,sigma)
## [1] 0.9683546
pnorm(110,miu,sigma)-pnorm(87,miu,sigma)
## [1] 0.8917909
```

## Pregunta 7

7. Hallar el procedimiento para verificar los siguientes resultados si se sabe que X se distribuye T Student con gl= 10, hallar:

- a)  $P(X < 0.5) = 0.6860532$
- b)  $P(X > 1.5) = 0.082253$
- c) La t que sólo el 5% son inferiores a ella. ( $t = -1.812461$ )

```
gl=10

pt(0.5,gl)
## [1] 0.6860532
1-pt(1.5,gl)
## [1] 0.08225366
qt(0.05,gl)
## [1] -1.812461
```

## Pregunta 8

8. Hallar el procedimiento para verificar los siguientes resultados si se sabe que X se distribuye Chi-cuadrada con gl = 6, hallar

- a)  $P(X^2 < 3) = 0.1911532$
- b)  $P(X^2 > 2) = 0.9196986$

- c) El valor  $x$  de chi que sólo el 5% de los demás valores de  $x$  es mayor a ese valor (Resp. 12.59159)

```
g1 = 6  
  
pchisq(3,g1)  
## [1] 0.1911532  
  
1-pchisq(2,g1)  
## [1] 0.9196986  
  
qchisq(0.95,6)  
## [1] 12.59159
```

## Pregunta 9

10. Hallar el procedimiento para verificar los siguientes resultados si se sabe que  $X$  se distribuye  $F$  con  $v_1 = 8$ ,  $v_2 = 10$ , hallar
- a)  $P(X < 2) = 0.8492264$
  - b)  $P(X > 3) = 0.05351256$
  - c) El valor de  $x$  que sólo el 25% de los demás valores es inferior a él. (Resp. 0.6131229)

```
v1 = 8  
v2 = 10  
  
pf(2, v1, v2)  
## [1] 0.8492264  
  
1-pf(3,v1,v2)  
## [1] 0.05351256  
  
qf(0.25,v1,v2)  
## [1] 0.6131229
```

## Pregunta 10

Una compañía de reparación de fotocopadoras encuentra, revisando sus expedientes, que el tiempo invertido en realizar un servicio, se comporta como una variable normal con media de 65 minutos y desviación estándar de 20 minutos. Calcula la proporción de servicios que se hacen en menos de 60 minutos. Resultado en porcentaje con dos decimales, ejemplo 91.32%.

```
mu <- 65  
sigma <- 20
```

```
X <- 60  
  
Z <- (X - mu) / sigma  
  
proporcion <- pnorm(Z)  
  
porcentaje <- round(proporcion * 100, 2)  
porcentaje  
  
## [1] 40.13
```