


Задача 1

Пусть люди - вершины графа $G = (V, E)$, а ребро между ними - признак знакомства. посмотрим на какую-либо вершину $(u, v) \in E$. По условию $|N(u) \cap N(v)| = 5$.

Поймем, что каждое ребро входит ровно в 5-ть троек попарно знакомых людей.



(Действительно, у двух знакомых людей ровно пять общих знакомых) Тогда посчитаем кол-во таких троек попарно соединенных вершин: каждое ребро состоит в 5 треугольниках тогда $|E| \cdot 5$ - число троек с повторами - каждый "треугольник" был посчитан ровно три раза, т.к. он был учтен для каждого из трех ребер "треугольника" \Rightarrow всего троек:

$$\frac{|E| \cdot 5}{3}$$

Но тогда, так как количество троек чисел может быть только целым, то число ребер кратно 3, т.к. 5 и 3 - взаимно просты. \Rightarrow число пар знакомых кратно 3.

Задача 2

А) n вершин. $|E|_{max} = \frac{n(n-1)}{2}$ - случай полного графа. $|E|_{min} = n - 1$. Докажем, что меньше быть не может. Возьмем какой-то связанный граф с n вершинами. Итеративно будем удалять из графа ребра, которые входят в какой-нибудь цикл, до тех пор, пока не останется граф $G' = (V, E')$ без циклов. Поймем, что граф после этого останется связанным и докажем это в Задаче 5.

Поймем, что в G' ровно $n - 1$ ребро и что больше нельзя удалить ребро не потеряв связности. Для начала докажем второе утв.: предположим, что можно удалить еще одно ребро $(u, v) \in E'$, не потеряв связность, тогда $\forall w \in V \exists$ простой путь из w в u, v , не проходящий через ребро (u, v) , но тогда существует и путь в u проходящий через $(u, v) \Rightarrow$ в вершины u, v можно добраться более чем одним путем, а это значит, что в графе есть какой-нибудь цикл, что не возможно по построению G' .

Докажем теперь, что $|E'| = n - 1$. Возьмем какую-либо вершину степени 1 (ее существование будет доказано в задаче 5), удалим ее и ребро, из нее выходящее, получим связанный граф без циклов (показано в задаче 5), повторим до тех пор, пока не останется одна вершина. Всего мы удалим

$n - 1$ вершину, а значит и $n - 1$ ребро, а т.к. больше ребер не осталось и на каждом шаге мы удаляли по 1-ой вершине, то ребер было $n - 1$.

Тогда в любом связанном графе есть подграф $G' = (V, E') \subset G = (V, E)$, $|V| = n$, $|E'| = n - 1$. Значит в графе G хотя бы $n - 1$ ребро.

В) Пусть $|V|$ - количество вершин, тогда пользуясь пунктом **А**:

$$\begin{cases} |V| - 1 \leq n, \\ \frac{|V|(|V|-1)}{2} \geq n \end{cases}$$

\Updownarrow

$$\begin{cases} |V| \leq n + 1 \\ \left[\begin{array}{l} |V| \geq \frac{1+2\sqrt{n}}{2}, \\ |V| \leq \frac{1-2\sqrt{n}}{2}. \end{array} \right. \end{cases}$$

При $n = 0$, $|V| = 1$ или $|V| = 0$, иначе:

$$\begin{cases} |V| - 1 \leq n, \\ |V| > \lfloor \frac{1+2\sqrt{n}}{2} \rfloor \end{cases}$$

Задача 5

Пусть $G = (V, E)$. Если граф содержит какие-нибудь циклы, тогда возьмем цикл $\{u_0, u_1, \dots, u_n\}$, $u_i \in V$. Поймем, что из него можно выкинуть какое-либо ребро, не повредив связности графа (Действительно, если есть какой-нибудь путь из v в w , проходящий через ребро (u_k, u_m) , то существует путь проходящий через прочие ребра цикла, ведь в цикле до каждой вершины можно дойти хотя бы двумя разными путями \Rightarrow граф без этого ребра останется связанным). Тогда выкинем его. Повторим до тех пор пока в графе не останется циклов.

Имеем $G' \subseteq G$, $V' = V$. Докажем, что в G' есть вершина степени 1. Возьмем, какую либо вершину этого графа. Перейдем в ее соседа, если у соседа нет ребер, отличных от того, по которому мы в него пришли, остановимся в соседе, иначе: перейдем по этому отличному ребру, в еще не посещенную вершину. Будем повторять эти переходы. Поймем, что раз граф связан и количество вершин конечно, то рано или поздно мы не сможем перейти. Это возможно в двух случаях: либо мы оказались в вершине со степенью 1, либо мы не можем перейти в посещенную вершину, что означает наличие цикла, а значит недостижимо. Значит мы остановились в вершине со степенью 1 \Rightarrow она существует.

Тогда эту вершину можно удалить, не навредив связности графа, т.к. любой простой путь проходящий по ее ребру ведет в эту вершину или из нее, т.е. только соединяет эту вершину с оставшимися, тогда в отсутствии этой вершины исчезнут только те пути, что вели в нее, а значит граф по прежнему останется связанным.

Тогда эту же вершину можно удалить и из начального графа G , не вредя связности, т.к. в нем есть связанный G'' (граф без вершины степени из G').

Задача 6

Предположим противное: ни сам граф $G = (V, E)$, ни его дополнение \bar{G} не содержат циклы длины 3.


Это означает, что в графе G нет таких 3-х вершин между которыми нет ни одного ребра и таких 3-х вершин, которые попарно соединены между собой. Тогда любые 3 вершины в графе соединяются одним из двух способов.



Т.е. в любой тройке людей есть либо два незнакомых человека, либо два знакомых.


Поймем, что у какого-нибудь человека u либо 3 и более знакомых **(1)**, либо 3 и более незнакомых **(2)** (т.к. всего людей хотя бы 6, по принципу Дирихле).

1) Среди трех знакомых с u есть хотя бы два знакомых между собой (по предположению), значит с u они образуют цикл длины 3.



Что невозможно по предположению.

2) Среди трех незнакомых u есть хотя бы два не знакомых между собой человека (т.к. они образуют тройку), а значит вместе с u они образуют тройку попарно незнакомых.



Но тогда эти три незнакомых в \bar{G} образуют цикл длины 3. Что не возможно по предположению. Противоречие. \Rightarrow Граф с более чем пятью вершинами или его дополнение содержат цикл длины 3.

А) В данном графе и его дополнении есть только цикл длины 5.

