KVADRATINIS DAUGIANARIS

10 TEMA

Kvadratinio daugianario ženklai

Andrius Berniukevičius | Vilniaus licėjus

Kaip dirbti su šia medžiaga?
Ši medžiaga skirta aktyviam mokymuisi: naujas mintis ir faktus atrasi spręsdamas uždavinius.

1. **Pirmiausia galvok pats.** Perskaityk sąlygą, išbandyk savo idėjas pasitelkdamas pavyzdžius ir užrašyk sprendimą taip, kaip supranti. Jei užstrigai, išbandyk konkretų skaičių arba grįžk prie panašaus ankstesnio uždavinio.
2. **Tik tada pasitikrink.** Palygink savo sprendimą su pateiktuoju. Tavo būdas gali skirtis nuo pateiktojo ir vis tiek būti teisingas. Jei suklydai, išsiaiškink savo klaidą. Jei pasinaudojai pateiktu sprendimu, išnagrinėk, kodėl kiekvienas jo žingsnis teisingas. Tada užversk sprendimą ir išspręsk uždavinį iš naujo pats.
3. **Sustok prie ⋆.** Žvaigždute pažymėti uždaviniai padeda atrasti ir suprasti svarbias idėjas, kuriomis remsimės šioje ir vėlesnėse temose. Juos išsprendęs, pabandyk savais žodžiais nusakyti, ką sužinojai ir kodėl tai teisinga.
4. **Apibendrink ir pasitikrink.** Temos pabaigoje rasi svarbiausias išvadas. Pirmiausia pamėgink jas prisiminti pats, tada palygink su pateiktomis. Savikontrolės uždavinį (♦) spręsk užvertęs santrauką, o po pertraukos prie jo sugrįžk.

Siek ne vien gauti teisingą atsakymą, bet ir suprasti, **kodėl jis teisingas ir kada atrastą mintį galėsi pritaikyti**.


Temos esmė ir tikslas. Išmoksi nustatyti, su kuriomis x reikšmėmis kvadratinis daugianaris yra teigiamas, neigiamas arba lygus nuliui. Nagrinėsi dauginamųjų ženklus skaičių tiesės intervaluose, pavaizduosi išvadas brėžiniuose ir susiesi jas su šaknimis, diskriminantu bei ekstremumu.

Prieš pradėdamas: prisimink sandaugos ženklų taisykles, kvadratinio daugianario šaknis ir diskriminantą (6 tema), pilnojo kvadrato pavidalą (2–4 temos) bei skaidymą dauginamaisiais (9 tema). Visi nagrinėjami skaičiai yra realieji; $a \neq 0$. Grafikų ir parabolės sąvokos šioje temoje nenaudojamos.

Kaip žymime ir skaitome ženklus skaičių tiesėje? Skaičių tiesėje žymime *kintamojo x reikšmes*. Virš jos rašomas ženklas nusako ne paties x, o nagrinėjamo reiškinio reikšmės ženklą:

- $+$ rašome virš intervalo tada, kai su *kiekviena* to intervalo x reikšme reiškinys yra teigiamas, t. y. didesnis už nulį;
- $-$ rašome virš intervalo tada, kai su *kiekviena* to intervalo x reikšme reiškinys yra neigiamas, t. y. mažesnis už nulį;
- ženklų tiesėje šaknį atitinkančią x reikšmę žymime tuščiaviduriu tašku, o 0 virš jo rodo, kad reiškinio reikšmė ten lygi nuliui. Tuščiaviduris taškas rodo, kad ši reikšmė neįeina į gretimus intervalus, kuriuose reiškinys griežtai teigiamas arba griežtai neigiamas. Šaknis vis tiek priklauso nagrinėjamai skaičių tiesei ir yra $P(x) = 0$ sprendinys.

Pavyzdys. Nagrinėkime $T(x) = x - 3$. Kai $x < 3$, tai $x - 3 < 0$ – kairėje nuo 3 rašome $-$. Kai $x > 3$, tai $x - 3 > 0$ – dešinėje rašome $+$. Kai $x = 3$, gauname $T(3) = 0$:



Pavyzdžiui, $T(2) = -1 < 0$, o $T(5) = 2 > 0$. Visų kitų intervalo taškų ženklą pagrindžia aukščiau pateiktas palyginimas su 3, o ne vien šie du skaičiavimai. Tolesniuose brėžiniuose spalvos padeda atpažinti ženklą, bet juo laikome + arba − simbolį. Ženklas virš intervalo galioja visam intervalui, o pažymėtame nulyje reiškinys nėra nei teigiamas, nei neigiamas. Brėžiniai nėra masteliniai. Atviri intervalo galai rašomi skliaustais, pavyzdžiui, $(2; 5)$, o įtraukti galai – laužtiniais skliaustais: $[2; 5]$ reiškia $2 \leq x \leq 5$. Sprendinių aibės brėžinyje įtrauktas galas žymimas pilnaviduriu tašku, neįtrauktas – tuščiaviduriu. Pavyzdžiui, $x \geq 2$ sprendiniuose taškas 2 įtraukiamas, o $x > 2$ – ne. Ženklai $\pm\infty$ nėra skaičiai, todėl šalia jų visada rašome apvaliuosius skliaustus.

1. Nagrinėkite reiškinį $x - 2$.

a) Apskaičiuokite jo reikšmes, kai $x = -1$, $x = 2$, $x = 5$.

b) Paaiškinkite, kodėl $x - 2 < 0$, kai $x < 2$; kodėl jis lygus nuliui, kai $x = 2$; kodėl $x - 2 > 0$, kai $x > 2$.


c) Nubraižykite skaičių tiesę ir pažymėkite ženklus.

2. ⋆

a) Kai t realusis, nustatykite reiškinio $x - t$ ženklą kiekvienu iš atvejų $x < t$, $x = t$, $x > t$. Paaiškinkite.

b) Pritaikykite išvadą reiškiniams $x + 3$ ir $x - 5$. Kur yra kiekvieno jų nulis?

3. Duotas $P(x) = (x - 1)(x - 4)$. 9 temos 13d punkte nustatėme sandaugos ženklą su dviem konkrečiomis x reikšmėmis. Dabar dauginamųjų ženklus tirsime kiekviename intervale. Žemiau pažymėtos abiejų dauginamųjų nulius atitinkančios reikšmės ir trys jų atskirti intervalai.



a) Pažymėkite 1 ir 4 skaičių tiesėje. Į kokius intervalus jie padalija tiesę?

b) Kiekviename intervale nustatykite dauginamųjų $x - 1$ ir $x - 4$ ženklus ir pagal sandaugos ženklų taisyklę nustatykite $P(x)$ ženklą.

c) Atskirai nustatykite $P(1)$ ir $P(4)$. Patikrinkite, apskaičiuodami $P(0)$, $P(2)$ ir $P(5)$.


d) Nubraižykite $P(x)$ ženklų tiesę ir atsakykite, kur $P(x) > 0$, kur $P(x) < 0$, o kur $P(x) = 0$.

4. Tegul $P(x) = -(x - 1)(x - 4)$.

a) Pasinaudodami 3 uždaviniu paaiškinkite, kaip daugiklis -1 pakeičia sandaugos ženklą. Kas nutinka nuliams?

b) Nustatykite ir skaičių tiesėje pažymėkite, kur $P(x) > 0$, kur $P(x) < 0$ ir kur $P(x) = 0$.

5. ⋆ Duota, kad $r < s$, o $P(x) = a(x - r)(x - s)$, $a \neq 0$.



a) Kiekviename intervale $(-\infty; r)$, $(r; s)$, $(s; +\infty)$ nustatykite $x - r$ ir $x - s$ ženklus. Koks yra jų sandaugos ženklas?

b) Remdamiesi a dalimi išnagrinėkite $P(x)$ ženklus, kai $a > 0$, ir juos pavaizduokite skaičių tiesėje.

c) Tą patį padarykite, kai $a < 0$. Atskirai nurodykite, ką gauname ties $x = r$ ir $x = s$.

d) Paaiškinkite, kodėl šaknų r, s tvarka šioje sąlygoje svarbi nurodant intervalus.

Sustok ir apibendrink. Kaip pagal dauginamųjų ženklus nustatyti $a(x - r)(x - s)$ ženklą kiekviename intervale? Ką žinome šaknyse?

6. Kiekvienam daugianariui nubraižykite ženklų tiesę ir nurodykite, kur jo reikšmės teigiamos, neigiamos ar lygios nuliui.

a) $P(x) = 3(x + 2)(x - 1)$;

b) $Q(x) = -2(x - 3)(x + 1)$;

c) $R(x) = (x + 4)(x + 2)$;

d) $S(x) = -x(x - 5)$.

7. Kiekvienu atveju pirmiausia raskite šaknis, išskaidykite daugianarį ir pagal dauginamųjų ženklus nustatykite jo ženklą. Pavaizduokite ženklų tiesę.

a) $x^2 - 5x + 6$;

b) $-x^2 + x + 6$;

c) $2x^2 - 8x - 10$;

d) $-x^2 - 4x$.

8. Duotas $P(x) = (x - 2)^2$.

a) Kodėl $P(x) \geq 0$ kiekvienam x? Kada $P(x) = 0$?

b) Įrodykite, kad, kai $x \neq 2$, yra $P(x) > 0$. Palyginkite ženklus kairėje ir dešinėje 2 pusėse. Kokia reikšmė yra ties $x = 2$?

c) Pavaizduokite ženklų tiesę ir palyginkite ją su 3 uždavinio ženklų tiese.

9. $\star$ Tegul $P(x) = a(x - r)^2$, $a \neq 0$.

a) Nustatykite $P(r)$ ir paaiškinkite, kodėl $(x - r)^2 > 0$, kai $x \neq r$.

b) Nubraižykite ženklų tieses, kai $a > 0$ ir kai $a < 0$. Palyginkite daugianario ženklus kairėje ir dešinėje šaknies r pusėse. Kokia reikšmė yra pačioje šaknyje?

Sustok ir apibendrink. Kaip skiriasi ženklai abipus dvigubosios šaknies? Kokia reikšmė yra pačioje šaknyje?

10. Kiekvienu atveju raskite šaknį, užrašykite pilnojo kvadrato pavidalą ir nustatykite ženklą visoje skaičių tiesėje.

a) $x^2 - 6x + 9$;

b) $-2x^2 - 8x - 8$;

c) $4x^2$.

11. Duotas $P(x) = (x - 1)^2 + 3$.

a) Paaiškinkite, kodėl $(x - 1)^2 \geq 0$. Pridėję po 3 prie abiejų nelygybės pusių, įrodykite, kad $P(x) \geq 3 > 0$.

b) Ar P turi realiųjų šaknų? Pavaizduokite jo ženklą skaičių tiesėje.

c) Nustatykite $Q(x) = -2(x + 1)^2 - 5$ ženklą ir paaiškinkite savo išvadą.

12. ⋆ Tegul $P(x) = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$, ir $D < 0$. Iš 4 temos 2 uždavinio žinome tapatybę

$$P(x) = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{D}{4a}.$$

a) Remdamiesi diskriminanto ženklu paaiškinkite, kiek daugianaris turi realiųjų šaknų.

b) Tarkime, $a > 0$. Nustatykite $-\frac{D}{4a}$ ženklą ir įrodykite, kad $P(x) > 0$ kiekvienam realiajam x.

c) Tą patį padarykite, kai $a < 0$. Palyginkite daugianario ženklą su a ženklu.

Sustok ir apibendrink. Kodėl, kai $D < 0$, daugianario ženklas visur sutampa su a ženklu?

13. Nustatykite ženklą visoje skaičių tiesėje ir kiekvieną išvadą pagrįskite.

a) $x^2 + 2x + 5$;

b) $-x^2 + 4x - 7$;

c) $2x^2 + 2$.

14. Kiekvienu atveju nustatykite D ženklą, šaknis, jei jų yra, ir daugianario ženklą kiekviename intervale. Nubraižykite ženklų tiesę.

a) $x^2 - 4x + 3$;

b) $x^2 - 4x + 4$;

c) $x^2 - 4x + 5$;

d) $-x^2 + 4x - 3$.

15. Mokinys teigia: „Kvadratinio daugianario ženklai kairėje ir dešinėje kiekvienos šaknies pusėse yra skirtingi.“ Ar teiginys teisingas? Palyginkite $P(x) = (x - 1)(x - 3)$ ir $Q(x) = (x - 2)^2$; nubraižykite abi ženklų tieses.

16. Duota, kad kvadratinio daugianario $P(x)$ šaknys yra -2 ir 4, o $P(0) = 8$.

a) Užrašykite $P(x)$ sandaugos pavidalu ir raskite a.

b) Nustatykite P ženklą visoje skaičių tiesėje. Koks ekstremumo taškas ir koks ekstremumas?

c) Patikrinkite $P(0)$ ir paaiškinkite, kodėl daugianaris nustatytas vienareikšmiškai.

17. Tarkime, kvadratinio daugianario $P(x)$ minimumas yra -4, o minimumo taškas $x = 3$; be to, $P(1) = 4$.

a) Raskite $P(x)$ pilnojo kvadrato pavidalą.

b) Raskite šaknis ir sandaugos pavidalą.

c) Nustatykite ženklą visoje skaičių tiesėje ir patikrinkite duotas sąlygas.

18. ⋆ Mokinys sako: „Kadangi $P(0) > 0$ ir $P(5) > 0$, tai $P(x) > 0$ visiems x tarp 0 ir 5.“ Nagrinėkite $P(x) = (x - 1)(x - 4)$.


a) Apskaičiuokite $P(0)$, $P(5)$ ir $P(2)$. Ar mokinio išvada teisinga?

b) Kokią tiesės dalį užima taškai 1 ir 4? Paaiškinkite, kodėl šaknys padalija intervalą $(0; 5)$.

c) Kodėl išnagrinėjus dauginamųjų ženklus žinome, kad P ženklas kiekviename iš intervalų $(-\infty; 1)$, $(1; 4)$, $(4; +\infty)$ yra pastovus? Paaiškinkite, kodėl tada kiekvieno tokio intervalo ženklui nustatyti pakanka vieno jame pasirinkto taško.

Sustok ir apibendrink. Kada, remiantis jau pagrįstu pastoviu ženklu, vieno pasirinkto taško pakanka intervalo ženklui nustatyti? Kodėl dviejų teigiamų reikšmių neužtenka visam tarp jų esančiam intervalui?

19. Kvadratinio daugianario $P(x)$ ženklų tiesė yra tokia:




Be to, $P(0) = -8$.

a) Ką iš brėžinio galite pasakyti apie šaknis ir vyriausiojo koeficiento ženklą?

b) Užrašykite $P(x)$ sandaugos pavidalu ir, naudodamiesi $P(0)$, raskite vyriausiąjį koeficientą.

c) Užrašykite standartinį ir pilnojo kvadrato pavidalus. Patikrinkite ženklus ir duotą reikšmę.

20. Kvadratinio daugianario $P(x)$ ženklų tiesė yra




o jo minimumas lygus -8.

a) Raskite šaknis, ekstremumo tašką ir užrašykite $P(x)$ per vyriausiąjį koeficientą a.

b) Iš minimumo raskite a, tada užrašykite $P(x)$ visais trimis pavidalais.


c) Patikrinkite ženklų tiesę ir minimumą. Kodėl toks daugianaris vienintelis?

21. Kvadratinio daugianario $P(x)$ ženklų tiesė yra



o $P(2) = -6$. Raskite $P(x)$, jo ekstremumo tašką ir ekstremumą. Patikrinkite atsakymą.

22. Kvadratinio daugianario $P(x)$ ženklų tiesė yra




o diskriminantas lygus 64. Raskite visus tokius daugianarius. Remkitės šaknų formule arba ryšiu $D = a^2(x_1 - x_2)^2$; paaiškinkite, kaip panaudojate a ženklą, ir patikrinkite gautą rezultatą.

23. Kvadratinio daugianario ženklų tiesėje nėra nulių, o ženklas visur teigiamas:



Žinoma, kad minimumo taškas yra $x = 2$, minimumas yra 3, o $P(0) = 11$. Raskite $P(x)$ standartiniu ir pilnojo kvadrato pavidalais. Ar jis turi realiųjų šaknų? Patikrinkite visas sąlygas.

24. Kvadratinio daugianario ženklų tiesė yra tokia:



Be to, $P(0) = 12$. Raskite $P(x)$, jo diskriminantą ir ekstremumą. Patikrinkite, kad atsakymas tenkina ir ženklų tiesėje pateiktą informaciją.

25. Kvadratinis daugianaris $P(x)$ yra teigiamas *tik* kai $1 < x < 3$, o $P(1) = P(3) = 0$. Jo maksimumas lygus 4. Raskite $P(x)$ ir nubraižykite ženklų tiesę. Paaiškinkite, kodėl iš sąlygų pakanka duomenų vienam daugianariui rasti.

26. Ar egzistuoja kvadratinis daugianaris, kuris būtų teigiamas visiems realiesiems x, o jo diskriminantas būtų lygus 4? Atsakymą pagrįskite.

27. Raskite *visus* kvadratinius daugianarius $P(x) = ax^2 + bx + c$, kurie yra teigiami kiekvienam realiajam x ir tenkina $P(0) = 1$.

a) Ką apie c, a ir diskriminantą pasako sąlygos?

b) Užrašykite visas galimas a, b, c sąlygas ir pagrįskite, kad jų pakanka.

c) Pateikite du skirtingus tokius daugianarius. Ar žinomos informacijos pakanka vienam daugianariui nustatyti?

28. Kiekvienu atveju nustatykite visas realiąsias x reikšmes, tenkinančias atitinkamą nelygybę, ir pavaizduokite sprendinių aibes skaičių tiesėje. Įtrauktą reikšmę žymėkite pilnaviduriu, neįtrauktą – tuščiaviduriu tašku.

a) $(x-1)(x-4) > 0$;

b) $(x-1)(x-4) \geq 0$;

c) $(x-1)(x-4) \leq 0$;

d) $(x-2)^2 \leq 0$.

Paaiškinkite, kodėl vienose dalyse šaknys įtraukiamos, o kitose – ne.

29. Grįžkime prie kurso pradžios. Duotas $P(x) = x^2 - 4x + 3$.

a) Kada $P(x) = 0$? Paaiškinkite, kaip tai susiję su šaknimis.

b) Kada $P(x) > 0$, kada $P(x) < 0$, o kada $P(x) \geq 0$? Ženklų ir sprendinių tiesėse pažymėkite taškus pagal jų įtraukimą.

c) Raskite ekstremumo tašką ir ekstremumą. Ką jie sako apie visas daugianario reikšmes?

d) Ar sąlygos $P(1) = P(3) = 0$ ir $P(0) = 3$ vienareikšmiškai nusako šį kvadratinį daugianarį? Pagrįskite.

e) Kurių ankstesnių temų išvadomis naudojotės? Savais žodžiais apibendrinkite, kaip atsakytumėte į tuos pačius keturis klausimus apie kitą kvadratinį daugianarį.

30. Papildomas iššūkis. Raskite realųjį m, su kuriuo lygtis $x^2 - mx + m = 0$ turi realiųjų šaknų, o jų kvadratų suma yra mažiausia. Vienintelės šaknies atveju laikykite $x_1 = x_2$. Pagrįskite, kad išnagrinėjote visas leistinas m reikšmes.

Ką atradome?

Prieš skaitydamas, pabandyk pats prisiminti ir savais žodžiais paaiškinti pagrindines šios temos išvadas. Tada palygink jas su pateiktomis.

Svarbiausios temos išvados

1. **Ženklų tiesė.** $+$ virš intervalo reiškia $P(x) > 0$ su kiekviena jo x reikšme, o $-$ reiškia $P(x) < 0$. Šaknyje $P(x) = 0$: nulis nėra nei teigiamas, nei neigiamas. Sprendinių tiesėje įtrauktas taškas yra pilnaviduris, neįtrauktas – tuščiaviduris; ženklų tiesėje tuščiavidurės šaknys neįeina į griežto ženklo intervalus, bet pažymėtas 0 nusako reikšmę šaknyje.

2. **Dvi šaknys.** Kai $r < s$ ir $P(x) = a(x - r)(x - s)$, sandauga $(x - r)(x - s)$ teigiama intervaluose $(-\infty; r)$ ir $(s; +\infty)$, o intervale $(r; s)$ neigiama. Jei $a < 0$, ženklai pasikeičia į priešingus; šaknyse reikšmė lygi nuliui.

3. **Viena šaknis.** Kai $P(x) = a(x - r)^2$, tai $P(r) = 0$, o su kiekvienu $x \neq r$ jo ženklas sutampa su a ženklu. Abipus šaknies ženklai vienodi.

4. **Šaknų nėra.** Kai $D < 0$, visoms realiosioms x reikšmėms $P(x)$ ženklas sutampa su a ženklu. Tai pagrindžia pilnojo kvadrato pavidalas.

5. **Kaip tirti?** Nustatyk šaknis ir jų tvarką; skaidyk, jei realiųjų šaknų yra; išnagrinėk dauginamųjų ženklus intervaluose; atskirai nurodyk reikšmes šaknyse. Kai ženklas intervale jau pagrįstai pastovus, jį galima nustatyti pasirinkus vieną to intervalo tašką. Sprendžiant $P(x) \geq 0$ ar $P(x) \leq 0$, į sprendinius įtraukiamos ir šaknys; sprendžiant griežtą nelygybę jos neįtraukiamos.

Kas toliau? Vėliau šaknis, ekstremumą, simetriją ir ženklus galėsite susieti su jų geometriniu vaizdu.

Ką verta užsirašyti savo atramose? Pasirink svarbią išvadą ir užsirašyk faktą, jo sąlygas, kodėl jis teisingas, ir vieną savo pavyzdį. Išvadų taikymą pasitikrink toliau pateiktu ♦ pažymėtu uždaviniu.

Savikontrolė

Pirmiausia užversk temos atramą ir savarankiškai išspręsk uždavinį. Pasitikrink atsakymus, o jei kuri nors dalis kėlė sunkumų, grįžk prie atitinkamos išvados ir pabandyk dar kartą. Kitą dieną dar kartą išspręsk šį uždavinį nesinaudodamas santrauka.

31. ♦ Atlikite užduotis ir pagrįskite atsakymus.

a) Raskite $P(x) = 2x^2+2x-12$ šaknis, nustatykite ženklą kiekviename intervale ir nubraižykite ženklų tiesę.

b) Nustatykite $Q(x) = -3(x-1)^2$ ženklą visoje skaičių tiesėje. Ką gaunate šaknyje?

c) Pagrįskite, koks yra $R(x) = -(x-2)^2 - 1$ ženklas su visomis realiosiomis x reikšmėmis.


d) Raskite kvadratinį daugianarį, kurio šaknys yra -2 ir 3, ženklų tiesėje tarp šaknų yra $-$, o $P(0) = -12$. Patikrinkite visas sąlygas.

Atsakymai ir sprendimai

1. **a)** Kai $x = -1$, gauname -3; kai $x = 2$ – 0; kai $x = 5$ – 3.

b) Jei $x < 2$, atėmę 2 iš abiejų nelygybės pusių gauname $x - 2 < 0$. Kai $x = 2$, $x - 2 = 0$. Jei $x > 2$, analogiškai $x - 2 > 0$.

c) Reiškinio $x - 2$ ženklų tiesė:



2. **a)** Atėmę t iš abiejų pusių, gauname: kai $x < t$, $x - t < 0$; kai $x = t$, $x - t = 0$; kai $x > t$, $x - t > 0$.

b) $x + 3 = x - (-3)$ nulis yra -3: kairėje ženklas neigiamas, dešinėje teigiamas. $x - 5$ nulis yra 5: kairėje neigiamas, dešinėje teigiamas.


3. **a)** Gauname intervalus $(-\infty; 1)$, $(1; 4)$, $(4; +\infty)$.

b) Jei $x < 1$, abu dauginamieji neigiami, todėl sandauga teigiama. Jei $1 < x < 4$, pirmasis teigiamas, antrasis neigiamas, todėl sandauga neigiama. Jei $x > 4$, abu teigiami, todėl sandauga teigiama.

x	$x < 1$		$1 < x < 4$		$x > 4$
$x - 1$	−	0	+	+	+
$x - 4$	−	−	−	0	+
$P(x)$	+	0	−	0	+

c) $P(1) = P(4) = 0$. Patikra: $P(0) = (-1)(-4) = 4 > 0$, $P(2) = 1 \cdot (-2) = -2 < 0$, $P(5) = 4 \cdot 1 = 4 > 0$. Šios trys reikšmės iliustruoja b dalį; ženklai visiems intervalo skaičiams pagrįsti b dalyje.


d)



$P(x) > 0$, kai $x \in (-\infty; 1) \cup (4; +\infty)$; $P(x) < 0$, kai $x \in (1; 4)$; $P(x) = 0$, kai $x = 1$ arba $x = 4$.

4. **a)** Daugyba iš -1 teigiamą reikšmę pakeičia neigiama ir atvirkščiai, o nulį palieka nuliu.


b)




$P(x) > 0$ intervale $(1; 4)$; $P(x) < 0$ intervaluose $(-\infty; 1)$ ir $(4; +\infty)$; šaknys 1, 4.

5. **a)** Kai $x < r < s$, abu skirtumai neigiami, sandauga teigiama. Kai $r < x < s$, pirmasis skirtumas teigiamas, antrasis neigiamas, sandauga neigiama. Kai $r < s < x$, abu skirtumai teigiami, sandauga teigiama.

b) Kai $a > 0$, daugyba iš a ženklų nekeičia:




c) Kai $a < 0$, daugyba iš a visus nenulinius ženklus pakeičia priešingais:



Abiem atvejais $P(r) = P(s) = 0$, nes vienas dauginamasis lygus nuliui.


d) Sąlyga $r < s$ užtikrina, kad r yra kairioji šaknis, o s – dešinioji; tik tuomet $(r; s)$ yra intervalas tarp jų.

6. a) Šaknys $-2 < 1$, $a = 3 > 0$:




$P > 0$ išoriniuose intervaluose, $P < 0$ intervale $(-2; 1)$; ties šaknimis $P = 0$.

b) Šaknys $-1 < 3$, $a = -2 < 0$:




$Q > 0$ intervale $(-1; 3)$; už jo neigiamas; ties šaknimis lygus nuliui.

c) Šaknys $-4 < -2$, $a = 1 > 0$:




$R < 0$ tarp šaknų, teigiamas už jų, lygus nuliui ties šaknimis.

d) Šaknys $0 < 5$, $a = -1 < 0$:




$S > 0$ tarp šaknų, neigiamas už jų, lygus nuliui ties šaknimis.


7. a) Šaknys 2, 3; $P(x) = (x - 2)(x - 3)$, $a > 0$:




b) Šaknys -2, 3; $P(x) = -(x + 2)(x - 3)$, $a < 0$:



c) $2x^2 - 8x - 10 = 2(x+1)(x-5)$; šaknys -1, 5, $a > 0$:



d) $-x^2 - 4x = -x(x+4)$; šaknys -4, 0, $a < 0$:




Kiekviename brėžinyje ženklai galioja atviruose intervaluose, o šaknyse daugianaris lygus nuliui.

8. **a)** Realaus skaičiaus kvadratas neneigiamas. Kvadratas lygus nuliui tik jei $x-2=0$, t. y. $x=2$.

b) Jei $x \neq 2$, tai $x-2 \neq 0$, todėl $(x-2)^2 > 0$. Abiejose šaknies pusėse ženklas teigiamas: jis nepasikeičia.


c)




3 uždavinyje ties kiekviena iš dviejų skirtingų šaknų ženklas keitėsi, o čia ties dvigubąja šaknimi nesikeičia.

9. **a)** $P(r) = a \cdot 0^2 = 0$. Jei $x \neq r$, tai $x - r \neq 0$, todėl jo kvadratas teigiamas.

b) Kai $a > 0$, visur, išskyrus r, sandauga teigiama:




Kai $a < 0$, ji visur, išskyrus r, neigiama:




Kai $x = r$, yra $P(r) = 0$; nulis nėra nei teigiamas, nei neigiamas. Nenulinis daugianario ženklas kairėje ir dešinėje šaknies pusėse yra tas pats.


10. **a)** $x^2 - 6x + 9 = (x-3)^2$; šaknis 3, kitur reikšmės teigiamos:



b) $-2x^2 - 8x - 8 = -2(x+2)^2$; šaknis -2, kitur reikšmės neigiamos:



c) $4x^2 = 4(x-0)^2$; šaknis 0, kitur reikšmės teigiamos:




11. **a)** Kvadratas neneigiamas: $(x-1)^2 \geq 0$. Pridėję po 3 gauname $(x-1)^2 + 3 \geq 3 > 0$.

b) Nuliui ši reikšmė nelygi, todėl realiųjų šaknų nėra:



c) $(x+1)^2 \geq 0$. Padauginę iš -2 pakeičiame nelygybės kryptį: $-2(x+1)^2 \leq 0$. Atėmę po 5 gauname $Q(x) = -2(x+1)^2 - 5 \leq -5 < 0$. Taigi Q visur neigiamas.



12. **a)** Kadangi $D < 0$, pagal 6 temos išvadą realiųjų šaknų nėra.

b) Jei $D < 0$ ir $a > 0$, tai $-D > 0$ ir $4a > 0$, todėl $-\frac{D}{4a} > 0$. Be to, $\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 \geq 0$, taigi $a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 \geq 0$. Pridėję teigiamą skaičių $-\frac{D}{4a}$ prie abiejų nelygybės pusių, gauname

$$P(x) = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{D}{4a} \geq -\frac{D}{4a} > 0.$$

Vadinasi, $P(x) > 0$ kiekvienam realiajam x.

c) Jei $D < 0$ ir $a < 0$, tai $-D > 0$, $4a < 0$, todėl $-\frac{D}{4a} < 0$. Kadangi kvadratas neneigiamas, o $a < 0$, gauname $a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 \leq 0$. Pridėję neigiamą skaičių $-\frac{D}{4a}$ prie abiejų pusių, gauname

$$P(x) = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{D}{4a} \leq -\frac{D}{4a} < 0.$$

Taigi, kai $D < 0$, daugianario ženklas visoje tiesėje sutampa su a ženklu.

13. **a)** $x^2 + 2x + 5 = (x+1)^2 + 4 \geq 4 > 0$ visiems x.




b) $-x^2 + 4x - 7 = -(x-2)^2 - 3 \leq -3 < 0$ visiems x.




c) $2x^2 + 2 \geq 2 > 0$ visiems x.




14. **a)** $D = 4 > 0$, šaknys 1, 3, $a > 0$:




b) $D = 0$, dviguboji šaknis 2, $P(x) = (x-2)^2$:




c) $D = -4 < 0$, šaknų nėra, $P(x) = (x-2)^2 + 1 > 0$:




d) $D = 4 > 0$, šaknys 1, 3, $a < 0$:



15. Teiginys klaidingas. Pirmajame pavyzdyje ženklas ties abiem skirtingomis šaknimis pasikeičia:




Antrajame ties dvigubąja šaknimi 2 ženklas nesikeičia, nors pati reikšmė joje lygi nuliui:



16. **a)** $P(x) = a(x+2)(x-4)$. Iš $P(0) = -8a = 8$ gauname $a = -1$, taigi $P(x) = -(x+2)(x-4)$.

b) $a < 0$, todėl ženklų tiesė yra




Ekstremumo taškas $\frac{-2+4}{2} = 1$; $P(1) = -(3)(-3) = 9$. Kadangi $a < 0$, ekstremumas yra maksimumas, todėl 9 yra didžiausioji reikšmė.

c) $P(0) = -(2)(-4) = 8$. Šaknys nustato sandaugos pavidalą, o ši reikšmė vienareikšmiškai nustato $a = -1$.

17. **a)** $P(x) = a(x-3)^2 - 4$. Iš $P(1) = 4a - 4 = 4$ gauname $a = 2$, todėl $P(x) = 2(x-3)^2 - 4$.

b) Iš $2(x-3)^2 - 4 = 0$ gauname $(x-3)^2 = 2$, todėl šaknys $3-\sqrt{2}$ ir $3+\sqrt{2}$. Sandaugos pavidalas yra $P(x) = 2(x-3+\sqrt{2})(x-3-\sqrt{2})$.

c) $a = 2 > 0$, tad




$P(3) = -4$, tai minimumas, nes $2(x-3)^2 \geq 0$; $P(1) = 2 \cdot 4 - 4 = 4$.

18. **a)** $P(0) = (-1)(-4) = 4 > 0$, $P(5) = 4 \cdot 1 = 4 > 0$, bet $P(2) = 1 \cdot (-2) = -2 < 0$. Todėl mokinio išvada klaidinga: taškas 2 yra tarp 0 ir 5.

b) Šaknys 1 ir 4 yra intervalo $(0;5)$ viduje: $0 < 1 < 4 < 5$. Todėl tiriamame intervale yra trys dalys – $(0;1)$, $(1;4)$, $(4;5)$ – ir dvi šaknys. Taškai 0 ir 5 yra skirtingose šaknų pusėse, todėl jų ženklai nepasako, kas vyksta tarp šaknų.

c) Kiekviename iš intervalų $(-\infty;1)$, $(1;4)$, $(4;+\infty)$ kiekvieno dauginamojo $x-1$ ir $x-4$ ženklas yra pastovus: pavyzdžiui, kai $1 < x < 4$, pirmasis visada teigiamas, o antrasis visada neigiamas. Todėl ir jų sandaugos ženklas tame intervale yra pastovus. *Jau pagrindus šį pastovumą*, bet kuris pasirinktas vienas intervalo taškas parodo viso intervalo ženklą. Pavyzdžiui, $P(0) > 0$, $P(2) < 0$, $P(5) > 0$ leidžia pažymėti atitinkamai $+$, $-$, $+$; ties šaknimis 1 ir 4 reikšmė yra 0.



Vieno taško patikra savaime neįrodo ženklo pastovumo: čia jį pirmiausia pagrindėme išskaidyto kvadratinio daugianario dauginamųjų ženklais.

19. **a)** Taškuose $x = 1$ ir $x = 4$ pažymėtas nulis, taigi tai šaknys. Už šaknų daugianaris neigiamas, o tarp jų teigiamas, todėl $a < 0$.

b) Pagal skaidymo formulę $P(x) = a(x-1)(x-4)$. Įrašę $x = 0$ gauname $P(0) = 4a = -8$, taigi $a = -2$.

c) $P(x) = -2(x-1)(x-4) = -2x^2 + 10x - 8 = -2\left(x - \frac{5}{2}\right)^2 + \frac{9}{2}$. Kadangi $a = -2 < 0$, ženklai už šaknų neigiami, tarp jų teigiami; $P(0) = -8$. Šaknys ir $P(0)$ vienareikšmiškai nustato daugianarį.

20. **a)** Šaknys yra -2 ir 2, todėl jų vidurkis, kartu ir ekstremumo taškas, yra 0. Kadangi šaknys skirtingos, $P(x) = a(x+2)(x-2)$; iš ženklų tiesės $a > 0$.

b) Minimumas pasiekiamas, kai $x = 0$, tad $P(0) = -4a = -8$ ir $a = 2$. Trys pavidalai:

$$P(x) = 2(x+2)(x-2) = 2x^2 - 8 = 2(x-0)^2 - 8.$$

c) $P(0) = -8$ ir, kadangi $2x^2 \geq 0$, minimumas tikrai yra -8. Iš $a > 0$ ir šaknų -2, 2 gaunami brėžinyje nurodyti ženklai. Šaknys ir minimumo reikšmė vienareikšmiškai nustatė a.

21. Brėžinyje nurodytos šaknys 1 ir 5, o išoriniai ženklai rodo, kad $a > 0$. Todėl $P(x) = a(x-1)(x-5)$. Iš $P(2) = a \cdot 1 \cdot (-3) = -6$ gauname $a = 2$.

Taigi $P(x) = 2(x-1)(x-5) = 2(x-3)^2 - 8$. Minimumo taškas yra 3, minimumas -8. Patikra: $P(2) = 2 - 8 = -6$, o ženklai yra teigiami už šaknų ir neigiami tarp jų.

22. Ženklų tiesė duoda šaknis -1 ir 3 bei $a<0$, todėl $P(x)=a(x+1)(x-3)$. Atskliaudę gauname $b=-2a$, $c=-3a$, taigi

$$D=b^2-4ac=4a^2+12a^2=16a^2.$$

Iš $16a^2=64$ turime $a=2$ arba $a=-2$; ženklų tiesė reikalauja $a<0$, todėl $a=-2$. Vienintelis atsakymas yra $P(x)=-2(x+1)(x-3)=-2x^2+4x+6$.

Patikra: $D=4^2-4(-2)\cdot 6=64$, šaknys -1, 3, o kai $a<0$, ženklai yra $-\,,+\,,-$, kaip brėžinyje.

23. Pagal ekstremumo duomenis $P(x)=a(x-2)^2+3$, o iš $P(0)=4a+3=11$ gauname $a=2$. Taigi $P(x)=2(x-2)^2+3=2x^2-8x+11$.


Kadangi $2(x-2)^2\geq 0$, tai $P(x)\geq 3>0$ visiems x, todėl šaknų nėra. Minimumas 3 pasiekiamas, kai $x=2$, o $P(0)=11$. Duomenys vienareikšmiškai nustatė a, taigi daugianaris vienintelis.

24. Brėžinyje ties 2 pažymėtas vienintelis nulis, o abiejose pusėse reikšmės teigiamos. Vadinasi, $P(x)=a(x-2)^2$, kur $a>0$. Iš $P(0)=4a=12$ randame $a=3$, todėl $P(x)=3(x-2)^2=3x^2-12x+12$.

$D=(-12)^2-4\cdot 3\cdot 12=0$. Minimumo taškas 2, minimumas 0. Kadangi kvadratas teigiamas, kai $x\neq 2$, o $a=3>0$, ženklų tiesė tenkinama; $P(0)=12$.

25. Kadangi $P(1)=P(3)=0$, šaknys yra 1 ir 3. Daugianaris teigiamas tarp šaknų, todėl $a<0$ ir $P(x)=a(x-1)(x-3)$. Ekstremumo taškas yra šaknų vidurkis 2. Iš maksimumo $P(2)=-a=4$ gauname $a=-4$.

Taigi $P(x)=-4(x-1)(x-3)=-4(x-2)^2+4$, o jo ženklų tiesė:



Patikra: $P(1)=P(3)=0$, $P(x)>0$ tik intervale $(1;3)$ ir maksimumas yra 4. Šaknys ir maksimumas vienareikšmiškai nustato a, todėl daugiau atsakymų nėra.

26. Tokio daugianario nėra. Jeigu $D=4>0$, pagal šaknų formulę jis turėtų dvi realiąsias šaknis. Kiekvienoje šaknyje daugianario reikšmė lygi 0, todėl jis negali būti teigiamas *visiems* realiesiems x.

27. **a)** Iš $P(0)=1$ gauname $c=1$. Kadangi daugianaris visur teigiamas, jis neturi realiųjų šaknų, todėl $D<0$. Be to, kai realiųjų šaknų nėra, ženklas sutampa su a ženklu; vadinasi, $a>0$.

b) Kadangi $c=1$, tai $D=b^2-4a$. Visos ieškomos sąlygos yra

$$c=1,\qquad a>0,\qquad b\in\mathbb{R},\qquad b^2<4a.$$

Jos ir pakankamos: kai $a>0$ ir $D<0$, realiųjų šaknų nėra, o daugianaris visoje tiesėje teigiamas; be to, $P(0)=c=1$.

c) Pavyzdžiui, $P(x)=x^2+1$ ir $Q(x)=2x^2+1$. Abu daugianariai teigiami visiems x, ir $P(0)=Q(0)=1$. Todėl vienam daugianariui nustatyti sąlygų nepakanka.

28. Šaknys yra 1 ir 4. Iš sandaugos ženklų: už šaknų reiškinys teigiamas, tarp jų neigiamas, o abiejose šaknyse lygus nuliui.

a) Kai $(x-1)(x-4)>0$, gauname $x\in(-\infty;1)\cup(4;+\infty)$. Šaknys neįtraukiamos – jos pažymėtos tuščiaviduriais taškais:




b) Kai $(x-1)(x-4) \geq 0$, įtraukiame ir abi šaknis: $x \in (-\infty; 1] \cup [4; +\infty)$. Jos pažymėtos pilnaviduriais taškais:



c) Kai $(x-1)(x-4) \leq 0$, imame neigiamą intervalą ir abi šaknis: $x \in [1; 4]$.



d) Kadangi $(x-2)^2 \geq 0$, nelygybė $(x-2)^2 \leq 0$ galima tik tada, kai kvadratas lygus nuliui. Vienintelis sprendinys $x = 2$, arba $\{2\}$; taškas įtraukiamas:



29. **a)** $P(x) = (x-1)(x-3)$, todėl šaknys yra 1 ir 3 – būtent šios reikšmės tenkina $P(x) = 0$.

b) Pagal dauginamųjų ženklus $P(x) > 0$, kai $x \in (-\infty; 1) \cup (3; +\infty)$; $P(x) < 0$, kai $x \in (1; 3)$. Pridėję šaknis gauname $P(x) \geq 0$, kai $x \in (-\infty; 1] \cup [3; +\infty)$. Ženklų tiesėje šaknys tuščiavidurės, nes neįeina į griežto ženklo intervalus; nurodžius 0, jos pažymi, kur $P(x) = 0$:



O sprendinių $P(x) \geq 0$ tiesėje abi šaknys įtrauktos, todėl taškai pilnaviduriai:



c) $P(x) = (x-2)^2 - 1 \geq -1$. Minimumo taškas $x_{\min} = 2$, minimumas $P_{\min} = -1$: visos daugianario reikšmės yra ne mažesnės kaip -1, ir ši reikšmė pasiekiama, kai $x = 2$.

d) Jei kvadratinio daugianario šaknys 1 ir 3, tai $P(x) = a(x-1)(x-3)$. Iš $P(0) = 3a = 3$ gauname vienintelį $a = 1$. Taigi duomenys vienareikšmiškai nusako pateiktą daugianarį; tiesioginė patikra duoda $P(1) = P(3) = 0$, $P(0) = 3$.

e) Šaknų sąvoka ir formulė nagrinėtos 6 temoje, ženklai – šioje temoje, pilnasis kvadratas bei ekstremumas – 2–4 temose, skaidymas ir konstravimas – 9 temoje. Kitam daugianariui pirmiausia pasirenkame patogų pavidalą, apskaičiuojame šaknis ar ekstremumą, atskirai pagrindžiame ženklus ir patikriname, ar duomenys vienareikšmiškai nustato koeficientus.


30. Jei šaknys realiosios, $D = m^2 - 4m = m(m-4) \geq 0$. Ženklų tyrimas duoda $m \in (-\infty; 0] \cup [4; +\infty)$: 0 ir 4 įtraukiame, nes tada $D = 0$ ir yra viena dviguboji šaknis. Pagal Vijeto teoremą $x_1 + x_2 = m$, $x_1 x_2 = m$, todėl

$$x_1^2 + x_2^2 = m^2 - 2m = (m-1)^2 - 1.$$


Jei nepaisytume sąlygos $D \geq 0$, mažiausią šio reiškinio reikšmę -1 gautume, kai $m = 1$. Tačiau tada $D = 1 - 4 = -3 < 0$: realiųjų šaknų nėra, todėl $m = 1$ nagrinėjamam uždaviniui netinka.

Kai $m \leq 0$, tai $m^2 - 2m \geq 0$, o lygybė yra tik kai $m = 0$. Kai $m \geq 4$, tai $m(m-2) \geq 4 \cdot 2 = 8 > 0$. Todėl mažiausia kvadratų sumos reikšmė yra 0, ji pasiekiama vienineliu atveju $m = 0$. Tuomet lygtis $x^2 = 0$ turi vieną dvigubąją šaknį: $x_1 = x_2 = 0$.

31. **a)** $2x^2 + 2x - 12 = 2(x^2 + x - 6) = 2(x + 3)(x - 2)$. Šaknys yra -3 ir 2. Kai $x < -3$, abu tiesiniai dauginamieji neigiami, todėl sandauga teigiama; kai $-3 < x < 2$, jų ženklai priešingi, todėl sandauga neigiama; kai $x > 2$, abu teigiami. Dauginamasis 2 teigiamas. Šaknyse reikšmė lygi nuliui:



b) $(x - 1)^2 = 0$ tik kai $x = 1$, o kai $x \neq 1$, jis teigiamas. Todėl $Q(1) = 0$, o su visomis kitomis reikšmėmis $Q(x) < 0$:



c) Kadangi $(x - 2)^2 \geq 0$, tai $-(x - 2)^2 \leq 0$. Atėmę 1 gauname $R(x) \leq -1 < 0$ su visomis realiosiomis x reikšmėmis. Realiųjų šaknų nėra:



d) Pagal skaidymo formulę $P(x) = a(x + 2)(x - 3)$, kur $a \neq 0$. Iš $P(0) = -6a = -12$ gauname $a = 2$, todėl $P(x) = 2(x + 2)(x - 3) = 2x^2 - 2x - 12$. Patikra: $P(-2) = P(3) = 0$, $P(0) = -12$. Tarp šaknų $x + 2 > 0$, $x - 3 < 0$, o $2 > 0$, todėl $P(x) < 0$. Duomenys vienareikšmiškai nustato a.