

Invariantai: lyginumas

ANDRIUS BERNIUKEVIČIUS

Vilniaus licėjus

§1 Kas yra invariantas ir kodėl jis toks galingas?

Mokyklinėje matematikoje viskas dažniausiai yra statiška: turime lygtį, ją išsprendžiame ir gauname vieną atsakymą.

Olimpiadinėje matematikoje labai dažnai viskas juda. Jums leidžiama trinti skaičius, keisti figūrų vietas, karpyti lentas, atlikti milijonus skirtingų ėjimų. Tokie uždaviniai iš pradžių sukelia šoką:

„Variantų yra milijardai! Kaip man juos visus patikrinti?“

Atsakymas trumpas: **nereikia tikrinti nė vieno.**

Olimpiadininkai tokius uždavinius sprendžia ieškodami **invarianto**. **Invariantas** (iš lotynų k. *invariants* – nesikeičiantis) yra tam tikra savybė, dydis arba taisyklė, kuri **niekada nesikeičia**, kad ir kokius leistinus veiksmus bedarytumėte.

Jeigu sugebate rasti tai, kas nesikeičia (nors aplink viskas keičiasi), jūs atrandate uždavinio „inkarą“. Jei pradinė būseną turi vieną invarianto reikšmę, o norima galutinė būseną – kitą, jūs iš karto galite drąsiai sakyti: „Tai neįmanoma“.

Mūsų pirmasis invariantas yra **lyginumas**. Olimpiadose jis tampa savotišku rentgenu, leidžiančiu peršviesti sudėtingą sąlygą ir pamatyti jos paslėptą struktūrą.

Prisiminkime abėcėlę:

- $L \pm L = L$, $N \pm N = L$, $L \pm N = N$.
- Jei sandaugoje yra **bent vienas** lyginis skaičius, visas rezultatas yra lyginis.
- Nelyginių skaičių sandauga visada yra nelyginė.

Auksinė taisyklė: Išsibandykite patys („Pažaiskite“)

Pamatę uždavinį apie procesą, nesistenkite iš karto atspėti invarianto. Paimkite popieriaus lapą ir atlikite kelis ėjimus ranka! Sumažinkite pradinis skaičius (jei duota 100, paimkite 4) ir pažiūrėkite, kas nutinka su lyginiu, sumomis ar skirtumais. Stebint savo paties atliktus ėjimus, pamatyti tai, kas **nesikeičia**, tampa kur kas lengviau.

Pavyzdys 1.1 (Auksinės taisyklės demonstravimas)

Uždavinys: Lentoje surašyti skaičiai $1, 2, \dots, 2026$. Vienu ėjimu leidžiama nutrinti bet kokius du skaičius a ir b , o vietoje jų parašyti $|a - b|$. Ar gali paskutinis lentoje likęs skaičius būti nulis?

Sprendimas:

Užuot iškart žiūrėję į 2026 skaičius, paimekime tik keturis: 1, 2, 3, 4. Stebėkime ne tik pačius skaičius, bet ir jų **sumą**.

- **Pradinė būseną:** 1, 2, 3, 4. Suma yra 10 (**lyginis** skaičius).
- **1 ėjimas:** Nutrinkime 2 ir 3, parašykime $|2 - 3| = 1$. Lentoje lieka 1, 4, 1. Suma dabar $1 + 4 + 1 = 6$ (**lyginis!**).
- **2 ėjimas:** Nutrinkime 4 ir 1, parašykime $|4 - 1| = 3$. Lentoje lieka 1, 3. Suma dabar $1 + 3 = 4$ (**lyginis!**).
- **3 ėjimas:** Nutrinkime 1 ir 3, parašykime $|1 - 3| = 2$. Lentoje liko skaičius 2.

Atradimas: Atliekant ėjimus, skaičių suma keitėsi ($10 \rightarrow 6 \rightarrow 4 \rightarrow 2$), bet jos **lyginumas** niekada nesikeitė – ji visada liko lyginė! Kodėl? Trinant skaičius a, b iš bendros sumos atimama $(a + b)$, o pridodamas skirtumas $(a - b)$. Matematikoje skaičių sumos $a + b$ ir skirtumo $a - b$ lyginumas **visada sutampa**. Vadinasi, bendros sumos lyginumas viso proceso metu nesikeičia.

Pritaikymas originaliam uždaviniui: Suskaičiuokime pradinę visų 2026 skaičių sumą:

$$1 + 2 + 3 + \dots + 2026 = \frac{2026 \cdot 2027}{2} = 1013 \cdot 2027$$

Dauginame du nelyginius skaičius, todėl pradinė suma yra **nelyginė**. Remiantis mūsų atrastu invariantu, skaičių suma po bet kokio ėjimų skaičiaus privalo išlikti nelyginė. Jei lentoje liktų nulis (kuris yra lyginis skaičius), suma taptų lyginė. Tai neįmanoma! $\square$

O dabar pažiūrėkime, kaip šios taisyklės keičia olimpiadininko mąstymą trimis pjūviais.

§2 1 strategija: Nematomos struktūros paieška (Algebrinis lyginumas)

Dažnai uždavinys atrodo sudėtingas, nes jūs blaškotės tarp plusų, minusų ir operacijų gausos. Olimpiadininko tikslas – ne atlikti operacijas, o pažiūrėti, ko tos operacijos *negali* pakeisti.

Pavyzdys 2.1 (Ženklių karas)

Tarp skaičių 1, 2, 3, ..., 10 bet kokia tvarka surašome „+“ ir „-“ ženklus. Ar įmanoma juos sudėlioti taip, kad gauto reiškinių reikšmė būtų lygi 0?

Sprendimas:

(Patarimas: Prieš skaitant toliau, pabandykite ranka sudėlioti ženklus tik skaičiams 1, 2, 3 ir paskaičiuoti sumas. Pamatysite, kad jos visada lyginės!)

Tarkime, iš pradžių prieš visus skaičius parašome plusus. Suma yra:

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = 55.$$

Ši pradinė suma yra **nelyginis** skaičius. Kas nutinka, jeigu prieš kažkokį skaičių x plusą pakeičiame minusu? Suma sumažėja lygiai $2x$. Pavyzdžiui, pakeitus $+3$ į -3 , bendra suma sumažėja 6.

Kadangi $2x$ visada yra **lyginis** skaičius, iš bendros sumos mes atimame lyginį skaičių. Pagal taisyklę: $Nelyginis - Lyginis = Nelyginis$. Kad ir kiek pliusų pakeistume minusais, reiškinys visada liks nelyginis. Vadinasi, 0 (lyginio skaičiaus) gauti neįmanoma. $\square$

Pavyzdys 2.2 (Sandaugos magija)

Lentoje užrašyti 2026 pliusai ir 2027 minusai. Vienu ėjimu leidžiama nutrinti bet kokius du ženklus ir vietoje jų parašyti „+“, jei jie buvo vienodi, arba „-“, jei jie buvo skirtingi. Koks ženklas liks paskutinis?

Sprendimas:

(Patarimas: Paimkite 2 pliusus ir 3 minusus. Trinkite juos pagal taisyklę. Koks ženklas visada lieka pabaigoje?)

Jei bandysime sekti pliusų ir minusų skaičių – susipainiosime. Įveskime algebrinę struktūrą: tegul pliusas reiškia skaičių 1, o minusas reiškia -1 . Ką daro mūsų operacija? Ji paprasčiausiai **sudaugina** tuos du skaičius!

- Plius ir Plius $\rightarrow (+1) \cdot (+1) = +1$ (Plius)
- Minus ir Minus $\rightarrow (-1) \cdot (-1) = +1$ (Plius)
- Plius ir Minus $\rightarrow (+1) \cdot (-1) = -1$ (Minus)

Visų lentoje esančių skaičių **sandauga** niekada nesikeičia! Pradinė sandauga yra $(1)^{2026} \cdot (-1)^{2027} = -1$. Vadinasi, proceso pabaigoje likęs vienintelis skaičius privalo būti -1 , tai yra **minusas**. $\square$

Pavyzdys 2.3 (Nelyginis kėlinys)

Skaičiai $x_1, x_2, \dots, x_9$ yra skaičių $1, 2, \dots, 9$ perstata (tie patys skaičiai, tik sumaišyta tvarka). Ar sandauga $(x_1 - 1)(x_2 - 2) \dots (x_9 - 9)$ gali būti nelyginis skaičius?

Sprendimas:

(Patarimas: Pabandykite sumaišyti tik skaičius 1, 2, 3 ir paskaičiuoti sandaugą $(x_1 - 1)(x_2 - 2)(x_3 - 3)$. Juk nors vienas narys $(x_k - k)$ visada išeina lyginis!)

Jei sandauga būtų nelyginė, tai **kiekvienas** dauginamasis $(x_k - k)$ privalėtų būti nelyginis. Kad skirtumas būtų nelyginis, x_k ir k lyginumas turi skirtis. Tačiau pažiūrėkime į sumą:

$$(x_1 - 1) + (x_2 - 2) + \dots + (x_9 - 9) = (x_1 + \dots + x_9) - (1 + \dots + 9) = 0.$$

Suma lygi 0 (lyginis skaičius). Bet mes turime 9 (nelyginį skaičių) dauginamųjų. Devynių nelyginių skaičių suma visada yra nelyginis skaičius, o mes gavome 0. Prieštara! Vadinasi, bent vienas dauginamasis privalo būti lyginis, ir visa sandauga bus lyginė. $\square$

§3 2 strategija: Struktūros sukūrimas (Geometrinis dažymas)


Ką daryti, jei uždavinyje net nėra skaičių, o tik tuščia erdvė? Olimpiadininkas pats sukuria struktūrą – pavyzdžiui, nuspalvina erdvę, kad išryškėtų lyginumo dėsniai.

Pavyzdys 3.1 (Žirgo kelionė)

Ar gali šachmatų žirgas, pradėjęs kelionę 5×5 dydžio lentoje, aplankyti kiekvieną langelį lygiai po vieną kartą ir sugrįžti į pradinį langelį?

Sprendimas: (*Patarimas: Nusipieškite 3×3 lentą ir pažiūrėkite, kaip keičiasi langelių spalvos. Langeliai turi būti dviejų spalvų, o žirgas – spalvų keitimo mašina!*)

Nuspalvinkime lentą šachmatine tvarka. Šachmatų žirgas turi savybę: kiekvienu ėjimu jis **privalo** pakeisti langelio spalvą (iš juodo į baltą, iš baltą į juodą). Lentoje yra 25 langeliai. Kad aplankytų juos visus ir grįžtų atgal, reikia 25 ėjimų. Po lyginio ėjimų skaičiaus žirgas grįžta į tos pačios spalvos langelį, po nelyginio – atsiduria priešingos. Kadangi 25 yra nelyginis, žirgas po 25 ėjimų privalo būti ant kitos spalvos langelio, todėl grįžti į pradžią neįmanoma. $\square$


**Pavyzdys 3.2** (Sukarpyta lenta)

Standartinėje 8×8 šachmatų lentoje išpjovėme du priešingus kampus. Ar likusius 62 langelius galima uždengti 31 domino kauliuku (1×2)?

Sprendimas:

(*Patarimas: Paimkite mažą 2×2 lentą ir iškirpkite du priešingus kampus. Ar galite uždėti bent vieną domino? Kokių spalvų langeliai liko?*)

Vienas domino kauliukas **visada** uždengia lygiai 1 baltą ir 1 juodą langelį. Vadinasi, 31 kauliukas privalo uždengti lygiai 31 baltą ir 31 juodą langelį. Tačiau priešingi lentos kampai visada yra **tos pačios spalvos** (pažiūrėkite į brėžinį, abu balti). Išpjovus juos, lentoje lieka 32 juodi ir 30 baltų langelių. Kadangi spalvų skaičiai nelygūs, padengti lentą domino kauliukais yra neįmanoma. $\square$


**Pavyzdys 3.3** (T-formos figūros)

Turime 10×10 lentą. Ar galima ją visą uždengti 25 „T“ formos tetromino figūromis (iš 4 langelių)?

Sprendimas:

(Patarimas: Nupieškite ant langinio popieriaus T formos figūrą ir „pavaikščiokite“ su ja kaip šachmatais nuspelvinta lenta. Kiek juodų langelių ji visada uždengia?)

Nuspalvinkime 10×10 lentą šachmatine tvarka. Lentoje yra 50 juodų ir 50 baltų langelių. Kaip bepadėtųume „ T “ figūrą ant šachmatų lentos, ji visada uždengs **nelyginį skaičių** juodų langelių (arba 3 juodus ir 1 baltą, arba 1 juodą ir 3 baltus). Jei padėsime 25 figūras, bendras uždengtų juodų langelių skaičius bus 25 nelyginių skaičių suma. Pagal lyginumo taisyklės, 25 (nelyginis kiekis) nelyginių skaičių suma yra **nelyginis** skaičius! Bet lentoje juodų langelių yra 50 (lyginis). Vadinasi, to padaryti neįmanoma. $\square$



§4 3 strategija: Taškai ir ryšiai (Grafų teorijos elementai)

Kai olimpiadinėje matematikoje išgirsite terminą „**grafas**“ ar „grafų teorija“, neišsigąskite. Tai neturi visiškai nieko bendro su funkcijų grafikais ($y = x^2$) ar koordinatų ašimis, kuriuos braižote per pamokas. Olimpiadinis grafas yra pats paprasčiausias piešinys: tai tiesiog **taškai** (kurie reiškia žmones, miestus, salas, komandas) ir tuos taškus jungiančios **linijos** (kurios reiškia draugystes, kelius, tiltus, rungtynes). Štai ir visa teorija! Ši strategija (taškų ir linijų braižymas) naudojama, kai uždavinys kalba apie ryšius tarp objektų. Čia dažniausiai veikia du galingi olimpiadininko ginklai: ryšių skaičiavimas („Rankų paspaudimų lema“) ir uždarytų ratų (ciklų) stebėjimas.

Pagrindinė ryšių taisyklė: kiekvienas ryšys (tiltas, draugystė, virvė) sujungia du taškus, todėl jis visada turi DU galus. **Pagrindinė ryšių taisyklė:** kiekvienas ryšys (tiltas, draugystė, virvė) sujungia du objektus, todėl jis visada turi DU galus.


Pavyzdys 4.1 (Draugų klasė)

Klasėje mokosi 15 mokinių. Ar gali būti taip, kad kiekvienas mokinys toje klasėje turi lygiai 3 draugus?

Sprendimas: *(Patarimas: Pabandykite nupiešti tris draugus (A , B , C) linijomis. Jei kiekvienas turi po 3 draugus, ar pavyks tai nupiešti? Kur trūks ryšio galo?)*

Pirmiausia, paskaičiuokime bendrą visų mokinių draugų sumą: $15 \text{ mokinių} \times 3 \text{ draugai} = 45$.

Tačiau atkreipkime dėmesį į tai, kaip veikia draugystės ryšys. (Čia pateikta diagrama **nėra** šio uždavinio iliustracija – tai tik pagalbinis pavyzdys, rodantis patį ryšių skaičiavimo principą). Jei mokinys A draugauja su mokiniu B , realybėje tai yra **viena draugystė** (vienas ryšys).



Tačiau atlikdami daugybą 15×3 , mes šią vieną draugystę suskaičiavome **du kartus**: vieną kartą skaičiuodami mokinio A draugus, ir kitą kartą – skaičiuodami mokinio B draugus.


Vadinasi, norėdami sužinoti tikrąjį, unikalų draugysčių skaičių klasėje, gautą rezultatą privalome padalinti iš dviejų: $45/2 = 22,5$.

Kadangi draugysčių skaičius gali būti tik sveikasis skaičius (negalima turėti pusės draugystės ryšio), tokia situacija yra matematiškai neįmanoma.

Išvada: **žmonių, turinčių nelyginį draugų skaičių, grupėje visada privalo būti lyginis kiekis.** (Šiame uždavinyje turėjome nelyginį skaičių žmonių (15), iš kurių kiekvienas turi nelyginį skaičių draugų (3), todėl sudaryti tokią klasę yra neįmanoma). $\square$

Pavyzdys 4.2 (Septyni tiltai)

Mieste yra 4 salos, sujungtos 7 tiltais. Iš salos A išeina 5 tiltai, iš salos B – 3, iš salos C – 3, iš salos D – 3. Ar galima praeiti visais tiltais lygiai po vieną kartą?



Sprendimas:

(Patarimas: Paimkite pieštuką ir pabandykite bent du kartus apibrėžti nupieštą grafą. Atkreipkite dėmesį, kad kaskart pravažiuodami tarpinę salą (ne pradžios, ne pabaigos), Jūs sunaudojate du tiltus (vieną atvykimui, kitą išvykimui).)

Tai klasikinis grafų teorijos (Eulerio kelio) uždavinys. Kad suprastume, kodėl toks maršrutas neįmanomas, panagrinėkime, kaip „naudojami“ tiltai kelionės metu.

Pirmiausia, nagrinėkime bet kurią salą (tarpinę stotelę), kuri **nėra** mūsų kelionės pradžios ar pabaigos taškas. Kiekvieną kartą, kai į šią salą atvykstame vienu tiltu, privalome iš jos išvykti kitu, dar neiktu tiltu. Taigi, kiekvienas pilnas apsilankymas tokioje saloje visada „sunaudoja“ lygiai du tiltus (vieną atėjimui, kitą išėjimui). Kadangi pagal sąlygą privalome pereiti *visus* tiltus ir nė vienu neiti du kartus, visi su šia sala sujungti tiltai privalo turėti porą. Vadinasi, tokioje tarpinėje saloje tiltų skaičius **privalo būti lyginis**.

Ši poravimosi taisyklė negalioja tik dviem išimtinėms saloms:

1. **Pradžios salai:** iš jos mes kelionę pradedame (išeiname), todėl tam nereikia atėjimo tilto. Vėliau į ją grįžtant ir išeinant tiltai poruojasi, todėl bendras tiltų

skaičius čia gali būti nelyginis.

2. **Pabaigos salai:** joje mes kelionę baigiame (ateiname, bet nebeišiname), todėl paskutinis tiltas lieka be poros. Čia taip pat tiltų skaičius gali būti nelyginis. (Pastaba: jei maršrutas prasideda ir baigiasi toje pačioje saloje, absoliučiai visų salų tiltų skaičius turi būti lyginis).

Iš šios logikos plaukia griežta taisyklė: kad būtų įmanoma pereiti visus tiltus lygiai po vieną kartą, nelyginį tiltų skaičių gali turėti **daugiausiai dvi** salos (viena skirta maršruto pradžiai, kita – pabaigai).

Mūsų nagrinėjamame mieste iš salos A išeina 5 tiltai, o iš salų B, C ir D – po 3 tiltus. Matome, kad visos 4 salos turi nelyginį tiltų skaičių (5, 3, 3, 3). Kadangi nelyginį skaičių turinčių salų yra daugiau nei dvi, rasti kelionės pradžios ir pabaigos taškų, kurie leistų laikytis taisyklių, neįmanoma. Vadinasi, pereiti visus tiltus po vieną kartą yra neįmanoma. $\square$

Nelyginiai ciklai grafuose

Išmokę stebėti atskirus ryšius, olimpiadininkai atkreipia dėmesį į dar vieną grafų struktūrą – uždarus ciklus (ratus). Čia sugrįžta mūsų antrojoje strategijoje išmokta būsenų kaitaliojimo (dažymo) idėja, tik dabar ji pritaikoma sujungtiems taškams.


Pavyzdys 4.3 (Užstrigę krumpliaraičiai)

11 krumpliaraičių sujungti į vieną uždara ratą (pirmas liečiasi su antru, antras su trečiu... 11-as liečiasi su pirmu). Ar ši sistema gali suktis?

Sprendimas: **(Patarimas: Nusipieškite tris krumpliaraičius sujungtus ratu ir pabandykite nupiešti sukimosi rodykles. Kas atsitinka su trečiuoju?)**

Krumpliaraičių mechanika remiasi vienu dėsniu: jei vienas krumpliaratis sukasi pagal laikrodžio rodyklę (žymėkime +), su juo besiliečiantis privalo suktis prieš laikrodžio rodyklę (žymėkime –). Matome tą pačią būsenų kaitaliojimosi taisyklę, kaip ir šachmatų lentoje!

Kadangi ratas uždaras, krumpliaraičių kryptys privalo kaitaliotis: +, –, +, –, +, ... Tačiau mes turime **nelyginį** (11) krumpliaraičių skaičių. Pirmasis (+) ir 11-asis (+) turės suktis ta pačia kryptimi. Bet jie liečiasi vienas su kitu! Du besiliečiantys ir ta pačia kryptimi besisukantys krumpliaraičiai sistemą akimirksniu užblokuoja. (Ši taisyklė grafų teorijoje skamba taip: nelyginio ilgio ciklai negali būti nuspalvinti dvejomis spalvomis). $\square$



Olimpiadininko mąstysenos apibendrinimas: Kaip matyti tai, kas nematoma?

Išsprendus tradicinį mokyklinį uždavinį, apima jausmas, kad pastatėte namą – viskas aiškiai suskaičiuota, padėta plyta prie plytos. Olimpiadinėje matematikoje dažniausiai jaučiatės taip, lyg kažkas tą namą sprogdintų, o jums lieptų nuspėti, kur nukris durų rankena. Kai variantų ir galimų ėjimų yra milijonai, bandyti juos visus perrinkti yra tiesiausias kelias į nusivylimą.

Būtent čia atsiskleidžia tikrasis jūsų, kaip problemų sprendėjo, meistriškumas. Užuo bandę aprėpti visą judėjimo ir keitimosi chaosą, jūs ieškote **inkaro(invarianto)** – to vienintelio dalyko, kuris atlaiko visas transformacijas ir išlieka stabilus.

Ką verta išsinešti iš trijų pagrindinių strategijų?

- **Neskaičiuokite visko – filtruokite esmę.** Algebriniuose uždaviniuose retai kada reikia žinoti tikslią galutinę sumą ar sandaugą. Jums rūpi tik jos prigimtis: ar ji lyginė, ar nelyginė? Ar jos ženklas yra pliusas, ar minusas? Lyginumas veikia kaip filtras, kuris atmeta 99 % nereikalingos informacijos ir palieka tik pačią struktūros šerdį.
- **Jei taisyklės neaiškios, sukurkite jas patys.** Tuščia erdvė ar balta lenta neduoda jokių užuominų. Geometrinis dažymas yra galingas įrankis, nes jis tuščiai erdvei suteikia struktūrą. Nuspalvinę lentą šachmatine tvarka, juostomis ar keliomis spalvomis, jūs atsitiktinį judėjimą paverčiate griežtu maršrutu tarp spalvų. Tai, kas iš pradžių atrodė įmanoma, per spalvų prizmę pasirodo besą iliuzija.
- **Kiekviena lazda turi du galus.** Grafų ir ryšių uždaviniuose lengviausia pasiklysti skaičiuojant atskirų elementų savybes. Taisyklė paprasta: kiekvienas ryšys sujungia du objektus. Jei skaičiuojate ryšius iš abiejų pusių, jūs juos padvigubinate. Šis paprastas suvokimas (rankų paspaudimų lema) elegantiškai išsprendžia uždavinius, kurie iš pirmo žvilgsnio atrodo reikalaujantys sudėtingų lygčių sistemų.

Susidūrę su nauju uždaviniu, kuriame prašoma įrodyti, ar įmanoma pasiekti tam tikrą būseną atliekant aibę veiksmų, išsiugdykite įprotį stabtelėti. Prieš puldami braižyti, skaičiuoti ir tikrinti dešimtis variantų, paklauskite savęs: „*O kas čia per visą šitą procesą garantuotai nepasikeis?*“ Radę šį atsakymą, jūs nebe spėliojate – jūs pradedate valdyti situaciją.

§5 Uždaviniai savarankiškam sprendimui (43 iššūkiai)

Šie uždaviniai surikiuoti pagal sunkumą (nuo apšilimo iki ekspertinio lygio). Jūsų tikslas nėra tik pasakyti „Taip“ arba „Ne“. Tikslas – atrasti invariantą ir pateikti **griežtą matematinį įrodymą**.

1. Lentoje užrašyti trys nelyginiai skaičiai. Ar gali jų suma būti lygi 100?
2. Plėšydamas knygą mokinys išplėšė 15 lapų. Suskaičiavus visus išplėštuose lapuose esančius puslapių numerius, gauta suma 2026. Įrodykite, kad mokinys apsiriko skaičiuodamas.
3. Ar galima 10 eurų (1000 centų) sumokėti panaudojant lygiai 25 monetas, kurių nominalai yra tik 1, 3 ir 5 centai?
4. Sraigė šliaužia medžiu. Dieną ji pakyla į viršų 3 metrais, o naktį nusileidžia žemyn 1 metru. Ar gali sraigė po kelių parų atsidurti lygiai 35 metrų aukštyje nuo pradinio taško?
5. Ant tiesės taške 0 tupi žiogas. Jis šokinėja tik į dešinę arba į kairę, kiekvieną kartą lygiai po 3 centimetrus arba lygiai po 5 centimetrus. Ar gali jis po lygiai 25 šuolių atsidurti taške, koordinatėje 10?
6. Lentoje surašyti visi sveikieji skaičiai nuo 1 iki 2026. Ar galima juos suskirstyti į dvi grupes taip, kad abiejų grupių skaičių sumos būtų lygios?
7. Prie apvalaus stalo sėdi 10 berniukų ir 10 mergaičių. Kiekvienas iš jų turi po vieną kortelę su skaičiumi: berniukai turi lyginius skaičius, o mergaitės – nelyginius. Žinoma, kad bet kurių dviejų šalia sėdinčių vaikų skaičių suma yra nelyginė. Įrodykite, kad berniukai ir mergaitės sėdi pakaitomis.
8. Žaidimo metu ant stalo guli 12 akmenukų krūvelė. Vienu ėjimu žaidėjas gali paimti 1 arba 3 akmenukus. Laimi tas, kuris paima paskutinį. Įrodykite, kad antrasis žaidėjas visada gali laimėti, kad ir kaip žaistų pirmasis.
9. Žaidėjas turi 3 monetas, kurios guli ant stalo „Ereljo“ puse į viršų. Jam leidžiama vienu ėjimu apversti lygiai 2 bet kurias monetas. Ar gali jis padaryti taip, kad visos monetos gulėtų „Skaičiaus“ puse į viršų?
10. Yra 7 puodeliai, iš pradžių visi apversti dugnu į viršų. Vienu ėjimu leidžiama apversti lygiai 2 puodelius. Ar įmanoma po kelių tokių ėjimų padaryti taip, kad visi puodeliai stovėtų normaliai?
11. Lentoje surašyti skaičiai $1, 2, 3, \dots, 2025$. Vienu ėjimu leidžiama nutrinti bet kokius du skaičius a ir b , o vietoje jų parašyti $a + b + 2$. Ar gali paskutinis lentoje likęs skaičius būti lyginis?
12. Lentoje surašyti skaičiai $1, 2, 3, \dots, 2026$. Vienu ėjimu leidžiama išsirinkti bet kokius du skaičius ir prie kiekvieno iš jų pridėti po 1. Ar po kurio laiko įmanoma pasiekti, kad visi 2026 skaičiai taptų visiškai lygūs?
13. Stebuklingame medyje auga 2026 obuoliai ir 2027 kriaušės. Sodininkas vienu ėjimu nuskina du vaisius. Jei jis nuskina du vienodus vaisius (du obuolius arba dvi kriaušes), medyje išauga naujas obuolys. Jei jis nuskina du skirtingus, išauga nauja kriaušė. Galiausiai medyje lieka tik vienas vaisius. Kas tai per vaisius?

14. Turime lentą 6×6 , iš kurios išpjauti du priešingi kampai. Ar galima likusius 34 langelius uždengti 17 domino kauliukų?
15. Šachmatų lentoje 4×4 kairiajame apatiniame kampe stovi žirgas. Ar gali jis aplankyti kiekvieną langelį po lygiai vieną kartą ir baigti kelionę dešiniajame viršutiniame kampe?
16. Šachmatų žirgas stovi 8×8 lentos kairiajame apatiniame kampe (juodame langelyje a1). Jam buvo liepta atlikti lygiai 2027 ėjimus. Ar gali jis po paskutinio ėjimo atsidurti dešiniajame viršutiniame kampe (langelyje h8)?
17. Vabzdys ropoja 5×5 lentos langeliais, kiekvienu ėjimu pereidamas į gretimą langelį (turintį bendrą kraštinę). Iš pradžių jis buvo centriniame langelyje. Ar gali jis pereiti visus lentos langelius lygiai po vieną kartą ir grįžti į centrą?
18. Dvidešimt penkios šaškės išdėliotos 25×25 dydžio šachmatų lentoje taip, kad jų išdėstymas yra simetriškas vienos iš lentos įstrižainių atžvilgiu. Įrodykite, kad bent viena šaškė stovi ant šios įstrižainės.
19. Duotas iškilusis 101-kampis, turintis simetrijos ašį. Įrodykite, kad simetrijos ašis eina per vieną iš jo viršūnių.
20. Duoti penki sveikieji skaičiai a, b, c, d, e . Įrodykite, kad sandauga $(a - b)(b - c)(c - d)(d - e)(e - a)$ visada yra lyginis skaičius.
21. Lentoje užrašyti skaičiai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sukuriame naujus skaičius pridėdami prie jų bet kokią šių skaičių perstatą (pvz., prie pirmo pridėdame 7, prie antro 1 ir t.t.). Ar gali gautų 7 naujų skaičių sandauga būti nelyginė?
22. Plėšikas pavogė 2027 auksines monetas. Jis nori jas padalinti į lygiai 4 krūvas taip, kad bet kurių dviejų iš šių krūvų monetų sumos būtų lyginiai skaičiai. Ar jam pavyks tai padaryti?
23. Klasėje yra 25 mokiniai. Ar gali kiekvienas iš jų klasėje turėti lygiai 5 draugus?
24. Duotas iškilusis briaunainis, turintis lygiai 13 sienų. Ar gali būti taip, kad kiekviena šio briaunainio siena turi lygiai 7 briaunas?
25. Futbolo turnyre dalyvavo 15 komandų. Kiekviena komanda sužaidė su kiekviena kita komanda lygiai po vieną kartą. Ar gali būti taip, kad pasibaigus turnyrui paaiškėjo, jog kiekviena komanda sužaidė lygiai po 7 rungtynes lygiosiomis?
26. Klasėje mokosi 25 mokiniai. Ar gali būti taip, kad kiekvienas berniukas šioje klasėje draugauja su lygiai 5 mergaitėmis, o kiekviena mergaitė draugauja su lygiai 5 berniukais?
27. Ant plokštumos nubrėžtos 9 tiesės atkarpos. Ar gali jos kirstis taip, kad kiekviena atkarpa būtų perkirsta lygiai kitų 3 atkarpų?
28. Ar galima nubrėžti uždara laužtę iš 9 atkarpų, kurios kiekviena atkarpa kerta lygiai vieną iš kitų atkarpų?
29. Visi domino rinkinio kauliukai yra sudėti į vientisą grandinę (laikantis taisyklių). Jei viename grandinės gale yra 5 taškeliai, kas yra kitame gale?

30. Sraigė griaužia $3 \times 3 \times 3$ sūrio kubą, sudarytą iš 27 mažų kubelių. Ji pradeda nuo vieno kampinio kubelio ir kiekvieną kartą pergraužia sieną pereidama į gretimą kubelį. Ar gali ji suvalgyti visus kubelius ir kelionę baigti pačiame centriniame kubelyje?
31. Turime 2026 sveikuosius skaičius. Žinoma, kad bet kurių 2025 skaičių suma yra lyginė. Įrodykite, kad visi šie skaičiai yra lyginiai.
32. Ar galima plokštumoje nubrėžti uždara laužtę (liniją), sudarytą iš lygiai 11 atkarpų taip, kad kiekviena atkarpa būtų lygiagreti arba X, arba Y ašiai, ir laužtė pati savęs nekirstų?
33. Sraigė šliaužia plokštuma pastoviu greičiu, kas 15 minučių pasukdama stačiu kampu (90 laipsnių). Įrodykite, kad sraigė gali grįžti į pradinį tašką tik praėjus sveikam valandų skaičiui.
34. Iš domino kauliukų rinkinio pašalinami visi tie, kurie turi bent vieną tuščią pusę (be taškelių). Ar galima likusius domino kauliukus sudėti į vientisą grandinę?
35. Būryje yra 100 kareivių, o kiekvieną vakarą trys iš jų eina budėti. Ar gali atsitikti taip, kad po tam tikro laiko kiekvienas kareivis bus budėjęs su kiekvienu kitu kareiviu lygiai po vieną kartą?
36. Aikštelėje guli trys ledo rituliai A, B ir C. Ledo ritulininkas muša vieną iš jų taip, kad šis pračiuožia tarp kitų dviejų. Jis tai padaro 25 kartus. Ar gali jis grąžinti tris ritulius į jų pradines vietas?
37. Trys žiogai žaidžia šokinėjimo žaidimą išilgai tiesės. Kiekvieno ėjimo metu vienas žiogas persoka per kitą žiogą, bet ne per du iš karto. Ar žiogai gali grįžti į savo pradines pozicijas po 1991 šuolio?
38. Ar galima iškilųjį 13-kampį padalinti į lygiagretėnius?
39. Uždara laužtę sudaro 11 atkarpų. Ar gali viena tiesė, neinanti per jokią laužtės viršūnę, kirsti kiekvieną iš jos atkarpų?
40. Parenkamas 17 skaitmenų skaičius ir jo skaitmenys perrašomi atvirkščia tvarka, gaunant naują skaičių. Šie du skaičiai sudedami. Įrodykite, kad jų sumoje yra bent vienas lyginis skaitmuo.
41. Ar galima sudaryti „magiškąjį kvadratą“ iš pirmųjų 36 pirminių skaičių? (Magiškasis kvadratas čia yra 6×6 lentelė, kurioje eilučių, stulpelių ir įstrižainių sumos yra vienodos).
42. Lentelės 25×25 langeliuose bet kaip surašyti skaičiai $+1$ ir -1 . Tegu $e_1, e_2, \dots, e_{25}$ yra kiekvienos eilutės skaičių sandaugos, o $s_1, s_2, \dots, s_{25}$ – kiekvieno stulpelio skaičių sandaugos. Ar gali visų šių 50-ies atsakymų suma būti lygi 0?
43. Ar lygtis $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{2027}$ turi sprendinių, jeigu reikalaujama, kad ir x , ir y būtų nelyginiai sveikieji skaičiai?