KVADRATINIS DAUGIANARIS

9 TEMA

Kvadratinio daugianario skaidymas dauginamaisiais

Andrius Berniukevičius | Vilniaus licėjus

Kaip dirbti su šia medžiaga?
Ši medžiaga skirta aktyviam mokymuisi: spręsdami uždavinius atrasite naujų minčių ir faktų.

1. **Pirmiausia galvokite patys.** Perskaitykite sąlygą, išbandykite savo idėjas pasitelkdami pavyzdžius ir užrašykite sprendimą taip, kaip suprantate. Jei užstrigote, išbandykite konkretų skaičių arba grįžkite prie panašaus ankstesnio uždavinio.
2. **Tik tada pasitikrinkite.** Palyginkite savo sprendimą su pateiktuoju. Jūsų būdas gali skirtis nuo pateiktojo ir vis tiek būti teisingas. Jei suklydote, išsiaiškinkite savo klaidą. Jei pasinaudojote pateiktu sprendimu, išnagrinėkite, kodėl kiekvienas jo žingsnis teisingas. Tada užverskite sprendimą ir išspręskite uždavinį iš naujo patys.
3. **Sustokite prie ⋆.** Žvaigždute pažymėti uždaviniai padeda atrasti ir suprasti svarbias idėjas, kuriomis remsimės šioje ir vėlesnėse temose. Juos išsprendę, pabandykite savais žodžiais nusakyti, ką sužinojote ir kodėl tai teisinga.
4. **Apibendrinkite ir pasitikrinkite.** Temos pabaigoje rasite svarbiausias išvadas. Pirmiausia pamėginkite jas prisiminti patys, tada palyginkite su pateiktomis. Savikontrolės uždavinį (⧫) spręskite užvertę santrauką, o po pertraukos prie jo sugrįžkite.

Siekite ne vien gauti teisingą atsakymą, bet ir suprasti, **kodėl jis teisingas ir kada atrastą mintį galėsite pritaikyti**.

Temos esmė ir tikslas. Atrasite ir įrodysite kvadratinio daugianario skaidymo dauginamaisiais formulę. Išmoksite susieti šaknis su sandaugos pavidalu, pasirinkti pavidalą pagal žinomą informaciją ir pereiti nuo vieno daugianario pavidalo prie kito. Sandaugos pavidalą susiesite su 7–8 temose nagrinėtomis Vijeto teoremomis.

Prieš pradėdami: prisiminkite daugianario šaknis ir diskriminantą (6 tema), Vijeto ir atvirkštinę Vijeto teoremas (7–8 temos), pilnojo kvadrato išskyrimą (2 tema), ekstremumo sąvokas ir formules (3–4 temos), reikšmių simetriją (5 tema). Visur koeficientai, kintamieji ir šaknys yra realieji skaičiai; kvadratiniame daugianaryje $a \neq 0$. Šioje temoje ieškome skaidinio, kurį sudaro pastovus nelygus nuliui skaičius ir *tiesiniai* dauginamieji $x - r$.

1. Atskliauskite ir sutraukite panašiuosius narius:

a) $(x-2)(x-3)$;
b) $(x+2)(x-3)$;
c) $2(x-2)(x-3)$;
d) $-3(x+1)(x-2)$.

Kiekvienu atveju nustatykite, su kuriomis x reikšmėmis *duotoji sandauga* lygi 0, ir patikrinkite jas gautame daugianaryje.

2. Prisiminkite: sandauga $A \cdot B$ lygi nuliui tada ir tik tada, kai $A = 0$ arba $B = 0$.

a) Kokios yra daugianario $P(x) = 4(x-1)(x+2)$ šaknys? Paaiškinkite, kodėl kitų nėra.
b) Koks yra atskliausto daugianario vyriausiasis koeficientas? Patikrinkite atskliaudę.

c) Mokinys teigia: „$P(x)$ šaknys yra 1 ir 2.“ Raskite ir paaiškinkite klaidą.

3. $\star$

a) Prisiminkite 8 temos 3d punktą, atskliauskite $(x-r)(x-s)$ ir parodykite, kad gaunate $x^2-(r+s)x+rs$.

b) Padauginkite šią lygybę iš $a \neq 0$. Kuris skaičius bus koeficientas prie x^2?

c) Tarkime, r, s yra $P(x)=ax^2+bx+c$ realiosios šaknys. Pagal Vijeto teoremą išreikškite $r+s$ ir rs.

d) Įrašę šiuos reiškinius į b dalies lygybę įrodykite, kad $P(x)=a(x-r)(x-s)$. Paaiškinkite, kodėl įrodymas tinka ir tada, kai šaknys sutampa ($r=s$).

Sustokite ir apibendrinkite. Kokia lygybė susieja daugianarį su jo šaknimis ir vyriausiuoju koeficientu? Ką formulėje reiškia $r=s$?

4. Tegul $P(x)=2x^2-7x+3$.

a) Raskite D ir šaknis x_1, x_2.

b) Remdamiesi 3 uždaviniu užrašykite $P(x)=2(x-x_1)(x-x_2)$; įrašykite šaknis.

c) Patikrinkite skaidinį atskliausdami. Ar iš sandaugos matyti abi šaknys?

5. Išskaidykite į tiesinius dauginamuosius, pirmiausia rasdami šaknis. Gautas lygybes patikrinkite atskliausdami.

a) $x^2-7x+12$;

b) x^2+x-6;

c) x^2-5x;

d) x^2-9;

e) x^2+6x+9;

f) x^2.

6. Išskaidykite į tiesinius dauginamuosius ir patikrinkite atskliausdami. Įsitikinkite, kad skaidinyje išsaugotas vyriausiasis koeficientas.

a) $2x^2-10x+12$;

b) $-3x^2-3x+18$;

c) $2x^2-7x+3$;

d) $-2x^2+5x+3$;

e) $4x^2-12x+9$;

f) $-2x^2+8$.

7. a) Išskaidykite x^2-2 suradę realiąsias šaknis. Patikrinkite skaidinį atskliausdami.

b) Išskaidykite $2x^2-3$, naudodamiesi šaknų formule arba iš pradžių išreikšdami x^2. Ar gautos šaknys privalo būti sveikieji skaičiai?

8. Duotas $P(x)=3x^2-12x+12$.

a) Apskaičiuokite diskriminantą ir raskite šaknį.

b) Taikydami skaidymo formulę užrašykite $P(x)$ sandaugos pavidalu. Kaip ją galima užrašyti trumpiau?

c) Išskirkite pilnąjį kvadratą ir palyginkite rezultatus. Kiek skirtingų realiųjų šaknų turi P?

9. Mokiniai pateikė skaidinius. Nustatykite, kurie teisingi; kitus pataisykite. Paaiškinkite klaidas ir patikrinkite atskliausdami.

a) $2x^2-10x+12=(x-2)(x-3)$;

b) $x^2 + x - 6 = (x - 3)(x + 2)$;

c) $x^2 - 4x + 4 = (x - 2)(x + 2)$;

d) $-2x^2 + 5x + 3 = -2(x - 3)\left(x + \frac{1}{2}\right)$.

10. a) Parodykite, kad $x^2 + 4$ neturi realiųjų šaknų.

b) Tarkime, kad būtų įmanoma užrašyti $x^2 + 4 = k(x - r)(x - s)$, kur $k \neq 0$, o r, s realieji. Ką gautumėte įrašę $x = r$? Kodėl tai prieštaravimas?

c) Ar šis rezultatas reiškia, kad reiškinio apskritai negalima užrašyti jokios sandaugos pavidalu? Paaiškinkite, apie kokio pavidalo skaidinį čia kalbame.

11. $\star$ Tegul $P(x) = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$.

a) Paaiškinkite, kodėl, kai $D > 0$, galima užrašyti $P(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$ su dviem skirtingomis realiosiomis šaknimis.

b) Užrašykite pavidalą, kai $D = 0$ ir šaknis lygi r.

c) Remdamiesi 10 uždavinio idėja įrodykite, kad, kai $D < 0$, P neįmanoma užrašyti pavidalu $k(x - r)(x - s)$, kur $k \neq 0$, r, s realieji.

Sustokite ir apibendrinkite. Kokios sąlygos leidžia užrašyti $P(x) = a(x - r)(x - s)$ su realiaisiais r, s? Kodėl toks pavidalas negalimas, kai $D < 0$?

12. Kiekvienu atveju apskaičiuokite D. Jei galima, išskaidykite į tiesinius dauginamuosius; jei negalima – paaiškinkite.

a) $x^2 - 4x + 3$;

b) $x^2 - 4x + 4$;

c) $x^2 - 4x + 5$;

d) $-2x^2 - 2x - 2$.

13. Duota $P(x) = 3(x - 2)(x + 4)$.

a) Neatskliausdami raskite šaknis, $P(0)$ ir $P(1)$.

b) Atskliauskite ir nustatykite a, b, c. Patikrinkite a dalies reikšmes.

c) Raskite šaknų vidurkį ir palyginkite jį su ekstremumo tašku $-\frac{b}{2a}$.

d) Kodėl $P(0)$ ir $P(1)$ yra neigiami? Nustatykite kiekvieno dauginamojo $x - 2$ ir $x + 4$ ženklą, kai $x = 0$ ir kai $x = 1$, ir paaiškinkite sandaugos ženklą.

14. Kvadratinio daugianario $P(x)$ šaknys yra -1 ir 3, o $P(0) = -6$.

a) Remdamiesi skaidymo formule užrašykite $P(x)$ per nežinomą vyriausiąjį koeficientą a.

b) Iš sąlygos $P(0) = -6$ raskite a ir užrašykite daugianarį.

c) Patikrinkite šaknis bei nurodytą reikšmę ir pagrįskite, kodėl atsakymas vienintelis.

15. Raskite visus kvadratinius daugianarius, kurių šaknys yra 2 ir 5. Ar šių duomenų užtenka vienam daugianariui nustatyti? Nurodykite papildomą sąlygą, kuri leistų nustatyti vieną daugianarį.

16. a) Išskaidykite $2x^2 - 7x + 3$ pavidalu $2(x - r)(x - s)$.

b) Parodykite, kad $2\left(x - \frac{1}{2}\right) = 2x - 1$, ir užrašykite skaidinį be trupmeninių koeficientų skliaustuose.

c) Patikrinkite naująjį užrašą atskliausdami. Ar pakeitėte daugianario reikšmę?

17. $\star$ Tarkime, kad $P(x) = a(x - r)(x - s)$, kur $a \neq 0$ ir $r \neq s$.

a) Paaiškinkite, kodėl r ir s yra vienintelės daugianario šaknys.

b) Prisiminkite 6 temos 12e ir 7 temos 19 uždavinių išvadą. Koks yra šio daugianario ekstremumo taškas?

c) Įrašę $x = \frac{r+s}{2}$ parodykite, kad ekstremumas yra $-\frac{a(r-s)^2}{4}$. Koks tai ekstremumas, kai $a > 0$, o koks, kai $a < 0$? Palyginkite gautą išraišką su $-\frac{D}{4a}$, pasinaudodami 8 temos 4c punkto lygybe $D = a^2(r-s)^2$.

18. ⋆ Kvadratinį daugianarį galima užrašyti *standartiniu pavidalu* $ax^2 + bx + c$ arba *pilnojo kvadrato pavidalu* $a(x-h)^2 + k$, kur h yra ekstremumo taškas, o k – ekstremumas. Jei daugianaris turi realiųjų šaknų r, s, jis taip pat užrašomas *sandaugos pavidalu* $a(x-r)(x-s)$.

a) Kokią informaciją apie daugianarį parodo kiekvienas pavidalas?

b) Kai $r \neq s$, paaiškinkite, kodėl šioje temoje nagrinėtais būdais galime gauti visus tris pavidalus.

c) Kai šaknis yra viena, $r = s$, palyginkite pilnojo kvadrato ir sandaugos pavidalus. Kodėl ekstremumas lygus 0?

d) Kai realiųjų šaknų nėra, kuriuos iš šių trijų pavidalų vis dar galime gauti? Kodėl negalime gauti nurodyto sandaugos pavidalo su realiaisiais r, s?

Sustokite ir apibendrinkite. Kokią informaciją galite perskaityti iš kiekvieno pavidalo? Kurie pavidalai galimi, jei daugianaris neturi realiųjų šaknų?

19. Duotas standartinis pavidalas $P(x) = 2x^2 - 8x + 6$.

a) Išskirkite pilnąjį kvadratą. Kokie yra ekstremumo taškas ir ekstremumas?

b) Raskite šaknis ir užrašykite daugianarį sandaugos pavidalu.

c) Atskliauskite abu gautus pavidalus ir patikrinkite, kad gaunate pradinį daugianarį.

20. Kiekvieną daugianarį užrašykite pilnojo kvadrato ir sandaugos pavidalais. Raskite ekstremumo tašką, ekstremumą ir šaknis. Pavidalus patikrinkite atskliausdami.

a) $x^2 - 6x + 8$;

b) $-x^2 + 2x + 3$;

c) $2x^2 + 4x - 6$;

d) $x^2 - 4x + 4$.

Kuriame iš pateiktų atvejų pilnojo kvadrato ir sandaugos pavidalai sutampa? Kodėl?

21. Kiekvienas daugianaris pateiktas pilnojo kvadrato pavidalu. Užrašykite standartinį pavidalą, raskite šaknis ir, jei galima, užrašykite sandaugos pavidalą. Palyginkite šaknų skaičių.

a) $P(x) = -2(x+1)^2 + 8$;

b) $Q(x) = 3(x-2)^2$;

c) $R(x) = (x+1)^2 + 4$.

22. Kiekvienas daugianaris pateiktas sandaugos pavidalu. Raskite šaknis, užrašykite standartinį ir pilnojo kvadrato pavidalus, nurodykite ekstremumo tašką bei ekstremumą.

a) $P(x) = 3(x-2)(x-4)$;

b) $Q(x) = -2(x+1)(x-3)$;

c) $R(x) = 2(x-2)(x-2)$.

23. Išnagrinėkite mokinio teiginį: „Jei kvadratinis daugianaris turi tik vieną šaknį, jo pilnojo kvadrato ir sandaugos pavidalai aprašo du skirtingus daugianarius.“ Paaiškinkite, kas iš tikrųjų sutampa. Pateikite konkretų pavyzdį.

Papildomi uždaviniai: jungiame temas. Šiuose uždaviniuose skaidymą dauginamaisiais derinkite su ankstesnių temų žiniomis. Juos galite spręsti atskiru metu.

24. Kvadratinio daugianario $P(x)$ viena šaknis yra 2. Žinoma, kad $P(1) = P(7)$ ir $P(0) = 12$.

a) Remdamiesi lygių reikšmių simetrija raskite ekstremumo tašką, tada raskite kitą šaknį.

b) Užrašykite $P(x)$ sandaugos pavidalu ir pagal $P(0)$ raskite vyriausiąjį koeficientą.

c) Užrašykite visus tris daugianario pavidalus ir patikrinkite sąlygas.

25. Kvadratinio daugianario realiųjų šaknų suma lygi 7, sandauga lygi 10, o $P(3) = -8$. Raskite $P(x)$ ir jo ekstremumą. Spręsdami pasinaudokite atvirkštine Vijeto teorema bei skaidymo formule, o atsakymą patikrinkite.

26. Kvadratinio daugianario $P(x)$ minimumo taškas yra $x = -1$, minimumas lygus -12, o $P(0) = -9$.

a) Užrašykite pilnojo kvadrato pavidalą ir raskite vyriausiąjį koeficientą.

b) Raskite šaknis, užrašykite sandaugos ir standartinį pavidalus.

c) Patikrinkite, kad gautas daugianaris tenkina visas sąlygas. Kodėl atsakymas vienintelis?

27. Kvadratinio daugianario diskriminantas yra $D = 36$, maksimumo taškas yra $x = 1$, o maksimumas lygus 9. Raskite $P(x)$ visais trimis pavidalais. Pirmiausia iš ryšio $P_{\max} = -\frac{D}{4a}$ raskite a; patikrinkite visas duotas sąlygas.

28. Kvadratinio daugianario realiosios šaknys r, s tenkina $r + s = 2$, $r^2 + s^2 = 10$, o $P(0) = -9$.

a) Remdamiesi tapatybe $(r + s)^2 = r^2 + 2rs + s^2$ raskite šaknų sandaugą.

b) Sudarykite lygtį, kurios koeficientas prie x^2 lygus 1, o šaknys yra r ir s, ir raskite šias šaknis.

c) Pagal skaidymo formulę bei $P(0)$ raskite $P(x)$; užrašykite tris pavidalus ir patikrinkite sąlygas.

29. Ar egzistuoja kvadratinis daugianaris, kurio šaknys yra 1 ir 3, o $P(2) = 0$? Atsakymą pagrįskite naudodamiesi sandaugos pavidalu.

30. Raskite visus kvadratinius daugianarius, kurių šaknys yra -2 ir 4, o vyriausiasis koeficientas teigiamas. Ką galima pasakyti apie jų ekstremumo tašką ir minimumą? Ar šių sąlygų pakanka vienam daugianariui nustatyti? Pateikite du skirtingus pavyzdžius.

31. Ar egzistuoja kvadratinis daugianaris, kurio vyriausiasis koeficientas teigiamas, dvi skirtingos realiosios šaknys, o minimumas yra 0? Atsakymą pagrįskite naudodamiesi pilnojo kvadrato arba sandaugos pavidalu.

Ką atradome?

Prieš skaitydami pabandykite patys prisiminti ir savais žodžiais paaiškinti pagrindines šios temos išvadas. Tada palyginkite jas su pateiktomis.

Svarbiausios temos išvados

1. **Skaidymo formulė.** Jei kvadratinio daugianario $P(x) = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$, realiosios šaknys yra r ir s, tai
$$P(x) = a(x - r)(x - s).$$
Kai šaknis viena, žymime $r = s$ ir gauname $P(x) = a(x - r)^2$. Tai viena dviguboji šaknis.

2. **Diskriminantas.** Kai $D > 0$, yra dvi skirtingos realiosios šaknys ir jų sandaugos pavidalas. Kai $D = 0$, gauname $a(x - r)^2$. Kai $D < 0$, realiųjų šaknų nėra, todėl užrašas $a(x - r)(x - s)$ su realiaisiais r, s negalimas.

3. **Daugianario pavidalai.** Standartinis pavidalas $ax^2 + bx + c$ parodo koeficientus; pilnojo kvadrato pavidalas $a(x - h)^2 + k$ – ekstremumo tašką h ir ekstremumą k; sandaugos pavidalas $a(x - r)(x - s)$ – realiąsias šaknis. Pirmieji du pavidalai galimi visada, trečiasis – kai yra realiųjų šaknų. Kai šaknis viena, pilnojo kvadrato ir sandaugos užrašai sutampa.

4. **Ryšys su ekstremumu.** Kai $r \neq s$, ekstremumo taškas yra $\frac{r+s}{2}$, o ekstremumas lygus $-\frac{a(r-s)^2}{4}$. Kai $a > 0$, tai minimumas, kai $a < 0$ – maksimumas.

5. **Patikrinkite.** Atskliaudę sandaugą turite gauti pradinį daugianarį. Nepamirškite a: vien šaknų nepakanka daugianariui nustatyti.

Ką verta įtraukti į teorijos santrauką? Pasirinkite svarbią išvadą ir užsirašykite faktą, jo sąlygas, kodėl jis teisingas, ir vieną savo pavyzdį. Išvadų taikymą pasitikrinkite toliau pateiktu ♦ pažymėtu uždaviniu.

Savikontrolė

Pirmiausia užverskite teorijos santrauką ir savarankiškai išspręskite uždavinį. Pasitikrinkite atsakymus, o jei kuri nors dalis kėlė sunkumų, grįžkite prie atitinkamos išvados ir pabandykite dar kartą. Kitą dieną arba prieš pradėdami kitą temą dar kartą išspręskite šį uždavinį nesinaudodami santrauka.

32. ♦ Atlikite užduotis ir pagrįskite atsakymus.

a) Daugianarį $P(x) = -2x^2 + 8x + 10$ užrašykite sandaugos ir pilnojo kvadrato pavidalais. Raskite jo šaknis, ekstremumo tašką ir ekstremumą. Patikrinkite atskliausdami.

b) Kiek realiųjų šaknų turi $Q(x) = 3(x-1)^2$? Užrašykite jį standartiniu ir sandaugos pavidalais.

c) Ar galima $R(x) = x^2 + 2x + 3$ užrašyti $a(x - r)(x - s)$ pavidalu, kai r, s realieji? Pagrįskite.

d) Raskite vieninteļį kvadratinį daugianarį, kurio šaknys yra -2 ir 1, o $P(0) = -4$. Patikrinkite sąlygas.

Atsakymai ir sprendimai

1. **a)** $(x-2)(x-3) = x^2 - 5x + 6$. Sandauga lygi nuliui, kai $x = 2$ arba $x = 3$; įrašius šias reikšmes į daugianarį, abiem atvejais gaunama reikšmė 0.

b) $(x+2)(x-3) = x^2 - x - 6$. Šaknys -2 ir 3; patikra: $4 + 2 - 6 = 0$, $9 - 3 - 6 = 0$.

c) $2(x-2)(x-3) = 2x^2 - 10x + 12$. Šaknys 2 ir 3; tai a dalies reiškinys, padaugintas iš 2, todėl patikra taip pat duoda nulį.

d) $-3(x+1)(x-2) = -3x^2 + 3x + 6$. Šaknys -1 ir 2; patikra: $-3 - 3 + 6 = 0$, $-12 + 6 + 6 = 0$.

2. **a)** Kadangi $4 \neq 0$, sandauga lygi nuliui, kai $x - 1 = 0$ arba $x + 2 = 0$. Taigi vienintelės šaknys yra 1 ir -2.

b) Vyriausiasis koeficientas yra 4: atskliaudę gauname $4(x^2 + x - 2) = 4x^2 + 4x - 8$.

c) Iš $x + 2 = 0$ gauname $x = -2$, o ne 2. Pavyzdžiui, $P(2) = 4 \cdot 1 \cdot 4 = 16 \neq 0$.

3. **a)** $(x-r)(x-s) = x^2 - sx - rx + rs = x^2 - (r+s)x + rs$.

b) $a(x-r)(x-s) = ax^2 - a(r+s)x + ars$; koeficientas prie x^2 yra a.

c) Pagal Vijeto teoremą $r + s = -\frac{b}{a}$, $rs = \frac{c}{a}$. Kai šaknis dviguboji, žymime $r = s$ ir šios lygybės taip pat galioja.

d) Įrašę į b dalies lygybę gauname

$$a(x-r)(x-s) = ax^2 - a\left(-\frac{b}{a}\right)x + a\frac{c}{a} = ax^2 + bx + c = P(x).$$

Kadangi $a \neq 0$, dalyba galima. Kai $r = s$, gauname $P(x) = a(x-r)^2$; įrodymo veiksmai nesikeičia.

4. **a)** $D = (-7)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 3 = 25$, todėl $x_1 = \frac{7+5}{4} = 3$, $x_2 = \frac{7-5}{4} = \frac{1}{2}$.

b) $P(x) = 2(x-3)\left(x - \frac{1}{2}\right)$.

c) $2\left(x^2 - \frac{7}{2}x + \frac{3}{2}\right) = 2x^2 - 7x + 3$. Iš sandaugos matyti šaknys 3 ir $\frac{1}{2}$, nes kiekviena jų paverčia vieną skliaustą nuliu.

5. Šaknų porą randame taikydami atvirkštinę Vijeto teoremą arba patikrindami galimus skaičius; gautus skaidinius galima patikrinti atskliaudžiant.

a) Šaknys 3, 4: $x^2 - 7x + 12 = (x-3)(x-4)$.

b) Šaknys -3, 2: $x^2 + x - 6 = (x+3)(x-2)$.

c) Šaknys 0, 5: $x^2 - 5x = x(x-5)$.

d) Šaknys -3, 3: $x^2 - 9 = (x+3)(x-3)$.

e) $D = 0$, šaknis -3: $x^2 + 6x + 9 = (x+3)^2$.

f) $D = 0$, šaknis 0: $x^2 = x \cdot x = x^2$. Kiekvienas užrašas atskliaudus duoda pradinį daugianarį; e ir f dalyse ta pati šaknis įrašoma du kartus.

6. **a)** Šaknys 2, 3: $2x^2 - 10x + 12 = 2(x-2)(x-3)$; atskliaudę gauname $2(x^2 - 5x + 6)$.

b) Šaknys -3, 2: $-3x^2 - 3x + 18 = -3(x+3)(x-2)$; atskliaudę gauname $-3(x^2 + x - 6)$.

c) Šaknys 3, $\frac{1}{2}$: $2x^2 - 7x + 3 = 2(x-3)\left(x - \frac{1}{2}\right) = 2x^2 - 7x + 3$.

d) $D = 25 + 24 = 49$, šaknys 3, $-\frac{1}{2}$: $-2x^2 + 5x + 3 = -2(x-3)\left(x + \frac{1}{2}\right)$. Atskliaudę gauname $-2(x^2 - \frac{5}{2}x - \frac{3}{2}) = -2x^2 + 5x + 3$.

e) $D = 0$, šaknis $\frac{3}{2}$: $4x^2 - 12x + 9 = 4\left(x - \frac{3}{2}\right)^2$.

f) Šaknys -2, 2: $-2x^2 + 8 = -2(x + 2)(x - 2)$. Atskliaudę gauname $-2(x^2 - 4) = -2x^2 + 8$.

7. **a)** Iš $x^2 - 2 = 0$ gauname $x = \pm\sqrt{2}$, todėl $x^2 - 2 = (x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2})$. Atskliaudę gauname $x^2 - (\sqrt{2})^2 = x^2 - 2$.

b) Iš $2x^2 = 3$ gauname $x^2 = \frac{3}{2}$, todėl šaknys yra $\pm\frac{\sqrt{6}}{2}$. Taigi $2x^2 - 3 = 2\left(x - \frac{\sqrt{6}}{2}\right)\left(x + \frac{\sqrt{6}}{2}\right)$. Jų kvadratų skirtumas duoda $2\left(x^2 - \frac{6}{4}\right) = 2x^2 - 3$. Šaknys nebūtinai sveikosios; čia jos iracionaliosios.

8. **a)** $D = 144 - 4 \cdot 3 \cdot 12 = 0$; vienintelė šaknis $r = \frac{12}{6} = 2$.

b) $P(x) = 3(x - 2)(x - 2) = 3(x - 2)^2$.

c) Iškėlę 3 ir išskyrę pilnąjį kvadratą gauname $3(x^2 - 4x + 4) = 3(x - 2)^2$. Yra tik viena šaknis: 2; skaidinyje abu dauginamieji vienodi.

9. **a)** Klaida: praleistas vyriausiasis koeficientas 2. Teisinga $2(x - 2)(x - 3) = 2x^2 - 10x + 12$.

b) Klaida: supainioti ženklai. Duotasis skaidinys lygus $x^2 - x - 6$. Teisinga $(x + 3)(x - 2) = x^2 + x - 6$.

c) Duotasis skaidinys lygus $x^2 - 4$, o ne $x^2 - 4x + 4$. Teisinga $(x - 2)^2 = x^2 - 4x + 4$.

d) Teisinga: atskliaudę gauname $-2\left(x^2 - \frac{5}{2}x - \frac{3}{2}\right) = -2x^2 + 5x + 3$.

10. **a)** Kiekvienam realiajam x yra $x^2 \geq 0$, todėl $x^2 + 4 \geq 4 > 0$. Taigi šaknų nėra.

b) Įrašę $x = r$ į tariamą lygybę gautume $r^2 + 4 = k \cdot 0 \cdot (r - s) = 0$. Tačiau $r^2 + 4 \geq 4 > 0$. Prieštaravimas.

c) Ne. Pavyzdžiui, $x^2 + 4 = 4\left(\frac{1}{4}x^2 + 1\right)$. Įrodyta tik tai, kad negalima užrašyti nurodytos sandaugos pavidalu su realiaisiais r, s ir dviem tiesiniais dauginamaisiais.

11. **a)** Kai $D > 0$, iš 6 temos žinome, kad yra dvi skirtingos realiosios šaknys. Tuomet 3 uždavinio formulė duoda $P(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$.

b) Kai $D = 0$, viena dviguboji šaknis yra r, todėl $P(x) = a(x - r)^2$.

c) Jei $D < 0$, realiųjų šaknų nėra. Jeigu būtų $P(x) = k(x - r)(x - s)$ su realiaisiais r, s, įrašius $x = r$ gautume $P(r) = 0$, taigi realiąją šaknį. Tai prieštarautų $D < 0$.

12. **a)** $D = 16 - 12 = 4 > 0$, šaknys 1 ir 3: $(x - 1)(x - 3)$.

b) $D = 16 - 16 = 0$, šaknis 2: $(x - 2)^2$.

c) $D = 16 - 20 = -4 < 0$: realiųjų šaknų nėra, todėl tokio skaidinio nėra.

d) $D = 4 - 16 = -12 < 0$: realiųjų šaknų nėra, todėl tokio skaidinio nėra.

13. **a)** Šaknys 2, -4. $P(0) = 3(-2) \cdot 4 = -24$, $P(1) = 3(-1) \cdot 5 = -15$.

b) $P(x) = 3(x^2 + 2x - 8) = 3x^2 + 6x - 24$, taigi $a = 3$, $b = 6$, $c = -24$. Įrašę 0 ir 1 gauname -24 ir -15.

c) Šaknų vidurkis $\frac{2+(-4)}{2} = -1$. Ekstremumo taškas taip pat $-\frac{6}{2 \cdot 3} = -1$.

d) Kai $x = 0$, gauname $x - 2 = -2 < 0$, $x + 4 = 4 > 0$. Kai $x = 1$, gauname $x - 2 = -1 < 0$, $x + 4 = 5 > 0$. Abiem atvejais vienas dauginamasis neigiamas, kitas teigiamas, o $3 > 0$, todėl $P(0) < 0$ ir $P(1) < 0$. Tai atitinka a dalyje gautas reikšmes -24 ir -15.

14. **a)** Kadangi šaknys -1 ir 3, tai $P(x) = a(x + 1)(x - 3)$, $a \neq 0$.

b) $P(0) = a \cdot 1 \cdot (-3) = -3a = -6$, todėl $a = 2$ ir $P(x) = 2(x + 1)(x - 3) = 2x^2 - 4x - 6$.

c) Įrašius -1 ar 3 vienas dauginamasis tampa nuliu; $P(0) = -6$. Kiekvienas sąlygas tenkinantis daugianaris turi a dalies pavidalą, o iš $P(0)$ gauname tik vieną galimą reikšmę $a = 2$, todėl kito daugianario nėra.

15. Visi tokie daugianariai yra $P(x) = a(x-2)(x-5)$, kur $a \in \mathbb{R}$ ir $a \neq 0$. Kiekvienas jų turi būtent šias šaknis, o kiekvienas daugianaris su šiomis šaknimis turi šį pavidalą pagal skaidymo formulę. Vieno daugianario duomenys nenustato, nes a gali būti bet kuris nelygus nuliui realusis skaičius. Pavyzdžiui, papildžius $P(0) = 10$, iš $10a = 10$ gauname vienintelį $a = 1$.

16. **a)** Šaknys 3 ir $\frac{1}{2}$, todėl $2x^2 - 7x + 3 = 2(x-3)\left(x - \frac{1}{2}\right)$.

b) Paskirstę daugiklį 2 gauname $2\left(x - \frac{1}{2}\right) = 2x - 1$, taigi $P(x) = (x-3)(2x-1)$.

c) $(x-3)(2x-1) = 2x^2 - x - 6x + 3 = 2x^2 - 7x + 3$. Daugianaris nepasikeitė: tik kitaip užrašėme tuos pačius dauginamuosius.

17. **a)** Sandauga lygi nuliui tik kai $x - r = 0$ arba $x - s = 0$, nes $a \neq 0$. Todėl šaknys yra r ir s, ir jokių kitų nėra.

b) Pagal 6 temos 12e arba 7 temos 19 uždavinio išvadą ekstremumo taškas yra šaknų vidurkis: $h = \frac{r+s}{2}$.

c) Įrašę $h = \frac{r+s}{2}$, randame $h - r = \frac{s-r}{2}$ ir $h - s = \frac{r-s}{2}$. Todėl

$$P(h) = a \cdot \frac{s-r}{2} \cdot \frac{r-s}{2} = -\frac{a(r-s)^2}{4}.$$

Pagal ankstesnių temų rezultatą, kai $a > 0$, tai minimumas, o kai $a < 0$ – maksimumas. Pagal 8 temos 4c punktą $D = a^2(r-s)^2$, todėl $-\frac{D}{4a} = -\frac{a^2(r-s)^2}{4a} = -\frac{a(r-s)^2}{4}$. Abi ekstremumo išraiškos sutampa.

18. **a)** Standartinis pavidalas parodo koeficientus a, b, c; pilnojo kvadrato pavidalas – koeficientą a, ekstremumo tašką h ir ekstremumą k; sandaugos pavidalas – koeficientą a ir šaknis r, s.

b) Pagal 2 temoje išmoktą pilnojo kvadrato išskyrimą gauname $a(x-h)^2 + k$. Kai yra dvi skirtingos realiosios šaknys, pagal 3 uždavinio formulę gauname ir $a(x-r)(x-s)$. Abu pavidalai, atskliaudus ir sutraukus narius, duoda pradinį $ax^2 + bx + c$.

c) Jei šaknis viena, $r = s$, tuomet sandaugos pavidalas yra $a(x-r)^2$. Šaknis yra ir ekstremumo taškas, o daugianario reikšmė joje lygi 0, todėl pilnojo kvadrato pavidalas yra $a(x-r)^2 + 0 = a(x-r)^2$. Taigi šie du užrašai sutampa.

d) Standartinis ir pilnojo kvadrato pavidalai egzistuoja visada, kai $a \neq 0$. Jei realiųjų šaknų nėra, sandauga $a(x-r)(x-s)$ su realiaisiais r, s negalima, nes įrašius $x = r$ ji būtų lygi nuliui. Tai prieštarautų šaknų nebuvimui.

19. **a)** Iškeliame 2 ir išskiriame pilnąjį kvadratą:

$$P(x) = 2(x^2 - 4x) + 6 = 2\Big((x-2)^2 - 4\Big) + 6 = 2(x-2)^2 - 2.$$

Kadangi $a = 2 > 0$, minimumo taškas $x_{\min} = 2$, minimumas $P_{\min} = -2$.

b) $D = (-8)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 6 = 16$, todėl šaknys yra 1 ir 3. Sandaugos pavidalas: $P(x) = 2(x-1)(x-3)$.

c) $2(x-2)^2 - 2 = 2(x^2 - 4x + 4) - 2 = 2x^2 - 8x + 6$; taip pat $2(x-1)(x-3) = 2(x^2 - 4x + 3) = 2x^2 - 8x + 6$.

20. **a)** $x^2 - 6x + 8 = (x-3)^2 - 1 = (x-2)(x-4)$. Minimumo taškas 3, minimumas -1, šaknys 2, 4. Atskliaudus abu pavidalus gaunamas pradinis daugianaris.

b) $-x^2 + 2x + 3 = -(x-1)^2 + 4 = -(x+1)(x-3)$. Maksimumo taškas 1, maksimumas 4, šaknys -1, 3. Patikra: $-(x^2 - 2x + 1) + 4 = -x^2 + 2x + 3$; $-(x^2 - 2x - 3) = -x^2 + 2x + 3$.

c) $2x^2+4x-6 = 2(x+1)^2-8 = 2(x+3)(x-1)$. Minimumo taškas -1, minimumas -8, šaknys -3, 1. Patikra: $2(x^2+2x+1)-8 = 2x^2+4x-6$; $2(x^2+2x-3) = 2x^2+4x-6$.

d) $x^2-4x+4 = (x-2)^2 = (x-2)(x-2)$. Minimumo taškas 2, minimumas 0, šaknis 2. Čia pilnojo kvadrato ir sandaugos pavidalai sutampa, nes yra dviguboji šaknis. Patikra: $(x-2)^2 = x^2-4x+4$.

21. **a)** Atskliaudę gauname $P(x) = -2(x^2+2x+1)+8 = -2x^2-4x+6$. Iš $-2(x+1)^2+8 = 0$ gauname $(x+1)^2 = 4$, taigi šaknys yra 1 ir -3. Todėl $P(x) = -2(x-1)(x+3)$.

b) $Q(x) = 3(x^2-4x+4) = 3x^2-12x+12$. Vienintelė šaknis yra 2, todėl sandaugos pavidalas $3(x-2)(x-2) = 3(x-2)^2$ sutampa su duotuoju.

c) $R(x) = x^2+2x+5$. Kiekvienam realiajam x yra $(x+1)^2+4 \geq 4 > 0$, taigi realiųjų šaknų nėra ir sandaugos pavidalo su realiaisiais tiesiniais dauginamaisiais gauti negalima.

22. **a)** Šaknys 2 ir 4. Atskliaudę gauname $P(x) = 3x^2-18x+24$; išskyrę pilnąjį kvadratą – $P(x) = 3(x-3)^2-3$. Kadangi $3 > 0$, minimumo taškas 3, minimumas -3.

b) Šaknys -1 ir 3. Atskliaudę gauname $Q(x) = -2x^2+4x+6$, o išskyrę kvadratą – $Q(x) = -2(x-1)^2+8$. Maksimumo taškas 1, maksimumas 8.

c) Šaknis 2 yra dviguboji. $R(x) = 2(x-2)^2 = 2x^2-8x+8$. Minimumo taškas 2, minimumas 0; pilnojo kvadrato pavidalas sutampa su sandaugos pavidalu.

23. Mokinio teiginys klaidingas: visi pavidalai aprašo tą patį daugianarį. Jei vienintelė šaknis yra r, tai dauginamųjų sandauga $a(x-r)(x-r)$ ir pilnojo kvadrato pavidalas $a(x-r)^2$ yra vienodi, tik skirtingai užrašyti. Pavyzdžiui, $x^2-4x+4 = (x-2)^2 = (x-2)(x-2)$.

24. **a)** Kadangi $1 \neq 7$ ir $P(1) = P(7)$, ekstremumo taškas yra $h = \frac{1+7}{2} = 4$. Šaknys simetriškos taško 4 atžvilgiu, todėl kita šaknis yra 6: $\frac{2+6}{2} = 4$.

b) Pagal skaidymo formulę $P(x) = a(x-2)(x-6)$, $a \neq 0$. Iš $P(0) = 12a = 12$ gauname $a = 1$.

c) Sandaugos, standartinis ir pilnojo kvadrato pavidalai yra

$$P(x) = (x-2)(x-6) = x^2-8x+12 = (x-4)^2-4.$$

Patikra: $P(2) = 0$, $P(0) = 12$, $P(1) = 5$, $P(7) = 5$. Bet kuris sąlygas tenkinantis daugianaris turi tas pačias šaknis ir $a = 1$, todėl atsakymas vienintelis.

25. Jei šaknys r, s, tai $r+s = 7$, $rs = 10$. Skaičiai 2 ir 5 turi tokią sumą ir sandaugą, todėl pagal atvirkštinę Vijeto teoremą jie yra $x^2-7x+10$ šaknys; kitų nėra. Taigi $P(x) = a(x-2)(x-5)$. Iš $P(3) = a \cdot 1 \cdot (-2) = -2a = -8$ gauname $a = 4$.

Todėl $P(x) = 4(x-2)(x-5) = 4x^2-28x+40 = 4\left(x-\frac{7}{2}\right)^2-9$. Kadangi $a > 0$, minimumo taškas $x_{\min} = \frac{7}{2}$, minimumas $P_{\min} = -9$. Patikra: šaknų suma $2+5 = 7$, sandauga $2 \cdot 5 = 10$, o $P(3) = -8$. Šaknys ir a nustatyti tik vienu būdu.

26. **a)** Pagal duotą minimumo tašką ir minimumą $P(x) = a(x+1)^2-12$, kur $a > 0$. Įrašę $x = 0$ gauname $a-12 = -9$, todėl $a = 3$.

b) Iš $3(x+1)^2-12 = 0$ gauname $(x+1)^2 = 4$, todėl $x = -3$ arba $x = 1$. Visi pavidalai:

$$P(x) = 3(x+3)(x-1) = 3x^2+6x-9 = 3(x+1)^2-12.$$

c) Kadangi $3(x+1)^2 \geq 0$, tai $P(x) \geq -12$, lygybė pasiekiama, kai $x = -1$. Be to, $P(0) = -9$. Ši sąlyga leidžia rasti tik vieną a reikšmę, todėl daugianaris vienintelis.

27. Iš $9 = -\frac{36}{4a}$ gauname $36a = -36$, taigi $a = -1$. Pagal ekstremumo duomenis pilnojo kvadrato pavidalas yra $P(x) = -(x-1)^2 + 9$. Spręsdami $-(x-1)^2 + 9 = 0$ gauname $(x-1)^2 = 9$, todėl šaknys yra -2 ir 4.

Visi trys pavidalai:

$$P(x) = -(x+2)(x-4) = -x^2 + 2x + 8 = -(x-1)^2 + 9.$$

Patikra: $D = 2^2 - 4(-1) \cdot 8 = 36$, maksimumo taškas 1, maksimumas 9, nes $-(x-1)^2 \leq 0$. Kiekviename sprendimo žingsnyje a, ekstremumo pavidalas ir šaknys gaunami tik vienu būdu.

28. **a)** Įrašę duomenis gauname $2^2 = 10 + 2rs$, taigi $rs = -3$.

b) Pagal Vijeto teoremą vienintelė galima redukuotoji lygtis yra $x^2 - 2x - 3 = 0$. Kadangi $3 + (-1) = 2$ ir $3 \cdot (-1) = -3$, pagal atvirkštinę teoremą jos šaknys yra 3 ir -1; kitų nėra.

c) Todėl $P(x) = a(x-3)(x+1)$. Iš $P(0) = -3a = -9$ randame $a = 3$. Taigi

$$P(x) = 3(x-3)(x+1) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x-1)^2 - 12.$$

Patikra: šaknų suma $3 + (-1) = 2$, kvadratų suma $9 + 1 = 10$, o $P(0) = -9$. Kiekvienas sąlygas tenkinantis daugianaris turi tas pačias šaknis ir tą patį a, todėl atsakymas vienintelis.

29. Tokio daugianario nėra. Jei šaknys būtų 1 ir 3, pagal skaidymo formulę $P(x) = a(x-1)(x-3)$, kur $a \neq 0$. Tada $P(2) = a \cdot 1 \cdot (-1) = -a \neq 0$, o tai prieštarauja sąlygai $P(2) = 0$.

30. Visi ieškomi daugianariai yra $P(x) = a(x+2)(x-4)$, kur $a > 0$. Kiekvienas toks daugianaris turi nurodytas šaknis. Atskliaudę ir išskyrę pilnąjį kvadratą gauname

$$P(x) = a(x^2 - 2x - 8) = a(x-1)^2 - 9a.$$

Taigi visų minimumo taškas yra 1, tačiau minimumas yra $-9a$ ir priklauso nuo a. Sąlygos nepakankamos vienam daugianariui nustatyti: pavyzdžiui, tinka $(x+2)(x-4)$ ir $2(x+2)(x-4)$.

31. Ne, tokio daugianario nėra. Jei $a > 0$, ekstremumo taškas yra minimumo taškas. Kai minimumas lygus 0, pilnojo kvadrato pavidalas yra $P(x) = a(x-h)^2$. Lygtis $a(x-h)^2 = 0$ turi vieną šaknį $x = h$, todėl dviejų skirtingų realiųjų šaknų būti negali.

32. **a)** $a = -2$, $b = 8$, $c = 10$, todėl $D = 8^2 - 4(-2) \cdot 10 = 144$. Šaknys yra -1 ir 5, taigi sandaugos pavidalas $P(x) = -2(x+1)(x-5)$. Išskyrę pilnąjį kvadratą gauname $P(x) = -2(x-2)^2 + 18$. Kadangi $a < 0$, maksimumo taškas $x_{\max} = 2$, maksimumas $P_{\max} = 18$. Patikra:

$$-2(x+1)(x-5) = -2(x^2 - 4x - 5) = -2x^2 + 8x + 10;$$

$$-2(x-2)^2 + 18 = -2(x^2 - 4x + 4) + 18 = -2x^2 + 8x + 10.$$

b) Lygybė $3(x-1)^2 = 0$ tenkinama tik kai $x = 1$, todėl šaknis yra viena. Standartinis pavidalas $Q(x) = 3x^2 - 6x + 3$, sandaugos pavidalas $Q(x) = 3(x-1)(x-1)$.

c) $D = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 3 = -8 < 0$, todėl realiųjų šaknų nėra. Jei toks sandaugos pavidalas egzistuotų, įrašius $x = r$ gautume realiąją šaknį. Vadinasi, toks užrašas negalimas.

d) Pagal skaidymo formulę kiekvienas ieškomas daugianaris yra $P(x) = a(x+2)(x-1)$, $a \neq 0$. Kadangi $P(0) = -2a = -4$, gauname $a = 2$, taigi $P(x) = 2(x+2)(x-1) = 2x^2 + 2x - 4$. Patikra: $P(-2) = P(1) = 0$ ir $P(0) = -4$. Sąlyga $P(0) = -4$ leidžia rasti tik vieną a reikšmę, todėl kito daugianario nėra.