



ჩაკეტვის დრო

უნგრეთში N რაოდენობის ქალაქია, რომლებიც გადანომრილია რიცხვებით 0 -დან $(N - 1)$ -მდე. ქალაქები ერთმანეთთან შეერთებულია $(N - 1)$ რაოდენობის ორმხრივი გზებით. გზები ასევე გადანომრილია რიცხვებით 0 -დან $(N - 2)$ -ის ჩათვლით.

ყოველი გზა j ($0 \leq j \leq N - 2$) სიგრძით $W[j]$, აკავშირებს ქალაქებს $U[j]$ და $V[j]$. გზის სიგრძე წარმოადგენს შესაბამის ქალაქებს შორის გადაადგილების ხანგრძლივობას. ყოველი გზა აკავშირებს ორ განსხვავებულ ქალაქს, ასევე ყოველი ორი ქალაქი დაკავშირებულია მაქსიმუმ ერთი გზით.

ორ განსხვავებულ a და b ქალაქს შორის **მარშრუტი** ვუწოდოთ განსხვავებული p_0, p_1, \dots, p_t ქალაქების ისეთ მიმდევრობას, რომ:

- $p_0 = a$,
- $p_t = b$,
- ყოველი i რიცხვისთვის ($0 \leq i < t$), არსებობს გზა, რომელიც აკავშირებს ქალაქებს p_i და p_{i+1} .

არსებული გზებით შესაძლებელია მოგზაურობა ნებისმიერი ქალაქიდან ნებისმიერ სხვა ქალაქამდე. ანუ, ნებისმიერი ორი განსხვავებული ქალაქი დაკავშირებულია ერთადერთი მარშრუტით.

p_0, p_1, \dots, p_t მარშრუტის **სიგრძე** არის მასში შემავალი გზების სიგრძეთა ჯამი.

უნგრეთში ბევრი ადამიანი მოგზაურობს, რათა დაესწროს ზოგი მსხვილი ქალაქის დაარსების დღესასწაულს. დღესასწაულის დასრულებისას ისინი ბრუნდებიან სახლში.

ქვეყნის მთავრობას სურს შეამციროს დიდი რაოდენობით ხალხის თავმოყრა, რათა ადგილობრივი მოსახლეობა ნაკლებად შეწუხდეს. ამიტომ დაგეგმილია გარკვეულ დროებში ქალაქების ჩაკეტვა.

ყველა ქალაქს მთავრობამ უნდა მიანიჭოს გარკვეული არაუარყოფითი **ჩაკეტვის დრო**. მთავრობამ ასევე გადაწყვიტა, რომ ჩაკეტვის დროების სრული ჯამი არ უნდა აღემატებოდეს მოცემულ K სიდიდეს. უფრო ზუსტად, ყველა i რიცხვისთვის 0 -დან $(N - 1)$ -ის ჩათვლით, i ქალაქის ჩაკეტვის დრო არის არაუარყოფითი $c[i]$ მთელი რიცხვი და ყველა ამ $c[i]$ რიცხვების ჯამი არ უნდა აღემატებოდეს K სიდიდეს.

განვიხილოთ a ქალაქი და ჩაკეტვის დროების გარკვეული განაწილება. ვთქვათ, b ქალაქი **მიღწევადია** a ქალაქიდან მაშინ და მხოლოდ მაშინ, თუ $b = a$, ან ამ ორ ქალაქს შორის მარშრუტი p_0, \dots, p_t (კერძოდ $p_0 = a$ და $p_t = b$) აკმაყოფილებს შემდეგ პირობებს:

- p_0, p_1 მარშრუტის სიგრძე არ აღემატება სიდიდეს $c[p_1]$, და
- p_0, p_1, p_2 მარშრუტის სიგრძე არ აღემატება სიდიდეს $c[p_2]$, და
- ...
- $p_0, p_1, p_2, \dots, p_t$ მარშრუტის სიგრძე არ აღემატება სიდიდეს $c[p_t]$.

წელს გაიმართება ორი მთავარი X და Y ქალაქის დაარსების დღესასწაული. ყველა განსაზღვრული ჩაკეტვის დროებისთვის **კომფორტულობის ქულა** განსაზღვროთ შემდეგი ორი რიცხვის ჯამის სახით:

- X ქალაქიდან მიღწევადი ქალაქების რაოდენობა.
- Y ქალაქიდან მიღწევადი ქალაქების რაოდენობა.

გაითვალისწინეთ, რომ თუ რომელიმე ქალაქი მიღწევადია როგორც X , ასევე Y ქალაქიდან, მაშინ კომფორტულობის ქულაში ის უნდა ჩაითვალოს ორჯერ.

თქვენი დავალებაა გარკვეული ჩაკეტვის დროებისთვის გამოთვალოთ კომფორტულობის ქულის მაქსიმალური მნიშვნელობა.

იმპლემენტაციის დეტალები

თქვენ უნდა მოახდინოთ შემდეგი პროცედურის იმპლემენტაცია.

```
int max_score(int N, int X, int Y, int64 K, int[] U, int[] V, int[] W)
```


- N : ქალაქების რაოდენობა.
- X, Y : მთავარი ქალაქები, სადაც ტარდება დღესასწაულები.
- K : ჩაკეტვის დროების ჯამის ზედა ზღვარი.
- U, V : $N - 1$ სიგრძის მასივები, რომლებიც აღწერენ დამაკავშირებელ გზებს.
- W : $N - 1$ სიგრძის მასივი, რომელიც აღწერს გზების სიგრძეებს.
- ამ პროცედურამ უნდა დააბრუნოს კომფორტულობის მაქსიმალური ქულა, რომელიც შეიძლება იყოს მიღებული რომელიმე ჩაკეტვის დროების განაწილებით.
- ყველა ტესტში ეს პროცედურა შესაძლოა მრავალჯერ იყოს გამოძახებული.

მაგალითი

განვიხილოთ შემდეგი გამოძახება:

```
max_score(7, 0, 2, 10,
          [0, 0, 1, 2, 2, 5], [1, 3, 2, 4, 5, 6], [2, 3, 4, 2, 5, 3])
```

ის შეესაბამება გზების შემდეგ ქსელს:



დავუშვათ ჩაკეტვის დროები დანიშნულია შემდეგი განაწილების სახით:

ქალაქი	0	1	2	3	4	5	6
ჩაკეტვის დრო	0	4	0	3	2	0	0


გაითვალისწინეთ, რომ ყველა ჩაკეტვის დროების ჯამი არ აღემატება სიდიდეს $K = 10$.

ქალაქები 0, 1 და 3 მიღწევადია ქალაქიდან X ($X = 0$), ამავე დროს ქალაქები 1, 2 და 4 მიღწევადია ქალაქიდან Y ($Y = 2$). შემდეგ კომფორტულობის ქულა არის $3 + 3 = 6$. არ არსებობს განაწილება, რომლის შესაბამისი კომფორტულობის ქულა მეტია, ვიდრე 6, ამიტომ პროცედურამ უნდა დააბრუნოს 6.

ასევე განვიხილოთ შემდეგი გამოცახება:

```
max_score(4, 0, 3, 20, [0, 1, 2], [1, 2, 3], [18, 1, 19])
```

ის შესაბამება გზების შემდეგ ქსელს:



დავუშვათ ჩაკეტვის დროები დანიშნულია შემდეგი განაწილების სახით:

ქალაქი	0	1	2	3
ჩაკეტვის დრო	0	1	19	0

ქალაქი 0 მიღწევადია ქალაქიდან X ($X = 0$), ამავე დროს ქალაქები 2 და 3 მიღწევადია ქალაქიდან Y ($Y = 3$). შედეგად კომფორტულობის ქულა არის $1 + 2 = 3$. არ არსებობს განაწილება, რომლის შესაბამისი კომფორტულობის ქულა მეტია, ვიდრე 3, ამიტომ პროცედურამ უნდა დააბრუნოს 3.

შეზღუდვები

- $2 \leq N \leq 200\,000$
- $0 \leq X < Y < N$
- $0 \leq K \leq 10^{18}$
- $0 \leq U[j] < V[j] < N$ (ყველა ისეთი j რიცხვისთვის, სადაც $0 \leq j \leq N - 2$)
- $1 \leq W[j] \leq 10^6$ (ყველა ისეთი j რიცხვისთვის, სადაც $0 \leq j \leq N - 2$)
- მოცემული გზებით შესაძლებელია ნებისმიერი ქალაქიდან ნებისმიერ სხვა ქალაქში გადაადგილება.
- $S_N \leq 200\,000$, სადაც S_N არის ყველა max_score პროცედურის გამოძახებებისთვის N სიდიდეების ჯამი.

ქვეამოცანები

ვითყვით, რომ გზების ქსელი **წრფივია**, თუ გზა i აკავშირებს ქალაქებს i და $i + 1$ (ყველა i -სათვის, სადაც $0 \leq i \leq N - 2$).

1. (8 ქულა) მარშრუტის სიგრძე X ქალაქიდან Y ქალაქამდე მეტია, ვიდრე $2K$.
2. (9 ქულა) $S_N \leq 50$, გზების ქსელი წრფივია.
3. (12 ქულა) $S_N \leq 500$, გზების ქსელი წრფივია.
4. (14 ქულა) $S_N \leq 3\,000$, გზების ქსელი წრფივია.
5. (9 ქულა) $S_N \leq 20$
6. (11 ქულა) $S_N \leq 100$
7. (10 ქულა) $S_N \leq 500$
8. (10 ქულა) $S_N \leq 3\,000$
9. (17 ქულა) დამატებითი შეზღუდვების გარეშე.

სანიმუშო გრაფერი

ვთქვათ C აღნიშნავს სცენარების რაოდენობას, თუ რამდენჯერ იქნება გამოძახებული პროცედურა max_score. სანიმუშო გრაფერი კითხულობს შემავალ მონაცემებს შემდეგი ფორმატით:

- სტრიქონი 1: C

ამის შემდეგ მოცემულია C სცენარის აღწერა.

სანიმუშო გრაფერი კითხულობს ყველა სცენარის აღწერას შემდეგი ფორმატით

- სტრიქონი 1: $N\ X\ Y\ K$
- სტრიქონი $2 + j$ ($0 \leq j \leq N - 2$): $U[j]\ V[j]\ W[j]$

სანიმუშო გრადერი ბეჭდავს ერთ სტრიქონს ყოველი სცენარისთვის შემდეგი ფორმატით:

- სტრიქონი 1: max_score პროცედურის დაბრუნებული მნიშვნელობა.