

Problème Kpart

Fichier d'entrée `stdin`
Fichier de sortie `stdout`

Virgil vient de se lancer dans l'étude des propriétés des tableaux de nombres. Ainsi, il définit un K -tableau de la manière suivante. Un tableau A constitué de nombres entiers strictement positifs est un K -tableau si toute séquence contiguë (d'indices consécutifs) de A de taille K peut être partitionnée en deux ensembles disjoints, pas forcément contigus ni de même taille, ayant une même somme. Par exemple, $1, 2, 1, 3$ est un 3-tableau, puisque $1, 2, 1$ peut être partitionné en deux ensembles ayant tous deux une somme de 2 ($1, 1$ d'une part et 2 d'autre part), et $2, 1, 3$ peut être partitionné en $2, 1$ et 3 , qui ont tous deux une somme de 3. Ce n'est pas un 2-tableau, car $1, 2$ ne peut pas être partitionné en deux ensembles de même somme. De même, ce n'est pas un 4-tableau.

On vous donne T tableaux d'entiers *strictement positifs*. Pour chaque tableau A , Virgil veut savoir quelles sont toutes les valeurs de K pour lesquelles A est un K -tableau.

Données d'entrée

La première ligne contient l'entier T . Les lignes suivantes contiennent la description des T tableaux. Chaque tableau est représenté par deux lignes. La première ligne contient N , la taille du tableau. La seconde ligne contient les éléments du tableau, séparés par des espaces.

Données de sortie

Affichez les réponses pour chaque tableau A dans l'ordre. Pour chaque tableau, n'affichez qu'une seule ligne contenant d'abord le nombre de valeurs de K pour lesquelles le tableau donné est un K -tableau, suivi des valeurs de K pour lesquelles le tableau est un K -tableau, par ordre croissant.

Contraintes

- $1 \leq T \leq 20$.
- Soit $\sum A$ la somme des valeurs d'un tableau quelconque (*et non pas* la somme des valeurs de tous les tableaux). Alors $1 \leq \sum A \leq 100\,000$.

#	Points	Contraintes
1	10	$1 \leq N \leq 30$
2	20	$31 \leq N \leq 120$
3	70	$121 \leq N \leq 1\,000$

Exemples

Fichier d'entrée	Fichier de sortie
2	2 4 6
7	2 3 6
7 3 5 1 3 3 5	
6	
1 2 3 5 8 3	

Explications

Le premier tableau, celui de taille 7, est un 4-tableau et un 6-tableau, puisque toutes les séquences contiguës de taille 4 et 6, respectivement, peuvent être partitionnées en deux ensembles de même somme.

Le second tableau, celui de taille 6, est un 3-tableau et un 6-tableau, puisque toutes les séquences contiguës de taille 3 et de taille 6, respectivement, peuvent être partitionnées en deux ensembles de même somme.