



## Xp Orbs

Во Minecraft, за секоја постигната цел, играчот се наградува со одреден број поени во форма на некои зелени топчиња, при што секое зелено топче го наградува играчот со различен број на поени врз основа на големината на топчето.

Топчето со големина  $i$  го наградува играчот со  $xp_i$  поени, каде што  $xp$  низата е дефинирана на следниов начин:

- $xp_1 = 1$ ;
- $xp_i = prev\_prime(2 \cdot xp_{i-1})$ , каде што  $prev\_prime(a)$  е најголем прост број кој е помал или еднаков на  $a$ . На пример,  $prev\_prime(16) = 13$  и  $prev\_prime(23) = 23$ .

На пример, првите 8 големини на топчиња го наградуваат играчот со: 1, 2, 3, 5, 7, 13, 23 и 43 поени, соодветно.

Ноч, креаторот на Minecraft, направи било кој ненегативен цел број на поени да може да се расчлени како збир од поени на неколку топчиња. Тоа е направено на следниот начин (тука  $\oplus$  претставува конкатенација на низи):

- Нека  $dec(a)$  е низа што го претставува расчленувањето на  $a$  поени како збир на поени наградени со зелени топчиња;
- $dec(0) = []$  (празната низа)
- $dec(a) = [xp_{max}] \oplus dec(a - xp_{max})$ , каде што  $xp_{max}$  е најголемиот елемент во  $xp$  така што  $xp_{max} \leq a$ . На пример, расчленувањето на 11 е  $dec(11) = [7, 3, 1]$  и расчленувањето на 15 е  $dec(15) = [13, 2]$ . Тој, исто така, дефинираше  $cnt(a)$  да биде должината на низата  $dec(a)$ , затоа  $cnt(11) = 3$ ,  $cnt(15) = 2$ .

Ноч сака да го знае одговорот на  $q$  прашанки од следнава форма:

- $l, r$  – најдете го збирот  $\frac{l}{cnt(l)} + \frac{l+1}{cnt(l+1)} + \dots + \frac{r-1}{cnt(r-1)} + \frac{r}{cnt(r)}$

## Влез

Првата линија содржи еден цел број, што го претставува бројот на прашанки  $q$ . Секоја од следните  $q$  линии содржи пар цели броеви.  $i$ -тата од овие линии ја опишува  $i$ -тата прашанка:  $l_i$  и  $r_i$ .

## Излез

Излезот содржи  $q$  линии.  $i$ -тата од овие линии содржи еден цел број, што го претставува одговорот на  $i$ -тата прашанка.

**Забелешка за печатење на излезот.** Нека  $\frac{x}{y}$  е одговорот за некоја прашанка. Треба да отпечатите еден цел број што го претставува производот  $x \cdot \text{mod\_inv}(y) \bmod 998\,244\,353$ , каде што  $\text{mod\_inv}(y)$  се дефинира како  $\text{mod\_inv}(y) = y^{998\,244\,351} \bmod 998\,244\,353$ .

**Забелешка во врска со модуларната аритметика.** Дополнително, имајте го на ум следново:

- За две дропки  $\frac{a}{b}$  и  $\frac{c}{d}$ , нивниот модуларен збир може лесно да се пресмета како:  
 $a \cdot \text{mod\_inv}(b) + c \cdot \text{mod\_inv}(d) \bmod 998\,244\,353$ ;
- Ако две дропки  $\frac{a}{b}$  и  $\frac{c}{d}$  се еднакви, тогаш  
 $a \cdot \text{mod\_inv}(b) \bmod 998\,244\,353 = c \cdot \text{mod\_inv}(d) \bmod 998\,244\,353$ .

## Ограничувања

- $1 \leq q \leq 5 \cdot 10^4$
- $1 \leq l_i \leq r_i \leq 10^{12}$

## Подзадачи

#	Поени	Ограничувања
1	18	$0 \leq r_i - l_i < 100$
2	65	$1 \leq l_i \leq r_i \leq 10^8$
3	17	Нема дополнителни ограничувања.

## Примери

### Влез Пример #1

```
2
5 12
1 1000000
```

### Излез Пример #1

```
166374097
439931963
```

## Влез Пример #2

```
5
11 15
5 14
3 10
12 20
7 19
```

## Излез Пример #2

```
166374096
166374117
499122210
499122249
665496322
```

## Објаснување

За првата прашанка во првиот пример, одговорот, почнувајќи од  $ans = 0$ , може да се пресмета на следниов начин:

- $dec(5) = [5] \rightarrow ans += \frac{5}{1}$
- $dec(6) = [5, 1] \rightarrow ans += \frac{6}{2}$
- $dec(7) = [7] \rightarrow ans += \frac{7}{1}$
- $dec(8) = [7, 1] \rightarrow ans += \frac{8}{2}$
- $dec(9) = [7, 2] \rightarrow ans += \frac{9}{2}$
- $dec(10) = [7, 3] \rightarrow ans += \frac{10}{2}$
- $dec(11) = [7, 3, 1] \rightarrow ans += \frac{11}{3}$
- $dec(12) = [7, 5] \rightarrow ans += \frac{12}{2}$

Вкупниот збир е  $ans = \frac{229}{6}$ , а излезот е:  
 $229 \cdot mod\_inv(6) \bmod 998\,244\,353 = 229 \cdot 166\,374\,059 \bmod 998\,244\,353 = 166\,374\,097.$