

Скінченні різниці. Властивості скінченних різниць

Нехай ми маємо сукупність значень деякої функції задані в $(n+1)$ вузлі з кроком h :

$$x_0, x_1, \dots, x_n$$

$$f_0, f_1, \dots, f_n$$

Де f_n - значення функції в n вузлі, тобто $f(x_n)$.

Припустимо, що всі вузли є рівновіддалені, тобто $x_1 - x_0 = h$ і $x_n - x_{(n-1)} = h$.

Тоді введемо заміну змінних:

$$t = \frac{(x - x_0)}{h}$$

В нульовому вузлі $t = 0$, в першому вузлі $t = 1$, другому $t = 2$ в n -вузлі $t = n$ тобто звідси випливає, що змінна t непотрібна, а достатньо тільки табличне значення f_n . Змінна t у вузлах приймає цілі значення рівні порядковому номеру вузла.

Така заміна змінних полегшує опрацювання даних заданих у рівновіддалених вузлах, а саме, дає зменшити число обчислень на яких базується похибка і покращується точність.

Введемо поняття скінчених різниць.

Скінченна різниця першого порядку визначається як різниця значень функції у сусідніх вузлах

$$\Delta f_0 = f_1 - f_0$$

Скінченні різниці вищих порядків можна обчислити за допомогою рекурентної формули через розділені різниці нижчих порядків:

$$\Delta^k f_0 = \Delta(\Delta^{k-1} f_0) = \Delta^{k-1} f_1 - \Delta^{k-1} f_0$$

$$\Delta^2 f_0 = f_2 - 2f_1 + f_0$$

$$\Delta^3 f_0 = f_3 - 3f_2 + 3f_1 - f_0$$

Де індекси k – порядок різниці. Для того, щоб обчислити різницю n -порядку треба мати інформацію $n+1$ вузол від 0 до n . Наприклад, щоб обчислити різницю 2-порядку треба мати 3 вузли нульовий, перший і другий, щоб знати скільки з таблиці зчитати вузлів.

Скінченна різниця будь-якого порядку являє собою лінійну комбінацію значення функцій в вузлах

Основна теорема скінченних різниць

Скінченна різниця довільного порядку взята в m -вузлі, тобто $f_m, f_{m+1}, f_{m+2}, \dots, f_{m+n}$ виражається по формулі

$$\Delta^n f_m = \sum_{k=0}^n C_n^k (-1)^{n-k} f_{m+k}$$

Де C_n^k - число перестановок, f_{m+k} - значення функції в $m+k$ вузлі.

Розглянемо основні властивості скінченних різниць

Оператор скінченної різниці є лінійним. Скінченну різницю довільного порядку можна обчислити за формулою

$$\Delta^n f_m = \sum_{k=0}^n C_n^k (-1)^{n-k} f_{m+k}$$

$$\Delta^n f_0 = f_n - n f_{n-1} + \frac{n(n-1)}{2!} f_{n-2} + \dots + (-1)^n f_0$$

Скінченна різниця вперед, це коли починаємо в нульовому вузлі і далі за розрахунком скінченних різниць беремо перший вузол, другий і до n , тобто рухаємося по таблиці вперед.

Можна ввести поняття скінченних різниць назад. Коли рухаємося від n - вузла до нульового вузла.

Скінченна різниця вперед позначається як Δ , тоді коли скінченна різниця назад позначається ∇ .

Скінченна різниця назад першого порядку визначається як різниця значень функції у сусідніх вузлах $\nabla f_n = f_n - f_{n-1}$.

Скінченні різниці назад володіють тими самими властивостями що і скінченні різниці вперед.

Скінченні різниці назад вищих порядків можна обчислити за допомогою рекурентної формули:

$$\nabla^k f_n = \nabla(\nabla^{k-1} f_n) = \nabla^{k-1} f_n - \nabla^{k-1} f_{n-1}$$

Скінченна різниця назад будь-якого порядку являє собою лінійну комбінацію значень функцій в вузлах.

Між скінченними різницями вперед і скінченними різницями назад є просте співвідношення $\nabla^m f_n = \nabla^m f_m + n$, яке легко дозволяє обчислити значення скінченної різниці назад по відомому значенню відповідної скінченної різниці вперед.

У разі необхідності обчислення скінченної різниці назад, достатньо тільки викликати функцію що обчислює скінченну різницю вперед тільки змінюючи аргументи.

Різницевий оператор.

Різницевий оператор- це такий оператор, який діє на якусь функцію в якомусь вузлі та повертає різницю значень функцій в двох сусідніх вузлах. З точки зору математики, вважається аналогом похідної, хоч і має деякі відмінності.

Основним оператором, в обчисленні скінченних різниць, є різницевий оператор, який визначається рівністю:

$$\Delta f(t) = f(t + 1) - f(t)$$

Розглянемо його основні властивості:

Різницевий оператор є лінійним, тобто дія різницевого оператора на лінійну комбінацію якихось функцій дорівнює лінійній комбінації дії різницевого оператора на кожен з цих функцій зокрема

$$\Delta(\alpha f(t) + \beta g(t)) = \alpha \Delta f(t) + \beta \Delta g(t)$$

Дія різницевого оператора на добуток функцій

$$\begin{aligned}
 \Delta(f(t)g(t)) &= f(t+1)g(t+1) - f(t)g(t) = \\
 &= f(t+1)g(t+1) - f(t+1)g(t) + f(t+1)g(t) - f(t)g(t) = \\
 &= f(t+1)(g(t+1) - g(t)) + g(t)(f(t+1) - f(t)) = \\
 &= f(t+1)\Delta g(t) + g(t)\Delta f(t)
 \end{aligned}$$

Дія різницевого оператора на частку двох функцій дає:

$$\Delta\left(\frac{f(t)}{g(t)}\right) = \frac{f(t+1)}{g(t+1)} - \frac{f(t)}{g(t)} = \frac{g(t)\Delta f(t) - f(t)\Delta g(t)}{g(t+1)g(t)}$$

Дія різницевого оператора на деякі стандартні функції визначається як

$$\begin{aligned}
 \Delta a^t &= a^t(a - 1) \\
 \Delta 2^t &= 2^t(2 - 1) \\
 \Delta \ln(t) &= \ln\left(1 + \frac{1}{t}\right) \\
 \Delta \sin(at + b) &= 2\sin\left(\frac{a}{2}\right)\cos\left(a\left(t + \frac{1}{2}\right) + b\right) \\
 \Delta \cos(at + b) &= -2\sin\left(\frac{a}{2}\right)\sin\left(a\left(t + \frac{1}{2}\right) + b\right)
 \end{aligned}$$

Різницевий оператор має також властивість, що його можна підносити до степені.

Тобто різницевий оператор другої степені є добутком двох різницевого операторів першої степені $\Delta^2 f(t) = \Delta(\Delta f(t))$.

В загальному випадку можна записати:

$$\Delta^n f(t) = \Delta(\Delta^{n-1} f(t))$$

Розглянемо основну теорему в обчисленні різниць:

Для алгебраїчного многочлена $f(t) = a_0 + a_1 t + \dots + a_n t^n$ різниця n -го порядку рівна $a_n n!$, а різниця $(n+1)$ порядку – рівна нулю.

Якщо $f(t)$ - алгебраїчний многочлен степені n , то $\Delta f(t)$ є алгебраїчний многочлен степені $n-1$. Щоб довести це твердження, розглянемо випадок $f(t) = t^n$:

$$\begin{aligned} \Delta(t^n) &= (t+1)^n - t^n = \sum_{k=0}^n C_n^k t^k - t^n = \\ &= t^n + n t^{n-1} + \dots + 1 - t^n = n t^{n-1} + \dots \end{aligned}$$

Подіявши різницеvim оператором на алгебраїчний многочлен $f(t) = a_0 + a_1t + \dots + a_nt^n$ n раз, ми отримаємо необхідний результат $a_nn!$.

Тобто якщо n раз подіяти дістанемо константу 0 , значення константи в будь -якому вузлі є однаковою .

Оператор зсуву

Якщо подіяти різницеvim оператором на функцію в деякому вузлі, тоді ми отримаємо значення функції в сусідньому вузлі.

Введемо оператор зсуву за допомогою співвідношення

$$E(f(t)) = f(t + 1)$$

Де t - змінна, що нумерує вузли. Тобто якщо є необхідність ввести від 0 до n , то t пробігає від 0 до n .

Звідси випливає, що значення t в n вузлі рівна n , а значення t в нульовому вузлі рівне 0.

Розглянемо тепер його основні властивості:

Оператор зсуву є лінійним

$$E(\alpha f(t) + \beta g(t)) = \alpha E(f(t)) + \beta E(g(t))$$

Оператор зсуву можна підносити до степені, тобто оператор зсуву в квадраті зсуває значення функції в 2 рази

$$E^n(f(t)) = f(t + n)$$

Формально можна ввести оператор зсуву в нульовій степені повертає те саме значення в тому самому вузлі

$$E^0(f(t)) = f(t)$$

Також формально можна ввести оператор зсуву у від'ємній степені, якщо оператор зсуву в додатній степені то він зсуває значення функції вперед, коли у від'ємній степені- назад.

$$E^{-n}(f(t)) = f(t - n)$$

Між різницеvim оператором і оператором зсуву є просте співвідношення $\Delta = E - 1$. Його правильність впливає з наступного:

$$\Delta f(t) = f(t + 1) - f(t) = E(f(t)) - f(t) = (E - 1)(f(t))$$

Використовуючи оператор зсуву, доведемо правильність формули для обчислення скінченних різниць:

$$\Delta^n = (E - 1)^n = \sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} C_n^k E^k$$

Отримаємо:

$$\Delta^k f(t) = \sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} C_n^k E^k(f(t)) = \sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} C_n^k f(t + k)$$

Факторіальні многочлени

Будь-яку функцію в класичній математиці можна обчислити за допомогою ряду алгебраїчних многочленів.

В математичному аналізі важливу роль відіграє функція x^n . Це зумовлено тим, що довільна функція може бути розкладена в ряд по степенях x^n .

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

Можна показати, що ця властивість функцій x^n в першу чергу визначається тим, що перша похідна задовольняє співвідношення:

$$(x^n)' = nx^{n-1}$$

В чисельних методах важливу роль відіграють функції – факторіальні многочлени. Факторіальні многочлени вводять виходячи з умови $\Delta t^{(n)} = nt^{(n-1)}$ Де $t^{(n)} = t(t-1)\dots(t-n+1)$.

Факторіальні многочлени задовольняють наступним властивостям:

Факторіальний многочлен в нульовій степені рівний одиниці $t^{(0)} = 1$. Звідси випливає, що $0^{(0)} = 1$. Це відповідає такому формальному співвідношенню $0! = 1$.

Факторіальний многочлен $t^{(n)}$ має n множників.

Доведемо основну властивість факторіальних многочленів.

$$\begin{aligned}\Delta t^{(n)} &= (t+1)^{(n)} - t^{(n)} = \\ &= (t+1)t(t-1)\dots(t-(n-2)) - t(t-1)\dots(t-(n-1)) = \\ &= t(t-1)\dots(t-(n-2))(t+1-t+n-1) = \\ &= nt(t-1)\dots(t-(n-2)) = nt^{(n-1)}\end{aligned}$$

Доведемо, що довільну функцію можна розкласти в ряд по факторіальних многочленах.

$$f(t) = \sum_{k=0}^{\infty} b_k t^{(k)}$$

При $t = 0$ знаходимо, що $f(0) = b_0$. Подіємо різницеvim оператором на обидві сторони рівняння

$$\Delta f(t) = \sum_{k=1}^{\infty} b_k k t^{(k-1)}$$

. Аналогічно знаходимо, що при $t = 0$ $\Delta f(0) = b_1$. Подіявши різницеvim оператором n раз отримаємо:

$$\Delta f(t) = \sum_{k=n}^{\infty} b_n k(k-1)\dots(k-(n-1))t^{(k-n)}$$

. При $t = 0$ $\Delta^n f(0) = n!b_n$

Отже, ми отримали ряд по факторіальних многочленах:

$$f(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\Delta^k f(0)}{k!} t^{(k)}$$

Числа Стирлінга

Числа Стирлінга встановлюють взаємозв'язок між алгебраїчними та факторіальними многочленами.

Визначимо коефіцієнти розкладу факторіальних многочленів по алгебраїчних многочленах:

$$t^{(n)} = \sum_{k=0}^{\infty} S(n, k) t^k$$

, де $S(n, k)$ -числа Стирлінга першого роду.

Для $n = 1$ знаходимо:

$$t^{(1)} = t = S(1, 0) + S(1, 1)t$$

Отже, $S(1, 0) = 0, S(1, 1) = 1$

Врахуємо, що $t^{(n+1)} = (t - n)t^{(n)}$. Отримаємо

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{n+1} S(n+1, k) t^k &= (t - n) \sum_{k=0}^n S(n, k) t^k = \\ &= \sum_{k=1}^n (S(n, k-1) - nS(n, k)) t^k + S(n, n) t^{(k+1)} - nS(n, 0) \end{aligned}$$

Врахуємо, що

$$S(n, n) = 1$$

$$S(n, 0) = 0$$

, де $n > 0$

Таким чином отримаємо рекурентне співвідношення для знаходження чисел Стирлінга першого роду:

$$S(n + 1, k) = S(n, k - 1) - nS(n, k)$$

,де $1 \leq k \leq n$

$$S(0, 0) = 1$$

$S(0, k) = 0$, де $k > 0$

Розглянемо зворотнє співвідношення:

$$t^{(n)} = \sum_{k=0}^n \varphi(n, k) t^{(k)}$$

Для $n = 1$

$$t = \varphi(1, 0) + \varphi(1, 1)t$$

Звідси:

$$\varphi(1, 0) = 0$$

$$\varphi(1, 1) = 0$$

Для $n = 2$

$$t^2 = \varphi(2, 0) + \varphi(2, 1) + \varphi(2, 2)t(t - 1)$$

Звідси знаходимо:

$$\phi(2, 0) = 0;$$

$$\phi(2, 2) = 1;$$

$$\phi(2, 1) = 1;$$

Врахуємо, що $t^{n+1} = t * t^n$, отримаємо:

$$\sum_{k=0}^{n+1} \varphi(n+1, k)t^{(k)} = t \sum_{k=0}^n \varphi(n, k)t^{(k)} = \sum_{k=0}^n \varphi(n, k)(t-k)t^{(k)} + \sum_{k=0}^n \varphi(n, k)kt^{(k)} =$$

$$\sum_{k=0}^n \varphi(n, k)t^{(k+1)} + \sum_{k=0}^n k\varphi(n, k)t^{(k)} = \sum_{k=1}^n (\varphi(n, k-1) + k\varphi(n, k))t^{(k)} + \varphi(n, n)t^{(n+1)}$$

Врахуємо, що

$$\varphi(n, n) = 1$$

$$\varphi(n, 0) = 0$$

, де $n > 0$

Отримаємо наступні рекурентні співвідношення для знаходження чисел Стирлінга другого роду:

$$\varphi(n+1, k) = \varphi(n, k-1) + k\varphi(n, k)$$