

Теорвер 7.

Шахматов Андрей, Б02-304

23 октября 2024 г.

Содержание

1	Т3	1
2	Т4	1
3	Т7	2

1 Т3

Начнём с сходимости по распределению:

$$F_{\xi_n} = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ (1 - p_n), & 0 \leq t < 1 \\ 1, & t \geq 1 \end{cases}$$

Тогда в случае $1 - p_n \rightarrow 1$ $F_{\xi_n} \rightarrow F_{\xi=0}$, из чего следует необходимым и достаточным условием слабой сходимости является $p_n \rightarrow 0$. Тогда так как сходимость является сходимостью к константе, то такие же условия накладываются и на сходимость по вероятности. Исследуем сходимоть в L_2 :

$$E\xi_n = p_n \rightarrow 0 \leftrightarrow p_n \rightarrow 0.$$

Остаётся сходимость почти наверное. Я не знаю, но думаю, что тут нужно будет по определению показывать только.

2 Т4

$$\forall m \in \mathbb{Z} P(\xi_n = m) = F_{\xi_n} \left(m + \frac{1}{2} \right) - F_{\xi_n} \left(m - \frac{1}{2} \right)$$

Что стремится к

$$F_{\xi} \left(m + \frac{1}{2} \right) - F_{\xi} \left(m - \frac{1}{2} \right) = F_{\xi}(m) - F_{\xi}(m-1) = P(\xi = m) \implies P(\xi_n = m) \rightarrow P(\xi = m).$$

Аналогично повторяя в обратную сторону получаем доказательство в другую сторону.

3 Т7

а) Иследуем на слабую сходимость к $\xi \equiv 1$. Распределение $F_{\max \xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n} = \prod_{k=1}^n F_k$. Каждое из этих распределений равно $F_k = t$ на $(0, 1)$, тогда их произведение:

$$\prod_{k=1}^n F_k = \prod_{k=1}^n t = t^n \rightarrow \begin{cases} 0, t < 1 \\ 1, t \geq 1 \end{cases}$$

Функция распределения $\xi = 1$ имеет такой же вид, потому по теореме Александрова имеет место слабая сходимость.

б) Согласно задаче Т2 слабая сходимость эквивалента сходимости по вероятности в случае сходимости к константе, поэтому сходимость по вероятности также имеет место.

в) Так как для последовательности выполнено, что $\eta_{n+1} \geq \eta_n$, то верно:

$$\{\omega \mid |\eta_{n+1} - 1| > \varepsilon\} \subset \{\omega \mid |\eta_n - 1| > \varepsilon\} \implies \bigcup_{n \geq N}^{\infty} \{\omega \mid |\eta_n - 1| > \varepsilon\} = \{\omega \mid |\eta_n - 1| > \varepsilon\}.$$

Тогда критерий сводимости почти наверное превращается в определение сходимости по мере, которую мы уже доказали. г) Иследуем на сходимость в среднем, как известно:

$$F_{\max \xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n} = t^n \implies \rho_{\max \xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n} = nt^{n-1} I(0, 1)$$

Тогда достаточно доказать, что $E \max(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n) \rightarrow 1$:

$$E \max(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n) = \int_0^1 nt^{n-1} dt = 1$$