



ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ СИНОСАН

Торговое название препарата: Синосан

Лекарственная форма: таблетки

Состав:

1 таблетка (250 мг) содержит:

действующие вещества: Cinnabaris (киноварь) trit. D3 25 мг, Echinacea (эхинацея) trit. D1 25 мг, Hydrastis (желтокорень канадский) trit. D3 25 мг, Kalium bichromicum (калия бихромат) trit. D3 25 мг;

вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, магния стеарат, крахмал пшеничный.

Описание: белые или почти белые, двухплоскостные таблетки со скошенной кромкой, иногда с отдельными темными точками.

Фармакотерапевтическая группа: гомеопатическое лекарственное средство.

Код ATX: R01B

Фармакологические свойства

Гомеопатическая терапия явно отличается от традиционной медицины в отношении понимания заболевания и использования лекарственных субстанций. Гомеопатические средства стимулируют защитные силы самого организма и активируют таким образом его потенциал самоизлечения. Ответ организма на гомеопатическое средство строго индивидуален. По этой причине дозоспецифические фармакологические эффекты, фармакодинамические или фармакокинетические данные не могут быть определены.

Показания к применению

Острый и хронический риносинусит.

Способ применения и дозы

Режим дозирования

Взрослые: при острой состояниях принимать по 1 таблетке каждый час, максимум 12 таблеток в день, до наступления улучшения. При дальнейшем лечении принимать по 1-2 таблетки 3 раза в день.

Педиатрическая группа

Дети от 2 до 5 лет: при острой состояниях – по 1 таблетке 3 раза в день до наступления улучшения. При дальнейшем лечении продолжать принимать по 1 таблетке 3 раза в день;

Дети от 6 до 11 лет: при острой состояниях – по 1 таблетке через каждые 2 часа (но не более 6 таблеток в день) до наступления улучшения. При дальнейшем лечении принимать по 1 таблетке 3 раза в день;

Дети от 12 лет и старше: при острой состояниях – по 1 таблетке через каждый час (но не более 12 таблеток в день) до наступления улучшения. При дальнейшем лечении принимать по 1-2 таблетке 3 раза в день.

При хронических состояниях детям и взрослым принимать по 1 таблетке 3 раза в день, рекомендуемая длительность лечения – 4-6 недель.

Синосан не рекомендуется принимать свыше 4 недель, не проконсультировавшись с врачом.

Способ применения

Таблетки следует принимать за полчаса до еды или через полчаса после еды, давая им медленно растворяться во рту. Маленьким детям рекомендуется растворять таблетку в небольшом количестве воды (например, в чайной ложке).

Побочные действия

В редких случаях возможны реакции гиперчувствительности, включая высыпания на коже и желудочно-кишечные расстройства. У больных, которые применяли другие препараты, содержащие эхинацею, наблюдались аллергические реакции (высыпания на коже, зуд, в редких случаях – отек лица, диспноэ, головокружение и снижение артериального давления).

Эхинацея может стать причиной возникновения аллергических реакций у атопических пациентов (например, у пациентов с сенной лихорадкой, нейродерматитом, аллергической астмой).

При возникновении таких нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и проконсультироваться с врачом.

При усилении слюноотделения после приема препарата Синосан рекомендуется снизить дозу или прекратить прием препарата.

Примечание: При применении гомеопатических лекарственных средств возможно временное первичное ухудшение. В этом случае следует прекратить прием препарата Синосан и проконсультироваться с врачом.

Противопоказания

Препарат не следует применять при известной гиперчувствительности к хрому, Echinacea и другим сложноцветным или к какому-либо из компонентов препарата.

Препарат не следует применять при прогрессирующих системных заболеваниях (таких как туберкулез, саркоидоз), системных заболеваниях системы белых кровяных телец (лейкемии и лейкозе), аутоиммунных заболеваниях (например, воспалительных заболеваниях коллагеновой ткани (коллагенозах), рассеянном склерозе), при иммунодефицитах (СПИД, ВИЧ-инфекция), при угнетенном состоянии иммунитета (например после трансплантации органов или трансплантации костного мозга, химиотерапии) или при хронических вирусных заболеваниях.

Препарат противопоказан детям до 2 лет и в период беременности.

Лекарственные взаимодействия

Взаимодействия с другими лекарственными средствами не известны. В случае, если пациент недавно принимал, принимает либо планирует принимать другие лекарственные препараты, рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Особые предостережения и меры предосторожности

Существует риск возможных анафилактических реакций у атопических пациентов. Перед применением данного лекарственного средства атопическим пациентам следует проконсультироваться с врачом.

Препарат содержит лактозу и пшеничный крахмал, поэтому пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, дефицитом лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не следует принимать препарат. Пшеничный крахмал может содержать глютен, но только в следовых количествах, поэтому он безопасен для людей с целиакией. Пациентам с аллергией на пшеницу (отличается от целиакии) не следует принимать препарат.

Проконсультируйтесь с врачом, если возникают следующие симптомы: отек лица, лихорадка или сильная головная боль, сохранение либо ухудшение острого состояния в течение первых 2-х дней лечения, а также появление дополнительных жалоб.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Не следует применять препарат в период беременности из-за содержания эхинацеи. Если Вы кормите грудью, проконсультируйтесь с врачом перед применением данного лекарственного средства.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.

Синосан не влияет на способность управлять автотранспортом или другими механизмами.

Передозировка.

В случае передозировки не наблюдалось никаких негативных последствий.

Форма выпуска.

По 20 таблеток в блистере из пленки ПВХ и фольги; по 5 блистеров вместе с инструкцией по применению в картонной коробке.

Условия хранения.

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C в недоступном для детей месте. Не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Срок годности.

5 лет.

Условия отпуска из аптек.

Без рецепта.

Производитель.

Дойче Хомеопати-Унион
ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ & Ко. КГ
Германия, 76227 Карлсруэ,
Оттоштрассе 24
Тел. +49 (721) 40 93 236

Доктор Вильмар Швабе ГмбХ & Ко. КГ
Германия, 76227 Карлсруэ,
Вильмар-Швабе Штрассе 4
Тел. +49 721 4005 0, +49 721 40005 165

Наименование и адрес организации, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств на территории Республики Узбекистан
ул. Навнихол 86

М. Улугбекский район
100041, Узбекистан, г. Ташкент,
Тел.: +99871 230 91 93
E-mail: infopharmaff@gmail.com

«25» 04.

2018 y. № 10

ТИББИЁТДА ҚҮЛЛАНИЛИШИГА ДОИР ЙЎРИҚНОМА СИНОСАН

Препаратнинг савдо номи: Синосан

Дори шакли: таблеткалар

Таркиби:

1 таблетка (250 мг) күйидагиларни сақлайди:

фаол моддалар: Cinnabaris (киноварь) trit. D3 25 мг, Echinacea (эхинацея) trit. D1 25 мг, Hydrastis (канада сариқ илдизи) trit. D3 25 мг, Kalium bichromicum (калий бихромати) trit. D3 25 мг;

ёрдамчи моддалар: лактоза моногидрати, магний стеарати, буғдой крахмали.

Таърифи: оқ ёки деярли оқ, икки томони ясси юзали четлари кесилган, баъзида айрим тўқ нукталари бўлган таблеткалар.

Фармакотерапевтик гуруҳи: гомеопатик дори воситалари.

Код ATХ: R01B

Фармакологик хусусиятлари

Гомеопатик даволаш усули касалликни тушиниш маъносига ва дори субстанцияларини қўлланишида анъанавий тиббиётдан аҳамиятли фарқ қиласди. Гомеопатик воситалар организмнинг шахсий ҳимоя кучларини рағбарлантиради, ҳамда ўзини-ўзи даволаш қобилиятини фаоллаштиради. Гомеопатик воситаларга организмнинг жавоби қатъий индивидуалдир. Шу сабабларга кўра доза-специфик самарани, ҳамда фармакодинамик ва фармакокинетик маълумотларни аниқлашнинг имконияти йўқ.

Қўлланилиши

Ўткир ва сурункали риносинуситни даволаш учун қўлланади.

Қўллаш усули ва дозалари

Дозалаш тартиби

Катталар: ўткир ҳолатларда ҳар соатда 1 таблеткадан, максимал кунига 12 таблеткадан яхшиланиш юз бергунгача. *Кейинги даволашда* 1-2 таблеткадан кунига 3 марта қабул қилинади.

Педиатрик гуруҳ

2 дан 5 ёшгacha болалар: ўткир ҳолатларда – 1 таблеткадан кунига 3 марта яхшиланиш пайдо бўлгунгача;

6 дан 11 ёшгacha болалар: ўткир ҳолатларда – 1 таблеткадан ҳар 2 соатда (кунига 6 таблеткадан кўп эмас) яхшиланиш пайдо бўлгунгача; Кейинчалик даволашда 1 таблеткадан кунига 3 марта.

12 ёшдан ва ундан катта болалар: ўткир ҳолатларда – 1 таблеткадан ҳар соатда (кунига 12 таблеткадан кўп эмас) яхшиланиш пайдо бўлгунгача; Кейинчалик даволашда 1-2 таблеткадан кунига 3 марта қабул қилиш керак.

Сурункали ҳолатларда болалар ва катталарга 1 таблеткадан кунига 3 марта қабул қилиш керак, тавсия этилган даволаш давомийлиги – 4-6 хафта.

Синосанни шифокор маслахатисиз 4 хафтадан кўп қабул қилиш тавсия этилмайди.

Кўллаш усули

Таблеткаларни оғизда аста-секин эришига имкон беріб, овқатдан ярим соат олдин ёки овқатдан ярим соат кейин қабул қилиш керак. Кичик болаларга таблеткаларни оз миқдордаги сувда әритиш тавсия этилади.

Ножұя таъсирлари

Кам ҳолларда юқори сезувчанлик реакциялари, шу жумладан терида тошмалар ва меъда-ичак бузилишлари. Бошқа эхинацея сақловчи препараттарни қўллаган беморларда аллергик реакциялар (терида тошмалар, қичишиш, кам ҳолларда – юз шиши, диспноэ, бош айланиши ва артериал босимни пасайиши) кузатилган.

Эхинацея атопик пациентларда аллергик реакциялар пайдо бўлишига сабаб бўлиши мумкин (масалан, пичан иситмаси, нейродерматит, аллергик астмаси бўлган пациентлар).

Бундай кутилмаган реакциялар пайдо бўлганида препаратни қўллашни бекор қилиш ва шифокор билан маслахатлашиш керак.

Синосан препаратини қабул қилгандан кейин сўлак ажралиши кучайса дозани камайтириш ёки препаратни қабул қилишни тўхтатиш керак.

Изоҳ: Гомеопатик дори воситаларини қўллаганда вақтингчалик бирламчи ёмонлашиш кузатилиши мумкин. Бундай ҳолларда Синосан препаратини қабул қилишни бекор қилиш ва шифокор билан маслахатлашиш керак.

Қўллаш мумкин бўлмаган ҳолатлар

Препаратни хромга, Echinacea ва бошқа мураккаб гулли ёки хар қандай препаратнинг компонентларига маълум бўлган юқори сезувчанлиқда қўллаш мумкин эмас.

Препаратни тизимли касалликларни авж олишида (туберкулёз, саркоидоз каби), оқ қон танаачалари тизими тизимли касалликлари, аутоиммун касалликларда (масалан, коллаген тўқималарининг яллигланиш касалликларида (коллагенозларда), ёйилган склерозда)), иммунтанқисликларда (ОИТС, ОВИ-инфекциялари), иммунитетни сусайган ҳолатларида (масалан аъзолар трансплантациясидан ёки мия кўмиги трансплантациясидан, кимётерапиядан кейин) ёки сурункали вирусли касалликларда қўллаш мумкин эмас.

Препаратни 2 ёшгача бўлган болаларга ва ҳомиладорлик даврида қўллаш мумкин эмас.

Дориларнинг ўзаро таъсири

Хозирги вактгача бошқа дори воситалари билан ўзаро таъсири номаълум. Агар пациент бошқа дори воситаларини қабул қилган, қабул қилаётган ёки қабул қилишни режалаштираётган бўлса шифокор билан маслахатлашинг.

Махсус кўрсатмалар

Атопик пациентларда анафилактик реакцияларни кутилиш хавфи мавжуд. Ушбу дори воситасини атопик пациентларга қўллашдан олдин шифокор билан маслахатлашиш керак.

Препаратни лактоза ва буғдой крахмали сақлайди, шунинг учун кам наслий галактозани ўзлаштираолмайдиган, лактаза танқислигини ёки глюкозо-галактоза мальабсорбцияси бўлган пациентларга қабул қилиш мумкин эмас. Буғдой крахмали глютен сақлаши мумкин, фақат оз миқдорда, шунинг учун целиакияси бўлган одамлар учун хавфсизdir.

Агар қуйидаги симптомлар пайдо бўлса шифокор билан маслахатлашинг: юз шиши, иситма ёки кучли бош оғриғи, 2 кун даволаниш давомида ўткир холатни сақланиши ёки ёмонлашиши, шу жумладан қўшимча шикоятлар пайдо бўлиши.

Ҳомиладорлик ёки эмизии даврида қўлланилиши

Препаратни ҳомиладорлик даврида эхинацеяни сақланиши туфайли қўллаш мумкин эмас.

Агар Сиз эмизаётган бўлсангиз ушбу дори воситасини қўллашдан олдин шифокор билан маслахатлашинг.

Автотранспортни бошқарыш ёки бошқа механизмлар билан ишлашида реакция тезлиги қобилиятига таъсири.

Синосан автотранспортни бошқарыш ёки бошқа механизмлар билан ишлаш қобилиятига таъсири килмайди.

Дозани ошириб юборилиши.

Доза ошириб юборилганда ҳеч қандай салбий асоратлар кузатилмаган.

Чиқарилиш шакли

20 таблеткадан ПВХ плёнкали ва фольгали блистерда; 5 блистердан қўллаш бўйича йўрикномаси билан картон қутида.

Сақлаш шароити

Оригинал ўрамда 25°C дан юқори бўлмаган хароратда, болалар ололмайдиган жойда сақлансин.

Яроқлилик муддати

5 йил.

Ўрамида кўрсатилган яроқлилик муддати ўтгач қўлланилмасин.

Дорихоналардан бериш тартиби

Рецептсиз.

Ишлаб чиқарувчи

Дойче Хомеопати-Унион

ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ & Ко. КГ

Германия, 76227 Карлсруэ,

Оттоштрассе 24

Тел. +49 (721) 40 93 236

Доктор Вильмар Швабе ГмбХ & Ко. КГ

Германия, 76227 Карлсруэ,

Вильмар-Швабе Штрассе 4

Тел. 49 (0)721 4005 0, +49 (0)721 40005 165

Ўзбекистон Республикаси худудида дори воситаларининг сифати бўйича эътиrozлар (таклифлар) ни қабул қилувчи ташкилот номи ва манзили

86, Навниҳол

М. Улугбек тумани,

100041, Тошкент ш., Ўзбекистон

тел: +99871 230 91 93

E-mail: infopharmaff@gmail.com