

## 莫比乌斯反演与杜教筛

公告

### 侵权

以下内容均来自TA爷课件，我只是改了几个小的地方qwq

请关闭浏览器的极速模式后阅读（极速模式显示的公式为什么辣么粗糙啊qwq）

### 枚举除法

- $\lfloor \frac{n}{i} \rfloor$  只有  $O(\sqrt{n})$  种取值。
- 对于  $i$ ,  $\lfloor \frac{n}{\lfloor \frac{n}{i} \rfloor} \rfloor$  是与  $i$  被  $n$  除并下取整取值相同的一段区间的右端点。
- 一个很有用的性质:  $\lfloor \frac{n}{ab} \rfloor = \lfloor \frac{\lfloor \frac{n}{a} \rfloor}{b} \rfloor = \lfloor \frac{\lfloor \frac{n}{b} \rfloor}{a} \rfloor$
- 上取整也有3所述的性质。

### 积性函数

- $f(ab) = f(a)f(b), (a, b) = 1$
- 完全积性: 不要求  $(a, b) = 1$
- 考虑时一般会考虑成  $f(x) = \prod_i f(p_i^{k_i})$
- 当  $f$  不是0的常值函数时,  $f(1) = 1$
- 积性函数的狄利克雷前缀和也是积性函数。

$$s(n) = \sum_{d|n} f(d) = \prod_i \sum_{j=0}^{k_i} f(p_i^j)$$

- 两个积性函数的狄利克雷卷积也是积性函数。

$$c(n) = \sum_{d|n} a(d)b\left(\frac{n}{d}\right) = \prod_i \sum_{j=0}^{k_i} a(p_i^j) b(p_i^{k_i-j})$$

- 积性函数可以线性筛出。线筛可以找到每个数  $x$  的最小质因子  $p_1$  及其次数  $k_1$ 。如果我们能以较小的代价 ( $O(1)$ ) 求出  $f(p_1^{k_1})$ , 便可以线筛了。

### 初等积性函数 $\mu$

- 栗子: 给定  $n, m$ , 求  $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m [i \perp j], n, m \leq 10^9$ , 不用  $\mu$  怎么做?

容斥! 设  $dp$  数组  $f(i, j)$  为当  $n = i, m = j$  时的答案。

$$f(n, m) = nm - \sum_{i=2}^{\min(n, m)} f\left(\left\lfloor \frac{n}{i} \right\rfloor, \left\lfloor \frac{m}{i} \right\rfloor\right)$$

$$\text{时间复杂度 } O\left(\sum_{i=1}^{\lfloor \sqrt{n} \rfloor} \left(\sqrt{\left\lfloor \frac{n}{i} \right\rfloor} + \sqrt{i}\right)\right) = O\left(n^{\frac{3}{4}}\right)$$

那么  $\mu$  是什么? 就是容斥系数!

$$\mu(1) = 1, \mu(2) = -1, \mu(3) = -1, \mu(4) = 0, \mu(5) = -1 \dots$$

$$\mu(n) = \begin{cases} 0 & , \exists x^2 | n \\ (-1)^k & , n = \prod_{i=1}^k p_i \end{cases}$$

$\mu$  显然是一个积性函数。



abclzr

"Winter has come."

我的QQ→  QQ交谈

我的朋友

BearChild  
cloverhxy  
xiaoyimi  
ShallWe  
reflash  
zyf2000  
flipped  
DaD3zZ  
mraser  
DMoon  
Menci  
BeiYu  
Yveh  
ATP

昵称: abclzr  
园龄: 1年7个月  
粉丝: 13  
关注: 0  
[+加关注](#)

| 2017年7月 |    |    |    |    |    |    |
|---------|----|----|----|----|----|----|
| 日       | 一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  |
| 25      | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1  |
| 2       | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 9       | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16      | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23      | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30      | 31 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |

搜索

[找我看](#)

随笔分类

啊给跪了的坑, %%%以后再看  
(4)  
动态规划-单调性优化(7)  
动态规划-递推/计数(20)  
动态规划-轮廓线/插头DP(3)  
动态规划-树形DP(12)  
动态规划-数位DP(3)  
动态规划-状压DP(5)  
计算几何-半平面交(2)  
计算几何-初步(18)

返回顶部

2.

$$\sum_{d|n} \mu(d) = \begin{cases} 0 & , n \neq 1 \\ 1 & , n = 1 \end{cases}$$

3. 莫比乌斯反演

$$F(n) = \sum_{d|n} f(d)$$

$$f(n) = \sum_{d|n} F(d) \mu\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{d|n} f(d) \sum_{g|\frac{n}{d}} \mu(g) = f(n)$$

$$F(n) = \sum_{n|d} f(d)$$

$$f(n) = \sum_{n|d} F(d) \mu\left(\frac{d}{n}\right) = \sum_{n|d} f(d) \sum_{g|\frac{d}{n}} \mu(g) = f(n)$$

4. 回到栗子:

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m [i \perp j] = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \sum_{d|(i,j)} \mu(d) = \sum_{d=1}^{\min(n,m)} \mu(d) \left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor \left\lfloor \frac{m}{d} \right\rfloor$$

当然这样还是做不了。。。.

所以我们需要杜教筛! (后面再说吧。。.)

不过大多数 $\mu$ 的题(第一步)这么化, 所以这个式子还是比较重要的。

## 初等积性函数 $\varphi$

1.  $\varphi(n) = 1 \sim n$ 与 $n$ 互质的数的个数

所以由定义便可直接写出:

$$\varphi(n) = \sum_{d|n} \mu(d) \frac{n}{d} = \prod_i \sum_{j=0}^{k_i} \mu(p_i^j) p_i^{k_i-j} = \prod_i p_i^{k_i-1} (p_i - 1)$$

这样就可以线筛出来了, 而且可以看出 $\varphi$ 是一个积性函数。2. 从刚才的式子可以看出,  $\varphi$ 完全可以用 $\mu$ 代替, 那么我们为什么需要 $\varphi$ 呢?

很大一部分原因是它定义比较直观, 比较容易想到。

3.  $\varphi$ 的性质:

$$\sum_{d|n} \varphi(d) = \sum_{d|n} d \sum_{g|\frac{n}{d}} \mu(g) = n$$

4. 栗子: 求 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (i, j)$ , 多组数据,  $t, n, m \leq 10^5$ 。

$$ans = \sum_{i=1}^{\min(n,m)} \varphi(i) \left\lfloor \frac{n}{i} \right\rfloor \left\lfloor \frac{m}{i} \right\rfloor$$

## 杜教筛

1. 求 $\sum_{i=1}^n \mu(i), n \leq 10^{11}$ 直接求不好求, 但是我们有 $\sum_{i=1}^n \sum_{d|i} \mu(d) = 1$ 化一下蛤:  $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{\lfloor \frac{n}{i} \rfloor} \mu(j) = 1, \sum_{i=1}^n \mu(i) = 1 - \sum_{i=2}^n \sum_{j=1}^{\lfloor \frac{n}{i} \rfloor} \mu(j)$ 

核心思想是枚举约数, 这样就可以递推/递归求解了。

时间复杂度 $O\left(n^{\frac{3}{4}}\right)$ 。

计算几何-旋转卡壳(2)

其他-bitset(1)

其他-Kruskal(10)

其他-倍增(8)

其他-分块(10)

其他-分治(9)

其他-高精度(2)

其他-构造(1)

其他-哈希(10)

其他-莫队(4)

其他-三分(1)

其他-贪心(6)

其他-游记(3)

其他-整体二分(2)

数据结构-KDTree(2)

数据结构-Splay(12)

数据结构-点分治(8)

数据结构-动态树(9)

数据结构-块状链表(2)

数据结构-树链剖分(5)

数据结构-线段树(25)

数据结构-主席树(11)

数据结构-左偏树(2)

数学-BSGS(2)

数学-FFT/NTT(7)

数学-博弈论(7)

数学-杜教筛/洲哥筛(5)

数学-概率与期望(4)

数学-高斯消元(7)

数学-矩阵乘法(3)

数学-莫比乌斯反演(15)

数学-欧拉筛(22)

数学-群论(5)

数学-容斥原理(4)

数学-数论(29)

数学-线性规划(1)

数学-组合数学(7)

搜索-A\*/IDA\*(5)

搜索-剪枝优化(8)

图论-2-SAT(2)

图论-tarjan(6)

图论-带花树(2)

图论-拓扑排序(1)

图论-网络流(12)

图论-仙人掌(1)

图论-最短路(9)

字符串-AC自动机(10)

字符串-KMP(3)

字符串-manacher(2)

字符串-后缀数组(16)

字符串-后缀自动机(11)

## 最新评论

1. Re: 【博客相关】

“盗”学长一波图的飘过

--Nietzeche

2. Re: SDOI 2017 Round2

退役了

qqq高考进THU啊!

--BearChild

3. Re: 【UOJ #201】 【CTSC 2016】单调上升路径

%%%

--outer\_form

4. Re: 莫比乌斯反演与杜教筛

@Bleacher是的, 谢谢, 已改正~...

--abclzr

但是注意到当 $n$ 比较小的时候其实我们可以 $O(n)$ 线筛出来。

所以我们考虑分类讨论，线筛出 $\leq B$ 的， $> B$ 的递推。

$$\text{时间复杂度 } O\left(B + \sum_{i=1}^{\frac{n}{B}} \sqrt{\frac{n}{i}}\right) = O\left(B + \frac{n}{\sqrt{B}}\right)$$

求导一下可知在 $B = n^{\frac{2}{3}}$ 时取得最小值 $O(n^{\frac{2}{3}})$ 。

2. 回到栗子：这样的话最初的栗子就会做了吧~

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m [i \perp j] = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \sum_{d|(i,j)} \mu(d) = \sum_{d=1}^{\min(n,m)} \mu(d) \left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor \left\lfloor \frac{m}{d} \right\rfloor$$

注意到杜教筛的时候不仅是求出了 $\sum_{j=1}^n \mu(j)$ ，还顺便求出了所有的 $\sum_{j=1}^{\lfloor \frac{n}{d} \rfloor} \mu(j)$ ，所以可以和普通的枚举除法完美契合。

3. 那么怎么求 $\sum_{i=1}^n \varphi(i)$ ?

$$\frac{n(n+1)}{2} = \sum_{i=1}^n \sum_{d|i} \varphi(d) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{\lfloor \frac{n}{i} \rfloor} \varphi(j)$$

## 下面讲些题吧~ (不一定是反演哦)

1. 求 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m lcm(i, j)$ ,  $n, m \leq 10^{11}$

$$\begin{aligned} & \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m lcm(i, j) \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \frac{ij}{(i, j)} \\ &= \sum_{i=1}^{\min(n, m)} i \sum_{j=1}^{\min(\lfloor \frac{n}{i} \rfloor, \lfloor \frac{m}{i} \rfloor)} \mu(j) j^2 \frac{\lfloor \frac{n}{ij} \rfloor (\lfloor \frac{n}{ij} \rfloor + 1)}{2} \frac{\lfloor \frac{m}{ij} \rfloor (\lfloor \frac{m}{ij} \rfloor + 1)}{2} \end{aligned}$$

如果我们可以杜教筛出 $\sum_{i=1}^n \mu(i) i^2$ ，就可以做到 $O(n^{\frac{3}{4}})$ 。

这是可以的

$$1 = \sum_{i=1}^n \sum_{d|i} \mu(d) d^2 \left(\frac{i}{d}\right)^2 = \sum_{i=1}^n i^2 \sum_{j=1}^{\lfloor \frac{n}{i} \rfloor} \mu(j) j^2$$

但是我们当然不必这么做。

可以直接令 $f(n, m)$ 表示 $(1 \sim n, 1 \sim m)$ 中所有互质数对乘积和。

$$\text{那么 } f(n, m) = \frac{n(n+1)m(m+1)}{4} - \sum_{i=2}^{\min(n, m)} i^2 f\left(\left\lfloor \frac{n}{i} \right\rfloor, \left\lfloor \frac{m}{i} \right\rfloor\right), \text{ 直接dp就好了。}$$

但是我们需要 $O(n^{\frac{2}{3}})$

$$\sum_{i=1}^{\min(n, m)} \frac{\lfloor \frac{n}{i} \rfloor (\lfloor \frac{n}{i} \rfloor + 1) \lfloor \frac{m}{i} \rfloor (\lfloor \frac{m}{i} \rfloor + 1)}{4} i \sum_{d|i} \mu(d) d$$

枚举除法，我们便只需求 $\sum_{i=1}^n i \sum_{d|i} \mu(d) d$

它等于 $\sum_{i=1}^n i \sum_{j=1}^{\lfloor \frac{n}{i} \rfloor} \mu(j) j^2$

我们先求出 $\sum_{i=1}^n \mu(i) i^2$

这个刚才已经讲过了。

5. Re:莫比乌斯反演与杜教筛  
楼主,那个积性函数的第5,6条  
的j是不是该从0开始枚举呢...  
--Bleacher

然后前者便可以预处理+直接求。

预处理的时候需要线性筛

$$\sum_{d|n} \mu(d)d = \prod_i (1 - p_i)$$

这题中涉及一种很重要的杜教筛的思路。

就是对于不能直接杜教筛的式子，可以将其与另一个前缀和易求的积性函数狄利克雷卷积，使得卷积后的函数前缀和也易求。

比如这道题就是与  $f(x) = x^2$  卷积。

这道题也涉及到一些常见的化式子的方法。

$\gcd \rightarrow \mu, \mu \rightarrow \varphi$

对于  $i, j, ij$  三项贡献的这种，可以枚举  $ij$  将其化为狄利克雷卷积，也可以枚举  $i$  和  $j$  化成带下取整的式子；一般来讲前者往往易于预处理，可以应付多组询问，后者则在单次询问中有优秀表现。

## 2. SDOI2015 约数个数和

求  $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m d(i, j)$ ，多组数据， $T, n, m \leq 10^5$ ， $d(i, j) = \sum_{x|i} \sum_{y|j} [x \perp y]$

$$\begin{aligned} & \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \sum_{x|i} \sum_{y|j} [x \perp y] \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \left\lfloor \frac{n}{i} \right\rfloor \left\lfloor \frac{m}{j} \right\rfloor \sum_d \mu(d) [d|i] [d|j] \\ &= \sum_{d=1}^{\min(n, m)} \mu(d) \left( \sum_{i=1}^{\lfloor \frac{n}{d} \rfloor} \left\lfloor \frac{\frac{n}{d}}{i} \right\rfloor \right) \left( \sum_{j=1}^{\lfloor \frac{m}{d} \rfloor} \left\lfloor \frac{\frac{m}{d}}{j} \right\rfloor \right) \end{aligned}$$

预处理  $O(n \log n) / O(n\sqrt{n})$ ，查询  $O(T\sqrt{n})$

## 3. BZOJ2820 YY的gcd

求  $(x, y) = \text{质数}$ ， $x \in [1, n]$ ， $y \in [1, m]$  的数对个数。多组数据， $n, m \leq 10^7$ ， $T \leq 10^4$

$$\begin{aligned} & \sum_{p \leq \min(n, m)} \sum_{i=1}^{\lfloor \frac{n}{p} \rfloor} \sum_{j=1}^{\lfloor \frac{m}{p} \rfloor} [i \perp j] \\ &= \sum_{p \leq \min(n, m)} \sum_{i=1}^{\lfloor \frac{n}{p} \rfloor} \sum_{j=1}^{\lfloor \frac{m}{p} \rfloor} \sum_d \mu(d) [d \perp i] [d \perp j] \\ &= \sum_{i=1}^n \left\lfloor \frac{n}{i} \right\rfloor \left\lfloor \frac{m}{i} \right\rfloor \sum_{p|i} \mu\left(\frac{i}{p}\right) \end{aligned}$$

预处理  $O(n) / O(n \lg \lg n)$ ，查询  $O(T\sqrt{n})$

## 4. FZU2016 how many tuples

有  $m$  个数，第  $i$  个数的取值范围是  $[1, a_i]$ ，求这  $m$  个数  $\gcd$  为 1 的方案数。多组数据，10s 时限， $t \leq 10^3$ ， $m \leq 20$ ， $a_i \leq 10^8$

$$\sum_{i=1}^{\min(a_i) (1 \leq i \leq m)} \mu(i) \prod_{j=1}^m \left\lfloor \frac{a_j}{i} \right\rfloor$$

直接杜教筛就可以了，杜教筛的时候预处理  $10^7$ 。

枚举除法的时候需要用堆。时间复杂度  $O(Tm\sqrt{A} \log m)$

## 5. CQOI2015 选数

求从  $[L, R]$  中选  $N$  个数，其  $\gcd$  等于  $K$  的方案数。 $N, K, L, R \leq 10^9$ ， $R - L \leq 10^5$

如果  $N$  个数互不相同，那么  $\gcd$  至多是  $R - L$ ，所以我们分情况讨论。

所以设  $f(i)$  表示  $\gcd$  是  $K * i$  的方案数，要求  $\left\lfloor \frac{R}{iK} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{L-1}{iK} \right\rfloor > 1$

$$f(i) = \left( \left\lfloor \frac{R}{iK} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{L-1}{iK} \right\rfloor \right)^N - \sum_{j=2}^{\lfloor \frac{R}{iK} \rfloor - 1} f(ij)$$

最后再加上 $[L \leq K \leq R]$   
时间复杂度 $O((R - L) \log K)$

NOI 2017 Bless All

分类: [数学-莫比乌斯反演](#), [数学-数论](#), [数学-杜教筛/洲哥筛](#)

[好文要顶](#)[关注我](#)[收藏该文](#)



abclzr

关注 - 0

粉丝 - 13

0

0

+加关注

« 上一篇: [【BZOJ 3993】 【SDOI 2015】 星际战争](#)  
» 下一篇: [【51Nod 1244】 莫比乌斯函数之和](#)

posted @ 2017-01-02 08:56 abclzr 阅读(1810) 评论(7) 编辑 收藏

评论列表

#1楼 2017-04-15 12:13 Candy?  
为什么我感觉题目1的第一个做法做不到 $O(n^{3/4})$ , 因为后面带着 $\frac{n}{ij}$ 的形式怎么处理啊 我太弱了 求教  
支持(0) 反对(0)

#2楼[楼主] 2017-04-15 14:25 abclzr  
@ Candy?  
对于前面每个固定的 $\lfloor \frac{n}{i} \rfloor$ ,  $\lfloor \frac{m}{i} \rfloor$ , 后面的 $\lfloor \frac{n}{ij} \rfloor$ ,  $\lfloor \frac{m}{ij} \rfloor$ 只有 $O(\sqrt{n})$ 种取值。前面分段求和套后面分段求和, 积分分析复杂度不是 $O\left(n^{\frac{3}{4}}\right)$ 的吗?  
支持(0) 反对(0)

#3楼 2017-04-15 15:30 Candy?  
@ abclzr  
就是说对于一个数 $n$ 的所有不同 $\frac{n}{i}$ 的取值, 他们的 $\frac{1}{2}$ 方后求和的结果为 $n^{\frac{3}{4}}$ 吗!  
支持(0) 反对(0)

#4楼[楼主] 2017-04-15 15:40 abclzr  
@ Candy?  
没错!  $f(x) = \frac{n}{x}$ ,  $\int_0^{\sqrt{n}} f(x) dx = n^{\frac{3}{4}}$ , 只考虑 $\frac{n}{x} > \sqrt{n}$ 的, 小于 $\sqrt{n}$ 的积分后一定比大于 $\sqrt{n}$ 的要小。  
支持(1) 反对(0)

#5楼 2017-04-15 16:02 Candy?  
和杜教筛的复杂度分析好像啊 谢谢啦!  
支持(0) 反对(0)

#6楼 2017-04-30 22:02 Bleacher  
楼主,那个积性函数的第5,6条的j是不是该从0开始枚举呢...  
支持(0) 反对(1)

#7楼[楼主] 2017-05-01 11:16 abclzr

返回顶部

@ Bleacher  
是的，谢谢，已改正~

支持(0) 反对(0)

[刷新评论](#) [刷新页面](#) [返回顶部](#)

注册用户登录后才能发表评论，请 [登录](#) 或 [注册](#)，[访问](#)网站首页。

【推荐】50万行VC++源码：大型组态工控、电力仿真CAD与GIS源码库

【免费】从零开始学编程，开发者专属实验平台免费实践！



历史上的今天：

2016-01-02 [vijos p1523](#) 贪吃的九头龙 [思考思考再思考](#)，就荒废了4小时

2016-01-02 [Vijos p1518](#) 河流 [转二叉树左儿子又兄弟](#)

Copyright ©2017 abclzr