

Catalog of stationary bowshock arcs in the Orion Nebula

Alumno: Luis Angel Gutiérrez Soto

Tutor: Dr. William Henney

17 de julio de 2014

1 Introducción

1.1 Orión y la formación estelar

Orión es la region de formación estelar más estudiada, debido a que las estrellas jóvenes y el gas nos proporcionan señales claras sobre la física en los procesos de la formación estelar, la formación, evolución y destrucción de las nubes en las que se forman las estrellas, además nos dan pistas claves y sutiles de la dinámica del medio interestelar y del papel que cumplen las estrellas de alta masa y las asociaciones OB en los ciclos del gas entre las distintas fases del medio interestelar.

1.1.1 Estrellas masivas en Orión

La vecindad solar es un caso particular donde es posible el estudio de los movimientos y distribuciones de las estrellas jóvenes relacionadas con el gas, que nos permiten trazar la historia de la formación estelar y la del medio interestelar. Como hay estrellas masivas, se crean regiones HII y estas junto a estrellas T-Tauri de baja masa trazar los sitios más recientes de formación estelar con edades entre 3 y 5 Myr (Jhon Bally, 2008), de la misma manera las asociaciones OB pueden trazar la historia de la formación estelar. Las asociaciones OB son las estrellas más masivas de la región, con ellas se pueden identificar lugares donde se han formado estrellas hace 40 Myr. Es así que las posiciones, velocidades, edades y masas de estrellas jóvenes y las propiedades del gas relacionadas con las asociaciones OB, son claves para entender la historia de la formación de estrellas y el origen, evolución y destrucción de las nubes moleculares en los últimos 100 años, logrando con esto desentrañar la naturaleza y la reciente historia del medio interestelar vinculada al nacimiento de las estrellas en esta región de la Vía Láctea.

Como el objetivo de nuestro estudio está centrado en la formación de estrellas jóvenes de baja masa asociadas a estrellas masivas y regiones HII, nos concentraremos particularmente en Orión. No obstante las asociaciones OB en Orión consiste en un grupo de estrellas de diferentes edades que están parcialmente superpuestas a lo largo de nuestra línea de visión (Briceño), dentro de estas región existen variós de estos subgrupos OB integradas por este tipo de estrellas másivas. Por ejemplo tenemos el grupo OB1a, del cual muchos trabajos coinciden de que se trata del grupo de estrellas másivas más viejo de esta región, se encuentra ubicado en el noroesta del Cinturón de Orión y su edad oscila entre 8 y 12 Myr (Blaauw 1991; Brown 1994) dentro de este grupo hay un subgrupo conocido como el grupo 25 Orionis (25 Orionis group en inglés). El subgrupo OB1b, está centrado en el cinturón y se ha estimado que su edad comprende un rango entre 1.7 y 8 Myr, esto último es inconsistente con la presencia de las tres estrellas gigantes (Ori, ϵ Ori y Ori) puesto que deberían ser al menos 5 Myr más viejas, deacuerdo lo que dicen sus masas.

En esta región se encuentra el subgrupo OB1c con edades entre 2 a 6 Myr, consiste básicamente en estrellas que se encuentran en Orion's Sword por su nombre en inglés, justamente frente de la Nebulosa de Orión. Este subgrupo contiene dos cúmulos, NGS 1980 ubicado en el extremo sur de Sword y NGS 1981 situada en el extremo norte (figura Bally). Las estrellas más viejas en el Sword se superponen con poblaciones de estrellas mucho más jóvenes asociadas a la Nebulosa de Orión, M43, NGC 1977, OMC1 y 3 regiones en el Integral Shaped Filament en el extremo norte de la nube molecular Orión A. Por otro lado tenemos a OB1d, que está formado por las estrellas de el cúmulo de la Nebulosa de Orión (ONC por sus siglas en inglés) situada en la nube molecular Orión A y por NGC 2024 ubicada en la nube molecular Orión B, son los dos cúmulos más grandes de este grupo que además resulta ser joven, es decir con edades que van desde 2 Myr (Muench et al). Es difícil separar estos dos tipos de poblaciones estelares, puesto que no es claro aún si estos dos subgrupos (1c y 1d) representan diferentes poblaciones o más bien son grupos estelares jóvenes y viejos que se formaron en la nebulosa de Orión en diferentes épocas, que desde luego han emigrado.

1.1.2 Formación estelar en Orión

Es bien sabido que la formación estelar ocurre cuando grandes nubes moleculares como Orión colapsan debido a su propia gravedad, es en ese momento cuando se desencadena la formación de estrellas de alta y baja masa. Como ya se dijo; en Orión tales fenómenos están presentes. Por ejemplo el subgrupo OB1d además de contener; el cúmulo de la nebulosa de Orión (ONC) y a NGC 2024 como se describió arriba, contiene una docena de pequeños cúmulos y una distribución de estrellas en el fondo que están mas o menos aisladas, que se han formado en núcleos a lo largo de nubes moleculares en Orión, es el caso de las estrellas formadas en NGC 2068 y 2071 en Orión (ver capítulo Allen y Davis). Varios miles de estrellas en su mayoría de baja masa, miembros del subgrupo 1d




Figura 1: Campo amplio de la región de Orión, que muestra los diferentes subgrupos formados por las osociaciones OB. Tomado de wikipedia.org

fueron formadas a partir de “integral shaped filament” (Bally et al 1987; Johnstone y Bally 1999) en la parte Norte de la nube molecular Orión A que contiene como ya sabemos a la Nebulosa de Orión. Entonces cerca de 2000 estrellas de baja masa con edades menores a 10^6 años están concentradas alrededor de un cúmulo de estrellas másivas denominado el trapezio en la misma nebulosa de Orión (Hillenbrand 1997). Hay que subrayar que cientos se están formando en el núcleo denso de OMC2 y en 3 núcleos situados en la parte norte de la Nebulosa de Orión. Hay que decir, que hay otro tipo de objetos que se han formado bajo estas circunstancias (proplyds y objetos LL) de los cuales hablaremos más adelante. A pesar de que no se sabe con certeza acerca de todos los miembros de la asociación OB, es probable que entre 5000 y 20000 estrellas se han formado en la región de Orión en los últimos 15 Myr. No obstante las edades y ubicaciones de varios subgrupos en Orión indican que la formación de estrellas, ha sido propagada a través de la nube de Orión de una forma secuencial (Bally este).

Ya desde hace muchos años se tiene conocimiento de que las estrellas fujitivas son conumente las estrellas O, raramente se da entre estrellas B y es inexistente en las estrellas de tipo espectral posteriores a las ya mencionadas (Gies y Bolton 1986; Gies 1987), en este sentido Orión es una fuente de varias estrellas fujitivas, dentro de esta se incluyen a Ae Aurigae que tiene una velocidad de 150 km/sg y a u Columbae con una velocidad de 117 km/sg moviendose exactamente en la dirección opuesta (Bauuw 1991). Ahora datos de Hipparcos sobre movimientos propios han mostrado que estas estrellas y la colisión de vientos de rayos-x de la binaria ι Ori, estaban ubicadas en la misma posición en el cielo hace más o menos 2.6 Myr (Hoovergerwerf, de Bruijne y Zeeuw 2001), algunos científicos han argumentado que estas dos estrellas (Ae Aurigae y u columbae) junto a ι Ori experimentaron una interacción de cuatro cuerpos que los llevó a sufrir cambios significativos, de tal manera que las estrellas más masivas se volvieron la binaria c Ori, mientras que para las estrellas menos masivas la suerte fue otra, puesto que la energía gravitacional liberado durante el encuentro lanzó a estas dos estrellas fuera de la región a muy altas velocidades (Gualandris, Portegies-Zwart y Eggleton 2004).

Tenemos que los movimientos propios en el cúmulo de la Nebulosa de Orión lo sitúan en la interacción de los cuatro cuerpos aproximadamente hace 2.6 Myr. Es así que la presencia de algunas de las estrellas viejas en el Cúmulo de la Nebulosa de Orión advierten que ha ocurrido la formación estelar en esta región, sin embargo el número de estrellas viejas indican que la formación estelar en el gas para formar la ONC era más suave hace 2.6 Myr y desde luego hay que resaltar que la tasa de formación estelar se ha ido acelerando con el tiempo, culminando recientemente con la formación de las estrellas masivas conocidas como el Trapecio y este proceso aún continua hasta el día de hoy.

Si se asume que NGC 1980 (NGC 1980 ha sido asociado con el subgrupo 1c de la asociación OB ubicada justamente en frente de la Nebulosa de Orión y

también con la nube molecular Orión A) comparte su movimiento con a través del espacio con Ori, este cúmulo podría haber estado situado en el mismo lugar del cual más tarde se formaría la Nebulosa de Orión. Esto nos lleva a pensar que el material del cual se formaron la Nebulosa de Orión y la ONC estaba aparentemente cerca de NGC 1980 hace varios millones de años, sugiriendo que la formación de las mismas estaría desencadenado por la estrellas viejas del cúmulo NGC 1980. Ahora si esto es verdad, las estrellas más viejas de la ONC pueden ser miembros de NGC 1980 y del sub-grupo OB1c.

Las ubicaciones y las edades de los grupos estelares en Orión, indican que la formación estelar puede propagarse a través de una nube de una forma no lineal. No obstante, una primera generación de estrellas desencadena el nacimiento de las posteriores generaciones. Es así que en Orión al parecer el subgrupo 1a fueron las primeras estrellas en formarse, consecuentemente estas estrellas masivas contribuyeron al nacimiento de las 25 Ori y del subgrupo 1b, posteriormente estas activaron la formación estelar en Orion's Sword en el sur, sigma Ori en el sureste, y posiblemente lambda Ori en norte, por tanto en los últimos Myr se ha propagado la formación estelar en el Filament integral shaped en la nube molecular Orión A, para formar la Nebulosa de Orión, M43, OMC2, OMC3 y NGC 1977.

1.1.3 El papel de las estrellas masivas en la formación estelar

Las estrellas masivas inyectan energía en el medio interestelar a través de su radiación del continuo de Lyman (EUV), de sus vientos estelares y a través de explosión de supernovas (SN). Si se usa la función de masa (IMF) estandar, entonces la población estimada de estrellas jóvenes en Orión indica que entre 30 y 100 estrellas más masivas que $8 M_{\odot}$, se han formado en esta región en los últimos 12 Myr, muchas de estas estrellas han alcanzado la secuencia principal y posteriormente han explotado. Usando la relación edad-masa $\tau(M) \propto M^{-\beta}$, con $\beta = 1.6 \pm 0.15$ en un rango de masas de 8 a $80 M_{\odot}$ (Shull y Saken 1995), ha mostrado que estrellas en el subgrupo 1a más masivas que $13 M_{\odot}$ han explotado. En los subgrupos 1b y 1c, estrellas con edades promedio de 6 Myr y con masas mayores a $20 M_{\odot}$, todo parece indicar que también han corrido con la misma suerte. Es así que han habido entre 10 y 20 explosiones de supernovas en la región de Orión en los últimos 12 Myr. Como consecuencia esta energía cinética liberada ($> 10^{52}$ ergs) ha formado una enorme burbuja de gas de emisión de rayos-x, que se ha extendido creando una cáscara masiva de gas y polvo, conocida como la superburbuja Orion/Eridanus.

La estructura del medio interestelar en la burbuja Orion/Eridanus proporcionan evidencias de que la energía liberada por estrellas de alta masa ha alterado profundamente la cinemática, la forma y la estructura del gas en esta región, debido a que la radiación de las asociaciones OB han provocado que la burbuja se haya inflado un poco más. La emisión de $H\alpha$ traza la ubicación actual del frente de ionización en Orión, además estas bajas densidades del gas se están

expandiendo con una velocidad promedio cerca de 10 a 60 Kms^{-1} hacia altas latitudes galáctica y hacia nosotros, este gas se puede ver en absorción y especialmente en el UV.

Por otro lado si somos más exigentes y nos situamos en determinadas regiones, por ejemplo en esa donde se situa a la ONC, tenemos que la ionización está dominada por θ^1 Ori C que es una de las estrellas masivas jóvenes que forman el ya mencionado Trapecio, el cual se encuentra aproximadamente a unos 0.3 Pc en la parte delantera del frente de ionización. La densidad del gas ionizado decrece desde un pico de densidad electrónica de unos 10^4 cm^{-3} en el frente de ionización, puesto que el gas se acelera lejos del frente (Henney, Arthur y Gearcía Díaz 2005). En la parte más brillante de la nebulosa es decir, en el oeste del Trapecio la capa que emite es delgada ($< 0.05 \text{ Pc}$), mientras que la región que emite en el este de la nebulosa es muchoa más gruesa ($\simeq 0.3 \text{ Pc}$), y esto puede relacionarse fácilmente con la extensión lateral y la distancia de θ^1 Ori C al frente de ionización. Por otro lado los choques estacionarios que se forman en el frente de los Proplyds cerca de la estrella ionizante (Bally 2000), son un indicativo de que hay una cavidad formada por los vientos de alta velocidad que vienen de esta estrella luminosa, además la presencia de líneas de HeI en absorción en el espectro de las estrellas del Trapecio (Baldwin 1991, O'Dell 1993, Wilson 1937, Adeams 1937) indican que hay baja densidad en las regiones que se encuentran en la vecindad del centro del cúmulo de la Nebulosa de Orión.

En resumidas cuentas, se tiene que la presencia de estrellas másivas dispara el nacimiento de futuras generaciones de estrellas, como a ocurrido en la región de Orión. Por otro lado hemos aprendido que los vientos estelares que son básicamente un flujo de partículas cargadas, que vienen de las estrellas másivas OB, o en el caso particular de θ^1 Ori C del grupo del Trapecio en el Cúmulo de la Nebulosa De Orión crean zonas de baja densidad. Además estos vientos estelares interaccionan con el gas de la Nebulosa para formar las ondas de choques, también se da el caso que chocan con otros flujos de gas provenientes de los proplyds en las cercanías de la estrella ionizadora formando los ya mencionados choques estacionarios y con estrellas T Tauri según sea el caso en las partes más alejadas para formar los arcos de emisión. Dichos choques compactan el gas en la nebulosa y crean densidades no homogéneas que provocan el colapso gravitacional de la nube.

1.2 Proplyds

Hasta el momento ya es de nuestro conocimiento, que la Nebulosa de Orión alberga un conjunto de Objetos Estelares Jóvenes (YSOs por sus siglas en inglés). Por tanto esta nebulosa nos brinda la posibilidad de estudiar estas estrellas, que aún están siendo rodeadas por su material primordial. En primera instancia una oportunidad de estudiarlas surge cuando estos objetos son iluminados por una estrella ionizante, en este contexto por θ^1 Ori C, de tal manera que el gas que




Figura 2: Imagen de los proplyds 182-413 (izquierda) y 183-419 (derecha). Son observaciones del telescopio espacial Hubble (HST). La imagen de arriba corresponde a emisión de [O I] y la de abajo a emisión de $H\alpha$. En ambos proplyds sobresale lo que parece ser un disco circunestelar muy brillante en [O I] (Bally). El campo de visión en cada marco es de $4.55'' \times 13.65''$.

rodea a las estrellas será ionizado y como consecuencia este material será visible en las mismas líneas de emisión que el de la nebulosa. Por otro lado es posible ver la componente del polvo en extinción contra la emisión de la nebulosa, dado que la mayoría de la emisión de la Nebula viene del fondo. Pero no todo termina aquí, puesto que la iluminación de la estrella masiva sobre estos YSOs, no sólo permite verlos, sino que además en el proceso parcial o total de la fotoionización de los mismos, genera un excedente de presión que provoca que el material sea expulsado a través del mecanismo de la fotoevaporación y en este sentido habrá como resultado una destrucción inevitable de sus envolventes. Estas estrellas jóvenes que tienen esa particularidad, es decir características especiales locales de su entorno, se han etiquetado como una subclase dentro de los YSOs y han sido llamados Proplyds (O' dell y Wen 1994).

Siendo más rigurosos un proplyd puede ser definido como una estrella de baja masa presecuencia principal, envuelta en un disco protoplanetario que esta siendo fotoevaporado por los fotones ultravioletas (UV) de una estrella masiva. En la Nebulosa de Orión los proplyds son vistos en líneas de emisión como se dijo arriba, con una forma alargada donde uno de sus extremos que es más ancho que el otro (cabeza del proplyd), apunta en dirección a la estrella θ^1 Ori C.

1.2.1 Descubrimiento

El primero de estos objetos descubierto y posteriormente identificado como proplyd fue LV 2 (167-317) y fue visto en la cercanías del Trapecio (Sheehan 1995). En trabajos posteriores se identificaron un conjunto de seis líneas de emisión no resueltas, es decir estrellas; en la las cercanías del Trapecio (Luquez y Vidal 1987). Hasta el momento no se conocía de manera clara la naturaleza de los proplyds, pero dado que son fuentes de radio compactas de emisión térmica, fueron descubiertos en estudios del Very large Array realizadas en el interior de la región de Huygens (Garay y Churchwell 1987), por tanto con las interpretaciones de los radios objetos, entonces se podía hacer una correcta identificación de los mismos (Churchwell 1987). Con la intervención del Telescopio Espacial Hubble (HST) se pudo establecer la verdadera naturaleza de los proplyds, ya que con la cámara WFPC2 (O'dell y Wen 1993) se pudieron obtener imágenes mas claras y puras de esta región, donde se puede apreciar, que hay unos objetos cerca de la estrella ionizadora, con una estrella central de baja masa y en algunas ocasiones una región oscura.

Como los proplyds emiten radiación, en las mismas líneas que la Nebulosa, se obtuvo su espectro corregido por la contribución de la radiación provenientes del fondo, pero no se tenía mucha confianza en estos espectros debido a la alta corrección que se había hecho. Mas tarde teniendo mejores resoluciones angulares del HST se pudo obtener un espectro más confiables de algunos de objetso, pudiendo llevar a cabo el estudio de la mejor forma, es decir medir brillos y temperaturas efectivas.

1.2.2 Modelo estandar de los proplyds

En la sección anterior se ha dicho que la verdadera naturaleza de los proplyds en la ONC fue revelada por observaciones de alta resolución del HST, aunque ya anteriormente Churchwell había escudriñado en su naturaleza con observaciones en el radio. Al comienzo se pensó que la cabeza del proplyd, se formaba por la interacción de un viento suave proveniente del disco de acreción estelar, con el viento rápido de θ^1 Ori C. Como a veces suele suceder en la ciencia, este modelo se dejó a un lado, puesto que se estableció que esta parte brillante del proplyd (cabeza), no eran más que frentes de ionización locales (O'dell y Wen 1994), en los cuales su brillo superficial disminuía como es de esperarse con la distancia a θ^1 Ori C.

Es así que el modelo estandar y ampliamente aceptado postula la existencia de un disco de acreción interno de material molecular que está rodeando una estrella joven de baja masa presecuencia principal que a su vez están siendo fotoevaporados por los fotones ultravioletas de una estrella masiva (Sutherland 1997; Johnstone et al 1998; Henney y Arthur 1998). Este disco sólo es afectado por la radiación externa Ultravioleta Lejano (FUV), es decir radiación con




Figura 3: Modelo ampliamente aceptado para los proplyds, que básicamente representa un flujo fotoevaporado. Se tiene que el disco proptoplanetario de una estrella joven de baja masa es afectado por los fotones estelares FUV y EUV. En este sentido la radiación FUV penetra en la superficie del disco de acreción generando una tasa de pérdida de masa, implicando con ello que se forme un flujo lento de gas neutro. Este gas neutro funciona como una capa protectora, pues absorbe la radiación EUV y es así como se forma un frente de ionización que apunta en la dirección de la estrella ionizadora, entonces este frente de ionización no es más que la cabeza del proplyd. La cola del proplyd se forma debido a la fotoevopación de la parte trasera del disco, por la radiación difusa UV. No obstante la radiacion difusa EUV; que es el resultado de la recombinación del hidrógeno a su estado base (Henney y O'dell 1999), influyen de manera importante en el flujo ionizado de la cola. Claramente se puede ver que un proplyd es semejante a un cometa.

energía menor a los 13.6eV necesarios para fotoionizar el hidrógeno (ver figura 3). Esto ocurre porque la fotoionización de gas molecular que es calentado y suavemente expulzado a partes externas del disco forma una atmósfera extendida que es ópticamente gruesa a la radiación del continuo lyman (EUV) (Johntone, Hollenbach y Bally 1998). Lo anteriormente dicho implica que esta atmósfera interna está siendo rodeada por un frente de ionización local, que es más brillante en la dirección en la que se encuentra la estrella ionizante dominante, también tiene una zona con un brillo más débil que tiene la forma de la cola de un cometa debido a la fotoionización del material por la radiación difusa del continuo de Lyman.

1.3 Objetos LL en la Nebulosa de Orión

Los típicos Objetos LL llamados así por la primera version de estrellas LL orionis descubierta en la Nebulosa de Orión, son básicamente estrellas jóvenes de baja masa presecuencia principal, es decir estrellas T Tauri asociadas a un arco de emisión circumstellar (ver figura 4). El prototipo de estos objetos es la estrella LL Ori cuya emisión circumstellar fue descubierto hace 36 años (?). Posteriormente se identificaron seis objetos más, con características similares (?) y fueron denotados empezando desde LL1 hasta LL7, donde el primero de estos corresponde a LL Ori. La lista de Objetos LL detectados siguió en aumento, puesto que gracias a datos de líneas de emisión en el óptico ($H\alpha$ 6563Å, [NII] 6584Å y [SII] 6716, 6731Å) del Telescopio Espacial Hubble (HST) (??) se han identificado cerca de 20 objetos. No obstante muchos de estos objetos tienen jets muy coliminados que se originan en la estrella T Tauri, que de alguno u otra forma alteran la morfología de los arcos de emisión. Es el caso de LL1 quien posé un jet hipersónico del tipo Herbig Haro conocido como HH 888.

1.3.1 Naturaleza de los choques de proa estacionarios

Los objetos LL Orionis pueden ser interpretados como la interacción supersónica de un viento interno de una estrella T Tauri, con el flujo ambiental de la Nebulosa. Todo parece indicar como ya se ha mencionado anteriormente, que dicho viento interno es un flujo fotoevaporado proveniente del disco protoplanetario de una estrella joven. En una escala más grande el viento externo parece ser originario de la región HII en el núcleo de la Nebulosa de Orión. Esto es debido a que cuando un frente de ionización envuelve un objeto muy denso, se forma un flujo fotoevaporado de gas ionizado con un frente D-crítico (Dyson 1968). Entonces, a este flujo de ahora en adelante lo llamaremos flujo de champagña y como han indicado Mellena, Gritsneider, Arthur y Ercolono, este flujo surge durante los procesos de evolución de una región HII dentro de una nube molecular turbulenta.




Figura 4: Izquierda. Ubicación de LL Ori en el suroeste de la Nebulosa de Orión. Esta imagen es el resultado de la combinación de observaciones del HST-WFPC2 (O'dell y Wong 1996) en los filtros: $H\alpha$ $\lambda 6563$ (verde), $[N II]$ $\lambda 6584$ (rojo) y $[O III]$ $\lambda 5007$ (azul). Hay una región de saturación en el Trapecio y esta aparece en color blanco siendo una imagen superpuesta de $H\alpha$. Derecha. Es una ampliación de la zona donde se encuentra LL Ori. Se puede ver el hiperbólico choque de proa que se forma debido a la interacción de un viento de una estrella T Tauri, con el flujo de champaña de gas ionizado proveniente del núcleo de la Nebulosa de Orión. También se puede apreciar un objeto HH (jet) asociada a una estrella T Tauri, en el cual el choque tiene movimientos propios (Henney 2013) y una velocidad radial (flecha de color). Las velocidades de las alas del choque es de $\sim 20 \text{ km s}^{-1}$, mientras que la velocidad del jet es muy superior ($60-120 \text{ km s}^{-1}$). (Imagen de William Henney)




Figura 5: Esquema general de los Objetos LL

Esquema general de los Objetos LL. La figura 5 nos muestra un esquema general de los choques de proa en la Nebulosa de Orión, es así que los arcos hiperbólicos de los objetos LL se forman, debido a que el flujo de “Champagne” (izquierda), que entre otras cosas es ligeramente supersónico ($M \simeq 2$) choca con un obstáculo (derecha), que en este caso es un flujo también supersónico asociado a una estrella joven de baja masa, no obstante la zona chocada es muy radiativa proporcionando un arco de emisión brillante, por tanto es muy visible, la naturaleza del obstáculo aún nos claro; puesto que es posible que sea el flujo suave de un gas ionizado proveniente del frente de ionización del Proplyd (arriba) o podría ser el viento de una estrella T Tauri (abajo).

La zona chocada. En general se dice que los choques de proa de los objetos LL son estacionarios, debido a que no se les han detectado movimientos propios y además muestran pequeñas velocidades radiales. Por otro lado, la región chocada es ancha debido a que la intersección de dos vientos, provoca que se forme un doble choque, entonces tenemos un arco interno y un arco externo separados cierta anchura que resulta ser muy grande en comparación a la zona de enfriamiento, esto implicaría que los choques podrían considerarse isotérmicos.

Los choques de este contexto se han dividido en dos grupos; el primer grupo corresponde a los clásicos choques de proa de los proplyds (Robberto et al 2005) y el segundo grupo corresponde a los típicos arcos hiperbólicos LL (ver figura 6). En el caso de los proplyds están situados en las proximidades del Trapecio, es así que el choque de proa externo no es visible porque este se produce por la interacción con un viento muy rápido y de baja densidad ($n \sim 1 \text{ cm}^{-3}$) de una estrella O, dando como resultado que la cáscara externa sea no-radiativa. No obstante el arco interno si es visible, dado que el choque interno se forma a partir de un flujo de gas muy denso ($10^3 - 10^4 \text{ cm}^{-3}$) ligeramente supersónico




Figura 6: Esquema de la interacción de los vientos en la Nebulosa de Orión. la región de color verde corresponde a gas molecular neutro cuya temperatura oscila entre los 50 y los 1000 K; la zona roja es el gas fotoionizado, ahí la temperatura es de aproximadamente 10^4 K y las densidades van de 10^2 a 10^4 cm^{-3} y por último el color azul representa el material del viento estelar con $T \geq 10^6$ K y $n \sim 1$ cm^{-3} . Las flechas hacen referencia al flujo de gas transónico y supersónico, por otro lado los choques de proa radiactivos son ilustrados por las líneas rojas oscuras y gruesas, mientras que los choques no-radiactivos son ilustrados por la línea discontinua azul y la línea de puntos también azul indica la discontinuidad de contacto. Los choques de proa ocurren en dos regiones de la nebulosa: una zona interna de interacción (cuadro izquierda arriba), donde los choques de proa externos se producen debido al viento hipersónico de una estrella másiva ($V \sim 1000$ km s^{-1}) y una zona externa de interacción (cuadro derecha arriba), donde los choques externos se forman debido al ligero flujo supersónico y fotoevaporado de champaña ($V \sim 20$ km s^{-1}). El choque externo es no-radiactivo en la zona interna de interacción pero radiactivo en la zona externa de interacción. Esto sugiere que el choque de proa interno es radiactivo cuando el viento interno es un flujo de gas fotoevaporado de un proplyd. (Imagen de William Henney)




Figura 7: Tipos de choques estacionarios en la Nebulosa de Orión. a) Choques de proas asociados a proplyds; el choque se forma por la interacción de un flujo de gas fotoevaporado que viene del proplyd a una velocidad entre $30\text{-}40\text{ km s}^{-1}$, con un viento que viaja a una alta velocidad ($> 1000\text{ km s}^{-1}$) desde una estrella masiva del Trapecio. b) Arcos hiperbólicos LL; el choque se forma debido a la interacción de un flujo de champaña de baja velocidad ($\simeq 20\text{ km s}^{-1}$) con un viento que viene de una estrella T Tauri o de un proplyd. Estas imágenes son tomadas de las observaciones del HST-ACS en el filtro f658n, es decir de $H\alpha + [N II]$.

($M \simeq 3$) proveniente del frente de ionización del proplyd. En el caso de los arcos hiperbólicos, se tiene que están ubicados en regiones externas de la nebulosa, es decir están mucho más lejos del Trapecio, incurriendo en el hecho de que el arco exterior de la región chocada sea radiactivo por tanto en este domina la emisión, otra característica diferenciadora de sus semejantes los proplyds, es que los arcos de estos tienden a hacer más abiertos.

1.4 Estructura de la tesis

Otro de los propósitos de este trabajo es realizar un estudio de las características físicas de los choques, en este sentido se pretende estudiar parámetros físicos como el brillo superficial, el cual se podría medir utilizando las observaciones del HST con las cámaras WFPC2, ACS y WFC3, y en este orden de ideas analizar las imágenes de $H\alpha$ y $[N II]$ en las diferentes zonas del choque, esto es; la zona pos-choque, en la cáscara chocada y en la parte interna del mismo. Esto va a hacer muy importante porque una vez medido el brillo y junto al radio de curvatura R_c , es factible calcular la densidad n y con esta se puede estimar la tasa de pérdida de masa \dot{M} de los objetos en cuestión, sin olvidar que hay que considerar otros parámetros como la temperatura y la emisividad. En última instancia estas serían las razones por las cuales se considera este estudio.