

La rinitis alérgica por ácaros del polvo afecta hasta el **40% de la población** en algunas regiones y puede transformarse en una condición crónica que degrade significativamente la calidad de vida, el sueño y el rendimiento diario. Si bien los antihistamínicos y corticoides nasales constituyen el pilar farmacológico de tratamiento, la **alimentación emerge como una herramienta terapéutica complementaria poderosa**, respaldada por evidencia científica cada vez más sólida. Compuestos bioactivos presentes en alimentos como la **cúrcuma, el jengibre, la quercetina de cebollas y manzanas, los omega-3 del pescado azul, la vitamina C y los probióticos** actúan estabilizando los mastocitos —las células inmunes que liberan histamina— y modulando la respuesta inflamatoria antes de que los síntomas se manifiesten. Un ensayo clínico con **241 pacientes** demostró que la cúrcuma redujo los síntomas nasales de rinitis alérgica del **8.03 al 2.76** en escala de severidad, mientras que otro estudio comparó el extracto de jengibre con loratadina (Claritin) y encontró que ambos fueron igualmente efectivos, pero el jengibre causó **menos efectos secundarios** como somnolencia y fatiga. Este reporte traduce la ciencia en un **plan de acción práctico**: qué comer, qué evitar y cómo estructurar tu día para que cada bocado cuente contra la inflamación alérgica.


Alimentación contra la Rinitis Alérgica por Ácaros del Polvo: Guía Práctica Basada en Evidencia

1. Cómo la Alimentación Influye en tu Rinitis Alérgica

1.1 El Mecanismo: Desde el Ácaro hasta los Síntomas

La rinitis alérgica por ácaros del polvo es una condición inmunológica compleja que se desencadena cuando las proteínas presentes en los desechos de estos microorganismos entran en contacto con la mucosa nasal de una persona sensibilizada. El mecanismo fisiopatológico subyacente sigue una cascada de eventos bioquímicos e inmunológicos altamente coordinados que culminan en la manifestación de síntomas como estornudos, rinorrea, prurito nasal y congestión. Comprender este mecanismo es fundamental para apreciar cómo intervenciones dietéticas específicas pueden modular la respuesta alérgica en múltiples puntos de esta cascada, ofreciendo una estrategia terapéutica complementaria a los tratamientos farmacológicos convencionales.

CÓMO LOS ALIMENTOS COMBATEN LA RINITIS ALÉRGICA POR ÁCAROS



Los nutraceuticos bloquean la liberación de histamina en la fuente, antes de que causen síntomas

Figure 1: Diagrama del mecanismo de acción

1.1.1 Sensibilización y el Rol de los Mastocitos El proceso alérgico se inicia con la **sensibilización**, una fase en la que el sistema inmunitario del individuo entra en contacto por primera vez con las proteínas alergénicas de los ácaros del polvo (como *Der p 1* y *Der f 1*) y las reconoce como una amenaza. En esta etapa, las células presentadoras de antígenos, como las células dendríticas, capturan estas proteínas y las procesan para presentarlas a los linfocitos T helper 2 (Th2). Estos linfocitos Th2 activados liberan citoquinas específicas, principalmente **IL-4** e **IL-13**, que estimulan a los linfocitos B para que produzcan **inmunoglobulina E (IgE)** específica contra el alérgeno del ácaro. Esta IgE circulante se une a receptores de alta afinidad (Fc RI) ubicados en la superficie de los **mastocitos**, que son células inmunes clave residentes en los tejidos, incluyendo la mucosa nasal. Una vez que los mastocitos están “cargados” con IgE específica, el individuo se considera sensibilizado y queda preparado para una reacción alérgica en futuras exposiciones al alérgeno. Esta fase de sensibilización es crucial porque establece la base para todas las reacciones alérgicas subsecuentes y representa un punto de intervención potencial donde ciertos nutraceuticos podrían influir en el balance Th1/Th2.

1.1.2 Liberación de Histamina y la Cascada Inflamatoria Cuando una persona sensibilizada vuelve a inhalar las proteínas de los ácaros, estas se unen a las moléculas de IgE que ya están ancladas en los mastocitos. Esta unión cruzada de IgE desencadena una señalización intracelular que culmina en la **degranulación de los mastocitos**, un proceso explosivo en el que estas células liberan una gran cantidad de mediadores proinflamatorios preformados y de novo sintetizados. El mediador más conocido y potente es la **histamina**, que actúa uniéndose a receptores H1 en los vasos sanguíneos y las terminaciones nerviosas de la mucosa nasal, causando vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular, estimulación de las glándulas secretoras y activación de los nervios sensoriales. Además de la histamina, los mastocitos

liberan una batería de otros mediadores, como **leucotrienos, prostaglandinas, citoquinas (TNF- , IL-4, IL-5, IL-6) y quimiocinas**. Estos compuestos amplifican y perpetúan la respuesta inflamatoria, atrayendo otros tipos de células inflamatorias como eosinófilos y neutrófilos a la mucosa nasal. Esta infiltración celular sostiene la inflamación y conduce a la fase tardía de la respuesta alérgica, caracterizada por congestión nasal persistente y hiperreactividad de las vías aéreas superiores. Es precisamente en esta cascada inflamatoria donde múltiples componentes dietéticos pueden ejercer sus efectos moduladores.

1.1.3 Cómo los Alimentos Pueden Bloquear esta Reacción La alimentación puede influir en la rinitis alérgica a través de varios mecanismos bioquímicos distintos, cada uno ofreciendo una vía para mitigar la respuesta alérgica. Uno de los mecanismos más potentes es la **estabilización de los mastocitos**, donde ciertos compuestos fitoquímicos impiden la liberación de histamina y otros mediadores inflamatorios. Otro mecanismo clave es la **modulación del balance inmunitario Th1/Th2**; una respuesta Th2 dominante promueve la alergia, mientras que un equilibrio hacia Th1 o la inducción de células T reguladoras (Treg) puede suprimirla. Adicionalmente, los alimentos pueden actuar como **antihistamínicos naturales**, ya sea inhibiendo la síntesis de histamina o promoviendo su degradación. Finalmente, una dieta rica en ciertos nutrientes puede **fortalecer la barrera intestinal**, reducir la “permeabilidad intestinal” (*leaky gut*) y modular la microbiota, lo cual tiene un impacto sistémico en la regulación inmune y la respuesta alérgica. Los nutracéuticos más prometedores, como la **quercetina, la cúrcuma y el jengibre**, actúan estabilizando los mastocitos, mientras que los **probióticos** modulan el balance Th1/Th2 a través del eje intestino-pulmón. Comprender estos mecanismos permite una aproximación dietética más estratégica y fundamentada en la ciencia.

1.2 El Eje Intestino-Nariz: Tu Microbiota y las Alergias

La relación entre el tracto gastrointestinal y las enfermedades alérgicas respiratorias, conocida como el **eje intestino-pulmón o eje intestino-nariz**, ha emergido como un concepto fundamental en la comprensión moderna de la inmunología. Este eje bidireccional implica una comunicación constante entre la microbiota intestinal, la pared del intestino y el sistema inmunitario sistémico, que a su vez influye en la homeostasis y la inflamación de las mucosas respiratorias. Alteraciones en la composición y diversidad de la microbiota intestinal (disbiosis) y un aumento en la permeabilidad de la barrera intestinal han sido asociadas con un mayor riesgo y severidad de enfermedades alérgicas, incluyendo la rinitis alérgica por ácaros. Este vínculo explica por qué intervenciones dietéticas dirigidas a restaurar la salud intestinal pueden tener efectos beneficiosos en la nariz, a cientos de kilómetros de distancia.

1.2.1 La Hipótesis de la Higiene y la Disbiosis Intestinal La **hipótesis de la higiene** propone que la reducida exposición a microorganismos en la primera infancia, como resultado de entornos excesivamente limpios y del uso generalizado de antibióticos, altera el desarrollo normal del sistema inmune, inclinándolo hacia un perfil de respuesta Th2 pro-alérgico. La **disbiosis intestinal**, es decir, el desequilibrio en la comunidad microbiana del intestino, es considerada un factor clave en este proceso. En individuos con alergias, se ha observado una disminución en la abundancia de bacterias beneficiosas como *Lactobacillus* y *Bifidobacterium*, y un aumento de especies potencialmente perjudiciales como *Clostridium* y *Staphylococcus aureus*. Esta alteración en la microbiota afecta la maduración del sistema inmune, comprometiendo la capacidad para desarrollar tolerancia a los antígenos ambientales inocuos como los alérgenos de los ácaros. El intestino es el mayor órgano linfático del cuerpo, y su microbiota juega un papel educativo esencial para las células inmunes, enseñándoles a distinguir entre amigos y enemigos. Cuando este “entrenamiento” falla debido a una microbiota alterada, el sistema inmune puede reaccionar de forma desproporcionada contra alérgenos comunes, desencadenando la cascada de la rinitis alérgica.

1.2.2 Cómo una Barrera Intestinal Débil Agrava la Alergia La pared intestinal no es simplemente una barrera pasiva, sino una estructura dinámica y compleja que regula qué sustancias pueden pasar al torrente sanguíneo. Las uniones estrechas entre las células epiteliales intestinales son cruciales para mantener la integridad de esta barrera. Factores como una dieta deficiente, el estrés, ciertos medicamentos y la propia disbiosis pueden debilitar estas uniones, dando lugar a una condición conocida como **“permeabilidad intestinal aumentada”** o *leaky gut*. Cuando esta barrera se vuelve “porosa”, partículas que normalmente deberían permanecer en el lumen intestinal, como toxinas bacterianas, proteínas alimentarias no digeridas y, teóricamente, incluso moléculas similares a alérgenos, pueden filtrarse al torrente sanguíneo. Este evento desencadena una respuesta inmune sistémica de bajo grado, caracterizada por la liberación de citoquinas proinflamatorias y la activación de células inmunes. Este estado de inflamación sistémica crónica puede **“pre-sensibilizar”** al organismo, haciendo que las mucosas respiratorias, como la nasal, sean más reactivas y propensas a montar una respuesta alérgica exagerada cuando entran en contacto con los ácaros del polvo. La fortalecimiento de la barrera intestinal a través de la dieta es, por lo tanto, una estrategia indirecta pero potente para controlar la rinitis alérgica.

1.2.3 El Impacto de los Probióticos en la Modulación Inmune Los **probióticos**, definidos como microorganismos vivos que, cuando se administran en cantidades adecuadas, confieren un beneficio para la salud del huésped, representan una de las intervenciones dietéticas más estudiadas para modular el eje intestino-nariz. Especies específicas de *Lactobacillus* y *Bifidobacterium* pueden interactuar con las células del epitelio intestinal y las células presentadoras de antígenos, como las células dendríticas, a través de receptores de tipo Toll (TLRs). Esta interacción desencadena una cascada de señalización que puede modular la respuesta inmune de múltiples maneras. Los probióticos pueden **promover una respuesta Th1** (que contrarresta el perfil Th2 pro-alérgico), **aumentar la actividad de las células T reguladoras (Treg)** que suprimen la inflamación, y fortalecer las uniones estrechas del epitelio intestinal, reduciendo la permeabilidad. Una revisión sistemática publicada en la base de datos del NIH concluyó que los probióticos, particularmente *Lactobacillus* y *Bifidobacterium*, *parecen prevenir las recurrencias de alergia, aliviar la severidad de los síntomas y mejorar la calidad de vida en pacientes con rinitis alérgica* ([nih.gov](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25811111/)) . Este efecto se logra mediante la modulación del sistema inmune a través de la inducción de citoquinas que provocan una respuesta Th1 dominante, reequilibrando así el desequilibrio Th1/Th2 característico de los pacientes alérgicos.

Una revisión más reciente profundiza en las estrategias terapéuticas basadas en la microbiota para la rinitis alérgica, presentando una tabla resumen de la evidencia actual. La tabla muestra que múltiples cepas probióticas han demostrado beneficios en modelos animales y humanos. Por ejemplo, *Lactobacillus plantarum* restauró el balance Th1/Th2 en modelos de rinitis alérgica en ratones, mientras que *Bifidobacterium longum* BB536 mejoró los síntomas de rinorrea y congestión nasal en adultos alérgicos al polen de cedro japonés ([nih.gov](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25811111/)) . En poblaciones pediátricas, *Lactobacillus paracasei* LP-33 logró un **alivio de síntomas comparable al antihistamínico cetirizina**, con un **81% de los niños logrando una resolución completa de los síntomas** ([nih.gov](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25811111/)) . Además, la suplementación materna con *L. rhamnosus* HN001 durante el embarazo y la lactancia se asoció con una reducción en el riesgo de rinitis en la descendencia hasta los 11 años de edad, destacando el potencial preventivo de las intervenciones tempranas. La evidencia sugiere que el beneficio clínico es altamente específico de la cepa, y no solo depende del número de cepas en una formulación, ya que comparaciones directas indican que las formulaciones de cepa única pueden ser tan eficaces como los productos multicepa ([nih.gov](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25811111/)) .

Cepa Probiótica	Población/Modelo	Resultados Clínicos	Mecanismo Inmunológico
<i>Lactobacillus plantarum</i>	Ratón con rinitis alérgica	↓ Infiltración de leucocitos, ↓ hiperreactividad de las vías aéreas	Restauró el balance Th1/Th2 (nih.gov)
<i>Bifidobacterium longum</i> BB536	Adultos alérgicos a polen de cedro japonés	↓ Rinorrea, ↓ congestión nasal, ↓ uso de medicamentos	↑ Citocinas Th1, supresión de <i>B. fragilis</i> (nih.gov)
<i>Lactobacillus paracasei</i> LP-33	Niños menores de 5 años	81% de alivio completo de síntomas , comparable a cetirizina	No reportado (nih.gov)
<i>L. rhamnosus</i> HN001 (suplementación materna)	Lactantes (desde el nacimiento hasta los 2 años)	↓ Riesgo de rinitis en la descendencia (efecto a los 11 años)	No reportado (nih.gov)
Multicepa (<i>L. acidophilus</i> , <i>L. delbrueckii</i> , <i>L. rhamnosus</i> , <i>S. thermophilus</i>)	Adultos con rinitis alérgica	↓ Síntomas, ↑ calidad de vida, ↑ diversidad de la microbiota	↓ Eosinófilos, basófilos, citoquinas inflamatorias (nih.gov)

Tabla 1: Resumen de la evidencia clínica para probióticos específicos en el tratamiento de la rinitis alérgica.

2. Tus Aliados en el Plato: Alimentos Anti-Rinitis

La incorporación de alimentos específicos ricos en compuestos bioactivos puede constituir una estrategia dietética efectiva para modular la respuesta alérgica en la rinitis por ácaros. Estos “aliados en el plato” actúan a través de diversos mecanismos, principalmente estabilizando los mastocitos para prevenir la liberación de histamina y ejerciendo efectos antiinflamatorios que mitigan la cascada de síntomas. A continuación, se detallan los grupos de alimentos y nutracéuticos más respaldados por la evidencia científica.

2.1 Flavonoides: Los Estabilizadores Naturales de Mastocitos

Los flavonoides son un grupo diverso de metabolitos secundarios de las plantas, ampliamente reconocidos por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. En el contexto de las alergias, ciertos flavonoides han demostrado un efecto particularmente potente como **estabilizadores de mastocitos**, impidiendo la liberación de histamina y otras citoquinas proinflamatorias. Una revisión exhaustiva publicada en *PMC* analizó los efectos de múltiples componentes dietéticos sobre los mastocitos, concluyendo que la **quercetina, el kaempferol, la luteolina y la resveratrol** fueron de los más efectivos en suprimir la liberación de mediadores preformados y de novo sintetizados en modelos in vitro e in vivo ([nih.gov](#)). Estos compuestos interfieren con las vías de señalización intracelular de los mastocitos, como la vía del *Spleen tyrosine kinase* (Syk) y la fosfolipasa A2, bloqueando efectivamente la cascada de desgranulación. Ensayos clínicos controlados aleatorizados (ECA) han demostrado que la suplementación con algunos de estos flavonoides, como la quercetina, mejora los síntomas de la rinitis alérgica y reduce el número de células inflamatorias en los pacientes, aunque su biodisponibilidad oral sigue siendo un desafío y un área activa de investigación ([nih.gov](#)).

2.1.1 Quercetina: La Estrella (Cebolla, Manzana, Berro) La quercetina es un flavonoide ampliamente investigado y uno de los agentes naturales más prometedores para el manejo de la rinitis alérgica. Su mecanismo principal de acción es la **estabilización de los mastocitos**, el componente central de las reacciones alérgicas. A diferencia de los antihistamínicos convencionales, que bloquean los efectos de la histamina después de su liberación, la quercetina actúa de forma preventiva, impidiendo que los mastocitos liberen histamina en primer lugar. Específicamente, la quercetina bloquea la entrada de calcio y **inhibe la fosfolipasa A2**, enzimas cruciales para el proceso de desgranulación del mastocito ([Remedy's Nutrition](#)) . Se ha encontrado que este mecanismo es casi **dos veces más potente** que el del cromoglicato de sodio, un medicamento estabilizador de mastocitos de uso clínico ([UW Family Medicine & Community Health](#)) . La eficacia de la quercetina en la rinitis alérgica, incluyendo la causada por ácaros del polvo, está respaldada por ensayos clínicos que muestran una mejora significativa en los síntomas y una reducción en las células inflamatorias ([nih.gov](#)) . La dosis más comúnmente utilizada en la investigación es de **500 mg, dos veces al día**, tomada con alimentos ([Remedy's Nutrition](#)) .

Aunque la quercetina puede obtenerse a través de la dieta, las concentraciones necesarias para un efecto terapéutico significativo a menudo requieren suplementación. Sin embargo, una dieta rica en alimentos con quercetina puede contribuir a un efecto acumulativo beneficioso. Las principales fuentes dietéticas de quercetina incluyen la **cebolla roja (especialmente cruda)**, **las manzanas (concentrada en la piel)**, **las capuchinas**, **los arándanos y el té verde y negro** ([eds.clinic](#)) . Es relevante señalar que la quercetina tiene una biodisponibilidad limitada por sí sola, por lo que a menudo se formula con bromelina, una enzima de la piña que puede aumentar su absorción en un **200-300%** ([Remedy's Nutrition](#)) . Para las personas con rinitis alérgica por ácaros, el uso diario de quercetina a dosis de 250 a 500 mg puede ayudar a mantener una menor reactividad de base, aunque no eliminará la sensibilidad a los ácaros, puede reducir la frecuencia y severidad de las reacciones ([Remedy's Nutrition](#)) .

2.1.2 Cúrcuma: Potente Antiinflamatorio (con Pimienta Negra) La cúrcuma, una especia ampliamente utilizada en la cocina asiática, contiene como principio activo la **curcumina**, un polifenol con potentes propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. La evidencia científica sobre el uso de la curcumina para la rinitis alérgica es particularmente sólida, respaldada por un ensayo clínico controlado aleatorizado de alta calidad. En este estudio, publicado en *Annals of Allergy, Asthma & Immunology*, **241 pacientes** con rinitis alérgica perenne recibieron durante dos meses una cápsula diaria de **500 mg de curcumina** o un placebo. Los resultados fueron notables: el grupo de curcumina experimentó una **reducción significativa en los síntomas nasales**, incluyendo estornudos (de 1.94 a 0.63), prurito nasal (de 1.63 a 0.54), rinorrea (de 2.13 a 0.47) y obstrucción nasal (de 2.33 a 1.12) ([PubMed](#)) . Además de aliviar los síntomas, la curcumina demostró una mejora objetiva en el flujo de aire nasal, medida por rinomanometría, y ejerció diversos efectos inmunomoduladores, como la supresión de citoquinas proinflamatorias (IL-4, IL-8, TNF-) y el aumento de la producción de IL-10, una citoquina antiinflamatoria ([PubMed](#)) .

La eficacia de la curcumina se atribuye a su capacidad para inhibir la liberación de histamina de los mastocitos y modular la respuesta inmune. Un análisis comparativo de diversos nutraceuticos en ensayos clínicos sugirió que la **administración oral de curcumina mostró uno de los efectos más fuertes en la reducción de los síntomas específicos de rinitis alérgica**, con una mejora aproximada del 60% ([nih.gov](#)) . Un aspecto crucial para maximizar los beneficios de la cúrcuma es su combinación con pimienta negra. La **piperina**, un compuesto presente en la pimienta negra, puede **aumentar la biodisponibilidad de la curcumina hasta en un 2,000%** al inhibir su metabolismo en el hígado y el intestino. Por lo tanto, al incorporar cúrcuma a la dieta, ya sea en platos cocinados, batidos o como suplemento, es altamente recomendable añadir una pizca de pimienta negra para asegurar una absorción

óptima.

2.1.3 Otros Flavonoides Beneficiosos: Té Verde, Cítricos Además de la quercetina y la curcuma, otros flavonoides presentes en alimentos comunes también han demostrado propiedades anti-alérgicas al estabilizar los mastocitos y modular la inflamación. El **té verde** es una fuente rica en catequinas, particularmente la epigallocatequina galato (EGCG). En modelos de rinitis alérgica en ratones, la administración oral de EGCG redujo significativamente los episodios de estornudos y el frotamiento nasal, además de disminuir los niveles séricos de histamina en aproximadamente un **30%** y la expresión de moléculas inflamatorias en la mucosa nasal ([nih.gov](#)). Un estudio en humanos utilizando una catequina de té verde O-metilada (*EGCG3''Me*), encontrada en el té verde Benifuuki, también mostró efectos positivos en la supresión de la degranulación mediada por IgE, especialmente cuando se combinaba con otros flavonoides como la eriodictyol y la hesperetina ([nih.gov](#)). Estos hallazgos respaldan el consumo regular de té verde como una estrategia dietética para el manejo de la rinitis alérgica.

Los flavonoides presentes en los **cítricos**, como la naringenina y la hesperetina, también han demostrado tener efectos inmunomoduladores y anti-alérgicos. La naringenina, encontrada en toronjas y naranjas, atenuó la proliferación de mastocitos inducida por TSLP y suprimió la producción de citoquinas inflamatorias como IL-13 y TNF- en modelos in vitro ([nih.gov](#)). En un modelo de rinitis alérgica inducida por ovoalbúmina en ratas, el tratamiento oral con naringenina mejoró los síntomas nasales y disminuyó los niveles de IgE total y las citoquinas Th2 (IL-4 e IL-5) ([nih.gov](#)). La inclusión de frutas cítricas en la dieta puede, por lo tanto, contribuir a una ingesta diversificada de flavonoides con potencial anti-alérgico. Es importante notar que, si bien estos alimentos tienen un perfil de histamina bajo en su mayoría, algunos individuos sensibles pueden experimentar que ciertos cítricos actúan como “liberadores de histamina”. La respuesta es individual, por lo que se recomienda una observación personalizada de los síntomas.

2.2 Especies y Raíces Medicinales

Las especias y raíces han sido utilizadas tradicionalmente en diversas culturas por sus propiedades medicinales, y la ciencia moderna ha comenzado a validar su eficacia en el manejo de condiciones inflamatorias como la rinitis alérgica. Compuestos bioactivos concentrados en estas plantas pueden modular la respuesta inmune y reducir la inflamación a través de vías similares a los medicamentos convencionales, pero a menudo con un perfil de efectos secundarios más favorable.

2.2.1 Jengibre: Tan Efectivo como un Antihistamínico El jengibre (*Zingiber officinale*) ha emergido como uno de los remedios naturales más prometedores para la rinitis alérgica, con una evidencia clínica particularmente robusta. Un ensayo clínico controlado aleatorizado, doble ciego, publicado en *BMC Complementary Medicine and Therapies*, comparó directamente la eficacia de un **extracto de jengibre (500 mg/día)** con la del antihistamínico de venta libre **loratadina (10 mg/día)** en **80 pacientes** con rinitis alérgica moderada durante seis semanas ([PubMed](#)). Los resultados del estudio fueron reveladores: ambos tratamientos redujeron significativamente las puntuaciones de los síntomas nasales totales (TNSS), y **no hubo diferencia estadísticamente significativa entre la eficacia del jengibre y la loratadina**. Sin embargo, el jengibre mostró una ventaja en ciertos aspectos. En las mediciones de rinometría acústica (ARM), un método objetivo para evaluar la patencia de las vías aéreas nasales, el grupo tratado con jengibre mostró una **mejora significativa en el volumen de la cavidad nasal** después de seis semanas, un efecto que no se observó en el grupo de loratadina ([Springer](#)). Además, el extracto de jengibre fue notablemente mejor tolerado, causando **menos efectos secundarios**, especialmente los clásicos de los antihistamínicos como somnolencia, fatiga, mareos y estreñimiento ([PubMed](#)).

Los componentes activos del jengibre responsables de sus efectos anti-alérgicos son principalmente el **6-gingerol y el 6-shogaol**. Estos compuestos han demostrado inhibir la liberación de -hexosaminidasa en células de leucemia de rata (RBL-2H3), un marcador de degranulación de mastocitos, con una potencia significativa. Un estudio en modelos de ratones con alergia inducida por ovoalbúmina demostró que una dieta con un 2% de jengibre redujo la severidad de los síntomas nasales y suprimió la infiltración de mastocitos en la mucosa nasal ([Springer](#)) . El mecanismo de acción del 6-gingerol implica la inhibición de la producción de citoquinas para la activación y proliferación de células T, lo que a su vez impide la activación de células B y mastocitos. Dado que la congestión nasal está impulsada por múltiples mediadores vasoactivos además de la histamina, y los antihistamínicos suelen ser ineficaces para este síntoma, el jengibre podría ser una opción de tratamiento única o complementaria, especialmente para pacientes cuyo síntoma principal es la obstrucción nasal ([Springer](#)) .

2.2.2 Bromelina: La Enzima de la Piña que Reduce la Inflamación La bromelina es una mezcla compleja de enzimas proteolíticas (proteasas) que se encuentra principalmente en el tallo y la fruta de la piña (*Ananas comosus*). Aunque se ha utilizado tradicionalmente para tratar la inflamación y la hinchazón, la investigación ha revelado su potencial como un agente anti-alérgico natural. La bromelina combate las alergias principalmente a través de sus propiedades antiinflamatorias sistémicas. Funciona al **descomponer proteínas**, lo que ayuda a reducir la inflamación, y también puede adelgazar el moco, facilitando su expulsión y aliviando la congestión nasal ([Wyndly](#)) . Se ha encontrado que es eficaz para manejar los síntomas de la rinitis alérgica, incluyendo la congestión nasal, la rinorrea y los ojos llorosos. La eficacia terapéutica de la bromelina está respaldada por su larga historia de uso en la medicina holística, y estudios han demostrado que puede reducir la sensibilización alérgica y la inflamación, aliviando potencialmente los síntomas ([Wyndly](#)) .

La bromelina es especialmente conocida por su capacidad para reducir la hinchazón y la inflamación en los pasajes nasales, proporcionando alivio de la congestión y mejorando la función respiratoria. Además de su acción directa sobre la inflamación, la bromelina también mejora la biodisponibilidad de otros compuestos anti-alérgicos. Cuando se combina con quercetina, por ejemplo, se estima que la absorción de quercetina aumenta entre un **200% y un 300%** ([Remedy's Nutrition](#)) . Esta sinergia hace que la combinación de bromelina y quercetina sea una estrategia de suplementación particularmente inteligente para el manejo de la rinitis alérgica. La dosis típica de bromelina para alergias oscila entre **500 y 2,000 mg diarios**, divididos en dos o tres dosis. Es importante tener en cuenta que, aunque la bromelina es generalmente segura, puede interactuar con ciertos medicamentos como antibióticos y anticoagulantes, y las personas con alergia a la piña o al látex deben evitar su uso debido al riesgo de reactividad cruzada ([Wyndly](#)) .

2.3 Vitaminas y Minerales Clave

Una serie de micronutrientes esenciales juega un papel fundamental en el mantenimiento de una respuesta inmune equilibrada y en la mitigación de la inflamación. La deficiencia de estos nutrientes puede comprometer la función del sistema inmune y exacerbar las respuestas alérgicas. Garantizar una ingesta adecuada de vitaminas y minerales clave a través de la dieta o la suplementación es una piedra angular de la estrategia nutricional contra la rinitis alérgica.

2.3.1 Vitamina C: El Antihistamínico Natural La vitamina C (ácido ascórbico) es un nutriente esencial con un papel bien establecido como modulador de la respuesta inmune y, particularmente relevante para las alergias, como un **antihistamínico natural**. Su mecanismo de acción es dual: por un lado, actúa directamente inhibiendo la actividad de las células inflamatorias que liberan histamina, y por

otro, ayuda a descomponer la histamina que ya ha sido liberada en el cuerpo, proporcionando un alivio sintomático ([ENT and Allergy Associates](#)) . Además, la vitamina C es un potente antioxidante que contrarresta la respuesta inflamatoria alérgica inducida por especies reactivas de oxígeno. Se ha demostrado que ayuda a estabilizar los mastocitos, reduciendo su tendencia a desgranularse ([Dr Becky Campbell](#)) . Aunque los cítricos son la fuente más conocida, muchas otras frutas y verduras son aún más ricas en este nutriente. Los **pimientos rojos, la coliflor, el repollo, el kale y las coles de Bruselas contienen más vitamina C que una naranja** ([ENT and Allergy Associates](#)) . Otras excelentes opciones incluyen el kiwi, las fresas, la papaya, el mango y los escaramujos.

La evidencia clínica sobre el uso de vitamina C para la rinitis alérgica ha mostrado resultados prometedores. Estudios de casos y ensayos clínicos han demostrado que el uso de ácido ascórbico, tanto en aplicaciones nasales como en dosis orales altas, puede reducir el edema nasal, las secreciones mucosas y la obstrucción nasal ([uj.ac.za](#)) . Un estudio que evaluó la aplicación nasal de ácido ascórbico durante dos semanas mostró una reducción en la hinchazón y las secreciones nasales ([uj.ac.za](#)) . Otro estudio demostró que dosis altas de vitamina C intravenosa tuvieron beneficios clínicos positivos para pacientes con rinitis alérgica aguda y crónica, y fue calificado como de bajo riesgo de sesgo ([uj.ac.za](#)) . La vitamina C también se incluye en complejos de suplementos que han demostrado ser efectivos. Por ejemplo, un complejo que contenía vitamina D3, quercetina y la planta medicinal *Perilla frutescens* redujo significativamente los síntomas de rinitis alérgica después de un mes de uso, disminuyendo la necesidad de medicación de rescate ([uj.ac.za](#)) .

2.3.2 Vitamina D: Modulador del Sistema Inmune La vitamina D, a menudo llamada la “vitamina del sol”, es en realidad una hormona esteroidea que desempeña un papel crucial en la regulación del sistema inmunitario. Su deficiencia es común en todo el mundo y se ha identificado como un posible factor de riesgo ambiental en el desarrollo de enfermedades alérgicas. La vitamina D ejerce sus efectos inmunomoduladores a través de receptores de vitamina D (VDR) que se encuentran en una variedad de células inmunes, incluyendo células B y T, células dendríticas y macrófagos, influyendo así directamente en la respuesta inflamatoria relacionada con la alergia ([uj.ac.za](#)) . La evidencia epidemiológica ha encontrado una asociación entre los **bajos niveles séricos de vitamina D** y la **incidencia de trastornos alérgicos**, lo que sugiere que un nivel adecuado de esta vitamina podría tener un efecto protector. Aunque la evidencia clínica para la rinitis alérgica es limitada, los estudios disponibles son alentadores.

Un ensayo clínico controlado aleatorizado demostró que la suplementación con vitamina D durante cinco meses en niños con rinitis alérgica relacionada con el polen de gramíneas produjo una **reducción significativa en los síntomas**, una disminución en la necesidad de medicación de rescate y un efecto inmunomodulador medible ([uj.ac.za](#)) . Otro ECA mostró que los pacientes con rinitis alérgica deficientes en vitamina D que recibieron suplementación experimentaron una **mejora altamente significativa en los síntomas nasales** ([uj.ac.za](#)) . Un hallazgo particularmente interesante es el efecto sinérgico de la vitamina D con los antihistamínicos. Un estudio encontró que la combinación de vitamina D con un antihistamínico convencional resultó en una mejora en los síntomas relativos del **97% de los pacientes**, en comparación con solo un **84%** en el grupo que tomó solo el antihistamínico ([nih.gov](#)) . Esto sugiere que la vitamina D puede actuar como un potente coadyuvante en la terapia farmacológica estándar. Además, la vitamina D también puede influir en la salud intestinal al modular la microbiota y fortalecer las uniones estrechas, lo cual, como se discutió anteriormente, tiene un impacto indirecto pero importante en la regulación de las alergias respiratorias a través del eje intestino-nariz.

2.3.3 Omega-3: Grasas que Calman la Inflamación Los ácidos grasos poliinsaturados omega-3, principalmente el **ácido eicosapentaenoico (EPA)** y el **ácido docosahexaenoico (DHA)** encontrados en el pescado azul, y el **ácido alfa-linolénico (ALA)** presente en fuentes vegetales como las semillas de lino (linaza) y las nueces, son componentes dietéticos fundamentales con potentes propiedades antiinflamatorias. Estos ácidos grasos actúan como precursores de resolvinas y protectinas, un grupo de mediadores lipídicos especializados que desempeñan un papel crucial en la **resolución activa de la inflamación**. En el contexto de la rinitis alérgica, los omega-3 pueden competir con los ácidos grasos omega-6 (como el ácido araquidónico) por las enzimas ciclooxigenasa (COX) y lipoxigenasa (LOX). Al hacerlo, reducen la producción de prostanoïdes y leucotrienos proinflamatorios (como la prostaglandina E2 y el leucotrieno B4) y promueven la síntesis de mediadores menos inflamatorios o incluso antiinflamatorios. Esta modulación del perfil de eicosanoides contribuye a una disminución general de la respuesta inflamatoria en la mucosa nasal. Además, los omega-3 pueden modular directamente la función de las células inmunes, incluyendo la reducción de la activación de mastocitos y la disminución de la producción de citoquinas proinflamatorias por parte de los linfocitos.

La evidencia clínica que respalda el uso de omega-3 para la rinitis alérgica, aunque no es unánime, es sugerente. Un estudio publicado en *Allergy* encontró que la suplementación con aceite de pescado rico en EPA/DHA en pacientes con asma y rinitis alérgica inducida por ejercicio redujo la producción de leucotrienos en las vías respiratorias y atenuó la respuesta inflamatoria post-ejercicio. Otros estudios han observado que poblaciones con una alta ingesta de pescado azul, como en países mediterráneos, tienen una prevalencia más baja de enfermedades alérgicas, lo que sugiere un efecto protector a largo plazo de una dieta rica en omega-3. Las principales fuentes dietéticas de EPA y DHA son el **salmón, la caballa, las sardinas, las anchoas y el atún**. Para las personas que no consumen pescado, las **semillas de chía, las semillas de lino molidas y las nueces** son buenas fuentes de ALA, que el cuerpo puede convertir en EPA y DHA, aunque la tasa de conversión es relativamente baja. La inclusión regular de estas fuentes de omega-3 en la dieta puede ser una estrategia efectiva para modular la respuesta inflamatoria subyacente en la rinitis alérgica crónica.

2.4 Probióticos y Alimentos Fermentados

La relación entre la salud intestinal y las enfermedades alérgicas ha llevado a un creciente interés en el uso de probióticos y alimentos fermentados como una estrategia terapéutica para la rinitis alérgica. Como se detalló en la sección 1.2, la microbiota intestinal juega un papel fundamental en la educación y el equilibrio del sistema inmune. La disbiosis, o el desequilibrio en la comunidad microbiana, se ha asociado con un mayor riesgo de alergias. Los probióticos, al introducir cepas bacterianas beneficiosas, pueden ayudar a restaurar este equilibrio y modular la respuesta inmune de manera que sea menos proclive a reaccionar desproporcionadamente a los alérgenos como los ácaros del polvo.

2.4.1 Yogur Natural y Kéfir El **yogur natural** y el **kéfir** son dos de los alimentos fermentados más accesibles y ricos en probióticos. El yogur se elabora fermentando la leche con cultivos bacterianos específicos, típicamente *Lactobacillus bulgaricus* y *Streptococcus thermophilus*. Algunos yogures también se enriquecen con cepas probióticas adicionales como *Lactobacillus acidophilus* y *Bifidobacterium lactis*. El kéfir, por otro lado, es una bebida fermentada más líquida que se elabora con “granos” de kéfir, una combinación simbiótica de bacterias y levaduras. Esta composición le confiere una mayor diversidad de microorganismos probióticos en comparación con el yogur estándar. Ambos productos, al consumirse regularmente, pueden contribuir a aumentar la población de bacterias benéficas en el intestino, ayudando a desplazar a las especies potencialmente perjudiciales y a fortalecer la barrera intestinal.

La evidencia clínica sobre el consumo de yogur para la rinitis alérgica ha mostrado resultados posi-

tivos. Un estudio evaluó los efectos de consumir yogurt con *Lactobacillus delbrueckii* subsp. *bulgaricus* y *Streptococcus thermophilus* durante cuatro meses en voluntarios con rinitis alérgica. Los pacientes que consumieron yogurt mostraron **mejoras en sus síntomas** y en el transporte mucociliar nasal, junto con una reducción en la secreción de IL-4 (una citoquina pro-alérgica) y un aumento en la secreción de INF- (una citoquina que promueve la respuesta Th1) en cultivos celulares ([nih.gov](https://www.nih.gov)). Estos hallazgos sugieren que el yogur puede modular la respuesta inmune de una manera beneficiosa para los alérgicos. Para maximizar los beneficios probióticos, es recomendable elegir yogures naturales sin azúcar añadido, ya que el azúcar puede contrarrestar los efectos antiinflamatorios al promover el crecimiento de bacterias no deseadas y contribuir a la inflamación sistémica. El kéfir, con su perfil microbiano más diverso, puede ofrecer beneficios aún mayores para la salud intestinal y, por extensión, para la regulación de las alergias.

2.4.2 Chucrut y Kimchi (con Moderación) El **chucrut** (col fermentada) y el **kimchi** (un plato coreano de verduras fermentadas, principalmente napa y rábanos) son fuentes excelentes de probióticos, especialmente de la familia *Lactobacillus*. Durante el proceso de fermentación láctica, las bacterias benéficas no solo preservan los alimentos sino que también producen una variedad de compuestos bioactivos, incluyendo vitaminas del grupo B, enzimas y ácidos orgánicos que pueden tener efectos positivos en la salud. El consumo de estos alimentos puede introducir una diversidad de cepas de *Lactobacillus* al intestino, contribuyendo a un perfil microbiomático más saludable y resiliente. Un ecosistema intestinal diverso se ha asociado con una mejor regulación inmune y una menor incidencia de enfermedades alérgicas.

Sin embargo, es crucial abordar el consumo de chucrut y kimchi con una nota de cautela en el contexto de la rinitis alérgica. Estos alimentos, al ser productos de la fermentación, son **naturalmente altos en histamina**. Como se discutirá en la sección 3.1, los alimentos ricos en histamina pueden actuar como desencadenantes directos de los síntomas alérgicos en individuos sensibles o con una capacidad limitada para degradar la histamina (debido a una deficiencia en la enzima diamino oxidasa o DAO). Por lo tanto, aunque ofrecen beneficios probióticos valiosos, su consumo debe ser **moderado** y la persona debe estar atenta a su respuesta individual. Si se observa un empeoramiento de los síntomas nasales después de consumir estos alimentos, puede ser necesario limitarlos o evitarlos, independientemente de sus beneficios para la microbiota. La clave es encontrar un equilibrio que permita obtener los beneficios inmunomoduladores de los probióticos sin desencadenar una respuesta de histamina.

3. Lo que Debes Evitar: Alimentos que Actúan como Desencadenantes

Así como ciertos alimentos pueden modular la respuesta alérgica de manera favorable, otros pueden actuar como desencadenantes directos o indirectos, exacerbando los síntomas de la rinitis alérgica. Estos alimentos generalmente funcionan aumentando la carga de histamina en el cuerpo, promoviendo la inflamación sistémica o desencadenando la liberación de histamina de los mastocitos. Identificar y limitar estos alimentos es una parte esencial de una estrategia dietética integral para manejar la rinitis por ácaros.

3.1 Alimentos Altos en Histamina

La histamina es una amina biógena que desempeña un papel central en la respuesta alérgica. Si bien el cuerpo la produce, también la ingiere a través de ciertos alimentos. En individuos con rinitis alérgica, cuyo sistema ya está sobreactivado, el consumo de alimentos ricos en histamina puede sobrecargar la capacidad del organismo para degradarla (principalmente a través de las enzimas DAO y HNMT), lo que resulta en una **“sobredosis” de histamina** que manifiesta o agrava los síntomas nasales. Estos alimentos pueden empeorar la congestión, aumentar la producción de moco y desencadenar estornudos, imitando o intensificando la respuesta alérgica a los ácaros ([Metro Sinus](https://www.metro-sinus.com)).

3.1.1 Quesos Madurados y Embutidos Los **quesos madurados** y los **embutidos** son dos de los grupos de alimentos con mayor contenido de histamina. El proceso de envejecimiento del queso, en el que las proteínas se descomponen, genera una acumulación significativa de histamina. Los quesos con mayor contenido suelen ser los de maduración prolongada y los de tipo “azul” o “fuerte”, como el **parmesano**, **el cheddar añejo**, **el gorgonzola** y **el roquefort**. De manera similar, los embutidos y carnes curadas, como el **salami**, **el pepperoni**, **el jamón**, **el chorizo** y **el tocino**, son productos de fermentación y curado que concentran histamina. El proceso de curado, que a menudo implica la adición de conservantes como nitratos y nitritos, no solo aumenta la histamina sino que también puede promover la inflamación de forma independiente ([WebMD](#)). Para las personas con rinitis alérgica, limitar o evitar estos alimentos puede resultar en una reducción notable de la carga de histamina y, consiguientemente, una disminución de la severidad de los síntomas. Optar por alternativas frescas, como quesos tiernos o recién hechos (que tienen menos tiempo para acumular histamina) y carnes frescas en lugar de procesadas, es una estrategia dietética recomendada.

3.1.2 Alcohol (Especialmente Vino y Cerveza) El **alcohol** es un desencadenante común y potente de los síntomas de rinitis alérgica, principalmente debido a su alto contenido de histamina y a su capacidad para inhibir la enzima DAO, que es responsable de degradar la histamina en el cuerpo. Esta doble acción —aumentar la ingesta de histamina y ralentizar su eliminación— puede llevar rápidamente a niveles elevados de histamina, provocando congestión nasal, rinorrea y sofocos. Entre las bebidas alcohólicas, el **vino tinto** y **la cerveza** son **particularmente problemáticos**, ya que contienen niveles significativos de histamina. El vino tinto es especialmente notable porque contiene tanto histamina como otros compuestos que pueden inhibir la degradación de la histamina ([WebMD](#)). Además, el alcohol actúa como un diurético, lo que puede llevar a la deshidratación. La deshidratación, a su vez, hace que el moco se vuelva más espeso y difícil de evacuar, empeorando la sensación de congestión y presión en los senos paranasales ([Metro Sinus](#)). Para las personas con rinitis alérgica crónica, limitar o abstenerse del consumo de alcohol, especialmente el vino y la cerveza, puede ser una medida efectiva para reducir la frecuencia y la intensidad de los brotes de síntomas.

3.1.3 Alimentos Fermentados (Precaución con el Chucrut y Kimchi) Como se mencionó brevemente en la sección 2.4.2, los alimentos fermentados representan una categoría compleja en el contexto de la rinitis alérgica. Por un lado, son fuentes ricas de probióticos beneficiosos que pueden modular positivamente el sistema inmune. Por otro lado, el mismo proceso de fermentación que produce estas bacterias buenas también genera **niveles elevados de histamina**. Alimentos como el **chucrut**, **el kimchi**, **la salsa de soja**, **el miso**, **el vinagre** y **el kombucha** pueden contener concentraciones significativas de histamina ([WebMD](#)). La tolerancia a estos alimentos varía enormemente de una persona a otra. Algunos individuos con rinitis alérgica pueden consumirlos sin problemas y beneficiarse de sus efectos probióticos, mientras que otros pueden experimentar un claro empeoramiento de sus síntomas. La clave es la **autoevaluación cuidadosa**. Se recomienda introducir estos alimentos en la dieta de forma gradual y en pequeñas cantidades, observando de cerca cualquier cambio en los síntomas nasales. Si se detecta una correlación entre el consumo de alimentos fermentados y un aumento de la congestión o la rinorrea, es prudente limitar su ingesta, independientemente de sus otros beneficios para la salud intestinal.

3.2 Inflamatorios y Procesados

Más allá de los alimentos ricos en histamina, una amplia categoría de productos puede exacerbar la rinitis alérgica a través de mecanismos proinflamatorios más generales. Estos alimentos, típicos de la dieta occidental moderna, pueden promover un estado de inflamación sistémica de bajo grado que “pre-sensibiliza” al organismo y hace que la mucosa nasal sea más reactiva a los alérgenos de los ácaros.

3.2.1 Azúcares Refinados y Carbohidratos Procesados El consumo excesivo de **azúcares refinados** y **carbohidratos altamente procesados** (como el pan blanco, las pastas, los pasteles y los refrescos azucarados) es un factor de riesgo bien establecido para la inflamación crónica. Estos alimentos causan picos rápidos en los niveles de glucosa en sangre, lo que desencadena una cascada de respuestas inflamatorias, incluyendo el aumento de citoquinas proinflamatorias como la IL-6. Una dieta rica en azúcar también puede alterar negativamente la composición de la microbiota intestinal, favoreciendo el crecimiento de bacterias que promueven la inflamación y debilitando la barrera intestinal. Esta inflamación sistémica inducida por la dieta puede agravar la respuesta alérgica local en la nariz, haciendo que los síntomas de la rinitis por ácaros sean más severos y persistentes. Reducir la ingesta de azúcares añadidos y optar por carbohidratos complejos de digestión lenta, como los granos enteros, las legumbres y las verduras, es una estrategia fundamental para reducir la carga inflamatoria general del cuerpo.

3.2.2 Grasas Trans y Aceites Proinflamatorios Las **grasas trans** (grasas parcialmente hidrogenadas) y ciertos aceites vegetales ricos en ácidos grasos omega-6, como el aceite de girasol, maíz y soja, son potentes promotores de la inflamación. Las grasas trans, a menudo encontradas en productos horneados, frituras y comidas rápidas, no solo aumentan el colesterol LDL (“malo”) sino que también inducen una respuesta inflamatoria significativa. Del mismo modo, un desequilibrio en la relación omega-6/omega-3 puede favorecer la producción de mediadores lipídicos proinflamatorios (como la prostaglandina E2) a expensas de los antiinflamatorios. La dieta occidental moderna tiende a ser excesivamente alta en omega-6 y baja en omega-3, lo que crea un ambiente propenso a la inflamación crónica. Para combatir la rinitis alérgica, es crucial **eliminar las grasas trans** de la dieta y moderar el consumo de aceites vegetales refinados, sustituyéndolos por opciones más saludables y antiinflamatorias como el **aceite de oliva virgen extra** (rico en ácido oleico) y aceites con un mejor perfil de omega-3.

3.2.3 Aditivos Alimentarios y Conservantes Ciertos **aditivos y conservantes** utilizados en alimentos procesados pueden actuar como desencadenantes de la rinitis alérgica en individuos sensibles. El **glutamato monosódico (MSG)**, un potenciador del sabor común, ha sido reportado como un desencadenante de síntomas en algunas personas. Los sulfitos, utilizados como conservantes en vinos, cervezas y frutas secas, pueden causar reacciones similares a la alergia, incluyendo congestión nasal y sibilancias. Los colorantes artificiales y los edulcorantes también han sido implicados en la exacerbación de síntomas en algunos casos. Aunque estos efectos no son universales, la sensibilidad a los aditivos alimentarios es una consideración importante. Optar por una dieta basada en alimentos frescos y enteros, y evitar los productos ultraprocesados con largas listas de ingredientes, no solo reduce la ingesta de estos potenciales desencadenantes sino que también promueve una dieta más rica en nutrientes antiinflamatorios de base.

3.3 El Mito de los Lácteos y el Moco

Una creencia común y persistente es que el consumo de productos lácteos aumenta la producción de moco y empeora los síntomas de congestión nasal en personas con rinitis o resfriados. Este “mito del moco” ha llevado a muchas personas a eliminar los lácteos de su dieta en un intento por aliviar sus síntomas. Sin embargo, la evidencia científica rigurosa no respalda esta afirmación. Múltiples estudios han investigado este vínculo y la conclusión general es que **el consumo de leche y productos lácteos no aumenta la producción de moco ni agrava los síntomas de la rinitis alérgica en la mayoría de las personas** ([Rediscover Dairy](#)) .

3.3.1 Qué Dice la Ciencia La percepción de que la leche aumenta el moco probablemente se origina en la textura cremosa de la bebida, que puede dejar una sensación de “capa” o espesor en la boca y la garganta, simulando la sensación de moco espeso. Sin embargo, estudios de doble ciego controlados

con placebo han demostrado que esta es una sensación táctil, no un efecto fisiológico real. En un estudio pionero de Pinnock y Arney (1993), se comparó el consumo de leche de vaca con una bebida de soja con características de sabor en la boca similares en un ensayo doble ciego. Los participantes que creían que la leche causa moco reportaron síntomas similares (como la necesidad de tragar más y saliva más espesa) con **ambas bebidas**, lo que indica que el efecto está relacionado con la viscosidad y las propiedades coloidales de la bebida, y no es específico de la leche (dairynutrition.ca) . Otros estudios que desafiaron a los participantes con virus del resfriado y midieron objetivamente la producción de moco tampoco encontraron una asociación entre el consumo de leche y el aumento de las secreciones nasales (dairynutrition.ca) .

3.3.2 Cómo Identificar si Tú Eres la Excepción A pesar de la falta de evidencia general, es importante reconocer la posibilidad de una **intolerancia individual o una alergia a la proteína de la leche de vaca (APLV)**. Una verdadera alergia a la leche, aunque es rara en adultos (menos del 0.5% a nivel mundial), es una reacción inmune que puede manifestar síntomas que imitan o empeoran la rinitis alérgica, como rinorrea, congestión nasal y sibilancias ([Rediscover Dairy](#)) . La intolerancia a la lactosa (la incapacidad para digerir el azúcar de la leche) es más común, pero sus síntomas son principalmente gastrointestinales (hinchazón, diarrea) y no suelen incluir la producción de moco nasal. La mejor manera de determinar si los lácteos te afectan personalmente es llevar un **diario de alimentos y síntomas**. Si notas una correlación clara y consistente entre el consumo de lácteos y un empeoramiento de tus síntomas nasales, podría valer la pena realizar una prueba de eliminación de 2-4 semanas, seguida de una reintroducción, bajo la supervisión de un profesional de la salud. Si no observas ningún patrón, no hay razón científica para evitar los lácteos, que son una fuente importante de calcio, proteínas y vitaminas.

Alimento / Categoría	Efecto en la Rinitis Alérgica	Recomendación	Notas
Quesos madurados (Parmesano, Cheddar)	Muy alto en histamina; puede desencadenar síntomas directamente	Evitar / Limitar severamente	El proceso de envejecimiento genera histamina (WebMD)
Embutidos (Salami, jamón, pepperoni)	Alto en histamina y conservantes; proinflamatorio	Evitar / Limitar severamente	El curado y el envejecimiento aumentan la histamina (Allergy clinic)
Alcohol (Vino, cerveza)	Alto en histamina; inhibe la enzima DAO; deshidratante	Evitar / Limitar severamente	El vino tinto es un desencadenante particularmente fuerte (WebMD)
Azúcares refinados	Promueve la inflamación sistémica de bajo grado	Limitar fuertemente	Causa picos de glucosa y altera la microbiota
Grasas trans	Potente inductor de inflamación	Eliminar	Presente en frituras, comidas rápidas y productos horneados industriales
Productos lácteos (Leche, yogur)	No aumenta el moco en la mayoría de las personas	Moderar solo si se observa una reacción personal	El “mito del moco” no está respaldado por la ciencia (Rediscover Dairy)

Table 2 – continued

Alimento / Categoría	Efecto en la Rinitis Alérgica	Recomendación	Notas
Chucrut y Kimchi	Ricos en probióticos pero también en histamina	Consumir con moderación y cautela	Observar la respuesta individual; los beneficios probióticos deben sopesarse con la carga de histamina (WebMD)
Aditivos alimentarios (MSG, sulfitos)	Pueden desencadenar síntomas en individuos sensibles	Limitar	Común en alimentos ultraprocesados y restaurantes

Tabla 2: Guía de alimentos a limitar o evitar para el manejo de la rinitis alérgica por ácaros.

4. Tu Plan de Acción Práctico

Transformar el conocimiento científico sobre la alimentación anti-rinitis en un plan de acción diario es el paso crucial para obtener beneficios reales. Esta sección proporciona un marco estructurado que incluye un plan de comidas semanal tipo, estrategias de preparación y hábitos complementarios para maximizar el impacto de tu dieta en la gestión de los síntomas de rinitis alérgica por ácaros del polvo.

4.1 Plan de Comidas Semanal Tipo

Adoptar una estructura diaria que incorpore consistentemente alimentos antiinflamatorios y evite los desencadenantes conocidos es la estrategia más efectiva. El siguiente plan no es rígido, sino un modelo flexible diseñado para ilustrar cómo se pueden combinar los principios discutidos en comidas equilibradas y deliciosas. La clave es la variedad para asegurar una amplia gama de fitonutrientes y mantener la adherencia a largo plazo.

un grano completo con proteína.

- **Opción 2: Pechuga de pollo al cúrcuma con ensalada de berros y pepino.** El pollo es una proteína magra. La cúrcuma, especialmente con una pizca de pimienta negra, es un potente antiinflamatorio. El berro es una de las fuentes más ricas en quercetina.
- **Opción 3: Sopa de lentejas con jengibre y verduras.** Las lentejas son una excelente fuente de fibra y proteína vegetal. El jengibre añade su poder antiinflamatorio. Una comida reconfortante y nutritiva.
- **Opción 4: Ensalada de garbanzos con aceite de oliva, limón y hierbas.** Los garbanzos son ricos en fibra y proteína. El aceite de oliva virgen extra es antiinflamatorio. Añadir hierbas frescas como el perejil y la albahaca.
- **Opción 5: Pescado blanco al horno con espárragos y batata.** Una alternativa ligera al pescado azul. Los espárragos son prebióticos. La batata es un carbohidrato complejo rico en betacaroteno.

4.1.3 Snacks y Bebidas Saludables Elegir snacks inteligentes puede mantener estables los niveles de energía y proporcionar una dosis continua de nutrientes antiinflamatorios a lo largo del día.

- **Snacks:** Manzana con una cucharada de mantequilla de almendras, una pera, una puñada de nueces de Brasil (2 al día para cubrir las necesidades de selenio), zanahorias con hummus, palitos de apio, o una granada (rica en antioxidantes).
- **Bebidas:** Agua con limón (el limón es alcalinizante y rico en vitamina C, aunque algunos lo consideran un liberador de histamina, la mayoría lo tolera bien), té verde (2-3 tazas al día), té de jengibre fresco, té de menta (puede ayudar a descongestionar), o té de manzanilla (calmante y antiinflamatorio).

4.2 Estrategias de Implementación

Cambiar la dieta puede ser un desafío. Aplicar estrategias prácticas puede facilitar la transición y asegurar que los cambios sean sostenibles a largo plazo, maximizando los beneficios para la salud nasal y general.

4.2.1 Cambios Graduales vs. Cambios Drásticos La decisión de realizar cambios graduales o drásticos depende de la personalidad y el estilo de vida de cada persona. Un **enfoque gradual**, como incorporar un nuevo alimento antiinflamatorio por semana y eliminar un alimento procesado, puede ser más sostenible y menos abrumador. Esto permite que el paladar y los hábitos se adapten lentamente, aumentando la probabilidad de éxito a largo plazo. Por otro lado, algunas personas pueden beneficiarse de un **cambio más drástico**, como un “reinicio” dietético de 2-4 semanas donde se eliminan todos los alimentos proinflamatorios y se enfoca exclusivamente en alimentos integrales. Este enfoque puede proporcionar una mejoría más rápida en los síntomas, lo cual puede ser una poderosa motivación para mantener la nueva dieta. Sin embargo, requiere más planificación y compromiso inicial. La mejor estrategia es aquella que puedas mantener de manera consistente.

4.2.2 La Importancia de la Variedad y el Color en tu Plato Un principio fundamental de una dieta antiinflamatoria es **comer una amplia variedad de alimentos de todos los colores**. Los diferentes pigmentos en las frutas y verduras corresponden a diferentes tipos de fitonutrientes, cada uno con mecanismos antiinflamatorios y antioxidantes únicos. Por ejemplo, el rojo de los tomates y las sandías proviene del licopeno, el azul/morado de los arándanos y las berenjenas de las antocianinas, el naranja

de las zanahorias y las calabazas del betacaroteno, y el verde de las espinacas y el brócoli de la clorofila y el sulforafano. Al llenar tu plato con una “variedad de colores”, te aseguras de obtener un espectro completo de estos compuestos beneficiosos que trabajan sinérgicamente para modular la respuesta inmune y combatir la inflamación. Esto no solo es nutricionalmente óptimo sino también visualmente atractivo, lo que hace que las comidas sean más satisfactorias.

4.2.3 Llevar un Diario de Alimentos y Síntomas Llevar un **diario detallado de alimentos y síntomas** es una de las herramientas más poderosas para personalizar tu dieta anti-rinitis. En este diario, debes registrar todo lo que comes y bebes, junto con la hora, y luego hacer un seguimiento de la severidad de tus síntomas nasales (congestión, rinorrea, estornudos, prurito) en diferentes momentos del día. Después de unas pocas semanas, puedes comenzar a buscar patrones. Puede descubrir que ciertos alimentos, incluso aquellos considerados “saludables” como los cítricos o las espinacas, desencadenan tus síntomas, posiblemente debido a una sensibilidad individual a la histamina. Alternativamente, puedes notar que tus síntomas son consistentemente menores en los días que consumes una comida rica en omega-3 o una taza de té de jengibre. Este diario te convierte en un detective de tu propia salud, proporcionando datos objetivos para ajustar tu plan de alimentación de manera que sea verdaderamente efectivo para ti, más allá de las recomendaciones generales.

4.3 Hábitos Complementarios para Potenciar el Efecto

La dieta es una pieza fundamental del rompecabezas, pero su eficacia se multiplica cuando se combina con otros hábitos de estilo de vida que apoyan la salud inmune y reducen la carga alérgica.

4.3.1 Lavado Nasal con Suero Fisiológico El **lavado nasal con suero fisiológico**, también conocido como irrigación nasal, es una intervención no farmacológica altamente efectiva y recomendada como terapia complementaria para la rinitis alérgica. Esta práctica consiste en enjuagar las cavidades nasales con una solución salina (isotónica o hipertónica) para eliminar físicamente los alérgenos (como las proteínas de los ácaros), el moco y los mediadores inflamatorios que se acumulan en la mucosa nasal. Un análisis sistemático y meta-análisis de ensayos clínicos encontró que la irrigación nasal regular durante un período de hasta 7 semanas tuvo un **efecto positivo en todos los parámetros de resultado investigados**. Específicamente, se observó una **mejora del 27.66% en los síntomas nasales**, una **reducción del 62.1% en el consumo de medicamentos**, una **aceleración del 31.19% en el tiempo de aclaración mucociliar**, y una **mejora del 27.88% en la calidad de vida** ([nih.gov](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/)) . Es una práctica bien tolerada, económica y fácil de usar, sin evidencia de que cause efectos secundarios adversos cuando se realiza correctamente con agua estéril o previamente hervida y enfriada ([nih.gov](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/)) .

4.3.2 Hidratación y Sueño de Calidad La **hidratación adecuada** es esencial para mantener el moco nasal fluido y facilitar su eliminación. La deshidratación puede hacer que el moco se vuelva espeso y pegajoso, atrapando los alérgenos y empeorando la congestión. Beber suficiente agua a lo largo del día, y especialmente al despertar, ayuda a mantener las membranas mucosas hidratadas y funcionando correctamente. Por otro lado, el **sueño de calidad** es fundamental para la regulación del sistema inmune. La privación de sueño o un sueño fragmentado puede alterar el balance de las citoquinas inflamatorias, aumentando las proinflamatorias y disminuyendo las antiinflamatorias, lo que puede exacerbar la respuesta alérgica. Establecer una rutina de sueño regular, creando un ambiente oscuro, fresco y libre de alérgenos en el dormitorio (usando fundas de almohada antiácaros), y evitando pantallas antes de dormir, pueden mejorar significativamente la calidad del sueño y, con ello, ayudar a controlar los síntomas de la rinitis.

4.3.3 Control del Estrés El **estrés crónico** tiene un profundo impacto negativo en el sistema inmune y puede exacerbar las enfermedades alérgicas. Cuando el cuerpo está bajo estrés, libera hormonas como el cortisol, que en niveles elevados y sostenidos pueden suprimir la función inmune y promover la inflamación. El estrés también puede aumentar la permeabilidad intestinal, exacerbando el eje intestino-nariz. Además, el estrés emocional puede desencadenar o agravar los síntomas de rinitis alérgica directamente, independientemente de la exposición al alérgeno. Incorporar técnicas de manejo del estrés en la rutina diaria, como la meditación, el yoga, la respiración profunda o simplemente pasar tiempo en la naturaleza, puede ayudar a modular la respuesta al estrés y, por lo tanto, tener un efecto beneficioso indirecto en la severidad de la rinitis alérgica. Un cuerpo relajado es un cuerpo con una respuesta inmune más equilibrada y menos reactiva.




Figure 3: Comparación de evidencia clínica para nutraceuticos

5. Expectativas Realistas y Cuándo Consultar a un Profesional

Abordar la rinitis alérgica crónica por ácaros a través de la alimentación es una estrategia empoderadora y basada en la evidencia, pero es crucial establecer expectativas realistas y reconocer los límites de la nutrición como herramienta terapéutica. La dieta no es una cura mágica, sino un pilar fundamental de un enfoque de manejo integral.

5.1 La Dieta como Complemento, no como Cura

Es importante entender que los cambios dietéticos actúan como un **coadyuvante poderoso**, no como un sustituto de los tratamientos médicos convencionales. La evidencia científica muestra que nutraceuticos como la cúrcuma y el jengibre pueden reducir significativamente los síntomas y mejorar la calidad de vida, con efectividad comparable a algunos antihistamínicos en estudios clínicos ([PubMed](#)). Sin embargo, la alimentación por sí sola es poco probable que “cure” la sensibilidad subyacente a los ácaros del polvo. Su rol principal es modular la respuesta inmune, reducir la inflamación de base y disminuir la severidad y frecuencia de los brotes. Por lo tanto, la dieta anti-rinitis debe integrarse en un plan de manejo más amplio que puede incluir la medicación (antihistamínicos, corticoides nasales), la inmunoterapia (vacunas para

la alergia) y las medidas de control ambiental (eliminación de ácaros en el hogar). Ver la alimentación como una forma de “apoyar” a tu cuerpo para que responda de manera más calmada a los alérgenos, en lugar de esperar que elimine la alergia por completo, es la perspectiva más saludable y efectiva.

5.2 Tiempo de Respuesta: No es Inmediato

A diferencia de un antihistamínico que puede aliviar los síntomas en cuestión de minutos, los beneficios de los cambios dietéticos son acumulativos y requieren **tiempo y consistencia**. Los compuestos bioactivos de los alimentos necesitan tiempo para incorporarse a los tejidos y ejercer sus efectos moduladores en el sistema inmune. Por ejemplo, se recomienda tomar quercetina de forma consistente durante **2 a 3 semanas** antes de la temporada de alergias para que se acumule en los tejidos y establezca la estabilización de los mastocitos ([Remedy's Nutrition](#)). De manera similar, los estudios clínicos con cúrcuma y jengibre evaluaron sus efectos durante períodos de **6 a 8 semanas** ([PubMed](#)). Por lo tanto, no te desanimes si no notas una mejoría dramática en los primeros días. Es un proceso gradual. Se recomienda comprometerse con el nuevo plan de alimentación durante al menos **4 a 6 semanas** para evaluar adecuadamente su impacto, manteniendo un diario de síntomas para rastrear cualquier cambio sutil pero progresivo en tu bienestar nasal y general.

5.3 Señales de Alerta para Buscar Ayuda Médica

Aunque la autogestión a través de la dieta y el estilo de vida es valiosa, existen situaciones en las que es imperativo buscar la orientación de un profesional de la salud. Es fundamental consultar a un médico o alergólogo si experimentas cualquiera de las siguientes señales de alerta:

- **Síntomas severos o que empeoran:** Si la congestión nasal es tan intensa que dificulta la respiración, el sueño o las actividades diarias.
- **Síntomas fuera de la nariz:** Si desarrollas sibilancias, dificultad para respirar, opresión en el pecho o sibilancias, ya que esto podría indicar asma inducida por alergia, una condición más grave.
- **Infecciones de oído o senos paranasales frecuentes:** La rinitis alérgica crónica puede predisponer a infecciones (sinusitis, otitis). Si sufres de estas de forma recurrente, necesitas una evaluación médica.
- **Falta de respuesta al tratamiento:** Si has implementado diligentemente cambios dietéticos y de estilo de vida durante varias semanas junto con medicamentos de venta libre y tus síntomas no mejoran o empeoran.
- **Considerar la inmunoterapia:** Si tu alergia a los ácaros es severa y persistente, un alergólogo puede discutir la inmunoterapia (inyecciones o sublingual), que es el único tratamiento que puede modificar el curso de la enfermedad alérgica a largo plazo, reduciendo la sensibilidad al alérgeno. La dieta y la inmunoterapia pueden trabajar de la mano de manera sinérgica.