Теорема на Хилберт-Акерман

Ангел Димитриев

Дефиниция. Хеникова система.

Една формална систма е **хеникова**, ако за всяка затворена формула $\exists xA$ на системата, съществува затворен терм t, такъв че $\exists xA \implies A_x[t]$ е теорема на системата.

Забележка. А изразява свойство на х. Системата трябва да е готова с пример, в случай че свойството е изпълнено в нея. Но това **HE** означава, че тя дава примера преди да сме доказали, че свойството е вярно.

Дефиниция. Специални константи. Специални аксиоми

Нека F е формална система. Ако $\exists xA$ е затворена формула от симовлите на F (и специалните константи на F), то символът $K_{\exists xA}$ е специална константа на F за формулата $\exists xA$.

Ако $K_{\exists xA}$ е специална константа, то формулата:

$$\exists x A \implies A_x [K_{\exists x A}] \tag{1}$$

наричаме **специална аксиома** за $K_{\exists xA}$.

Ако F' е получен от F, добавяйки всички специални константи, то от **теоремата за константите** следва, че F' е консервативни разшиерение на F. А ако SA е множеството на всички специални аксиоми, то F'[SA] е **хенкинова формална система**.

Твърдение 1:

Ако $\vdash_F T$, то всеки затворен частен случай на T от $L_c(F)$ е тавтологично следствие на затворени частни случаи в $L_c(F)$ на аксиомите и специалните аксиоми на F.

Доказателство:

Нека $\vdash_F T$ и нека T' е затворен частен случай на T.

Ще покажем, че T' е тавтологично следствие на затворени частни случаи на аксиомите и специалните аксиоми. Ще направим индукция по дължината на извода в F.

- 1. 1 случай:
- Нека Т е аксиома.

то T' е затворен частен случай на аксиома на F.

Но всеки терм е тавтологично следствие на себе си (в частност T' на T'), от където следва, че T' е тавтологично следствие на затворени частни случай на аксиомите на F (в частност аксиомата T).

• Нека T е тавтологично следствие на $T_1, T_2...T_n$:

Тогава T' се получава чрез замяна на свободните промени с термове в T. Прилагаме същите замени в $T_1, T_2...T_n$ и получаваме $T_1', T_2'...T_n'$. Тогава $T_1', T_2'...T_n'$ са затворени частни случаи на теоремите $T_1, T_2...T_n$.

От и.п. $T'_1, T'_2...T'_n$ са тавтологични следствия на затворени частни случаи на аксиомите и специалните аксиоми. Но T' е тавтологично следствие на $T'_1, T'_2...T'_n$. А T' е тавтологично следствие на това, на което $T'_1, T'_2...T'_n$ са тавтологични следствия.

Следователно T' е тавтологично следствие на затворени частни случаи на аксиомите и специалните аксиоми.

2. Нека T се получава от $A \Longrightarrow B$ чрез ($\Pi \exists$).

Тогава: $T' = \exists x A' \implies B'$, където A' е частен случай на A, а B' е **затворен** частен случай на B.

Възможно е A' да **не е затворена**. Ако в A променливата x е участвала **свободно**, то в T' тя вече е свързана и **не можем да я заменим** в A'. Тогава за да получим **затворен** частен случай на $\exists xA' \Longrightarrow B'$ **трябва да заменим свободните срещания на** x (които са в A') с терм.

Нека $C_{\exists xA'}$ е специалната константа на $\exists xA'$.

Тогава $A'_x[C_{\exists xA'}] \implies B'$ е затворен частен случай на $A \implies B$. От и.п. формулата $A'_x[C_{\exists xA'}] \implies B'$ е тавтологично следствие на аксиомите на F и специалните аксиоми на F.

Специалната аксиома за $C_{\exists xA'}$ е $\exists xA' \implies A'_x[C_{\exists xA'}]$. Имаме, че:

- а) $\exists xA' \implies A'_x[C_{\exists xA'}]$ е специална аксиома.
- б) $A_x'[C_{\exists xA'}] \Longrightarrow B'$ е тавтологично следствие на аксиомите и специалните аксиоми на F

От а), б) и транзитивността на импликацията следва, че:

 $T' = \exists x A' \implies B'$ е тавтологично следствие на затворени частни случаи в $L_c(F)$ на аксиомите и специалните аксиоми на F.

Теорема на Хилеберт-Акерман:

Нека F е формална система, имаща само **безкванторни нелогически аксиоми**. Тогава F е противоречива тогава и само тогава, когато някоя дизюнкция от отрицания на частни случаи на нелогическите аксиоми на F е тавтологично следствие на частни случаи на аксиомите за равенството.

Доказателство:

 $\ \, \Longleftrightarrow \ \, \big)$ Нека някоя дизюнкция от отрицания на частни случаи на нелогически аксиоми на F е тавтологично следствие на частни случай на аксиомите за равенството. Т.е. :

$$\neg A_1 \lor \neg A_2 \lor \dots \lor \neg A_n \tag{2}$$

е тавтологично следствие на частни случаи на аксиомите за равенството и $A_i(1 <= i <= n)$ е частен случай на аксиомите на F. Но тогава:

$$\vdash_F \neg A_1 \lor \neg A_2 \lor \dots \lor \neg A_n \tag{3}$$

но A_i е частен случай на аксиома и съгласно **теоремата за замяната**:

$$\vdash_F A_1, \vdash_F A_2, \dots \vdash_F A_n$$
 (4)

Горната формула може да запишем така:

$$A_1 \implies A_2 \implies A_3 \implies \dots \implies A_{n-2} \implies A_{n-1} \implies \neg A_n.$$
 (5)

Ho по modus ponens:

$$\mathscr{A}_1 \Longrightarrow A_2 \Longrightarrow A_3 \Longrightarrow \ldots \Longrightarrow A_{n-2} \Longrightarrow A_{n-1} \Longrightarrow \neg A_n \qquad (6)$$

$$\cancel{A}_1 \Longrightarrow \cancel{A}_2 \Longrightarrow A_3 \Longrightarrow \ldots \Longrightarrow A_{n-2} \Longrightarrow A_{n-1} \Longrightarrow \neg A_n$$

$$\mathscr{A}_1 \Longrightarrow \mathscr{A}_2 \Longrightarrow \mathscr{A}_3 \Longrightarrow \ldots \Longrightarrow A_{n-2} \Longrightarrow A_{n-1} \Longrightarrow \neg A_n$$

.

$$\cancel{A}_1 \implies \cancel{A}_2 \implies \cancel{A}_3 \implies \dots \implies \cancel{A}_{n-2} \implies \cancel{A}_{n-1} \implies \neg A_n$$

Следователно $\neg A_n$ е теорема на F. Но и A_n е теорема на F. От тук следва, че F е противоречива.

 \Longrightarrow) Нека F е противоречива (и F има само безкванторни нелогически аксиоми). Тогава $\vdash_F x \neq x$. Но от твърдение 1, следва, че $c \neq c$ (c е произволна константа от $L_c(F)$) е **тавтологично следствие** на затворени в $L_c(F)$ частни случай на аксиомите и специалните аксиоми на F.

Т.е от затворени частни случай на аксиомите и специалните аксиоми на F, използвайки само **теорема за тавтологиите**, може да докажем, че $c \neq c$. Следователно имаме нещо от типа:

$$A_1 \implies A_2 \implies A_3 \implies \dots \implies A_n \implies c \neq c$$

което е тавтология. $A_i(1 \le i \le n)$ е частен случай на аксиомите и специалните аксиоми на F. Ще трябва да се освободим от **аксиомите за субституция и специалните аксиоми**. Така ще получим тавтология, която е дизюнкция от отрицания на затворени частни случаи в $L_c(F)$ на аксиоми за равенството и нелогически аксиоми на F. Имаме следната тавтология:

$$\neg A_1 \lor \neg A_2 \lor \neg A_3 \cdots \lor \neg A_n$$

 $A_i(1 <= i <= n)$

- Затворена аксиома за субституцията.
- Затворен частен случай на аксиома за равенството.
- \bullet Затворен частен случай на аксиома на F.

Но F е отворена формална система - **нелогическите аксиоми нямат квантори**. В аксиомите за равенството също **няма квантори**. Тогава може да разпознаем дали A_i е аксиома за субституцията/специална аксиома по това **дали съдържа квантор**.

Нека $\exists xA'$ е формулата с възможно най-много квантори от тавтологията. Тогава $\exists xA'$ е парче от:

- $A_x'[a] \implies \exists x A'$ (част от аксиома за субституцията).
- $\exists x A' \implies A'_x[C_{\exists x A'}]$ (част от специална аксиома)

Тогава имаме следната тавология:

$$\neg(\exists xA' \implies A'_x[C_{\exists xA'}]) \vee \neg(A'_x[a_1] \implies \exists xA') \vee \cdots \vee \neg(A'_x[a_m] \implies \neg(A'_x[a_$$

$$\vee \neg A_1 \vee \neg A_2 \vee \neg A_3 \cdots \vee \neg A_s$$

където $\exists x A'$ не участва в A_1, \ldots, A_s .

Забележка: Ако някой дизюнкт не участва във формулата

(например: $A_x'[a] \implies \exists xA'$), то понеже нашата дизюнкция е тавтология, можем да го добавим.

Искаме да премахнем $\exists xA'$. След краен брой прилагания на тази процедура(която сега ще приложим), ще премахнем всички квантори от тавтологията.

Заместваме $\exists xA' \in A'_x[C_{\exists xA'}])$

$$\neg (A'_x[C_{\exists xA'}] \implies A'_x[C_{\exists xA'}]) \vee \neg (A'_x[a_1] \implies A'_x[C_{\exists xA'}]) \vee \cdots \vee \neg (A'_x[a_m] \implies A'_x[C_{\exists xA'}]) \vee \neg (A'_x[a_m] \implies A'_x[C_{\exists xA'}]) \vee (A'_x[a_m] \implies A'_x[A_x[a_m] \implies A'_x[$$

$$\vee \neg A_1 \vee \neg A_2 \vee \neg A_3 \cdots \vee \neg A_s$$

Но $A_x'[C_{\exists xA'}] \implies A_x'[C_{\exists xA'}]$ е аксиома, т.е целият дизюнкт можем да го премахнем. Така получаваме тавтологията:

$$\neg (A'_x[a_1] \implies A'_x[C_{\exists xA'}]) \lor \dots \lor \neg (A'_x[a_m] \implies A'_x[C_{\exists xA'}]) \lor \lor \neg A_1 \lor \neg A_2 \lor \neg A_3 \dots \lor \neg A_s$$

За всеки израз t с t^i да означим израза, който се получава след заместване на $C_{\exists xA'}$ с a_i . Заместваме и в индексите на специалните константи. При тази замяна, спциалната константа се превръща в специална константа, а специалните аксиоми в специални аксиоми. Получаваме m тавтологии.

$$\neg (A'_x[a_1^1] \implies A'_x[a_1]) \lor \dots \lor \neg (A'_x[a_m^1] \implies A'_x[a_1]) \lor \neg A_1^1 \lor \dots \lor \neg A_s^1$$

$$\neg (A'_x[a_1^2] \implies A'_x[a_2]) \lor \dots \lor \neg (A'_x[a_m^2] \implies A'_x[a_2]) \lor \neg A_1^2 \lor \dots \lor \neg A_s^2$$

 $\neg (A'_x[a_1^m] \implies A'_x[a_m]) \lor \dots \lor \neg (A'_x[a_m^m] \implies A'_x[a_m]) \lor \neg A_1^m \lor \dots \lor \neg A_s^m$

Ако в і-тата тавтология a_i е истина, то първите m дизюнкта ще са лъжа. От тук получаваме, че:

$$A'_x[a_1] \implies \neg A_1^1 \lor \dots \lor \neg A_s^1$$

$$A'_x[a_2] \implies \neg A_1^2 \lor \dots \lor \neg A_s^2$$

$$\vdots$$

От (*) за да бъде истина дизюнкта $\neg (A_x'[a_1] \implies A_x'[C_{\exists xA'}]) (1 <= i <= m)$, то трябва $A_x'[a_1]$ да е истина. Следователно получаваме:

 $A'_{r}[a_{m}] \implies \neg A_{1}^{m} \lor \cdots \lor \neg A_{s}^{m}$

$$\neg (A'_x[a_1] \implies A'_x[C_{\exists xA'}]) \implies A'_x[a_1]$$

$$\neg (A'_x[a_2] \implies A'_x[C_{\exists xA'}]) \implies A'_x[a_2]$$

$$\vdots$$

$$\neg (A'_x[a_m] \implies A'_x[C_{\exists xA'}]) \implies A'_x[a_m]$$

Следователно следната формула е тавтология:

$$\neg A_1^1 \lor \dots \lor \neg A_s^1 \lor \dots \dots \lor \neg A_1^m \lor \dots \lor \neg A_s^m \lor \neg A_1 \lor \dots \neg A_m.$$