

**MBA
USP
ESALQ**

Supervised Machine Learning: Modelagem Multinível

Prof. Dr. Luiz Paulo Fávero

*A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.

Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização.

Lei nº 9610/98


MODELAGEM MULTINÍVEL

Fundamentação teórica dos modelos multinível

Conceitos para a estimação de
modelos multinível

Modelagem multinível no Python

Reflexão



Contexto


Machine Learning

Unsupervised

Análise de
Conglomerados

Componentes
Principais

Análise de
Correspondência




Supervised

Modelos Lineares
Generalizados (GLM)

Modelos Lineares
Generalizados
Multinível (GLMM)

O que são Modelos Multinível?

São modelos que reconhecem a existência de estrutura multinível ou hierárquica nos dados.



Stephen W. Raudenbush
University of Chicago

Hierarchical linear models: applications and data analysis methods. 2. ed. Thousand Oaks: Sage Publications, 2002.




Anthony S. Bryk
Stanford University


Estrutura Multinível




Estrutura Multinível




Estrutura Multinível




Estrutura Multinível



Estrutura Multinível



Estrutura Multinível



Estrutura Multinível

Escola 1:

$$Y_{i1} = \beta_{01} + \beta_{11} \cdot X_{i1} + \varepsilon_{i1}$$

Escola 2:

$$Y_{i2} = \beta_{02} + \beta_{12} \cdot X_{i2} + \varepsilon_{i2}$$

Escola 3:

$$Y_{i3} = \beta_{03} + \beta_{13} \cdot X_{i3} + \varepsilon_{i3}$$

Escola 4:

$$Y_{i4} = \beta_{04} + \beta_{14} \cdot X_{i4} + \varepsilon_{i4}$$

O Modelo Multinível

Nível 1

$$Y_{ij} = \beta_{0j} + \beta_{1j} \cdot X_{ij} + \varepsilon_{ij}$$

Nível 2

$$\beta_{0j} = \gamma_{00} + \gamma_{01} \cdot W_j + \nu_{0j}$$

$$\beta_{1j} = \gamma_{10} + \gamma_{11} \cdot W_j + \nu_{1j}$$

$$Y_{ij} = \underbrace{\left(\gamma_{00} + \gamma_{01} \cdot W_j + \nu_{0j} \right)}_{\text{intercepto com efeitos aleatórios}} +$$

**intercepto com
efeitos aleatórios**

$$\underbrace{\left(\gamma_{10} + \gamma_{11} \cdot W_j + \nu_{1j} \right)}_{\text{inclinação com efeitos aleatórios}} \cdot X_{ij} + \varepsilon_{ij}$$

**inclinação com
efeitos aleatórios**

O Modelo Multinível

$$Y_{ij} = \underbrace{\gamma_{00} + \gamma_{10} \cdot X_{ij} + \gamma_{01} \cdot W_j + \gamma_{11} \cdot W_j \cdot X_{ij}}_{\text{Efeitos Fixos}} + \underbrace{\nu_{0j} + \nu_{1j} \cdot X_{ij}}_{\text{Efeitos Aleatórios}} + \varepsilon_{ij}$$

- Os modelos tradicionais de regressão ignoram as interações entre variáveis no componente de efeitos fixos e as interações entre termos de erro e variáveis no componente de efeitos aleatórios.

Multilevel statistical models. 4. ed. Chichester: John Wiley & Sons, 2011.

Harvey Goldstein
Centre for Multilevel Modelling
University of Bristol



Variância dos Termos Aleatórios

Se as variâncias dos termos aleatórios ν_{0j} e ν_{1j} forem estatisticamente diferentes de zero, procedimentos tradicionais de estimação dos parâmetros do modelo, como mínimos quadrados ordinários, não serão adequados.



Barbara G. Tabachnick
California State University

Using multivariate statistics. 6. ed. Boston: Pearson, 2013.



Linda S. Fidell
California State University

Dummies?

Apenas a inserção de ***dummies* de grupo** não capturaria os **efeitos contextuais**, visto que não permitiria que se separassem os efeitos observáveis dos não observáveis sobre a variável dependente.



Sophia Rabe-Hesketh
U. C. Berkeley

Multilevel and longitudinal modeling using Stata. 3. ed.
College Station: Stata Press, 2012.

Anders Skrondal
*Norwegian Institute of Public Health
University of Oslo
U. C. Berkeley*



Por que Utilizar?

Os modelos multinível permitem, portanto, o desenvolvimento de novos e mais bem elaborados constructos para predição e tomada de decisão.

“Dentro de uma estrutura de modelo com equação única, parece não haver uma conexão entre indivíduos e a sociedade em que vivem. Neste sentido, o uso de equações em níveis permite que o pesquisador ‘pule’ de uma ciência a outra: alunos e escolas, famílias e bairros, firmas e países. Ignorar esta relação significa elaborar análises incorretas sobre o comportamento dos indivíduos e, igualmente, sobre os comportamentos dos grupos. Somente o reconhecimento destas recíprocas influências permite a análise correta dos fenômenos.”

Methodology and epistemology of multilevel analysis.

London: Kluwer Academic Publishers, 2003.

Daniel Courgeau

*Institut National D'Études
Démographiques*



APLICAÇÕES DE MODELAGEM MULTINÍVEL

Aplicações

Business, Economics & Management

Periódico	Índice h5 (Google Scholar)	% / Modelos Supervisionados
Journal of Business Research	173	10,78%
American Economic Review	160	12,71%
Technological Forecasting and Social Change	157	14,04%
Journal of Business Ethics	136	12,15%
Journal of Retailing and Consumer Services	131	11,83%
International Journal of Hospitality Management	130	3,75%
Tourism Management	126	6,88%
Journal of Financial Economics	123	4,59%
Energy Economics	122	8,15%
The Review of Financial Studies	119	8,57%
		9,26%

Aplicações

Engineering & Computer Science

Periódico	Índice h5 (Google Scholar)	% / Modelos Supervisionados
IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition	356	4,78%
Advanced Materials	294	3,56%
International Conference on Learning Representations	253	6,22%
Neural Information Processing Systems	245	4,83%
Renewable and Sustainable Energy Reviews	225	3,42%
Advanced Energy Materials	206	2,53%
International Conference on Machine Learning	204	8,24%
Energy & Environmental Science	202	3,54%
ACS Nano	202	2,89%
European Conference on Computer Vision	197	3,38%
		4,28%

Aplicações

Health & Medical Sciences

Periódico	Índice h5 (Google Scholar)	% / Modelos Supervisionados
The New England Journal of Medicine	410	1,97%
The Lancet	345	2,34%
Cell	288	2,41%
Journal of the American Medical Association	253	2,75%
Proceedings of the National Academy of Sciences	245	0,98%
Journal of Clinical Oncology	213	1,75%
Nature Medicine	205	0,73%
The Lancet Oncology	196	0,45%
PLoS ONE	185	0,43%
Nature Genetics	184	2,34%
		1,70%

Aplicações

Social Sciences

Periódico	Índice h5 (Google Scholar)	% / Modelos Supervisionados
Journal of Business Ethics	117	0,97%
Computers & Education	109	0,34%
Research Policy	95	0,41%
New Media & Society	93	0,75%
American Journal of Public Health	90	0,98%
Global Environmental Change	86	0,75%
Nature Human Behaviour	84	0,73%
Health Affairs	84	0,45%
Social Science & Medicine	83	0,43%
Teaching and Teacher Education	83	0,97%
		0,64%

Pouca Utilização: Qual a Razão?

- Estrutura dos dados.
- Não consideração de natureza multinível nos dados.
- Capacidade computacional por vezes insuficiente, principalmente quando da existência de interações profundas.



Emmanuel Lazega
Institut d'Études Politiques de Paris

Multilevel network analysis for the social sciences: theory, methods and applications. New York: Springer, 2016.



Tom Snijders
University of Oxford

Aplicação

RAJAN, R.G.; ZINGALES, L.

What do we know about capital structure? Some evidence from international data.

Journal of Finance, v. 50-5, p. 1421-1460, 1995.

- *Compustat Global e MSCI*;

- 4.557 empresas;

- 7 países;

- período: 1987-1991.

Country	Local Market Index	Number of Firms
United States	S&P 500	2.583
Japan	Nikkei 500	514
Germany	FAZ Share Index	191
France	CAC General Index	225
Italy	MIB Current Index	118
United Kingdom	FT 500	608
Canada	TSE 300	318

$$\text{Leverage}_i = \beta_0 + \beta_1 \cdot (\text{Tangible Assets})_i + \beta_2 \cdot (\text{Market to Book})_i \\ + \beta_3 \cdot (\text{Log Sales})_i + \beta_4 \cdot (\text{ROA})_i + \varepsilon_i$$

Aplicação

$$\text{Leverage}_i = \beta_0 + \beta_1 \cdot (\text{Tangible Assets})_i + \beta_2 \cdot (\text{Market to Book})_i \\ + \beta_3 \cdot (\text{Log Sales})_i + \beta_4 \cdot (\text{ROA})_i + \varepsilon_i$$

Nível 1

$$\text{Leverage}_{ij} = \beta_{0j} + \beta_{1j} \cdot (\text{Tangible Assets})_{ij} + \beta_{2j} \cdot (\text{Market to Book})_{ij} \\ + \beta_{3j} \cdot (\text{Log Sales})_{ij} + \beta_{4j} \cdot (\text{ROA})_{ij} + \varepsilon_{ij}$$

Nível 2

$$\beta_{0j} = \gamma_{00} + v_{0j}$$

$$\beta_{1j} = \gamma_{10} + v_{1j}$$

$$\beta_{2j} = \gamma_{20} + v_{2j}$$

$$\beta_{3j} = \gamma_{30} + v_{3j}$$

$$\beta_{4j} = \gamma_{40} + v_{4j}$$

leverage	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
tang_assets	.3462677	.049087	7.05	0.000	.2500589	.4424765
market_book	-.0641481	.0143289	-4.48	0.000	-.0922322	-.036064
logsale	.0353799	.0098784	3.58	0.000	.0160185	.0547413
roa	-.7729998	.2071899	-3.73	0.000	-1.179085	-.366915
_cons	-.6153343	.795045	-0.77	0.439	-2.173594	.9429252

Random effects Parameters		Estimate	Std. Err.	[95% Conf. Interval]	
country:					
var(tang_a~s)		4.33e-13	33%	1.83e-28	1021.785
var(market~k)		.0087904		.002262	.0341598
var(logsale)		7.67e-06		1.96e-06	.00003
var(roa)		10.84124		3.37015	34.87456
var(_cons)		3.811897		1.036019	14.02538
var(Residual)		29.18282	67%	28.01925	30.39471


LR test vs. linear regression: $\chi^2(5) = 1047.68$ Prob > $\chi^2 = 0.0000$

Aplicação






RAJAN, R.G.; ZINGALES, L.

What do we know about capital structure? Some evidence from international data.

Journal of Finance, v. 50-5, p. 1421-1460, 1995.



Aplicação



Desafios em Modelagem Multinível

Interações Profundas e
Capacidade de Processamento

Métodos de Estimação dos
Parâmetros

Clusterização da Amostra

Estimação de
modelos com a
melhor aderência
possível entre os
valores reais e
previstos



Andrew Gelman

Multilevel Conference, 31 Out 2015, Columbia University, NYC.

MODELAGEM MULTINÍVEL

NO  SPYDER
Scientific Python IDE



Modelagem HLM2 com Dados Agrupados

Modelagem HLM2

Modelo Nulo

Nível 1

$$desempenho_{ij} = \beta_{0j} + \varepsilon_{ij}$$

Nível 2

$$\beta_{0j} = \gamma_{00} + v_{0j}$$

Substituindo...

$$desempenho_{ij} = \gamma_{00} + v_{0j} + \varepsilon_{ij}$$

LINHA 320
DO SCRIPT

Modelagem HLM2

Modelo com Interceptos e Inclinações Aleatórios

Nível 1

$$desempenho_{ij} = \beta_{0j} + \beta_{1j} \cdot horas_{ij} + \varepsilon_{ij}$$

Nível 2

$$\begin{cases} \beta_{0j} = \gamma_{00} + v_{0j} \\ \beta_{1j} = \gamma_{10} + v_{1j} \end{cases}$$

Substituindo...

$$desempenho_{ij} = \gamma_{00} + \gamma_{10} \cdot horas_{ij} + v_{0j} + v_{1j} \cdot horas_{ij} + \varepsilon_{ij}$$

**LINHA 411
DO SCRIPT**

Modelagem HLM2

Modelo Final HLM2

Nível 1

$$desempenho_{ij} = \beta_{0j} + \beta_{1j} \cdot horas_{ij} + \varepsilon_{ij}$$

Nível 2


$$\begin{cases} \beta_{0j} = \gamma_{00} + \gamma_{01} \cdot texp_j + v_{0j} \\ \beta_{1j} = \gamma_{10} + \gamma_{11} \cdot texp_j + v_{1j} \end{cases}$$

Substituindo...

$$desempenho_{ij} = \gamma_{00} + \gamma_{10} \cdot horas_{ij} + \gamma_{01} \cdot texp_j + \gamma_{11} \cdot texp_j \cdot horas_{ij} + v_{0j} + v_{1j} \cdot horas_{ij} + \varepsilon_{ij}$$

**LINHA 507
DO SCRIPT**


HLM2 x OLS x OLS com Dummies





Modelagem HLM3 com Medidas Repetidas

Modelagem HLM3 com Medidas Repetidas



Modelagem HLM3 com Medidas Repetidas

Modelo Nulo

Nível 1

$$desempenho_{tjk} = \beta_{0jk} + \varepsilon_{tjk}$$

Nível 2

$$\beta_{0jk} = \gamma_{00k} + v_{0jk}$$

Nível 3

$$\gamma_{00k} = \delta_{000} + \tau_{00k}$$

Substituindo...

$$desempenho_{tjk} = \delta_{000} + v_{0jk} + \tau_{00k} + \varepsilon_{tjk}$$



LINHA 1144
DO SCRIPT

Modelagem HLM3 com Medidas Repetidas

Modelo de Tendência Linear com Interceptos e Inclinações Aleatórios

Nível 1

$$desempenho_{tjk} = \beta_{0jk} + \beta_{1jk} mes_{jk} + \varepsilon_{tjk}$$

Nível 2

$$\begin{cases} \beta_{0jk} = \gamma_{00k} + v_{0jk} \\ \beta_{1jk} = \gamma_{10k} + v_{1jk} \end{cases}$$

Nível 3

$$\begin{cases} \gamma_{00k} = \delta_{000} + \tau_{00k} \\ \gamma_{10k} = \delta_{100} + \tau_{10k} \end{cases}$$

Substituindo...

$$desempenho_{tjk} = \delta_{000} + \delta_{100} \cdot mes_{jk} + v_{0jk} + v_{1jk} mes_{jk} + \tau_{00k} + \tau_{10k} \cdot mes_{jk} + \varepsilon_{tjk}$$



LINHA 1247
DO SCRIPT

Modelagem HLM3 com Medidas Repetidas

Modelo de Tendência Linear com Interceptos e Inclinações Aleatórios e as Variáveis *ativ* de Nível 2 e *texp* de Nível 3 (Modelo Completo)

Nível 1

$$desempenho_{tjk} = \beta_{0jk} + \beta_{1jk} mes_{jk} + \varepsilon_{tjk}$$

Nível 2

$$\left\{ \begin{array}{l} \beta_{0jk} = \gamma_{00k} + \gamma_{01k} \cdot ativ_{jk} + v_{0jk} \\ \beta_{1jk} = \gamma_{10k} + \gamma_{11k} \cdot ativ_{jk} + v_{1jk} \end{array} \right.$$

Nível 3


$$\left\{ \begin{array}{l} \gamma_{00k} = \delta_{000} + \delta_{001} \cdot texp_k + \tau_{00k} \\ \gamma_{01k} = \delta_{010} \\ \gamma_{10k} = \delta_{100} + \delta_{101} \cdot texp_k + \tau_{10k} \\ \gamma_{11k} = \delta_{110} \end{array} \right.$$

Substituindo...

$$desempenho_{tjk} = \delta_{000} + \delta_{100} \cdot mes_{jk} + \delta_{010} \cdot ativ_{jk} + \delta_{001} \cdot texp_k + \delta_{110} \cdot ativ_{jk} \cdot mes_{jk} + \delta_{101} \cdot texp_k \cdot mes_{jk} + v_{0jk} + v_{1jk} \cdot mes_{jk} + \tau_{00k} + \tau_{10k} \cdot mes_{jk} + \varepsilon_{tjk}$$

**LINHA 1324
DO SCRIPT**

HLM3 com Medidas Repetidas x OLS com Dummies






FINALIZANDO...

“Nada na vida deve ser temido, apenas compreendido. Entretanto, ninguém disse que o caminho do progresso seria rápido e fácil. Agora é hora de compreendermos mais, temermos menos, e trabalharmos para nosso próprio aperfeiçoamento, com responsabilidade coletiva por toda a humanidade.”




**Marie Curie
(1867-1934)**

**Nobel de Física – 1903
Nobel de Química – 1911**



Reflexão Multinível

“Devemos expandir o círculo do nosso amor até que ele englobe todo o nosso bairro; do bairro, por sua vez, deve desdobrar-se para toda a cidade; da cidade para o estado, e assim, sucessivamente, até que o objeto do nosso amor inclua todo o universo.”



Mahatma Gandhi
(1869 – 1948)

OBRIGADO!

Linked in

Prof. Dr. Luiz Paulo Fávero