




Data Science
Academy

Data Science Academy angelicogfa@gmail.com 5b81f7e45e4cdea2118b4569



Matemática para Machine Learning

A sua base começa aqui!




Matemática para Machine Learning



Sistemas de Equações Lineares



Sistemas de Equações Lineares





Matemática para Machine Learning



Sistemas de Equações Lineares e As Primeiras
Linguagens de Programação





Sistemas de Equações Lineares



Filme sobre solução de sistemas de equações lineares (sem o uso de computadores) e o surgimento de uma das primeiras linguagens de programação de computadores, a linguagem Fortran.





Matemática para Machine Learning



O Que é Uma Equação Linear?





O Que é Uma Equação Linear?

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b$$

Uma equação é linear se: cada termo contém não mais do que uma variável e cada variável aparece na primeira potência.

Cada elemento dessa equação possui um significado: os elementos a_1, a_2, \dots, a_n são coeficientes das incógnitas x_1, x_2, \dots, x_n e o termo b é o termo independente.





O Que é Uma Equação Linear?

$$3x_1 + 4x_2 - 10x_3 = -3$$

$$x_1x_2 - 3x_3 = -3$$

$$\sqrt{x_1} + x_2 = 2$$

$$2x_1 + 3x_2 + 4x_3 - 5x_4 = 10$$

$$x_1^3 + x_2 - x_3 = 0$$

Equação Linear

Equação Não Linear

Equação Não Linear

Equação Linear

Equação Não Linear





Matemática para Machine Learning



Conjunto Solução de uma Equação Linear





Conjunto Solução de uma Equação Linear

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b$$

Uma solução da equação é um conjunto de valores das incógnitas x_1, x_2, \dots, x_n com a propriedade de que, quando substituídas na equação, a tornam uma verdade. Dizemos, então, que este conjunto satisfaz a equação.





Conjunto Solução de uma Equação Linear

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b$$

Chama-se Conjunto Solução o conjunto de todas as soluções da equação.



Conjunto Solução de uma Equação Linear

$$x_1 - 5x_2 + 3x_3 - 2x_4 = 14$$

Esta é uma possível solução para a equação acima:

$$x = (2, -1, 1, -2)$$

$$(2) - 5(-1) + 3(1) - 2(-2) = 14$$



Conjunto Solução de uma Equação Linear

$$x_1 - 5x_2 + 3x_3 - 2x_4 = 14$$

Dada uma equação linear, podemos isolar uma das incógnitas e descrever a solução geral:

$$x_1 = 14 + 5x_2 - 3x_3 + 2x_4$$

$$x = (x_1, x_2, \dots, x_i, \dots, x_n)$$





Matemática para Machine Learning



Sistemas Lineares





Sistemas Lineares

Vamos considerar agora um conjunto de m equações lineares com n variáveis (incógnitas)

Um conjunto de m equações lineares nas variáveis x_1, x_2, \dots, x_n é chamado sistema linear e será representado por:

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{11} x_1 + a_{12} x_2 + a_{13} x_3 + \dots + a_{1n} x_n = b_1 \\ a_{21} x_1 + a_{22} x_2 + a_{23} x_3 + \dots + a_{2n} x_n = b_2 \\ a_{31} x_1 + a_{32} x_2 + a_{33} x_3 + \dots + a_{3n} x_n = b_3 \\ \dots \dots \\ a_{m1} x_1 + a_{m2} x_2 + a_{m3} x_3 + \dots + a_{mn} x_n = b_m \end{array} \right.$$





Sistemas Lineares

E como definimos o Conjunto Solução de uma equação linear?

Uma solução de um sistema linear é uma **n-upla** (x_1, x_2, \dots, x_n) de números reais que satisfaz simultaneamente a todas as equações.

Assim, um Conjunto Solução consiste de todos os possíveis valores para as n variáveis, com a propriedade de que, quando substituídas nas equações, todas elas são satisfeitas simultaneamente.





Sistemas Lineares

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 3 \\ 2x_1 + x_2 - 4x_3 = 7 \end{cases}$$
$$x = (1, 1, -1)$$
$$x = (10, -5, 2)$$
$$x = (7, -3, 1)$$

Conjunto Solução
Possíveis valores de x que
satisfazem TODAS as
equações do sistema linear.





Matemática para Machine Learning



Sistemas Lineares de Ordem n





Sistemas Lineares de Ordem n

Estamos interessados em determinar a solução de sistemas lineares com n equações e n incógnitas, da forma:

$$\begin{cases} a_{11} x_1 + a_{12} x_2 + a_{13} x_3 + \dots + a_{1n} x_n = b_1 \\ a_{21} x_1 + a_{22} x_2 + a_{23} x_3 + \dots + a_{2n} x_n = b_2 \\ a_{31} x_1 + a_{32} x_2 + a_{33} x_3 + \dots + a_{3n} x_n = b_3 \\ \dots \dots \\ a_{n1} x_1 + a_{n2} x_2 + a_{n3} x_3 + \dots + a_{nn} x_n = b_n \end{cases}$$

Isso é o que chamamos de sistema de n equações lineares, ou apenas, sistema linear de ordem n.





Sistemas Lineares de Ordem n

Podemos representar um sistema linear de ordem n em sua forma matricial:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

Ou simplesmente: $Ax = b$

onde $A = (a_{ij})$ é uma matriz de ordem n; x e b são vetores do R^n .
A matriz A é chamada matriz dos coeficientes, b é o vetor do termo independente e x é o vetor solução.





Matemática para Machine Learning



Sistemas Lineares Triangulares





Sistemas Lineares Triangulares

$$\left\{ \begin{array}{lcl} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n & = & b_1 \\ & a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \dots + a_{2n}x_n & = b_2 \\ & a_{33}x_3 + \dots + a_{3n}x_n & = b_3 \\ & \vdots & \\ & \dots\dots\dots & \\ & a_{nn}x_n & = b_n \end{array} \right.$$



Sistemas Lineares Triangulares

$$\begin{cases} x_n = \frac{b_n}{a_{nn}}, \\ x_i = \frac{b_i - \sum_{j=i+1}^n a_{ij} x_j}{a_{ii}}, \quad i = n-1, \dots, 1. \end{cases}$$



Matemática para Machine Learning



Solução de Sistemas Lineares





Solução de Sistemas Lineares

Regra de
Cramer

Utilizando a
Matriz Inversa

Utilizando
Escalonamento
(Eliminação Gaussiana)





Matemática para Machine Learning



Solução de Sistemas Lineares - Regra de Cramer





Matemática para Machine Learning



Solução de Sistemas Lineares - Utilizando Escalonamento





Solução de Sistemas Lineares - Utilizando Escalonamento

Uma maneira de obter a solução de um sistema linear é transformá-lo em outro equivalente cuja solução seja facilmente obtida. Em geral, transformamos o sistema original em um sistema linear equivalente, cuja solução é obtida resolvendo-se sistemas lineares triangulares superiores.





Solução de Sistemas Lineares - Utilizando Escalonamento

Uma maneira de obter a solução de um sistema linear é transformá-lo em outro equivalente cuja solução seja facilmente obtida. Em geral, transformamos o sistema original em um sistema linear equivalente, cuja solução é obtida resolvendo-se sistemas lineares triangulares superiores.

Logo, nosso objetivo aqui é saber como transformar um sistema linear de ordem n em um outro, cuja matriz dos coeficientes seja uma matriz triangular superior, usando operações elementares sobre as linhas, isto é, usando escalonamento.





Solução de Sistemas Lineares - Utilizando Escalonamento

Se um sistema de equações lineares é obtido de um outro sistema de equações lineares através de uma sequência finita de operações elementares, então os sistemas são equivalentes.





Solução de Sistemas Lineares - Utilizando Escalonamento

Portanto, precisamos utilizar um processo de 2 etapas para resolver sistemas lineares utilizando escalonamento:

1. Reduzir o sistema à forma triangular através de operações elementares por linhas.
2. Resolver o sistema triangular por substituição.

Este método é por vezes designado por método de eliminação de Gauss, pois consiste em eliminar as incógnitas das equações até se poder resolver o sistema por substituição.





Solução de Sistemas Lineares - Utilizando Escalonamento

$$\left\{ \begin{array}{lcl} a_{11}x_1 & + & a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ & & a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ & & a_{33}x_3 + \dots + a_{3n}x_n = b_3 \\ & & \vdots \\ & & \dots\dots\dots \\ & & a_{nn}x_n = b_n \end{array} \right.$$

Este é um sistema linear escalonado (no formato de um sistema linear triangular). Nosso trabalho é converter qualquer sistema linear de ordem n neste formato e depois aplicar o método da substituição para encontrar o valor das incógnitas.





Matemática para Machine Learning



Sistemas Escalonados

Número de Equações Igual o Número de Incógnitas





Número de Equações Igual o Número de Incógnitas

$$\begin{cases} 2x - 3y - z = 4 \\ x + 2y + z = 3 \\ 3x - y - 2z = 1 \end{cases}$$

1º passo: Anulamos todos os coeficientes da 1ª incógnita a partir da 2ª equação, aplicando as propriedades dos sistemas equivalentes.

$$\begin{cases} x + 2y + z = 3 \\ 2x - 3y - z = 4 \\ 3x - y - 2z = 1 \end{cases} \xleftarrow{[(-2)]} \Rightarrow \begin{cases} x + 2y + z = 3 \\ -7y - 3z = -2 \\ 3x - y - 2z = 1 \end{cases}$$

Trocamos de posição a 1ª equação com a 2ª equação, de modo que o 1º coeficiente de x seja igual a 1. Trocamos a 2ª equação pela soma da 1ª equação, multiplicada por -2, com a 2ª equação.

$$\begin{cases} x + 2y + z = 3 \\ -7y - 3z = -2 \\ 3x - y - 2z = 1 \end{cases} \xleftarrow{[(-3)]} \Rightarrow \begin{cases} x + 2y + z = 3 \\ -7y - 3z = -2 \\ -7y - 5z = -8 \end{cases}$$

Trocamos a 3ª equação pela soma da 1ª equação, multiplicada por -3, com a 3ª equação.





Número de Equações Igual o Número de Incógnitas

$$\begin{cases} x + 2y + z = 3 \\ -7y - 3z = -2 \\ -7y - 5z = -8 \end{cases} \Leftarrow [(-1)] \Rightarrow \begin{cases} x + 2y + y = 3 \text{ (I)} \\ -7y - 3z = -2 \text{ (II)} \\ -2z = -6 \text{ (III)} \end{cases}$$

2º passo: Anulamos os coeficientes da 2ª incógnita a partir da 3ª equação: Trocamos a 3ª equação pela soma da 2ª equação, multiplicada por -1, com a 3ª equação.

$$\begin{cases} x + 2y + y = 3 \text{ (I)} \\ -7y - 3z = -2 \text{ (II)} \\ -2z = -6 \text{ (III)} \end{cases}$$

Agora que o sistema está escalonado e no formato de uma matriz triangular superior, podemos resolver de baixo para cima e aplicar a regra da substituição.

$$-2z = -6 \Rightarrow z = 3$$

$$\text{Substituindo } z=3 \text{ em (II): } -7y - 3(3) = -2 \Rightarrow -7y - 9 = -2 \Rightarrow y = -1$$

Substituindo $z=3$ e $y=-1$ em (I):

$$x + 2(-1) + 3 = 3 \Rightarrow x = 2$$





Matemática para Machine Learning



Sistemas Escalonados

Número de Equações Diferente do Número de Incógnitas





Número de Equações Diferente do Número de Incógnitas

$$\begin{cases} x + y + z - t = 6 \\ 2x + y - 2z + t = -1 \\ x - 2y + z + 2t = -3 \end{cases}$$

1º passo: Anulamos todos os coeficientes da 1ª incógnita a partir da 2ª equação.

$$\begin{cases} x + y + z - t = 6 \\ 2x + y - 2z + t = -1 \\ x - 2y + z + 2t = -3 \end{cases} \xleftarrow{[(-2)]} \begin{cases} x + y + z - t = 6 \\ -y - 4z + 3t = -13 \\ x - 2y + z + 2t = -3 \end{cases}$$

Trocamos a 2ª equação pela soma do produto da 1ª equação por -2 com a 2ª equação.

$$\begin{cases} x + y + z - t = 6 \\ -y - 4z + 3t = -13 \\ x - 2y + z + 2t = -3 \end{cases} \xleftarrow{[(-1)]} \begin{cases} x + y + z - t = 6 \\ -y - 4z + 3t = -13 \\ -3y + 0z + 3t = -9 \end{cases}$$

Trocamos a 3ª equação pela soma do produto da 1ª equação por -1 com a 3ª equação.





Número de Equações Diferente do Número de Incógnitas

$$\begin{cases} x + y + z - t = 6 \\ -y - 4z + 3t = -13 \\ -3y + 0z + 3t = -9 \end{cases} \Leftarrow [(-3)] \Rightarrow \begin{cases} x + y + z - t = 6 \\ -y - 4z + 3t = -13 \\ 12z - 6t = 30 \end{cases}$$

2º passo: Anulamos os coeficientes da 2ª incógnita, a partir da 3ª equação. Trocamos a 3ª equação pela soma do produto da 2ª equação por -3 com a 3ª equação.

O sistema está escalonado. Como $m < n$, o sistema é possível e indeterminado, admitindo infinitas soluções. A diferença entre o número de incógnitas (n) e o de equações (m) de um sistema nessas condições é chamada **grau de indeterminação (GI)**:

$$GI = n - m$$





Número de Equações Diferente do Número de Incógnitas

$$\begin{cases} x + y + z - t = 6 \\ -y - 4z + 3t = -13 \\ 12z - 6t = 30 \end{cases}$$

Consideramos o sistema em sua forma escalonada e calculamos o grau de indeterminação do sistema nessas condições: $GI = n - m = 4 - 3 = 1$

Como o grau de indeterminação é 1, atribuímos a uma das incógnitas um valor, supostamente conhecido, e resolvemos o sistema em função desse valor. Sendo $t = \alpha$, substituindo esse valor na 3ª equação, obtemos:

$$12z - 6\alpha = 30 \Rightarrow 12z = 30 + 6\alpha \Rightarrow z = \frac{30 + 6\alpha}{12} = \frac{5 + \alpha}{2}$$

Assim, a solução do sistema é dada por $S = \left\{ \left(\frac{1 - \alpha}{2}, \alpha + 3, \frac{5 + \alpha}{2}, \alpha \right) \right\}$, com $\alpha \in \mathbb{R}$.

Para cada valor que seja atribuído a α , encontraremos uma quádrupla que é solução para o sistema.



É um prazer ter você aqui!

Muito Obrigado!

Pela Confiança em Nosso Trabalho.

Continue Trilhando Uma Excelente Jornada de Aprendizagem!



Data Science Academy