

COVEÑAS



Sistemas Atmosféricos Influyentes

- Zona de Confluencia Intertropical
- Sistema de Baja Presión del Darién
- Ondas Tropicales del Este
- Ciclones Tropicales

El puerto de Coveñas, ubicado en el centro del litoral Caribe colombiano presenta una alta influencia de la dinámica de la Zona de Convergencia Intertropical y el sistema de baja presión del Darién, el cual presenta un ciclo diurno marcado y es cuasipermanente, posicionándose durante la mayor parte del año entre 9° y 10° de latitud norte. Así mismo, el tránsito de ondas tropicales del este y de sistemas ciclónicos a través del Caribe, son responsables también de la época de lluvias la cual se extiende desde mayo hasta el mes de noviembre.

Climatología : Temperatura y Precipitación

De acuerdo con la clasificación climática de Caldas Lang, el puerto de Coveñas se ubica sobre una zona de clima cálido árido. De acuerdo con la estación climatológica disponible más cercana (Aeropuerto Rafael Barbo), la temperatura media mensual multianual de 27.5°C, temperatura máxima media anual de 32.5°C y temperatura mínima media anual de 22.07°C. La precipitación total anual multianual alcanza 1127.9 mm.




Fuente: Promedios multianuales estación meteorológica Aeropuerto Rafael Barbo, municipio de Corozal, Sucre data 1981-2010 Instituto de hidrología, Meteorología y estudios ambientales – IDEAM.

COVEÑAS

Climatología: Velocidad y Dirección del Viento

Referente al régimen de vientos, estos son predominantes del norte-noreste con velocidades entre 4 y 12 nudos de diciembre a abril (época seca), en tanto que durante la época húmeda, los vientos son débiles con velocidades inferiores a los 6 nudos.




Fuente: Reanalysis Cross-Calibrated, Multiplatform Ocean Surface Wind Velocity – CCMP 1987-2016.



Climatología: Altura y Dirección del Oleaje

La dirección predominante del oleaje en el Puerto de Coveñas es del norte y norte noreste, con alturas de hasta 2.5 metros de diciembre a abril, coincidente con la época seca y de mayor actividad de los alisios en la zona. Oleajes inferiores a 1.5 metros son predominantes durante el resto del año.



Fuente: Simulating Wave Nearshore –SWAN 1979 a 2010, CIOH.