Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nhận biết cấp số nhân, công bội và số hạng

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính III.4: y = 6x = 43,2 (nguồn nhầm y = 36x). III.6: giá trị sau 5 năm là 3.0,8^5 = 0,98304 tỉ đồng (nguồn tính sai 0,1875). Đề MTM sửa phương án C của I.4, sửa dãy số ở I.5 (1; 2; 4; 8; ...) và thêm đơn vị tỉ đồng ở III.6. Đề MTM bổ sung điều kiện $x \neq 0$ ở I.10 và làm rõ tứ giác không nhất thiết lồi ở II.3. Khử trùng 14/10/2026: thay Phần III Câu 5 (trùng với đề khác trên web) bằng câu cùng dạng.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Đính chính MTM: Lời giải ghi nhầm '-1; 3; 9; 10', đúng là dãy 1; -3; 9; 10 ở phương án B (không là cấp số nhân). Đáp án B không đổi.

Câu 1: Dãy số nào sau đây không phải là cấp số nhân?

A. $1;-1;1;-1$. **B.** $1;-3;9;10$. **C.** $1;0;0;0$. **D.** $32;16;8;4$.

Lời giải

Nếu (u_n) là cấp số nhân với công bội q ta có: $u_{n+1}=u_n.q \Rightarrow q=\dfrac{u_{n+1}}{u_n}$.

$1;-1;1;-1$ là cấp số nhân với $q=-1$.

$-1;3;9;10$ không là cấp số nhân.

$1;0;0;0$ là cấp số nhân với $q=0$.

$32;16;8;4$ là cấp số nhân với $q=\dfrac{1}{2}$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Dãy số nào sau đây **không phải** là cấp số nhân?

A. $1;-3;9;-27;54$. **B.** $1;2;4;8;16$. **C.** $1;-1;1;-1;1$. **D.** $1;-2;4;-8;16$.

Lời giải

Dãy $1;2;4;8;16$ là cấp số nhân với công bội $q=2$.

Dãy $1;-1;1;-1;1$ là cấp số nhân với công bội $q=-1$.

Dãy $1;-2;4;-8;16$ là cấp số nhân với công bội $q=-2$.

Dãy $1;-3;9;-27;54$ không phải là cấp số nhân vì $-3=1.(-3);(-27).(-3)=81\neq 54$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nhận biết cấp số nhân, công bội và số hạng

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Trong các dãy số sau, dãy số nào **không** phải là một cấp số nhân?

A. $2;\ 4;\ 8;\ 16;\ \ldots$ **B.** $1;\ -1;\ 1;\ -1;\ \cdots$

C. $1^2;\ 2^2;\ 3^2;\ 4^2;\ \cdots$ **D.** $a;\ a^3;\ a^5;\ a^7;\ \cdots (a \neq 0)$.

Lời giải

Xét đáp án C: $1^2;\ 2^2;\ 3^2;\ 4^2;\ \cdots \longrightarrow \frac{u_2}{u_1} = 4 \neq \frac{9}{4} = \frac{u_3}{u_2}$

Các đáp án A, B, D đều là các cấp số nhân.

$a;\ a^3;\ a^5;\ a^7;\ \cdots (a \neq 0) \longrightarrow$ là cấp số nhân và $u_n = a^{2n-1} = \frac{1}{a}.\left(a^2\right)^n$.

PHẦN I · CÂU 4

Đính chính MTM: Đề MTM sửa phương án C thành 4; 2; 1; 1/2; ... (công bội 1/2). Chỉ D không là cấp số nhân, đáp án D.

Câu 4: Dãy số nào sau đây không phải là cấp số nhân?

A. $1;\ 2;\ 4;\ 8;\ \cdots$ **B.** $3;\ 3^2;\ 3^3;\ 3^4;\ \cdots$

C. $4;\ 2;\ \frac{1}{2};\ \frac{1}{4};\ \cdots$ **D.** $\frac{1}{\pi};\ \frac{1}{\pi^2};\ \frac{1}{\pi^4};\ \frac{1}{\pi^6};\ \cdots$

Lời giải

Các đáp án A, B, C đều là các cấp số nhân công bội lần lượt là $u_m = u_k.q^{m-k}$.

Xét đáp án D: $\frac{1}{\pi};\ \frac{1}{\pi^2};\ \frac{1}{\pi^4};\ \frac{1}{\pi^6};\ \cdots \longrightarrow \frac{u_2}{u_1} = \frac{1}{\pi} \neq \frac{1}{\pi^2} = \frac{u_3}{u_2}$

PHẦN I · CÂU 5

Đính chính MTM: Đề MTM sửa thành dãy 1; 2; 4; 8; 16; 32; ... (khớp lời giải nguồn): u1 = 1, q = 2, đáp án B.

Câu 5: Dãy số $u_n = 3 + 3^n$. là một cấp số nhân với:

A. Công bội là 3 và số hạng đầu tiên là 1.

B. Công bội là 2 và số hạng đầu tiên là 1.

C. Công bội là 4 và số hạng đầu tiên là 2.

D. Công bội là 2 và số hạng đầu tiên là 2.

Lời giải

Cấp số nhân: $1;\ 2;\ 4;\ 8;\ 16;\ 32;\ldots \longrightarrow \begin{cases} u_1 = 1 \\ q = \frac{u_2}{u_1} = 2 \end{cases}$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nhận biết cấp số nhân, công bội và số hạng

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1=-2$ và $q=-5$. Viết bốn số hạng đầu tiên của cấp số nhân.

A. $-2;\ 10;\ 50;\ -250$.
B. $-2;\ 10;\ -50;\ 250$.
C. $-2;\ -10;\ -50;\ -250$.
D. $-2;\ 10;\ 50;\ 250$.

Lời giải.

$$\begin{cases} u_1=-2 \\ q=-5 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} u_1=-2 \\ u_2=u_1q=10 \\ u_3=u_2q=-50 \\ u_4=u_3q=250 \end{cases}$$

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Tìm tất cả giá trị của x để ba số $2x-1;\ x;\ 2x+1$ theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân.

A. $x=\pm\dfrac{1}{\sqrt{3}}$.
B. $x=\pm\dfrac{1}{3}$.
C. $x=\pm\sqrt{3}$.
D. $x=\pm 3$.

Lời giải

Cấp số nhân $2x-1;\ x;\ 2x+1 \longrightarrow (2x-1)(2x+1)=x^2 \Leftrightarrow 3x^2=1 \Leftrightarrow x=\pm\dfrac{1}{\sqrt{3}}$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Trong các dãy số cho dưới đây, dãy số nào là cấp số nhân?

A. $1;2;3;4;5$.
B. $1;3;6;9;12$.
C. $2;4;6;8;10$.
D. $2;2;2;2;2$.

Lời giải

Ta thấy ở đáp án D có $u_1=u_2=u_3=u_4=u_5=2$ nên đây là cấp số nhân với công bội $q=1$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Trong các dãy số sau, dãy số nào là một cấp số nhân?

PHẦN I · CÂU 9 · tiếp theo (2/2)

A. $1;2;3;4;5;6;\ldots$.
B. $2;4;6;8;16;32;\ldots$.
C. $-2;-3;-4;-5;-6;-7;\ldots$.
D. $1;2;4;8;16;32;\ldots$.

Lời giải

Nhận thấy $\dfrac{u_2}{u_1}\neq\dfrac{u_3}{u_2}$ nên các dãy số ở đáp án A, B và C không phải là cấp số nhân.

Riêng đối với dãy $1,2,4,8,16,32,\ldots$ở đáp án D thỏa mãn: $u_{n+1}=2u_n\ \ \forall n\in\mathbb{N}^*$.

Vậy dãy số $1,2,4,8,16,32,\ldots$ là cấp số nhân với $u_1=1$ và công bội $q=2$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nhận biết cấp số nhân, công bội và số hạng

PHẦN I · CÂU 10

Đính chính MTM: Bản MTM bổ sung điều kiện x ≠ 0 (khi x = 0 dãy C cũng là cấp số nhân). Đáp án D giữ nguyên.

Câu 10: Chọn cấp số nhân trong các dãy số sau:

A. $1;\ 0,2;\ 0,04;\ 0,0008;\ ...$ **B.** $2;\ 22;\ 222;2222;\ ...$

C. $x;\ 2x;\ 3x;\ 4x;\ ...$ **D.** $1;\ -x^2;\ x^4;\ -x^6;\ ...$

Lời giải

Dãy số : $1;\ -x^2;\ x^4;\ -x^6;\ ...$ là cấp số nhân có số hạng đầu $u_1=1;$ công bội $q=-x^2.$

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Trong các số sau, dãy số nào là một cấp số nhân:

A. $1,-3,9,-27,81.$ **B.** $1,-3,-6,-9,-12.$ **C.** $1,-2,-4,-8,-16.$ **D.** $0,3,9,27,81.$

Lời giải

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Xác định x để 3 số $x-2;\ x+1;\ 3-x$ theo thứ tự lập thành một cấp số nhân:

A. Không có giá trị nào của $x.$ **B.** $x=\pm 1.$

C. $x=2.$ **D.** $x=-3.$

Lời giải

Ba số $x-2;\ x+1;\ 3-x$ theo thứ tự lập thành một cấp số nhân $\Leftrightarrow (x-2)(3-x)=(x+1)^2$

$\Leftrightarrow 2x^2-3x+7=0$

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho các dãy số sau đây: $u_n=\left(\sqrt{5}\right)^{2n-3}$; $v_n=\dfrac{2}{n}$; $w_n=\dfrac{3^{n+1}}{2^n}$ và dãy số hữu hạn gồm các số hạng: $16;4;1;\dfrac{1}{4};\dfrac{1}{16};\dfrac{1}{64}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) (u_n) là một cấp số nhân công bội $q=5.$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nhận biết cấp số nhân, công bội và số hạng

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

b) (v_n) không phải là một cấp số nhân

c) (w_n) là một cấp số nhân có số hạng đầu $w=\dfrac{9}{2}$

d) Dãy số hữu hạn đã cho theo thứ tự lập thành cấp số nhân có công bội bằng $\dfrac{1}{8}$.

Lời giải

a) Đúng: Ta có: $u_{n+1}=\left(\sqrt{5}\right)^{2(n+1)-3}=\left(\sqrt{5}\right)^{2n-1}\Rightarrow\dfrac{u_{n+1}}{u_n}=\dfrac{\left(\sqrt{5}\right)^{2n-1}}{\left(\sqrt{5}\right)^{2n-3}}=\left(\sqrt{5}\right)^2=5,\forall n\in\mathbb{N}^*$.

Do đó (u_n) là một cấp số nhân có số hạng đầu $u_1=\dfrac{1}{\sqrt{5}}$ với công bội $q=5$.

b) Đúng: Ta có: $v_{n+1}=\dfrac{2}{n+1}\Rightarrow\dfrac{v_{n+1}}{v_n}=\dfrac{n}{n+1}$ (tỉ số này còn phụ thuộc vào n).

Do đó (v_n) không phải là một cấp số nhân.

c) Đúng: Ta có: $w_{n+1}=\dfrac{3^{n+2}}{2^{n+1}}=\dfrac{3}{2}\cdot\dfrac{3^{n+1}}{2^n}\Rightarrow\dfrac{w_{n+1}}{w_n}=\dfrac{\dfrac{3}{2}\cdot\dfrac{3^{n+1}}{2^n}}{\dfrac{3^{n+1}}{2^n}}=\dfrac{3}{2},\forall n\in\mathbb{N}^*$.

Do đó (w_n) là một cấp số nhân có số hạng đầu $w_1=\dfrac{3^2}{2^1}=\dfrac{9}{2}$ với công bội $q=\dfrac{3}{2}$

d) Sai: Đặt $u_1=16;u_2=4;u_3=1;u_4=\dfrac{1}{4};u_5=\dfrac{1}{16};u_6=\dfrac{1}{64}$.

Ta có: $u_2=u_1\cdot\dfrac{1}{4};u_3=u_2\cdot\dfrac{1}{4};u_4=u_3\cdot\dfrac{1}{4};u_5=u_4\cdot\dfrac{1}{4};u_6=u_5\cdot\dfrac{1}{4}$.

Vì vậy dãy số hữu hạn đã cho theo thứ tự lập thành cấp số nhân có công bội bằng $\dfrac{1}{4}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nhận biết cấp số nhân, công bội và số hạng

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Xác định tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Dãy số (u_n) với $u_n=(-7)^n\cdot 5^{3n-1}$ là cấp số nhân với công bội $q=-875$.

b) Dãy số (u_n) với $\begin{cases}u_1=2\\u_{n+1}=-5u_n\end{cases}$ là cấp số nhân với công bội $q=-4$.

c) Dãy số (u_n) với $\begin{cases}u_1=2\\u_{n+1}=u_n^2\end{cases}$ không là cấp số nhân.

d) Dãy số (u_n) với $-\frac{1}{8};-\frac{1}{4};-\frac{1}{2};1$ không là cấp số nhân.

Lời giải

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

a) Đúng: Ta có: $\frac{u_{n+1}}{u_n}=\frac{(-7)^{n+1}\cdot 5^{3(n+1)-1}}{(-7)^n\cdot 5^{3n-1}}=\frac{(-7).5^2}{5^{-1}}=-7.5^3=-875$ không đổi.

Vậy (u_n) là cấp số nhân với công bội $q=-875$.

b) Sai: Ta có: $\begin{cases}u_1=2\\u_{n+1}=-5u_n\end{cases}$. Khi đó $\frac{u_{n+1}}{u_n}=\frac{-5u_n}{u_n}=-5$

Vậy (u_n) là cấp số nhân với công bội $q=-5$.

c) Đúng: Ta có: $u_2=u_1^2=2^2=4;u_3=u_2^2=4^2=16;u_4=u_3^2=16^2=256$

Khi đó: $\frac{u_2}{u_1}=\frac{4}{2}=2;\frac{u_4}{u_3}=\frac{256}{16}=16$

Nhận thấy: $\frac{u_2}{u_1}\neq\frac{u_4}{u_3}(2\neq 16)$

Vậy (u_n) không là cấp số nhân.

d) Đúng: Ta có: $\frac{u_2}{u_1}=\left(-\frac{1}{4}\right):\left(-\frac{1}{8}\right)=2;\frac{u_4}{u_3}=1:\left(-\frac{1}{2}\right)=-2$

Nhận thấy: $\frac{u_2}{u_1}\neq\frac{u_4}{u_3}(2\neq -2)$

Vậy (u_n) không là cấp số nhân.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nhận biết cấp số nhân, công bội và số hạng

PHẦN II · CÂU 3

Đính chính MTM: Bản MTM làm rõ: tứ giác không nhất thiết lồi; các góc 24°, 48°, 96°, 192° (tứ giác lõm). Khóa giữ nguyên.

Câu 3: Cho tứ giác $ABCD$ có bốn góc tạo thành một cấp số nhân có công bội bằng 2. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Số đo góc nhỏ nhất bằng $24°$

b) Số đo góc lớn nhất bằng $196°$

c) Tổng số đo góc lớn nhất với góc nhỏ nhất bằng $220°$

d) Số đo góc lớn nhất trừ cho số đo góc nhỏ nhất bằng $168°$

Lời giải

Đặt $u_1;u_2;u_3;u_4$ theo thứ tự là số đo bốn góc của tứ giác $ABCD$, gọi q là công bội của cấp số nhân $u_1;u_2;u_3;u_4 \Rightarrow q=2$.

Ta có: $\begin{cases} u_1+u_2+u_3+u_4=360^\circ \\ q=2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1\cdot\dfrac{1-q^4}{1-q}=360^\circ \\ q=2 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} u_1\cdot\dfrac{1-2^4}{1-2}=360^\circ \\ q=2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1=24^\circ \\ q=2 \end{cases}$.

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Vậy số đo bốn góc của tứ giác $ABCD$ là: $24^\circ;48^\circ;96^\circ;192^\circ$.

a) Đúng: Số đo góc nhỏ nhất bằng $24°$

b) Sai: Số đo góc lớn nhất bằng $192°$

c) Sai: Tổng số đo góc lớn nhất với góc nhỏ nhất bằng $216°$

d) Đúng: Số đo góc lớn nhất trừ cho số đo góc nhỏ nhất bằng $168°$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nhận biết cấp số nhân, công bội và số hạng

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho các dãy số $a_n = n^2 + n + 1; b_n = (n+2)\cdot 3^n; \begin{cases} c_1 = 2 \\ c_{n+1} = \dfrac{6}{c_n}, \forall n \in \mathbb{N}^* \end{cases}; d_n = (-4)^{2n+1}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) (a_n) không phải là cấp số nhân

b) (b_n) không phải là cấp số nhân

c) (c_n) là một cấp số nhân

d) (d_n) là một cấp số nhân

Lời giải

a) Đúng: $\dfrac{a_{n+1}}{a_n} = \dfrac{n^2+3n+3}{n^2+n+1}, \forall n \in \mathbb{N}^*$, không phải là hằng số nên (a_n) không phải là cấp số nhân.

b) Đúng: $\dfrac{b_{n+1}}{b_n} = \dfrac{(n+3)\cdot 3^{n+1}}{(n+2)\cdot 3^n} = \dfrac{3(n+3)}{n+2}, \forall n \in \mathbb{N}^*$, không phải là hằng số nên (b_n) không phải là cấp số nhân.

c) Sai: Từ công thức truy hồi của dãy số, suy ra $c_1 = 2; c_2 = 3; c_3 = 2; c_4 = 3; \ldots$

Vì $\dfrac{c_3}{c_2} \neq \dfrac{c_2}{c_1}$ nên (c_n) không phải là cấp số nhân.

d) Đúng: $\dfrac{d_{n+1}}{d_n} = \dfrac{(-4)^{2(n+1)+1}}{(-4)^{2n+1}} = 16, \forall n \in \mathbb{N}^*$. Vậy (d_n) là một cấp số nhân công bội $q = 16$.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Một cấp số nhân có hai số hạng liên tiếp là 16 và 36. Số hạng tiếp theo là:

Lời giải

Ta có cấp số nhân (u_n) có:

$$\begin{cases} u_k = 16 \\ u_{k+1} = 36 \end{cases} \Rightarrow q = \frac{u_{k+1}}{u_k} = \frac{9}{4} \longrightarrow u_{k+2} = u_{k+1} q = 81$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nhận biết cấp số nhân, công bội và số hạng

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Tìm x để các số $2;\ 8;\ x;\ 128$ theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân.

Lời giải

Cấp số nhân $2;\ 8;\ x;\ 128$ theo thứ tự đó sẽ là $u_1; u_2; u_3; u_4$, ta có

$$\begin{cases} \dfrac{u_2}{u_1}=\dfrac{u_3}{u_2} \\ \dfrac{u_3}{u_2}=\dfrac{u_4}{u_3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \dfrac{8}{2}=\dfrac{x}{8} \\ \dfrac{128}{x}=\dfrac{x}{8} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=32 \\ x^2=1024 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=32 \\ \left[\begin{array}{l} x=32 \\ x=-32 \end{array}\right. \end{cases} \Leftrightarrow x=32$$

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Tìm x để ba số $1+x;\ 9+x;\ 33+x$ theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân.

Lời giải

Cấp số nhân $1+x;\ 9+x;\ 33+x \longrightarrow (1+x)(33+x)=(9+x)^2 \Leftrightarrow x=3.$

PHẦN III · CÂU 4

Đính chính MTM: Đính chính: y = u3 = u2.q = 6x = 6.36/5 = 43,2 (nguồn nhầm y = u2.q^2 = 36x, ra khoảng 259). Đáp án: 43,2.

Câu 4: Ba số hạng đầu của một cấp số nhân là $x-6;\ x$ và y. Tìm y, biết rằng công bội của cấp số nhân là 6.

Lời giải

Cấp số nhân $x-6;\ x$ và y có công bội $q=6$ nên ta có


PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

$$\begin{cases} u_1=x-6,\ q=6 \\ x=u_2=u_1q=6(x-6) \\ y=u_3=u_2q^2=36x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=\dfrac{36}{5} \\ y=36.\dfrac{36}{5}=\dfrac{1296}{5}\approx 259 \end{cases}$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nhận biết cấp số nhân, công bội và số hạng

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Một loại vi khuẩn được nuôi cấy trong ống nghiệm, cứ 20 phút lại phân đôi một lần. Nếu ban đầu có 200 vi khuẩn, tính sô lượng vi khuẩn có trong ống nghiệm sau 2 giờ.



Lời giải

Ta có: 2 giờ = 120 phút=6.20 phút. Do đó sau 2 giớ vi khuẩn phân đôi 6 lần.

Gọi u_n là số lượng vi khuẩn có trong ống nghiệm sau lần phân đôi thứ $n-1$.

Khi đó, dãy số (u_n) là một cấp số nhân với $u_1 = 200$ và $q = 2$.

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Ta có $u_7 = u_1.q^6 = 200.2^6 = 12800$. Vậy sau 2 giờ, trong ống nghiệm có 12800 vi khuẩn.

PHẦN III · CÂU 6

Đính chính MTM: Đính chính: giá trị sau 5 năm là 3.0,8^5 = 0,98304 (tỉ đồng). Nguồn lấy nhầm số mũ 4 (3.0,8^4 = 1,2288 là giá trị sau 4 năm) và tính sai ra 0,1875. Đề MTM đã thêm đơn vị tỉ đồng: 3.0,8^5 = 0,98304, đáp án 0,98304.

Câu 6: Một công ty xây dựng mua một chiếc máy ủi với giá 3 tỉ đồng. Cứ sau mỗi năm sử dụng, giá trị của chiếc máy ủi này lại giảm 20% so với giá trị của nó trong năm liền trước đó. Tìm giá trị còn lại của chiếc máy ủi đó sau 5 năm sử dụng.

Lời giải

Giá trị của chiếc máy ủi mỗi năm lập thành một cấp số nhân với số hạng đầu bằng 3 và công bội $q = 0,8$

Giá trị của chiếc máy ủi sau 5 năm sử dụng là: $u_5 = 3 \times 0,8^{5-1} = 0,1875$ (tỷ đồng)