Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số hạng và công thức số hạng tổng quát của dãy số

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Câu I.4 đã thay bằng câu cùng dạng (câu cũ trùng I.11). Làm rõ câu chữ III.6 (số đôi thỏ trong tháng thứ 12). Sửa trình bày lời giải I.10 (lệch chỉ số) và bảng Fibonacci III.6 (u10 = 55, u11 = 89); khóa giữ theo nguồn. Khử trùng 14/10/2026: thay Phần II Câu 2 (trùng với đề khác trên web) bằng câu cùng dạng.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho dãy số (u_n) xác định bởi: $\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = u_n + 2 \end{cases} (n \geq 1)$. Xác định công thức của số hạng tổng quát.

A. $u_n = 2n - 1$. **B.** $u_n = 3n - 2$. **C.** $u_n = 4n - 3$. **D.** $u_n = 8n - 7$.

Lời giải

Ta có:

$u_1 = 1; u_2 = 3; u_3 = 5$

Dự đoán $u_n = 2n - 1, n \in \mathbb{N}^*$. Ta dễ dàng chứng minh được công thức dự đoán bằng quy nạp

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho dãy số có các số hạng đầu là: $\frac{1}{3}; \frac{1}{3^2}; \frac{1}{3^3}; \frac{1}{3^4}; \frac{1}{3^5}; \ldots$ Số hạng tổng quát của dãy số này là?

A. $u_n = \frac{1}{3}.\frac{1}{3^{n+1}}$. **B.** $u_n = \frac{1}{3^{n+1}}$. **C.** $u_n = \frac{1}{3^n}$. **D.** $u_n = \frac{1}{3^{n-1}}$.

Lời giải

Từ các số hạng đầu tiên của dãy số ta dự đoán $u_n = \frac{1}{3^n}, n \in \mathbb{N}^*$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số hạng và công thức số hạng tổng quát của dãy số

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho dãy số (u_n) với $\begin{cases} u_1 = 5 \\ u_{n+1} = u_n + n \end{cases}$.Số hạng tổng quát u_n của dãy số là số hạng nào dưới đây?

A. $u_n = \dfrac{(n-1)n}{2}$.

B. $u_n = 5 + \dfrac{(n-1)n}{2}$.

C. $u_n = 5 + \dfrac{(n+1)n}{2}$.

D. $u_n = 5 + \dfrac{(n+1)(n+2)}{2}$.

Lời giải

Theo công thức truy hồi ta có $u_{n+1} - u_n = n$. Khi đó

$u_1 = 5; u_2 - u_1 = 1; u_3 - u_2 = 2 ... u_n - u_{n-1} = n-1$

Cộng vế theo vế các đẳng thức trên ta được $u_n = 5 + (1 + 2 + 3 + ... n - 1) = 5 + \dfrac{(n-1)n}{2}$

PHẦN I · CÂU 4

Đính chính MTM: Câu I.4 đã thay bằng câu cùng dạng (câu cũ trùng I.11): u2 = 17, u3 = 37, u4 = 77, u5 = 157, đáp án B.

Câu 4: Cho dãy số (u_n) xác định bởi $\begin{cases} u_1 = 7 \\ u_{n+1} = 2u_n + 3 \end{cases}$ khi đó u_5 bằng:

A. 317. **B.** 157. **C.** 77. **D.** 112.

Lời giải

PHẦN I · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Ta có $u_2 = 2.7 + 3 = 17, u_3 = 2.17 + 3 = 37, u_4 = 2.37 + 3 = 77, u_5 = 2.77 + 3 = 157$

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho dãy số có các số hạng đầu là: $-2; 0; 2; 4; 6; ...$ .Số hạng tổng quát của dãy số này có dạng?

A. $u_n = -2n$. **B.** $u_n = (-2) + n$. **C.** $u_n = (-2)(n+1)$. **D.** $u_n = (-2) + 2(n-1)$

.

Lời giải

Dãy số là dãy số cách đều có khoảng cách là 2 và số hạng đầu tiên là (-2) nên $u_n = (-2) + 2.(n-1)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số hạng và công thức số hạng tổng quát của dãy số

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho dãy số (u_n) với $\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = u_n + (-1)^{2n} \end{cases}$. Số hạng tổng quát u_n của dãy số là số hạng nào dưới đây?

A. $u_n = 1 + n$. **B.** $u_n = 1 - n$. **C.** $u_n = 1 + (-1)^{2n}$. **D.** $u_n = n$.

Lời giải

Ta có: $u_{n+1} = u_n + (-1)^{2n} = u_n + 1 \Rightarrow u_2 = 2; u_3 = 3; u_4 = 4; \ldots$ Dễ dàng dự đoán được $u_n = n$.

Thật vậy, ta chứng minh được $u_n = n$ $(*)$ bằng phương pháp quy nạp như sau:

Với $n = 1 \Rightarrow u_1 = 1$. Vậy $(*)$ đúng với $n = 1$

Giả sử $(*)$ đúng với mọi $n = k\left(k \in \mathbb{N}^*\right)$, ta có: $u_k = k$. Ta đi chứng minh $(*)$ cũng đúng với $n = k + 1$, tức là: $u_{k+1} = k + 1$

Thật vậy, từ hệ thức xác định dãy số (u_n) ta có: $u_{k+1} = u_k + (-1)^{2k} = k + 1$. Vậy $(*)$ đúng với mọi $n \in \mathbb{N}^*$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho dãy số (u_n) với $\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = u_n + (-1)^{2n+1} \end{cases}$. Số hạng tổng quát u_n của dãy số là số hạng nào dưới đây?

A. $u_n = 2 - n$. **B.** u_n không xác định. **C.** $u_n = 1 - n$. **D.** $u_n = -n$ với mọi n.

Lời giải

Ta có: $u_2 = 0; u_3 = -1; u_4 = -2$,. Dễ dàng dự đoán được $u_n = 2 - n$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số hạng và công thức số hạng tổng quát của dãy số

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho dãy số (u_n) với $\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = u_n + n^2 \end{cases}$. Số hạng tổng quát u_n của dãy số là số hạng nào dưới đây?

A. $u_n = 1 + \dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

B. $u_n = 1 + \dfrac{n(n-1)(2n+2)}{6}$.

C. $u_n = 1 + \dfrac{n(n-1)(2n-1)}{6}$.

D. $u_n = 1 + \dfrac{n(n+1)(2n-2)}{6}$.

Lời giải

Ta có: $\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_2 = u_1 + 1^2 \\ u_3 = u_2 + 2^2 \\ \ldots \\ u_n = u_{n-1} + (n-1)^2 \end{cases}$.

Cộng hai vế ta được $u_n = 1 + 1^2 + 2^2 + \ldots + (n-1)^2 = 1 + \dfrac{n(n-1)(2n-1)}{6}$

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho dãy số (u_n) với $\begin{cases} u_1 = 2 \\ u_{n+1} - u_n = 2n - 1 \end{cases}$. Số hạng tổng quát u_n của dãy số là số hạng nào dưới đây?

A. $u_n = 2 + (n-1)^2$.

B. $u_n = 2 + n^2$.

C. $u_n = 2 + (n+1)^2$.

D. $u_n = 2 - (n-1)^2$.

Lời giải

Ta có: $\begin{cases} u_1 = 2 \\ u_2 = u_1 + 1 \\ u_3 = u_2 + 3 \\ \ldots \\ u_n = u_{n-1} + 2n - 3 \end{cases}$. Cộng hai vế ta được $u_n = 2 + 1 + 3 + 5 + \ldots + (2n-3) = 2 + (n-1)^2$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số hạng và công thức số hạng tổng quát của dãy số

PHẦN I · CÂU 10

Đính chính MTM: Đúng là u1 = -2, u2 = -3/2, u3 = -4/3, u4 = -5/4 (nguồn lệch chỉ số); u_n = -(n + 1)/n, đáp án C không đổi.

Câu 10: Cho dãy số (u_n) với $\begin{cases} u_1 = -2 \\ u_{n+1} = -2 - \dfrac{1}{u_n} \end{cases}$. Công thức số hạng tổng quát của dãy số này là:

A. $u_n = -\dfrac{n-1}{n}$. **B.** $u_n = \dfrac{n+1}{n}$. **C.** $u_n = -\dfrac{n+1}{n}$. **D.** $u_n = -\dfrac{n}{n+1}$.

Lời giải

PHẦN I · CÂU 10 · tiếp theo (2/2)

Ta có: $u_1 = -\dfrac{3}{2}; u_2 = -\dfrac{4}{3}; u_3 = -\dfrac{5}{4}; \ldots$ Dễ dàng dự đoán được $u_n = -\dfrac{n+1}{n}$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho dãy số (u_n) với $\begin{cases} u_1 = \dfrac{1}{2} \\ u_{n+1} = u_n - 2 \end{cases}$. Công thức số hạng tổng quát của dãy số này là:

A. $u_n = \dfrac{1}{2} + 2(n-1)$. **B.** $u_n = \dfrac{1}{2} - 2(n-1)$. **C.** $u_n = \dfrac{1}{2} - 2n$. **D.** $u_n = \dfrac{1}{2} + 2n$.

Lời giải

Ta có: $\begin{cases} u_1 = \dfrac{1}{2} \\ u_2 = u_1 - 2 \\ u_3 = u_2 - 2 \\ \ldots \\ u_n = u_{n-1} - 2 \end{cases}$. Cộng hai vế ta được $u_n = \dfrac{1}{2} - 2 - 2 \ldots - 2 = \dfrac{1}{2} - 2(n-1)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số hạng và công thức số hạng tổng quát của dãy số

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho dãy số (u_n) với $\begin{cases} u_1 = -1 \\ u_{n+1} = \dfrac{u_n}{2} \end{cases}$. Công thức số hạng tổng quát của dãy số này là:

A. $u_n = (-1).\left(\dfrac{1}{2}\right)^n$. **B.** $u_n = (-1).\left(\dfrac{1}{2}\right)^{n+1}$. **C.** $u_n = \left(\dfrac{1}{2}\right)^{n-1}$. **D.** $u_n = (-1).\left(\dfrac{1}{2}\right)^{n-1}$.

Lời giải

Ta có: $\begin{cases} u_1 = -1 \\ u_2 = \dfrac{u_1}{2} \\ u_3 = \dfrac{u_2}{2} \\ \ldots \\ u_n = \dfrac{u_{n-1}}{2} \end{cases}$.

Nhân hai vế ta được $u_1.u_2.u_3...u_n = (-1).\dfrac{u_1.u_2.u_3...u_{n-1}}{\underbrace{2.2.2...2}_{n-1 \text{ lần}}} \Leftrightarrow u_n = (-1).\dfrac{1}{2^{n-1}} = (-1).\left(\dfrac{1}{2}\right)^{n-1}$

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số hạng và công thức số hạng tổng quát của dãy số

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho dãy số (u_n), biết $u_n = \dfrac{-n}{n+1}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Năm số hạng đầu tiên của dãy số là $u_1 = -\dfrac{1}{2}; u_2 = -\dfrac{2}{3}; u_3 = -\dfrac{3}{4}; u_4 = -\dfrac{4}{5}; u_5 = -\dfrac{5}{6}$

b) Số hạng u_{10}, u_{100} lần lượt là $-\dfrac{10}{11}; -\dfrac{100}{101}$

c) $-\dfrac{85}{86}$ là số hạng thứ 86 của dãy số (u_n)

d) $-\dfrac{99}{101}$ là một số hạng của dãy số (u_n)

Lời giải

a) Đúng: Ta có: $u_1 = -\dfrac{1}{2}; u_2 = -\dfrac{2}{3}; u_3 = -\dfrac{3}{4}; u_4 = -\dfrac{4}{5}; u_5 = -\dfrac{5}{6}$.

b) Đúng: Ta có: $u_{10} = -\dfrac{10}{11}, u_{100} = -\dfrac{100}{101}$.

c) Sai: Xét $-\dfrac{85}{86} = \dfrac{-n}{n+1} \Leftrightarrow 85n + 85 = 86n \Leftrightarrow n = 85$.

Vậy $-\dfrac{85}{86}$ là số hạng thứ 85 của dãy (u_n).

d) Sai: Xét $-\dfrac{99}{101} = \dfrac{-n}{n+1} \Leftrightarrow 99n + 99 = 101n \Leftrightarrow n = \dfrac{99}{2} \notin \mathbb{N}^*$ (loại).

Vậy $-\dfrac{99}{101}$ không phải là số hạng của dãy số (u_n).

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số hạng và công thức số hạng tổng quát của dãy số

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho dãy số $u_n = \dfrac{2n-1}{n+1}, n = 1,2,\ldots$ Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Số hạng thứ 5 của dãy số là $u_5 = 8$

b) Dãy số đã cho không bị chặn trên

c) Dãy số đã cho là một dãy số tăng

d) Dãy số đã cho bị chặn trên bởi 2025.

Lời giải

a) Sai: $u_n = \dfrac{2n-1}{n+1} = 2 - \dfrac{3}{n+1} \Rightarrow u_5 = 2 - \dfrac{3}{5+1} = \dfrac{3}{2}$

b) Sai: $u_n = \dfrac{2n-1}{n+1} = 2 - \dfrac{3}{n+1} \Rightarrow 0 < u_n < 2, \forall n \in \mathbb{N}^*$ nên u_n là dãy số bị chặn.

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

c) Đúng: $u_{n+1} - u_n = 3\left(\dfrac{1}{n+1} - \dfrac{1}{n+2}\right) > 0, \forall n \in \mathbb{N}^*$ nên u_n là dãy số tăng.

d) Đúng: Dãy số đã cho bị chặn trên bởi 2025.

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho dãy số (u_n) có số hạng tổng quát $u_n = \dfrac{2n+1}{n+2}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Số hạng đầu tiên của dãy số là 1

b) Số hạng $u_2 = \dfrac{5}{4}; u_3 = \dfrac{7}{5}$

c) Số hạng $u_4 = \dfrac{3}{2}; u_5 = \dfrac{11}{7}$

d) Số $\dfrac{167}{84}$ là số hạng thứ 252 của dãy số (u_n)

Lời giải

a) Đúng: $u_1 = 1$

b) Đúng: $u_2 = \dfrac{5}{4}; u_3 = \dfrac{7}{5}$

c) Đúng: Ta có: $u_4 = \dfrac{3}{2}; u_5 = \dfrac{11}{7}$.

d) Sai: Xét $\dfrac{2n+1}{n+2} = \dfrac{167}{84} \Leftrightarrow 84(2n+1) = 167(n+2) \Leftrightarrow n = 250$.

Vậy $\dfrac{167}{84}$ là số hạng thứ 250 của dãy số (u_n).

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho dãy số (u_n) được xác định như sau: $\begin{cases} u_1 = 2 \\ u_{n+1} = u_n + 5 \end{cases}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Năm số hạng đầu của dãy số là: $u_1 = 2; u_2 = 7; u_3 = 12; u_4 = 17; u_5 = 22$.

b) Số hạng tổng quát của dãy (u_n) là $u_n = 5n - 3$

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

c) Số hạng u_{50} bằng 247

d) 512 là số hạng thứ 102 của dãy (u_n)

Lời giải

a) Đúng: Năm số hạng đầu của dãy số là: $u_1=2;u_2=7;u_3=12;u_4=17;u_5=22$.

b) Đúng: Ta có: $\begin{cases} u_1=2 \\ u_2=u_1+5 \\ u_3=u_2+5 \\ u_4=u_3+5 \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ u_n=u_{n-1}+5 \end{cases}$.

Cộng theo vế toàn bộ đẳng thức trên rồi triệt tiêu các số hạng giống nhau ở hai vế, ta được: $u_n=2+(n-1)5=5n-3$.

c) Đúng: Số hạng thứ 50 của dãy số là: $u_{50}=5\cdot 50-3=247$.

d) Sai: Xét $5n-3=512\Rightarrow n=103$.

Vậy số 512 là số hạng thứ 103 của dãy số (u_n).

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho dãy số (u_n) có $u_n=-n^2+n+1$. Số -19 là số hạng thứ mấy của dãy?

Lời giải

Giả sử $u_n=-19$, $(n\in\mathbb{N}^*)$.

Suy ra $-n^2+n+1=-19\Leftrightarrow -n^2+n+20=0\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} n=5 \\ n=-4\ (l) \end{array}\right.$.

Vậy số -19 là số hạng thứ 5 của dãy.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số hạng và công thức số hạng tổng quát của dãy số

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho dãy số (u_n) có $u_n = \dfrac{an+b}{n+1}$. Biết số hạng thứ 2 và số hạng thứ 4 lần lượt bằng 4 và bằng 2. Tìm số hạng đầu tiên của dãy là

Lời giải

Vì $u_2 = 4$ và $u_4 = 2$ nên $\begin{cases} \dfrac{a.2+b}{2+1} = 4 \\ \dfrac{a.4+b}{4+1} = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2a+b = 12 \\ 4a+b = 10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -1 \\ b = 14 \end{cases}$.

Do đó $u_n = \dfrac{-n+14}{n+1}$. Suy ra $u_1 = \dfrac{-1+14}{1+1} = \dfrac{13}{2}$.

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho dãy số (u_n) với $u_n = n^2 + n + 1$ với $n \in \mathbb{N}^*$. Số 21 là số hạng thứ bao nhiêu của dãy số đã cho?

PHẦN III · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

Ta có $u_n = 21 \Rightarrow n^2 + n + 1 = 21 \Leftrightarrow n^2 + n - 20 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} n = 4 \\ n = -5 \end{array}\right.$.


Vì $n \in \mathbb{N}^*$ nên $n = 4$.

Vậy số 21 là số hạng thứ 4 của dãy số đã cho.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số hạng và công thức số hạng tổng quát của dãy số

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Với mỗi số nguyên dương n, lấy $n+6$ điểm cách đều nhau trên đường tròn. Nối mỗi điểm với điểm cách nó hai điểm trên đường tròn đó để tạo thành các ngôi sao như Hình 1. Gọi u_n là số đo góc ở đỉnh tính theo đơn vị độ của mỗi ngôi sao thì ta được dãy số (u_n). Tìm công thức của số hạng tổng quát u_n và tính u_6



Lời giải

PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Ta thấy đường tròn được chia thành $n+6$ cung bằng nhau và mỗi cung có số đo bằng $\left(\frac{360}{n+6}\right)^\circ$. Do mỗi điểm được nối với điểm cách nó hai điểm trên đường tròn nên góc ở đỉnh của mỗi ngôi sao là góc nội tiếp chắn $n+6-2.3=n$ cung bằng nhau đó. Suy ra số đo góc ở đỉnh tính theo đơn vị độ của mỗi ngôi sao là $u_n=\frac{1}{2}\cdot\frac{360}{n+6}\cdot n=\frac{180n}{n+6}\xrightarrow{n=6}u_6=90$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số hạng và công thức số hạng tổng quát của dãy số

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Cho dãy số (u_n) xác định bởi $\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = u_n + n^3, \ \forall n \in \mathbb{N}^* \end{cases}$. Tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho $\sqrt{u_n - 1} \geq 2039190$.

Lời giải

Ta có $\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_2 = u_1 + 1^3 \\ u_3 = u_2 + 2^3 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ u_{n+1} = u_n + n^3 \end{cases} \Rightarrow u_n = 1 + 1^3 + 2^3 + \ldots + (n-1)^3$

Ta lại có $1^3 + 2^3 + \ldots + (n-1)^3 = (1 + 2 + 3 + \ldots + n - 1)^2 = \left(\dfrac{n(n-1)}{2}\right)^2$

Suy ra $u_n = 1 + \left(\dfrac{n(n-1)}{2}\right)^2$

Theo giả thiết ta có $\sqrt{u_n - 1} \geq 2039190 \Leftrightarrow \dfrac{n(n-1)}{2} \geq 2039190$

$\Leftrightarrow n(n-1) \geq 4078380 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} n \geq 2020 \\ n \leq -2019 \end{array}\right.$ mà n là số nguyên dương nhỏ nhất nên $n = 2020$.

PHẦN III · CÂU 6

Đính chính MTM: Đề MTM làm rõ: tính theo tháng, tháng 1 và tháng 2 đều có 1 đôi, hỏi số đôi trong tháng thứ 12. Bảng: u10 = 55, u11 = 89 (nguồn in nhầm 54, 88); u12 = 144, đáp số không đổi.

Câu 6: Một đôi thỏ cứ mỗi tháng đẻ được một đôi thỏ con; mỗi đôi thỏ con, khi tròn hai tháng tuổi, lại mỗi tháng đẻ ra một đôi thỏ con, và quá trình sinh nở cứ thế tiếp diễn. Hỏi sau một năm sẽ có tất cả bao nhiêu đôi thỏ, nếu đầu năm có một đôi thỏ sơ sinh? Giả sử thời gian trong năm này không có con thỏ nào chết.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số hạng và công thức số hạng tổng quát của dãy số

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)



Lời giải

Số đôi thỏ tạo thành dãy Fibonacci, gọi u_n là số đôi thỏ tại tháng thứ n ta có dãy số cho bởi công thức truy hồi sau $\begin{cases} u_1 = u_2 = 1 \\ u_n = u_{n-1} + u_{n-2}, n \geq 3 \end{cases}$

Số lượng đôi thỏ là

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
u_n	1	1	2	3	5	8	13	21	34	54	88	144

Vậy sau một năm có 144 đôi thỏ.