

# Introdução e Revisão de Álgebra Linear

Anizio Silva Correia Júnior  
Mariana Tiemi Yoshioka

1 de dezembro de 2025



# Sumário

<b>1</b>	<b>Álgebra Vetorial e Geometria Analítica</b>	<b>3</b>
1.1	Álgebra Vetorial . . . . .	3
1.2	Geometria Analítica . . . . .	14
1.3	Matrizes como Vetores . . . . .	14
<b>2</b>	<b>Sistemas Lineares</b>	<b>15</b>
2.1	Matrizes como Sistemas Lineares . . . . .	15
2.2	Combinação Linear . . . . .	15
2.3	Dependência Linear . . . . .	15
<b>3</b>	<b>Espaços Vetoriais</b>	<b>17</b>
3.1	Espaços Vetoriais . . . . .	18
3.2	Subespaços Vetoriais . . . . .	20
3.3	Base e Coordenadas . . . . .	20
3.4	Ortogonalidade . . . . .	20
3.4.1	Processo de Ortogonalização de Gram-Schmidt . . . . .	20
<b>4</b>	<b>Transformações Lineares</b>	<b>21</b>
4.1	Teorema Núcleo-Imagem . . . . .	21
4.2	Matriz de uma Transformação Linear . . . . .	21
<b>5</b>	<b>Autovalores e Autovetores</b>	<b>23</b>
5.1	Polinômios . . . . .	23
5.2	Diagonalização . . . . .	23
<b>A</b>	<b>Aplicações (Cônicas)</b>	<b>25</b>



# Prefácio

Este documento aborda os conteúdos do curso de Álgebra Linear, ministrado no período 2025.1 do curso Bacharelado em Matemática da Tecnologia e Inovação, do Instituto de Matemática Pura e Aplicada e Tecnologia – IMPA Tech. O objetivo deste material é auxiliar os discentes do IMPA Tech que estão no primeiro ano da graduação nos estudos da presente matéria, bem como servir de revisão para as demais turmas. Sua construção foi feita com a orientação da professora Nara Bobko, em seu projeto de extensão para elaboração de materiais de estudo para Álgebra Linear.

Assim como o curso de Álgebra Linear do IMPA Tech, este material não apresenta pré-requisitos, a não ser um nivelamento de matemática em conceitos básicos do Ensino Médio, que podem ser facilmente resgatados durante a leitura.

No capítulo 1, o foco será, principalmente, resgatar e abordar assuntos básicos, necessários ao discente para o aproveitamento completo do curso de Álgebra Linear, e que possivelmente não foram apresentados no Ensino Médio. Isso inclui noções básicas de vetores, bem como de objetos geométricos como retas e planos. Além disso, tem-se um resgate do conceito de matrizes, em uma perspectiva voltada principalmente para matrizes como vetores, e vice-versa.

No capítulo 2 em diante, conceitos da Álgebra Linear são de fato apresentados, iniciando com sistemas lineares, combinação linear e dependência linear. Em seguida, o capítulo 3 apresenta o coração da Álgebra Linear, que são os espaços vetoriais, a partir de ideias como base de um espaço vetorial e ortogonalidade; e o capítulo 4 segue com outro conceito fundamental, que são as transformações lineares. Por fim, no capítulo 5, autovalores e autovetores são apresentados, trazendo aplicações diretas em diagonalização de matrizes, por exemplo.

Espera-se um bom aproveitamento deste material, que apresenta tópicos de Álgebra Linear de forma direta e clara, com algumas motivações geométricas.



# Capítulo 1

## Álgebra Vetorial e Geometria Analítica


Para iniciar os estudos de Álgebra Linear, é interessante apresentar, inicialmente, conceitos básicos para visualizar e estruturar o conhecimento. Nesse sentido, entender vetores na perspectiva geométrica, ou seja, no plano ( $\mathbb{R}^2$ ) ou no espaço ( $\mathbb{R}^3$ ), é mais intuitivo em um primeiro contato. Nos próximos capítulos, em especial no capítulo 3, a definição de vetores será ampliada para outros espaços vetoriais, com um maior nível de abstração.

### 1.1 Álgebra Vetorial

Embora iniciemos com Álgebra Vetorial e não Geometria Analítica, é interessante começar com um ponto de vista mais geométrico, para criar intuição.


**Definição 1.1.1.** *Vetores (geometricamente)* são objetos matemáticos que possuem módulo, direção e sentido.

*Usualmente, um vetor é representado por segmentos de retas orientados equipolentes, ou seja, que apresentam mesmo tamanho, direção e sentido.*



Note que, pela definição, um vetor não possui "origem fixa" e pode ser representado por diferentes segmentos de reta orientados.



**Definição 1.1.2.** *Sejam  $U$  e  $V$  vetores representados por  $\vec{AB}$  e  $\vec{BC}$ , respectivamente. A soma de vetores  $U+V$  é definida como o vetor representado pelo segmento de reta orientado  $\vec{AC}$*



**Proposição 1.1.3.** *Sejam  $V$ ,  $W$  e  $U$  vetores. A soma de vetores segue as seguintes propriedades:*

- i)  $V + W = W + V$  (comutatividade)
- ii)  $V + (W + U) = (V + W) + U$  (associatividade)
- iii)  $\exists$  vetor  $\bar{0}$ , tal que  $V + \bar{0} = V$  (existência do elemento neutro/vetor nulo)

Abaixo seguem ilustrações das propriedades i) e ii).



**Definição 1.1.4.** *Seja  $V$  um vetor. Seu **simétrico**, denotado por  $-V$ , é o vetor tal que*

$$V + (-V) = \bar{0}$$

**Definição 1.1.5.** *Sejam  $V$  e  $W$  vetores. A **diferença  $W$  menos  $V$**  é definida como*

$$W - V = W + (-V)$$

**Definição 1.1.6.** *Sejam  $V \neq \bar{0}$  um vetor e  $\alpha \neq 0$  um escalar (ou seja, um número real). A **multiplicação do vetor  $V$  por um escalar  $\alpha$** , denotada por  $\alpha V$ , é definida pelo vetor tal que:*

- i) seu módulo é  $|\alpha||V|$ , onde  $|V|$  é o módulo de  $V$ ;
- ii) a direção é a mesma de  $V$ ;
- iii) tem sentido de  $V$  se  $\alpha > 0$ , e sentido de  $-V$  se  $\alpha < 0$ .



Caso  $V = \vec{0}$  ou  $\alpha = 0$ ,  $\alpha V = \vec{0}$

Note, portanto, que, para um vetor qualquer  $W$  ser paralelo (ou seja, ter a mesma direção que) a outro vetor  $V$ , basta que exista um  $\alpha \in \mathbb{R}$  tal que  $W = \alpha V$ .

**Definição 1.1.7.** Seja  $V$  um vetor. As **componentes de  $V$**  são cada elemento das coordenadas que representam o ponto final com relação à origem do sistema de coordenadas escolhido.

Se  $V$  está no plano ( $\mathbb{R}^2$  ou **espaço euclidiano bidimensional**), então suas coordenadas são uma tupla de dois números reais, denotadas usualmente por  $(v_1, v_2)$ .

Se  $V$  está no espaço ( $\mathbb{R}^3$  ou **espaço euclidiano tridimensional**), então suas coordenadas são uma tupla de três números reais, denotadas usualmente por  $(v_1, v_2, v_3)$ .

Se  $V$  está em "dimensões maiores" ( $\mathbb{R}^n$  ou **espaço euclidiano  $n$ -dimensional**), então suas coordenadas são uma tupla de  $n$  números reais, denotadas usualmente por  $(v_1, \dots, v_n)$ .

Abaixo seguem ilustrações de como coordenadas funcionam no plano e no espaço.




Figura 1.1: Componentes de vetores em  $\mathbb{R}^2$  e  $\mathbb{R}^3$ .

Perceba que, para verificar as componentes de um vetor qualquer  $W$  representado por um segmento  $\overrightarrow{AB}$ , basta subtrair as suas coordenadas, de modo que:

$$W = \overrightarrow{AB} \Rightarrow \begin{cases} w_1 = x_B - x_A \\ w_2 = y_B - y_A \end{cases} \Rightarrow W = (x_B - x_A, y_B - y_A)$$

Para o  $\mathbb{R}^3$ , a subtração ocorre da mesma forma.

Com isso, note que as operações ficam muito mais fáceis, sem depender sempre do apelo geométrico. Assim, podemos buscar uma nova forma de fazer as operações básicas entre vetores (soma e multiplicação por escalar):

**Proposição 1.1.8.** *Sejam  $V, W \in \mathbb{R}^2$  e  $\alpha \in \mathbb{R}$ . Então,*

i)  $V + W = (v_1 + w_1, v_2 + w_2)$

ii)  $\alpha V = (\alpha v_1, \alpha v_2)$

Abaixo temos uma ilustração disso.




Figura 1.2: Ilustração da soma de vetores e multiplicação escalar em  $\mathbb{R}^2$ .

Para o  $\mathbb{R}^3$ , essas operações ocorrem da mesma forma. Generalizando para qualquer dimensão ( $\mathbb{R}^n$ ), temos:

**Proposição 1.1.9.** *Sejam  $V, W \in \mathbb{R}^n$  e  $\alpha \in \mathbb{R}$ . Então,*

i)  $V + W = (v_1 + w_1, \dots, v_n + w_n)$

ii)  $\alpha V = (\alpha v_1, \dots, \alpha v_n)$

E se quisermos fazer ambas as operações ao mesmo tempo? Então teremos uma combinação linear!

**Definição 1.1.10.** *Sejam  $V_1, \dots, V_k \in \mathbb{R}^n$  vetores e  $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{R}$  escalares. Seja  $W$  um vetor tal que*

$$W = \alpha_1 V_1 + \dots + \alpha_k V_k$$

Então,  $W$  é **combinação linear** de  $V_1, \dots, V_k$ .

Abordaremos melhor esse conceito em tópicos mais a frente, como em sistemas lineares.

A partir da definição de coordenadas e da soma/multiplicação de vetores por meio delas, podemos provar as seguintes propriedades:

**Teorema 1.1.11.** *Sejam  $U$ ,  $V$  e  $W$  vetores e  $\alpha$  e  $\beta$  escalares. Então,*

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| i) $U + V = V + U$ ;              | v) $\alpha(\beta U) = (\alpha\beta)U$ ;         |
| ii) $(U + V) + W = U + (V + W)$ ; | vi) $\alpha(U + V) = \alpha U + \alpha V$ ;     |
| iii) $U + \bar{0} = U$ ;          | vii) $(\alpha + \beta)U = \alpha U + \beta U$ ; |
| iv) $U + (-U) = \bar{0}$ ;        | viii) $1U = U$ .                                |

Outra ideia muito importante é saber o módulo do vetor a partir de seus componentes. Para isso, vamos definir o que chamamos de norma euclidiana.

**Definição 1.1.12.** *Seja  $V \in \mathbb{R}^n$ . O seu comprimento, também chamado de **norma de  $V$**  e denotado por  $\|V\|$ , é dado por*

$$\|V\| = \sqrt{v_1^2 + \cdots + v_n^2}$$

*Exemplo 1.1.13.* Para um vetor  $V \in \mathbb{R}^2$ , temos que

$$\|V\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2}$$




Figura 1.3: Norma de um vetor  $\vec{V}$  em  $\mathbb{R}^2$ .

Essa forma de calcular a norma está ligada ao cálculo do tamanho de vetores no  $\mathbb{R}^2$  e no  $\mathbb{R}^3$ , utilizando o Teorema de Pitágoras.

A partir dessa definição de norma, podemos definir outro conceito fundamental: o produto escalar. Este produto pega dois vetores e devolve um escalar (número real), que vai indicar o "nível de alinhamento entre eles".

**Definição 1.1.14.** *Sejam  $V, W \in \mathbb{R}^n$ , onde  $n \in \{2, 3\}$ . O **produto escalar** (também conhecido como **produto interno**) entre esses vetores, denotado por  $V \cdot W$ , é dado por*

$$V \cdot W = \begin{cases} 0, & \text{se } V = \bar{0} \text{ ou } W = \bar{0} \\ \|V\| \|W\| \cos(\theta), & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

onde  $\theta$  é o ângulo no intervalo  $[0, \pi]$  entre eles.

Note, no entanto, que o ângulo entre dois vetores só é bem definido para vetores em  $\mathbb{R}^2$  ou  $\mathbb{R}^3$ . Para resolver esse problema, podemos encontrar uma definição equivalente para o produto escalar e depois generalizá-la para dimensões maiores.

**Proposição 1.1.15.** *Sejam  $V$  e  $W$  vetores. Então, seu produto escalar é dado por*

$$V \cdot W = \begin{cases} v_1 w_1 + v_2 w_2, & \text{se } V, W \in \mathbb{R}^2 \\ v_1 w_1 + v_2 w_2 + v_3 w_3, & \text{se } V, W \in \mathbb{R}^3. \end{cases}$$

A partir disso, podemos definir o produto escalar da seguinte forma generalizada.

**Definição 1.1.16.** *Sejam  $V, W \in \mathbb{R}^n$ . O produto escalar entre esses vetores, denotado por  $V \cdot W$ , é dado por*

$$V \cdot W = v_1 w_1 + \cdots + v_n w_n$$

Com essa definição, podemos facilmente provar as seguintes propriedades (que futuramente definirão de forma ainda mais abrangente o produto interno).

**Proposição 1.1.17.** *Sejam  $U, V, W \in \mathbb{R}^n$  e  $\alpha \in \mathbb{R}$ . Então:*

- i)  $U \cdot V = V \cdot U$ ;
- ii)  $U \cdot (V + W) = U \cdot V + U \cdot W$ ;
- iii)  $\alpha(U \cdot V) = (\alpha U) \cdot V = U \cdot (\alpha V)$ ;
- iv)  $V \cdot V = \|V\|^2 \geq 0$ ,  $\forall V$  e  $V \cdot V = 0 \Leftrightarrow V = \bar{0}$ .

As ideias de norma e produto escalar são essenciais e possuem interpretação geométrica. O produto escalar, por exemplo, mostra a relação entre dois vetores e seus tamanhos e "alinhamento" (ângulo entre eles). Isso é muito bem visualizado ao tentarmos entender projeções de um vetor sobre outro: a projeção ortogonal.

**Definição 1.1.18.** *Sejam  $V$  e  $W$  vetores. A **projeção ortogonal de  $V$  sobre  $W$** , denotada por  $\text{proj}_W V$  é o vetor tal que*

- $\text{proj}_W V \parallel W$ ;
- $V - \text{proj}_W V \perp W$ .

Abaixo segue uma ilustração da projeção ortogonal. A partir dessa definição, podemos




Figura 1.4: Projeção ortogonal de  $\vec{V}$  sobre  $\vec{W}$ .

provar o seguinte teorema.

**Teorema 1.1.19.** *Seja  $W \neq \vec{0}$  um vetor. Então,*

$$\text{proj}_W V = \left( \frac{V \cdot W}{\|W\|^2} \right) W$$

Além do produto escalar, existem outros dois produtos essenciais da Álgebra Vetorial. Enquanto o produto escalar trabalha com "alinhamentos" e projeções, o produto vetorial e misto representam, respectivamente, área e volume.

**Definição 1.1.20.** *Sejam  $V, W \in \mathbb{R}^3$ . O **produto vetorial** (também conhecido como **produto externo**) entre esses vetores, denotado por  $V \times W$ , é dado por*

$$V \times W = \begin{cases} \vec{0}, & \text{se } V = \vec{0} \text{ ou } W = \vec{0} \\ U, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

onde  $U$  é definido como o vetor tal que:

- $\|U\| = \|V\| \|W\| \sin(\theta)$ ;
- $U \perp V$  e  $U \perp W$ ;
- o sentido é dado pela regra da mão direita.

A regra da mão direita estabelece que os dedos giram de  $V$  para  $W$  e o polegar aponta na direção de  $U$ , representada na Figura 1.5.

Utilizando as componentes dos vetores, podemos obter as coordenadas do seu produto vetorial de uma forma mais simples.

**Proposição 1.1.21.** *Sejam  $V, W \in \mathbb{R}^3$ . Então,*

$$V \times W = \left( \det \begin{bmatrix} v_2 & v_3 \\ w_2 & w_3 \end{bmatrix}, -\det \begin{bmatrix} v_1 & v_3 \\ w_1 & w_3 \end{bmatrix}, \det \begin{bmatrix} v_1 & v_2 \\ w_1 & w_2 \end{bmatrix} \right)$$

*Ou, utilizando um abuso de notação, temos*

$$V \times W = \det \begin{bmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{bmatrix}$$

onde  $\vec{i} = (1, 0, 0)$ ,  $\vec{j} = (0, 1, 0)$  e  $\vec{k} = (0, 0, 1)$  são os **vetores canônicos**.




Figura 1.5: Regra da mão direita

Note que, no abuso de notação para representar o produto vetorial, temos que os componentes da matriz são ora vetores, ora números reais, o que indica uma matriz inválida. A ideia dessa representação é de que, se considerássemos  $\vec{i}$ ,  $\vec{j}$  e  $\vec{k}$  números reais e fizéssemos a conta de tal determinante, e a multiplicação entre reais fosse igual à multiplicação por escalar, teríamos o equivalente à primeira forma do produto vetorial, apresentada imediatamente antes. Em suma, essa segunda representação é, na verdade, um "macete" para decorar o produto vetorial.

A partir dessas definições equivalentes do produto vetorial, podemos demonstrar as seguintes propriedades.

**Proposição 1.1.22.** *Sejam  $U, V, W \in \mathbb{R}^3$  e  $\alpha \in \mathbb{R}$ . Então:*

- i)  $V \times W = -(W \times V)$ ;
- ii)  $V \times W = \bar{0} \Leftrightarrow V = \alpha W$  ou  $W = \alpha V$  (ou seja, caso sejam paralelos);
- iii)  $(V \times W) \cdot V = (V \times W) \cdot W = 0$ ;
- iv)  $\alpha(V \times W) = (\alpha V) \times W = V \times (\alpha W)$ ;
- v)  $V \times (W + U) = V \times W + V \times U$  e  $(V + W) \times U = V \times U + W \times U$ .

Já o produto misto é dado pela "mistura" dos dois conceitos apresentados anteriormente.

**Definição 1.1.23.** *Sejam  $V, W, U \in \mathbb{R}^3$ . Então, o **produto misto**, denotado por  $[V, W, U]$ , é dado por*

$$[V, W, U] = (V \times W) \cdot U$$

A partir dos conceitos de produto vetorial e escalar, podemos descrever o misto de uma forma facilitada, bem como ressaltar algumas propriedades interessantes.

**Proposição 1.1.24.** *Sejam  $V, W, U \in \mathbb{R}^3$ . Então,*

$$[V, W, U] = \det \begin{bmatrix} v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \\ u_1 & u_2 & u_3 \end{bmatrix}$$

**Proposição 1.1.25.** *Sejam  $V, W, U \in \mathbb{R}^3$  e  $\alpha \in \mathbb{R}$ . Então,*

- i)  $[U + Z, V, W] = [U, V, W] + [Z, V, W]$   
 $[U, V + Z, W] = [U, V, W] + [U, Z, W]$   
 $[U, V, W + Z] = [U, V, W] + [U, V, Z]$ ;
- ii)  $[U, V, W] = -[U, W, V] = -[W, V, U] = -[V, U, W]$ ;
- iii)  $[U, V, W] = U \cdot (V \times W)$ ;
- iv)  $\alpha[U, V, W] = [\alpha U, V, W] = [U, \alpha V, W] = [U, V, \alpha W]$ .

Como dito, anteriormente, os produtos vetorial e misto possuem uma interpretação geométrica interessante. Isso se deve ao fato de que, quando os vetores  $V, W$  e  $U$  são não nulos, temos  $\|V \times W\| = \|V\|\|W\| \sin(\theta_1)$  e  $|[V, W, U]| = \|V \times W\|\|U\| \cos(\theta_2)$ .




Figura 1.6: Produto vetorial e produto misto.

Essas definições permitem o entendimento de que a norma do produto vetorial é a área do paralelogramo formado pelos vetores  $V$  e  $W$ , e o módulo do produto misto é o volume do paralelepípedo.

Como sabemos, a área do paralelogramo é dada pelo produto da base com a altura, enquanto o volume do paralelepípedo é dado pelo produto da área da base com a altura. Assim seguem as relações abaixo.

$$A_{VW} = \|V\| \|W\| \sin(\theta_1) = \|V \times W\|$$

$$V_{VWU} = A_{VW} \|U\| \cos(\theta_2) = \|V \times W\| \|U\| \cos(\theta_2) = |[V, W, U]|$$

Além das suas normas representarem áreas e volumes, os produtos vetorial e misto, assim como o escalar, são indicadores de "alinhamento" entre vetores. A essas características damos o nome de colinearidade e coplanaridade.

**Definição 1.1.26.** *Dois ou mais vetores são **colineares** se pertencem a uma mesma reta (ou seja, se são paralelos).*

**Definição 1.1.27.** *Dois ou mais vetores são **coplanares** se pertencem a um mesmo plano.*

Na próxima seção de Geometria Analítica, ficará mais claro o que significa um vetor pertencer a uma reta ou a um plano. De forma intuitiva, isso significa que o segmento de reta orientado que representa um vetor é paralelo à reta ou ao plano em questão.

Como dito anteriormente, ao definir a multiplicação por escalar, implicitamente entendemos as condições de colinearidade no plano.

**Proposição 1.1.28.** *Sejam  $V, W \in \mathbb{R}^2$ .*

- $V$  e  $W$  são colineares  $\Leftrightarrow \exists \alpha \in \mathbb{R}$ , tal que  $V = \alpha W$ , ou seja, se um for múltiplo escalar do outro;



- $V$  e  $W$  são sempre coplanares (pertencem ao  $\mathbb{R}^2$ ).

Já para o espaço, é possível utilizar as ideias de senos e cossenos que os produtos vetorial e misto trazem, garantindo as propriedades abaixo.

**Proposição 1.1.29.** *Sejam  $V, W, U \in \mathbb{R}^3$ .*

- $V$  e  $W$  são colineares  $\Leftrightarrow V \times W = \bar{0}$ ;
- Dois vetores  $V$  e  $W$  são sempre coplanares;
- $V, W$  e  $U$  são coplanares  $\Leftrightarrow [V, W, U] = 0$ .

Outra forma de verificar colinearidade ou coplanaridade, é utilizando a ideia de combinação linear.

**Corolário 1.1.30.** *Sejam  $U, V, W \in \mathbb{R}^3$  coplanares não nulos. Então,*

- um dos vetores é combinação linear dos outros dois;*
- $V$  e  $W$  não paralelos  $\Rightarrow U$  combinação linear de  $V$  e  $W$ .*

Um fato interessante é que, a partir do item *i)* do corolário acima, obtemos que a equação  $xV + yW + zU = \bar{0}$  tem solução não trivial, ou seja, tem solução onde  $x, y, z \neq 0$ . Isso porque, se existem reais  $\alpha, \beta$  tais que  $\alpha V + \beta W = U$  (definição de combinação linear), então basta tomar  $x = \alpha, y = \beta$  e  $z = -1$ .

Com isso, finalizamos a parte de Álgebra Vetorial. Seguem abaixo os exercícios da seção.

## Exercícios

- (SANTOS, R; 2014; p. 154) Verifique se o vetor  $U$  é combinação linear de  $V$  e  $W$ :

- $V = (9, -12, -6), W = (-1, 7, 1), U = (-4, -6, 2)$ ;
- $V = (5, 4, -3), W = (2, 1, 1), U = (-3, -4, 1)$ .

- (SANTOS, R; 2014; p. 177) Demonstre que, se  $V$  e  $W$  são vetores quaisquer, então:

- $|V \cdot W| \leq \|V\| \|W\|$ ;
- $\|V + W\| \leq \|V\| + \|W\|$ ; (Sugestão: mostre que  $\|V + W\|^2 = (V + W) \cdot (V + W) \leq (\|V\| + \|W\|)^2$ , usando o item anterior)
- $|\|V\| - \|W\|| \leq \|V - W\|$ . (Sugestão: defina  $U = V - W$  e aplique o item anterior a  $U$  e  $W$ )

3. (SANTOS, R; 2014; p. 199) Calcule o volume do paralelepípedo que tem um dos vértices no ponto  $A = (2, 1, 6)$  e os três vértices adjacentes nos pontos  $B = (4, 1, 3)$ ,  $C = (1, 3, 2)$  e  $D = (1, 2, 1)$ .
4. (SANTOS, R; 2014; p.201) Prove a identidade de Lagrange

$$\|V \times W\|^2 = \|V\|^2\|W\|^2 - (V \cdot W)^2$$

## 1.2 Geometria Analítica

## 1.3 Matrizes como Vetores

# Capítulo 2

## Sistemas Lineares

### 2.1 Matrizes como Sistemas Lineares

### 2.2 Combinação Linear

### 2.3 Dependência Linear



# Capítulo 3

## Espaços Vetoriais

Videoaula 12 - Espaços Vetoriais

<https://www.youtube.com/watch?v=UkKQEYRdiks>

Videoaula 18 - Espaços Vetoriais Abstratos

<https://www.youtube.com/watch?v=dkaUQG1Ic3A>

Videoaula 13 - Subespaços Vetoriais

<https://www.youtube.com/watch?v=4D-q80IXa94>

Videoaula 16 - Base e Dimensão

<https://www.youtube.com/watch?v=wSXwQ3gM7Eo>

Videoaula 17 - Coordenadas

<https://www.youtube.com/watch?v=GPnZsHawg6A>

Videoaula 20 - Ortogonalidade

<https://www.youtube.com/watch?v=QxsxaQrCHww>

Videoaula 21 - Processo de Ortogonalização de Gram-Schmidt

<https://www.youtube.com/watch?v=GbQ-pjpsY9Q>

### 3.1 Espaços Vetoriais

Espaços vetoriais são, basicamente, a nossa bancada de trabalho, e os vetores, as ferramentas com as quais construímos muitas funcionalidades. Exemplos disso são as LLMs (ChatGPT, Gemini, DeepSeek) e os sites de busca (Google, DuckDuckGo). Eles utilizam vetores para executar suas tarefas: todas as entradas são convertidas para dentro de um espaço vetorial e, de acordo com a posição do seu vetor, o sistema aproxima os resultados mais relevantes para você.

Além das aplicações na vida real, também temos na matemática pura, espaços vetoriais são muito necessário em cálculo de múltiplas variáveis e uma das bases de análise funcional.

**Definição 3.1.1.** ***Espaços vetorial** é um conjunto  $V$  não vazio no qual existe as operações de adição (entre vetores) e multiplicação por um número real (escalar), respeitando as seguintes propriedades com as operações citadas:*

**Adição:**

$$(A1) \quad u + v = v + u \text{ (Comutatividade);}$$

$$(A2) \quad (u + v) + w = u + (v + w) \text{ (Associatividade);}$$

$$(A3) \quad \exists v : v + u = u + v = u \text{ denotamos } v \text{ por } \vec{0} \text{ (Vetor nulo);}$$

$$(A4) \quad \forall u \exists v : u + v = v + u = \vec{0} \text{ denotamos } v \text{ por } -u \text{ (Inverso aditivo).}$$

**Multiplicação por Escalar:**

$$(M1) \quad \alpha(u + v) = \alpha u + \alpha v \text{ (Distributividade de um escalar);}$$

$$(M2) \quad (\alpha + \beta)v = \alpha v + \beta v \text{ (Distributividade de um vetor);}$$

$$(M3) \quad v \cdot 1 = v \text{ (Multiplicação por 1);}$$


$$(M4) \quad \alpha(\beta \cdot v) = (\alpha \cdot \beta)v \text{ (Associatividade).}$$

**Definição 3.1.2.** *Elementos de um espaço vetorial  $V$  são denominados **vetores**.*

*Exemplo 3.1.3* (Exemplo de espaço vetorial). O plano euclidiano de dimensão  $n$  ( $\mathbb{R}^n$ ) é um dos exemplos mais clássicos de espaço vetorial, seja dois vetores  $u = (\eta_1, \dots, \eta_n)$  e  $v = (\delta_1, \dots, \delta_n)$  e também dois escalares  $\alpha$  e  $\beta$ , com sua soma e multiplicação definido por:

$$u + v = (\eta_1 + \delta_1, \dots, \eta_n + \delta_n)$$

$$\alpha \cdot u = (\alpha\eta_1, \dots, \alpha\eta_n)$$



*Exemplo 3.1.4* (Exemplo de espaço vetorial). O conjunto das matrizes  $n \times m$  com soma entre vetores e multiplicação por escalar definido da seguinte forma:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2m} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nm} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1m} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2m} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ b_{n1} & b_{n2} & \dots & b_{nm} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (a+b)_{11} & (a+b)_{12} & \dots & (a+b)_{1m} \\ (a+b)_{21} & (a+b)_{22} & \dots & (a+b)_{2m} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ (a+b)_{n1} & (a+b)_{n2} & \dots & (a+b)_{nm} \end{bmatrix}$$

$$\alpha \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2m} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nm} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (\alpha a)_{11} & (\alpha a)_{12} & \dots & (\alpha a)_{1m} \\ (\alpha a)_{21} & (\alpha a)_{22} & \dots & (\alpha a)_{2m} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ (\alpha a)_{n1} & (\alpha a)_{n2} & \dots & (\alpha a)_{nm} \end{bmatrix}$$

é um espaço vetorial, chamado de espaço vetorial das matrizes  $n \times m$ .

## Exercícios

1. Descreva o vetor nulo dos seguintes espaços vetoriais, considerando as operações usuais:

a)  $\mathbb{R}^5$

b)  $\mathbb{M}_{3 \times 2}$

2. Mostre que o espaço  $\mathbb{P}_n = \{p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n : a_0, a_1, a_2, a_3, \dots, a_n \in \mathbb{R}\}$  dos polinômios reais de grau menor ou igual a  $n$  é um espaço vetorial real, com as operações usuais de soma e multiplicação por escalar.
3. Verifique se  $V = \{x \in \mathbb{R} : x > 0\}$  é um espaço vetorial com as operações de adição ( $\oplus$ ) e a multiplicação por escalar ( $\odot$ ) dadas abaixo. Em caso positivo, prove e indique o vetor nulo (neutro aditivo) e o inverso aditivo.

$$x \oplus y = xy \quad \text{e} \quad \alpha \odot x = x^\alpha$$

## 3.2 Subespaços Vetoriais

Subespaços vetoriais são subconjuntos de um espaço vetorial maior que ainda utilizam das mesmas operações e são "independentes" do espaço vetorial original, sendo mais exato:

**Definição 3.2.1.** *Seja  $E$  um espaço vetorial. Um **subespaço vetorial** (ou simplesmente **subespaço**) de  $E$  é um subconjunto  $F \subset E$  com as seguintes propriedades:*

(P1)  $\vec{0} \in F$ ;

(P2) Se  $u, v \in F$  então  $u + v \in F$ ;

(P3) Se  $v \in F$  então, para todo  $\alpha \in \mathbb{R}$ ,  $\alpha v \in F$ .

Decorrendo da definição, percebemos que todo subespaço é um espaço vetorial em si mesmo, também percebemos que em todo espaço vetorial existe o **subespaço trivial**, composto somente pelo vetor nulo.

## Exercícios

1. Prove que um plano é um subespaço vetorial de  $\mathbb{R}^3$  se, e somente se, o plano passa pela origem.
2. Sejam  $A_{m \times n}$  e  $B_{n \times 1}$  matrizes. Prove que o conjunto solução de  $AX = B$  é subespaço vetorial de  $M_{n \times 1}$  se, e somente se,  $B = 0$ .

## 3.3 Base e Coordenadas

## 3.4 Ortogonalidade

### 3.4.1 Processo de Ortogonalização de Gram-Schmidt



# Capítulo 4

## Transformações Lineares

### 4.1 Teorema Núcleo-Imagem

### 4.2 Matriz de uma Transformação Linear



# Capítulo 5

## Autovalores e Autovetores

### 5.1 Polinômios

### 5.2 Diagonalização



# Apêndice A

## Aplicações (Cônicas)



# Referências Bibliográficas

- [1] Lang, Serge. *Linear Algebra*. 3ª ed.
- [2] Hoffman, Kenneth; Kunze, Ray. *Linear Algebra*. 2ª ed.
- [3] Lima, Elon Lages. *Álgebra Linear*. 10ª ed.
- [4] Axler, Sheldon. *Linear Algebra Done Right*. 4ª ed.
- [5] Santos, Reginaldo. *Um Curso de Geometria Analítica e Álgebra Linear*. Cópia digital.