

FROM MENTAL NOISE TO CLARITY



दिमाग का शोर

Overthinking को समझें, रोकें
और खुद को बेहतर बनाएँ

NITENDRA SAHU

दिमाग का शोर

Overthinking को समझें, रोकें और खुद को बेहतर बनाएँ

लेखक: **Nitendra Sahu**

INFO

Copyright और Disclaimer

© 2026 Nitendra Sahu. सर्वाधिकार सुरक्षित। लेखक की लिखित अनुमति के बिना इस पुस्तक के किसी भी हिस्से को कॉपी, बेचना या वितरित करना वर्जित है।

ज़रूरी सूचना: यह पुस्तक केवल शैक्षिक और self-improvement उद्देश्य से लिखी गई है। यह किसी डॉक्टर, psychologist या therapist की सलाह या इलाज का विकल्प नहीं है। अगर आपकी सोच के साथ लगातार उदासी, घबराहट, नींद की गंभीर समस्या, या खुद को नुकसान पहुँचाने के विचार जुड़े हैं, तो कृपया किसी योग्य mental health professional से मिलें। भारत में Tele-MANAS की 24x7 free helpline **14416** (या 1-800-891-4416) उपलब्ध है।

INFO

किताब में दिए गए उदाहरणों के बारे में

इस किताब के सभी किरदार (जैसे रिया, अमित, सना, कबीर) **काल्पनिक हैं और केवल समझाने के लिए बनाए गए हैं**। इनका किसी real व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। Research के नाम, वर्ष और निष्कर्ष वास्तविक studies पर आधारित हैं और अंत में Sources सेक्शन में दिए गए हैं। जहाँ research के नतीजे मिले-जुले हैं, वहाँ यह बात साफ़ लिखी गई है।

यह किताब कैसे पढ़ें

यह किताब आपको “बस positive सोचो” जैसी खोखली सलाह नहीं देगी। इसका तरीका सीधा है: पहले समझो कि overthinking क्या है और क्यों होती है, फिर उसे पकड़ना सीखो, फिर रोकने के औज़ार आजमाओ, और आखिर में एक ऐसा system बनाओ जिससे दिमाग हल्का रहे।

किताब चार हिस्सों में बँटी है:

1. **भाग 1 – समझें:** Overthinking की असली पहचान, उसके पीछे का दिमागी विज्ञान, उसके चार रूप और उसकी असली कीमत।
2. **भाग 2 – पकड़ें:** आपके triggers, दिमाग की सोचने की गलतियाँ (thought traps) और आपकी अपनी Overthinking Profile।
3. **भाग 3 – रोकें:** Loop तोड़ने के तुरंत काम आने वाले तरीके, decision framework, worry time, journaling और body-based reset।
4. **भाग 4 – बदलें:** Perfectionism और comparison का इलाज, रोज़ का system, 21-दिन का Reset Plan और आपका Final Action Plan।

PRO TIP

पढ़ने का सबसे असरदार तरीका

हर अध्याय के अंत में एक छोटा **Action Task** है। उसे उसी दिन करें। किताब को एक बार में ख़त्म करने की जल्दी न करें। रोज़ एक अध्याय और एक task, यह सबसे अच्छा रहेगा। एक नोटबुक पास रखें; कई worksheets में आपको लिखना होगा।

WORKSHEET

आपकी शुरुआती स्थिति (Baseline)

किताब शुरू करने से पहले अपने आप से ईमानदारी से पूछें और लिखें:

1. पिछले 7 दिनों में मैं सबसे ज़्यादा किस बात को लेकर सोचता/सोचती रहा/रही?

2. इस सोच की वजह से मेरी नींद, काम या मूड पर क्या असर पड़ा?

3. 0 से 10 में, आज मेरा overthinking level कितना है? _____

4. इस किताब से मैं सबसे ज़्यादा क्या पाना चाहता/चाहती हूँ?

अनुक्रमणिका

- भूमिका: रात के 2 बजे का वो सवाल 8

भाग 1 — समझें

- 01 वो आवाज़ जो बंद नहीं होती 12
- 02 दिमाग़ ऐसा क्यों करता है 17
- 03 Overthinking के चार चेहरे 23
- 04 Overthinking की असली कीमत 30

भाग 2 — पकड़ें

- 05 Triggers: शोर कब और क्यों शुरू होता है 37
- 06 विचार बनाम तथ्य: दिमाग़ की दस चालें 43
- 07 आपकी Overthinking Profile 50

भाग 3 — दो कें

- 08 Loop तोड़ने की पाँच तुरंत तकनीकें 57
- 09 सोच से फैसले तक: Decision Framework 63
- 10 Worry Time, Journaling और CBT के औज़ार 69
- 11 शरीर से शुरू करें: Mindfulness और Reset 74

भाग 4 — बदलें

- 12 Perfectionism, तुलना और भीतर की आवाज़ 80

13	रोज़ का System: शोर कम रखने की आदतें	86
•	21-दिन का Reset Plan	91
•	आपका Final Action Plan	94
•	Sources और संदर्भ	97

भूमिका: रात के 2 बजे का वो सवाल

रात के 2 बजे हैं। कमरे की बत्ती बंद है, फ़ोन साइलेंट पर है, और शरीर थका हुआ है। फिर भी दिमाग़ चालू है। वह मीटिंग में कही गई एक लाइन को बार-बार replay कर रहा है: “क्या मैंने कुछ ग़लत बोल दिया?” फिर बात अचानक अगले महीने की EMI तक पहुँच जाती है, फिर करियर तक, और फिर इस सवाल पर कि “मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है?”

अगर यह दृश्य आपको अपना-सा लगा, तो आप अकेले नहीं हैं। Overthinking कोई दुर्लभ बीमारी नहीं है। यह एक बेहद आम **mental habit** है। और habit का मतलब है कि इसे समझा जा सकता है और बदला भी जा सकता है।

इसे “शोर” क्यों कहा गया

सोचना अपने आप में बुरा नहीं है। सोच आपको planning, सीखना और सही फैसले करना सिखाती है। समस्या तब शुरू होती है जब सोच एक ही जगह घूमने लगती है और आपको कुछ नया नहीं देती। तब वह सोच नहीं रहती, **शोर** बन जाती है: लगातार, थकाने वाला और बिना किसी नतीजे का।

शोर की एक पहचान है: आप उसे बंद करना चाहते हैं, पर बंद नहीं कर पाते। और जितना उसे दबाने की कोशिश करते हैं, वह उतना तेज़ लगता है। इस किताब का बड़ा हिस्सा इसी सवाल का जवाब है कि शोर को **दबाए बिना** उसकी आवाज़ कैसे कम की जाए।

यह समस्या इतनी महत्वपूर्ण क्यों है

Yale University की psychologist **Susan Nolen-Hoeksema** ने अपना पूरा करियर इसी सवाल पर लगाया कि कुछ लोग नकारात्मक भावनाओं में क्यों फँसे रह जाते हैं। उनके काम की एक अहम बात यह थी कि बार-बार एक ही परेशानी पर सोचते रहना (rumination) मूड को लंबा खींच सकता है और समस्या सुलझाने की क्षमता को कमज़ोर कर सकता है।

सबसे अजीब बात यह है कि overthinking **productive लगती है**। हमें लगता है कि हम समस्या पर “काम” कर रहे हैं। असल में हम एक ही गोले में घूम रहे होते हैं: चल बहुत रहे हैं, पहुँच कहीं नहीं रहे।

सोचना आपको कहीं पहुँचाता है / Overthinking आपको सिर्फ थका देती है ।

इस किताब में आपको क्या मिलेगा

- Overthinking के **चार असली चेहरे** और अपने pattern की पहचान
- दिमाग ऐसा क्यों करता है, इसका सरल विज्ञान
- दिमाग की 10 आम “सोचने की गलतियाँ” और उन्हें पकड़ने का तरीका
- Loop को तुरंत तोड़ने वाले **research-backed tools**: distanced self-talk, worry time, brain dump, if-then plans और बहुत कुछ
- Decision paralysis, पुरानी बातों, perfectionism और comparison का practical इलाज

- एक **21-दिन का Reset Plan** और आपका अपना Final Action Plan

IMPORTANT

एक ईमानदार वादा

यह किताब कोई जादुई इलाज नहीं है और यह नहीं कहती कि आपके विचार कभी आएँगे ही नहीं। लक्ष्य यह है कि विचार आएँ तो आप उनके **गुलाम न बनें**। छोटे अभ्यास, रोज़, कुछ हफ़्तों तक। असली बदलाव यहीं से आता है।

तैयार हैं? चलिए, पहले यह समझते हैं कि आख़िर हमारे दिमाग़ में चल क्या रहा है।

आ ग 1

समझें

Overthinking क्या है, क्यों होती है, और हमें कितनी महँगी पड़ती है

CHAPTER 01

01

वो आवाज़ जो बंद नहीं होती

“मैं समस्या सुलझा रहा हूँ: यही वह झूठ है जो overthinking हमें सबसे ज़्यादा सुनाती है।

इस अध्याय में

इस अध्याय में आप सीखेंगे

- Planning, Reflection, Worry और Rumination में अंतर
- एक “10-Minute Test” जिससे आप अपनी सोच को परख सकेंगे
- Overthinking क्यों “काम जैसा” महसूस होता है

EXAMPLE

रिया की एक रात (काल्पनिक)

रिया ने ऑफिस में एक presentation दिया। सब ठीक रहा, पर अंत में एक सहकर्मी ने हल्की-सी भौंहें चढ़ाई। उस रात रिया ने तीन घंटे यही सोचा: “क्या मैंने कुछ ग़लत बोल दिया? उसे पसंद नहीं आया होगा। मैनेजर क्या सोचेगा? अगली बार मुझे बुलाएँगे भी या नहीं?”

सुबह रिया थकी हुई उठी। तीन घंटे की “सोच” के बाद भी उसके पास कोई नई जानकारी नहीं थी, कोई फ़ैसला नहीं था, और कोई अगला कदम नहीं था। सिर्फ़ चिंता बढ़ी थी।

रिया की कहानी में एक बात ग़ौर करने लायक है। उसने सोचने में मेहनत बहुत की, पर सोच ने उसे **कुछ दिया नहीं।** यही overthinking की सबसे सटीक परिभाषा है: **ऐसी सोच जो बार-बार दोहराई जाए, भावनात्मक रूप से थकाए, और आपको किसी फ़ैसले या कार्रवाई तक न पहुँचाए।**

सोचना बनाम Overthinking

हर लंबी सोच overthinking नहीं होती। अगर आप दो घंटे बैठकर नौकरी बदलने के फ़ायदे-नुकसान लिख रहे हैं और अंत में एक निर्णय पर पहुँचते हैं, तो वह गहरी सोच है। फ़र्क़ इस बात में नहीं कि आप *कितना* सोचते हैं। फ़र्क़ इसमें है कि सोच *कहाँ* पहुँचाती है।*

पैमाना	स्वस्थ सोच	Overthinking
दिशा	आगे की ओर, समाधान की तरफ़	गोल-गोल, उसी बिंदु पर वापसी
सवाल	“अब मैं क्या कर सकता हूँ?”	“मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ?”
नतीजा	निर्णय, योजना या नई समझ	थकान और ज़्यादा चिंता
भावना	जिज्ञासा या शांत गंभीरता	डर, शर्म, बेचैनी
अंत	सोच ख़त्म होती है	सोच अपने आप नहीं रुकती

फ़र्क़ इसमें नहीं कि आप कितना सोचते हैं । फ़र्क़ इसमें है कि सोचने के बाद आप कहाँ पहुँचते हैं ।

Overthinking “काम जैसी” क्यों लगती है

Overthinking की सबसे चालाक बात यह है कि वह ज़िम्मेदारी जैसी दिखती है। दिमाग़ कहता है: “अगर मैंने इस पर और सोचा नहीं, तो कुछ छूट जाएगा।” इसलिए सोचना बंद करना लापरवाही जैसा लगता है।

इसके पीछे तीन छिपे हुए भ्रम काम करते हैं:

1. **नियंत्रण का भ्रम:** हमें लगता है कि चिंता करके हम भविष्य को नियंत्रित कर रहे हैं।
2. **तैयारी का भ्रम:** हमें लगता है कि हर बुरे नतीजे के बारे में पहले से सोच लेने से हम बच जाएंगे।
3. **समझ का भ्रम:** हमें लगता है कि पुरानी बात को बीसवीं बार दोहराने पर उसका राज़ खुल जाएगा।

असल में, तीनों भ्रम हैं। वही जानकारी बीसवीं बार सोचने पर भी वही रहती है। नई जानकारी या नई कार्रवाई के बिना सोच सिर्फ ऊर्जा खाती है।

IMPORTANT

अपने आप से मत लड़ें

Overthinking करने वाले लोग अक्सर *कमज़ोर* नहीं, बल्कि *ज़िम्मेदार और संवेदनशील* होते हैं। उन्हें परवाह होती है, इसीलिए दिमाग बार-बार जाँच करता रहता है। इस किताब का मक़सद आपकी परवाह कम करना नहीं, उसे सही दिशा देना है।

10-Minute Test: क्या यह सोच काम की है?

अगली बार जब आप किसी बात पर देर तक सोच रहे हों, तो **टाइमर लगाएँ और 10 मिनट बाद खुद से तीन सवाल पूछें:**

1. क्या मुझे इस सोच से कोई **नई जानकारी** मिली?
2. क्या मैंने कोई **निर्णय या अगला कदम** तय किया?

3. क्या मैं पहले से **हल्का** महसूस कर रहा हूँ, या ज़्यादा भारी?

अगर तीनों का जवाब “नहीं” है, तो आप सोच नहीं रहे, **घूम रहे हैं**। यह टेस्ट आपको दोष नहीं देता; यह सिर्फ़ एक आईना है। आगे के अध्यायों में हम सीखेंगे कि घूमना कैसे बंद करें।

KEY TAKEAWAY

मुख्य बातें

- Overthinking की पहचान उसकी **लंबाई** से नहीं, उसके **नतीजे** से होती है।
- वह productive लगती है, पर नई जानकारी या कार्रवाई के बिना सिर्फ़ थकान देती है।
- 10-Minute Test: नई जानकारी? निर्णय? हल्कापन? तीनों “नहीं” हैं तो आप loop में हैं।

ACTION STEP

आज का छोटा Action Task

आज दिन में कम से कम **एक बार** 10-Minute Test करें। जब भी आप किसी बात को तीसरी बार सोच रहे हों, टाइमर लगाएँ और तीनों सवाल नोटबुक में लिख लें। आज का लक्ष्य सोच बदलना नहीं, **सिर्फ़ खुद को देखना** है।

CHAPTER 02

02

दिमाग़ ऐसा क्यों करता है

“आपका दिमाग़ आपका दुश्मन नहीं है। वह बस ज़रूरत से ज़्यादा सावधान दोस्त है।”

इस अध्याय में

इस अध्याय में आप सीखेंगे

- दिमाग का “ख़तरा पकड़ने वाला” सिस्टम कैसे काम करता है
- अनिश्चितता से हमें इतना डर क्यों लगता है
- Overthinking एक habit loop कैसे बन जाती है
- सोच को “दबाने” की कोशिश उल्टी क्यों पड़ती है

अगर आपने कभी सोचा है, “मेरा दिमाग बंद क्यों नहीं होता?“, तो पहली राहत की बात यह है कि आपका दिमाग ख़राब नहीं है। वह अपना काम **बहुत ज़्यादा मेहनत से** कर रहा है। समस्या यह है कि उसका काम अब बदली हुई दुनिया में चल रहा है।

ख़तरा पकड़ने वाला पुराना सिस्टम

माना जाता है कि हमारे दिमाग का एक हिस्सा लाखों साल में इस तरह विकसित हुआ कि वह अच्छी चीज़ों से ज़्यादा **ख़तरों पर ध्यान दे**। जंगल में झाड़ी की सरसराहट को ख़तरा समझकर भाग जाना सही रणनीति थी। अगर वह सिर्फ़ हवा निकली तो नुकसान कुछ नहीं; पर अगर शेर निकला और आपने ध्यान नहीं दिया, तो कहानी ख़त्म।

आज हमारे आसपास शेर नहीं हैं। पर वही सिस्टम अब इन चीज़ों पर चालू हो जाता है:

- “बॉस ने सिर्फ़ ‘OK’ क्यों लिखा?”
- “दोस्त ने मैसेज पढ़कर जवाब क्यों नहीं दिया?”
- “अगर मेरा interview अच्छा नहीं गया तो?”

ये जानलेवा ख़तरा नहीं हैं, पर दिमाग़ इन्हें उसी गंभीरता से लेता है, क्योंकि उसकी नज़र में **“कोई अनिश्चितता = संभावित ख़तरा।”**

अनिश्चितता से हमारी दुश्मनी

हम इंसान अज्ञात से असहज होते हैं। कई लोगों को “कुछ ग़लत होने” से ज़्यादा परेशान करती है “पता न होना कि क्या होगा।” इसलिए दिमाग़ अनिश्चितता को मिटाने के लिए एक ही औज़ार जानता है: **और सोचना।** वह हर संभावना की रिवर्सल करता है, यह उम्मीद करते हुए कि सोचते-सोचते कोई गारंटी मिल जाएगी।

पर ज़िंदगी में गारंटी लगभग कभी नहीं मिलती। इसलिए यह खोज कभी पूरी नहीं होती, और सोच घूमती रहती है।

INFO

“अनिश्चितता सहने की क्षमता”

Psychologists इसे **intolerance of uncertainty** कहते हैं। इसका मतलब है अनिश्चितता को बुरी तरह असहज महसूस करना। यह चिंता (worry) से जुड़ी एक जानी-पहचानी विशेषता है। राहत की बात यह है कि अनिश्चितता सहने की क्षमता **अभ्यास से** बढ़ाई जा सकती है, जैसे मांसपेशी।

Overthinking कैसे एक Habit Loop बन जाती है

कोई भी आदत तीन हिस्सों से बनती है: **Cue (संकेत) → Routine (दोहराव) → Reward (इनाम)।** Overthinking भी यही करती है:

हिस्सा

Overthinking में क्या होता है

Cue	कोई अनिश्चितता, आलोचना, ख़ाली समय या रात की चुप्पी
Routine	“क्यों?”, “क्या होगा अगर?”, replay और अंदाज़े
Reward	थोड़ी देर का “मैं कुछ कर रहा हूँ” वाला एहसास, जो जल्दी ग़ायब हो जाता है

इनाम बहुत छोटा और झूठा है, पर दिमाग़ को इतना ही चाहिए। हर बार जब हम चिंता करके थोड़ी राहत महसूस करते हैं, दिमाग़ सीखता है: “चिंता काम करती है।” और loop और पक्का हो जाता है।

सोच को “दबाने” की कोशिश क्यों उल्टी पड़ती है

अक्सर हम कहते हैं, “बस इसके बारे में मत सोचो।” पर इस सलाह में दिक्कत है। Psychologist Daniel Wegner ने 1980 के दशक में एक मशहूर प्रयोग किया, जिसमें लोगों से कहा गया कि वे सफ़ेद भालू के बारे में **न** सोचें। नतीजा यह रहा कि वही विचार बार-बार लौटता रहा। इस अवधारणा पर आगे भी काफ़ी research हुई है और विशेषज्ञों में इसके असर की सीमाओं पर बहस भी है। पर रोज़मर्रा की सीख वही है जो आप खुद भी जानते हैं: **किसी विचार को ज़बरदस्ती दबाने से अक्सर वह और उभरता है।**

इसलिए इस किताब का तरीका “विचार बंद करो” नहीं है। तरीका है: **विचार को आने दो, पहचानो, और उससे अलग तरह से जुड़ो।** ठीक वैसे जैसे खिड़की के बाहर चलती गाड़ियों का शोर: आप उन्हें रोक नहीं सकते, पर उनमें उलझना बंद कर सकते हैं।

CASE STUDY (ILLUSTRATIVE)

अमित और उसका “आखिरी मैसेज” (काल्पनिक)

अमित ने दोस्त को एक मैसेज भेजा, जिसका दो दिन तक जवाब नहीं आया। पहले दिन उसने सोचा: “शायद व्यस्त होगा।” दूसरे दिन: “शायद मैंने कुछ गलत लिख दिया।” तीसरे दिन तक वह पुराने मैसेज दोबारा पढ़कर “सबूत” खोज रहा था।

यहाँ गौर करें: **नई जानकारी कुछ भी नहीं आई थी।** बदला सिर्फ यह कि अनिश्चितता को बढ़ाश्चिंत करने की जगह अमित का दिमाग उसे *कहानी* से भर रहा था। (बाद में पता चला कि दोस्त की फ़ोन-स्क्रीन टूटी थी।)

KEY TAKEAWAY

मुख्य बातें

- दिमाग ख़तरों पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए बना है; आज वही सिस्टम रोज़मर्रा की बातों पर चालू हो जाता है।
- अनिश्चितता को मिटाने के लिए दिमाग “और सोचना” चुनता है, जो काम नहीं करता।
- Overthinking एक Cue-Routine-Reward loop है; इनाम छोटा और झूठा है।
- विचारों को ज़बरदस्ती दबाना अक्सर उल्टा पड़ता है; पहचानना और अलग तरह से जुड़ना बेहतर है।

ACTION STEP

आज का छोटा Action Task

अपना एक **Overthinking Loop** लिखें: Cue (क्या शुरू करता है?) → Routine (दिमाग क्या करता है?) → Reward (मुझे क्षण भर के लिए क्या मिलता है?)। सिर्फ लिखें। इसे बदलने की ज़रूरत नहीं है। पहचान ही पहला कदम है।

CHAPTER 03

03

Overthinking के चार चेहरे

“हर overthinker एक जैसा नहीं सोचता। सही इलाज के लिए पहले सही पहचान चाहिए।”

इस अध्याय में

इस अध्याय में आप सीखेंगे

- Rumination, Worry, Analysis Paralysis और Mind-Reading में फ़र्क़
- Brooding और Reflection: कौन-सी सोच मदद करती है, कौन-सी नुकसान
- “क्यों?” वाले सवाल की जगह “कैसे / क्या?” पूछना

“मैं बहुत सोचता हूँ” एक ही वाक्य है, पर इसके पीछे चार अलग-अलग तरह की सोच छिपी हो सकती है। हर एक का स्वाद अलग है, और हर एक का इलाज भी थोड़ा अलग। इस अध्याय में हम चारों को पहचानेंगे।

चेहरा 1: Rumination (अतीत की जुगाली)

Rumination का मतलब है बीती हुई बात को बार-बार चबाना। जैसे गाय जुगाली करती है, वैसे ही दिमाग़ एक ही घटना को बार-बार मुँह में घुमाता है: “मैंने ऐसा क्यों कहा?”, “काश वैसा न किया होता।”

Nolen-Hoeksema ने इसे इस तरह परिभाषित किया कि इसमें इंसान अपनी परेशानी और उसके मतलब पर **निष्क्रिय और बार-बार** ध्यान देता है, बिना उसे सुधारने के लिए कुछ किए। उनके शोध का एक मुख्य निष्कर्ष है कि ऐसी ruminative प्रतिक्रिया उदास मनोदशा को लंबा खींच सकती है।

चेहरा 2: Worry (भविष्य की चिंता)

Worry का मतलब है भविष्य की संभावित बुरी बातों की बार-बार कल्पना करना: “अगर interview में फेल हो गया तो?”, “अगर पैसे कम पड़ गए तो?” इसका सबसे पहचानने वाला शब्द है **“अगर” (What if)।**

Rumination अतीत में अटकती है, Worry भविष्य में। दोनों के बीच एक चीज़ समान है: **दोनों वर्तमान में कुछ नहीं करने देती।**

चेहरा 3: Analysis Paralysis (फ़ैसले का जाम)

यह तब होता है जब आप निर्णय लेने से पहले इतनी जानकारी और इतने विकल्प तौलते हैं कि अंत में कोई निर्णय हो ही नहीं पाता। “कौन-सा phone लूँ?” पर तीन हफ़्ते, 40 reviews, और फिर भी कुछ ख़रीदा नहीं।

Psychologist Barry Schwartz और उनके सहयोगियों ने “maximizers” (हमेशा सर्वश्रेष्ठ चुनने की कोशिश करने वाले) और “satisficers” (जो “काफ़ी अच्छा” मिलते ही रुक जाते हैं) पर शोध किया। उनके अध्ययन में maximizers अक्सर अपने चुनावों से कम संतुष्ट पाए गए। यानी “सबसे अच्छा” खोजना अक्सर “अच्छा चुनने” से कम सुख देता है।

चेहरा 4: Mind-Reading और Social Replay

यह सबसे “सामाजिक” चेहरा है। इसमें आप दूसरों के मन को पढ़ने की कोशिश करते हैं और अपनी बातचीत को बार-बार replay करते हैं: “उसने ऐसे क्यों देखा?”, “क्या उसे बुरा लगा?”, “लोग क्या सोच रहे होंगे?”

समस्या यह है कि दूसरे के मन के बारे में आपके पास सबूत नहीं, **अंदाज़े** होते हैं। और चिंतित दिमाग़ अंदाज़े आम तौर पर बुरे वाले चुनता है।

EXAMPLE

एक ही घटना, चार चेहरे (काल्पनिक)

सना का presentation थोड़ा हकलाते हुए ख़त्म हुआ।

- **Rumination:** “मैं बीच में अटक क्यों गई? मुझसे हमेशा यही होता है।”
- **Worry:** “अगर अगली बार भी ऐसा हुआ तो promotion रूक जाएगा।”
- **Analysis Paralysis:** “अब कौन-सा course करूँ? पहले public speaking या communication? या दोनों से पहले एक किताब पढ़ूँ?”
- **Mind-Reading:** “सबने नोटिस किया होगा। बॉस को मेरी क्षमता पर शक हो गया होगा।”

सबसे अहम खोज: हर आत्म-चिंतन बुरा नहीं होता

1999 में psychologists Paul Trapnell और Jennifer Campbell ने एक दिलचस्प पहेली सुलझाई। पुराने शोध में एक अजीब बात मिलती थी: जो लोग अपने बारे में ज़्यादा सोचते थे, उन्हें अपनी बेहतर समझ भी थी और वे ज़्यादा परेशान भी थे। इसे उन्होंने **“self-absorption paradox”** कहा।

उन्होंने दिखाया कि “ख़ुद के बारे में सोचना” असल में दो अलग चीज़ें हैं:

Rumination (ख़तरा, नुकसान और अन्याय पर बार-बार लौटना) और **Reflection** (ख़ुद के बारे में जिज्ञासा)। दोनों को मिला देने से यह उलझन पैदा हुई थी।

बाद में Treynor, Gonzalez और Nolen-Hoeksema (2003) ने rumination को भी दो हिस्सों में बाँटा: **Brooding** (निष्क्रिय, उदासी भरी जुगाली) और **Reflective Pondering** (समझने की कोशिश वाली सोच)। Brooding का संबंध डिप्रेशन के लक्षणों से ज़्यादा मज़बूत पाया गया।

	Brooding	Reflection
सवाल	“मैं ही क्यों?”	“इससे मैं क्या समझ सकता हूँ?”
स्वभाव	निष्क्रिय, आलोचनात्मक	जिज्ञासु, खोजी
नतीजा	भारीपन	अक्सर समझ या कदम

IMPORTANT

एक ज़रूरी चेतावनी

Research बताती है कि लोग अक्सर *दोनों* साथ-साथ करते हैं। Takano और Tanno (2009) के एक अध्ययन में reflection अकेले कम अवसाद से जुड़ी थी, पर जो लोग reflect करते थे वे अक्सर ruminate भी करने लगते थे, और उसका नुकसान फ़ायदा काट देता था। इसलिए “मैं तो बस सोच-समझ रहा हूँ” कहकर निश्चित न हों। **ख़ुद को परखिए:** क्या यह सोच मुझे आगे ले जा रही है?

सवाल बदलिए: “क्यों?” से “कैसे / क्या?”

एक व्यावहारिक तरीका यह है कि अपने सवाल की बनावट बदलें:

Brooding वाला सवाल	Reflection वाला सवाल
मैं हमेशा ऐसा क्यों करता हूँ?	अगली बार मैं इसे अलग कैसे कर सकता हूँ?
सब मेरे खिलाफ क्यों हैं?	इस स्थिति में मेरे हाथ में क्या है?
मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है?	इससे मैं एक छोटी चीज़ क्या सीख सकता हूँ?

यह कोई जादू नहीं है; यह एक *व्यावहारिक कसौटी* है। “क्यों” वाले सवाल अक्सर अंतहीन होते हैं, जबकि “कैसे/क्या” वाले सवालों का जवाब अक्सर एक *कदम* में बदल सकता है।

KEY TAKEAWAY

मुख्य बातें

- Overthinking के चार चेहरे हैं: Rumination (अतीत), Worry (भविष्य), Analysis Paralysis (फ़ैसला), Mind-Reading (दूसरों का मन)।
- हर आत्म-चिंतन बुरा नहीं; **Brooding** नुकसान करती है, **Reflection** मदद कर सकती है।
- दोनों अक्सर मिले होते हैं, इसलिए हर बार जाँचें कि सोच आपको आगे ले जा रही है या नहीं।
- “क्यों?” को “कैसे / क्या?” में बदलना एक आसान शुरुआत है।

ACTION STEP

आज का छोटा Action Task

आज रात अपनी सबसे ज़्यादा घूमने वाली एक सोच चुनिए। उसे लिखिए, फिर देखिए कि वह चार चेहरों में से किसमें फिट होती है। फिर उस सोच का सवाल “क्यों?” से बदलकर एक “कैसे / क्या?” वाला सवाल बनाइए।

CHAPTER 04

04

Overthinking की असली कीमत

“आप सोचने में जो ऊर्जा लगाते हैं, वह किसी और चीज़ से कटती है:
नींद, रिश्ते, काम या सुकून।”

इस अध्याय में

इस अध्याय में आप सीखेंगे

- Overthinking आपकी नींद, फैसलों, रिश्तों और काम पर कैसे असर डालती है
- “छिपी हुई कीमत” को कैसे गिनें
- कब यह सिर्फ आदत नहीं, बल्कि मदद लेने का संकेत हो सकती है

अब तक हमने समझा कि overthinking क्या है और क्यों होती है। यह अध्याय एक असहज सवाल पूछता है: **इसकी आपको असल में कितनी कीमत चुकानी पड़ रही है?** कीमत समझने से बदलाव की प्रेरणा मज़बूत होती है, इसलिए इसे ईमानदारी से देख लेते हैं।

कीमत 1: नींद

रात के समय दिमाग को ध्यान भटकाने वाली चीज़ें नहीं मिलतीं, इसलिए चिंताएँ और पुरानी बातें सबसे ज़्यादा आवाज़ करती हैं। सोने से पहले की चिंता और बार-बार सोचना नींद आने में देरी से जुड़ा माना जाता है। और खराब नींद अगले दिन दिमाग को और ज़्यादा चिड़चिड़ा और नकारात्मक बनाती है, जिससे अगली रात फिर वही सिलसिला शुरू हो सकता है।

कीमत 2: फैसले

Overthinking फैसलों को बेहतर नहीं, **धीमा** बनाती है। दो तरह के नुकसान आम हैं:

- **ढालना:** “अभी और जानकारी चाहिए”, और अवसर निकल जाता है।

- **ग़लत पैमाने से चुनना:** डर से बचने के लिए ऐसा विकल्प चुन लेना जो सबसे सुरक्षित लगे, पर आपकी असली ज़रूरत से मेल न खाए।

कीमत 3: रिश्ते

बार-बार सोचने वाला इंसान अक्सर दूसरों के छोटे-छोटे संकेतों को ज़्यादा पढ़ता है: अधूरा जवाब, ठंडा लहजा, देर से आया reply। इससे बिना वजह की ग़लतफ़हमियाँ, बार-बार “सब ठीक है ना?” वाले सवाल और दूरी बन सकती है।

Nolen-Hoeksema और उनके सहयोगियों ने अपने सिद्धांत में यह भी सुझाया है कि rumination लोगों को दूसरों से मिलने वाले सहारे से दूर कर सकती है, क्योंकि ruminating व्यक्ति कई बार लगातार शिकायत या अंदरूनी उलझन में फँसा रहता है।

कीमत 4: काम और रचनात्मकता

जब ध्यान का एक हिस्सा हमेशा किसी पुरानी बातचीत में अटका हो, तो बाक़ी ध्यान से किया गया काम धीमा और कम गहरा होता है। Overthinking का एक और रूप है “परफ़ेक्ट होने तक शुरू न करना”, जो projects को शुरू होने से पहले ही रोक देता है।

कीमत 5: शरीर और ऊर्जा

लगातार तनावपूर्ण सोच शरीर को “alert mode” में रखती है: कंधे अकड़ना, सिरदर्द, भूख में बदलाव, थकान। ये हर किसी में एक जैसे नहीं होते और इनके पीछे और कारण भी हो सकते हैं, इसलिए लगातार शारीरिक लक्षण हों तो डॉक्टर से मिलना ही सही रास्ता है।

CASE STUDY (ILLUSTRATIVE)

कबीर की “अदृश्य कीमत” (काल्पनिक)

कबीर रोज़ रात को औसतन डेढ़ घंटा बिस्तर पर लेटे-लेटे सोचता है। एक साल में यह लगभग **550 घंटे** बनते हैं। इतने समय में वह चाहे तो एक नई skill का कोर्स पूरा कर सकता था।

सबसे बड़ी कीमत समय नहीं थी। नींद की कमी से सुबह वह छोटी बातों पर झल्लाता था, जिससे घर में तनाव रहता। और तनाव फिर रात की सोच का नया विषय बन जाता। (यह गणना केवल उदाहरण है: $1.5 \text{ घंटे} \times 365 \text{ दिन} \approx 548 \text{ घंटे}$)

अपनी कीमत का हिसाब लगाइए

WORKSHEET

मेरा Overthinking Cost Audit

1. मैं रोज़ औसतन कितने घंटे बेकार सोच में लगाता/लगाती हूँ? _____ घंटे
2. साल में यह कितना बनता है? (रोज़ के घंटे $\times$ 365) _____ घंटे
3. नींद, रिश्ते, काम और सेहत: इनमें से किस पर सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है? कैसे?

4. अगर यह समय मुझे वापस मिल जाए, तो मैं उसमें क्या करूँगा/करूँगी?

कब यह सिर्फ “आदत” नहीं रहती

कभी-कभी लगातार चलती सोच के पीछे सिर्फ आदत नहीं, बल्कि अवसाद (depression), anxiety या कोई और स्थिति भी हो सकती है। इन संकेतों पर ध्यान दें:

- कई हफ्तों से लगातार उदासी, खालीपन या दिलचस्पी खत्म होना
- नींद या भूख में गंभीर बदलाव
- रोजमर्रा के काम (पढ़ाई, नौकरी, रिश्ते) पर साफ असर
- खुद को नुकसान पहुँचाने या जीवन खत्म करने के विचार

IMPORTANT

मदद माँगना कमज़ोरी नहीं है

अगर इनमें से कुछ भी आप पर लागू होता है, तो यह किताब पढ़ते रहने के साथ-साथ किसी योग्य mental health professional (psychologist, psychiatrist या counselor) से ज़रूर बात करें। भारत में **Tele-MANAS: 14416** (या 1-800-891-4416) 24x7 मुफ्त उपलब्ध है। अगर आप किसी तात्कालिक ख़तरे में हैं, तो तुरंत आपातकालीन सेवा (112) से संपर्क करें। यह किताब इलाज का विकल्प नहीं है।

KEY TAKEAWAY

मुख्य बातें

- Overthinking की कीमत नींद, फैसलों, रिश्तों, काम और शरीर पर पड़ती है; समय सिर्फ सबसे दिखने वाला हिस्सा है।
- इसकी छिपी हुई कीमत गिन लेने से बदलाव की प्रेरणा बढ़ती है।
- लगातार गंभीर लक्षण हों तो पेशेवर मदद लेना सही और बहादुरी भरा कदम है।

ACTION STEP

आज का छोटा Action Task

ऊपर का **Cost Audit** पूरा करें। फिर अपने सबसे बड़े नुकसान को एक वाक्य में लिखिए: “Overthinking की वजह से मैं _____ खो रहा/रही हूँ।” इस वाक्य को अपने फ़ोन के नोट्स में सेव कर लें। यह आपकी “क्यों बदलना है” वाली वजह है।

आ ग 2

पकड़ें

अपने Triggers, Thought Traps और Pattern की पहचान

05

Triggers: शोर कब और क्यों शुरू होता है

“जिसे आप पकड़ नहीं सकते, उसे बदल भी नहीं सकते। पहचान पहला औज़ार है।”

इस अध्याय में

इस अध्याय में आप सीखेंगे

- Overthinking के छह आम Triggers
- शुरुआती चेतावनी के संकेत (Early Warning Signs) कैसे पहचानें
- अपना Trigger Map और 7-दिन का Trigger Log कैसे बनाएँ

Overthinking आसमान से नहीं गिरती। हर loop के पीछे एक **शुरुआती चिंगारी** (Cue) होती है। अगर आप चिंगारी पहचान लें, तो आग बनने से पहले ही उसे संभाल सकते हैं। इस अध्याय का काम है आपको एक जासूस बनाना, जो अपने ही दिमाग के पैटर्न का पता लगाए।

छह आम Triggers

- 1. अनिश्चितता (Uncertainty):** Result का इंतज़ार, कोई pending जवाब, बदलता हुआ plan। जवाब न मिलने पर दिमाग ख़ाली जगह अपनी कहानियों से भरता है।
- 2. मूल्यांकन (Evaluation):** Presentation, interview, review, किसी का feedback। जहाँ भी “मुझे जाँचा जा रहा है” वाला एहसास हो, वहाँ replay का ख़तरा बढ़ता है।
- 3. ख़ाली और शांत समय:** रात का बिस्तर, सफ़र, नहाते समय, अकेले चलते हुए। जब बाहर का शोर कम होता है, अंदर का शोर बढ़ जाता है।

4. शारीरिक और भावनात्मक कमज़ोरी: भूख, थकान, अकेलापन या गुस्सा। कई लोग इसे HALT के रूप में याद रखते हैं: **Hungry, Angry, Lonely, Tired**। इन अवस्थाओं में विचारों की “आवाज़” ज़्यादा नकारात्मक लगती है।

5. Digital संकेत: “Seen” पर कोई जवाब नहीं, किसी की story, किसी का last seen। ये छोटे संकेत हैं, पर चिंतित दिमाग को बहुत सामग्री दे देते हैं।

6. तुलना (Comparison): Social media पर दूसरों की उपलब्धियाँ, रिश्तेदारों की बातें, दोस्तों की तनख़्वाह। तुलना अक्सर “मैं पीछे हूँ” वाली सोच शुरू करती है।

PRO TIP

आपका Trigger एक या दो होगा

आम तौर पर हर इंसान के दो-तीन खास triggers होते हैं, छहों नहीं। पूरी किताब का फ़ायदा तब ज़्यादा होता है जब आप अपने दो-तीन triggers को ठीक से पहचान लें।

शुरुआती चेतावनी के संकेत

Loop शुरू होने से पहले शरीर, विचार और व्यवहार में छोटे संकेत आते हैं। इन्हें पहचानना सीखें:

संकेत का प्रकार	उदाहरण
शरीर	कंधे अकड़ना, पेट में कसाव, तेज़ धड़कन, जबड़ा भींचना
विचार	“काश...”, “अगर...”, “उसने ऐसा क्यों...”, “मुझे यह पक्का पता करना होगा”
व्यवहार	बार-बार फ़ोन देखना, पुराने मैसेज दोबारा पढ़ना, बिना वजह इंटरनेट पर खोजना, जवाब न देकर टालना

जब इनमें से कोई भी संकेत दिखे, इसे अपना **“अलार्म”** मानिए। अगले हिस्सों में हम सीखेंगे कि अलार्म बजने पर क्या करना है। अभी सिर्फ़ उसे पकड़ना सीखना है।

दो सबसे ज़रूरी सवाल

हर बार जब आप खुद को loop में पाएँ, ये दो सवाल पूछिए:

1. **“यह शुरू कब हुआ?”** (पिछले 30 मिनट में क्या हुआ था?)
2. **“शरीर में अभी क्या महसूस हो रहा है?”**

पहला सवाल Trigger पकड़ता है, दूसरा आपको वर्तमान में लौटाता है। दोनों मिलकर loop की रफ़्तार तुरंत धीमी करते हैं।

EXAMPLE

रिया का Trigger Map (काल्पनिक)

सात दिन तक नोट करने पर रिया ने पाया कि उसकी overthinking ज़्यादातर तीन समय पर होती थी: (1) किसी meeting के ठीक बाद, (2) रात 11 बजे बिस्तर पर, (3) जब वह Instagram खोलती थी। उसने एक ज़रूरी बात भी देखी: जिस दिन उसने दोपहर का खाना छोड़ा, उस शाम loop ज़्यादा तेज़ था। यह जानकारी उसके लिए सोने की तरह कीमती थी, क्योंकि अब उसे पता था कि कहाँ पहरा लगाना है।

WORKSHEET

7-दिन का Trigger Log

नीचे दी तालिका को अपनी नोटबुक में बनाइए और 7 दिन तक भरिए। हर बार जब आपको लगे कि आप loop में हैं, लिखिए:

तारीख़ और समय	कहाँ / किसके साथ	Trigger क्या था	शरीर का संकेत	कितनी देर चला

7 दिन बाद ये पूछिए: 1. सबसे ज़्यादा किस समय loop चला?

2. सबसे आम Trigger कौन-सा था?

3. किस स्थिति में loop नहीं चला? वहाँ क्या अलग था?

KEY TAKEAWAY

मुख्य बातें

- हर overthinking loop की शुरुआत एक Trigger से होती है; उसे पकड़ना सबसे असरदार पहला कदम है।
- छह आम Triggers: अनिश्चितता, मूल्यांकन, ख़ाली समय, शारीरिक/भावनात्मक कमज़ोरी (HALT), digital संकेत, तुलना।
- शरीर, विचार और व्यवहार में “अलार्म” संकेतों को पहचानना सीखें।
- दो सवाल: “यह शुरू कब हुआ?” और “शरीर में अभी क्या महसूस हो रहा है?”

ACTION STEP

आज का छोटा Action Task

आज से **Trigger Log** शुरू कीजिए। पहले ही दिन कम से कम तीन entries लिखिए। सही या ग़लत की चिंता न करें; सिर्फ़ जासूस की तरह नोट करें।

CHAPTER 06

06

विचार बनाम तथ्य: दिमाग की दस चालें

“आपका दिमाग एक कहानीकार है। उसकी हर कहानी सच नहीं होती।”

इस अध्याय में

इस अध्याय में आप सीखेंगे

- Thought Traps (cognitive distortions) क्या होते हैं
- दस आम सोचने की गलतियाँ, उदाहरणों के साथ
- “विचार या तथ्य?” वाला तीन-सवाल टेस्ट

1960 के दशक से psychiatrist **Aaron Beck** ने देखा कि चिंता और उदासी में फँसे लोगों की सोच में कुछ **दोहराई जाने वाली गलतियाँ** होती हैं। उन्होंने इन्हें cognitive distortions कहा, और इन्हीं के आधार पर आगे चलकर Cognitive Behavioural Therapy (CBT) विकसित हुई। आम भाषा में हम इन्हें **“Thought Traps”** कह सकते हैं: ऐसी सोच जो तर्कसंगत लगती है, पर असल में आपको एक तरफ़ा नज़र देती है।

अच्छी बात: ये दस फंदे इतने आम हैं कि एक बार नाम पता चल जाए, तो आप उन्हें दिन में कई बार पकड़ने लगेंगे।

दस Thought Traps

Thought Trap	यह क्या है	उदाहरण	सवाल जो इसे चुनौती देता है
1. Mind-Reading	बिना सबूत दूसरों के मन का अंदाज़ा	“वह मुझसे नाराज़ है।”	मेरे पास इसका सबूत क्या है?
2. Fortune-Telling	भविष्य को पक्का मान लेना	“मैं interview में फेल ही होऊंगा।”	क्या मैं सच में भविष्य जानता हूँ?
3. Catastrophizing	सबसे बुरे नतीजे को सबसे संभावित मान लेना	“एक ग़लती हुई तो नौकरी चली जाएगी।”	सबसे संभावित नतीजा क्या है?
4. All-or-Nothing	सिर्फ़ दो छोर: सफल या असफल	“परफ़ेक्ट नहीं तो बेकार।”	बीच के रास्ते कौन-से हैं?
5. Should Statements	“मुझे ऐसा होना चाहिए” का दबाव	“मुझे कभी ग़लती नहीं करनी चाहिए।”	यह नियम किसने बनाया?
6. Personalization	हर बात को अपनी ग़लती मानना	“मीटिंग का मूड ख़राब था, मेरी वजह से।”	और कौन-से कारण हो सकते हैं?
7. Emotional Reasoning	जो महसूस हो रहा है, उसे सच मानना	“डर लग रहा है, मतलब कुछ बुरा होगा।”	क्या भावना और तथ्य एक ही हैं?

8. Mental Filter	सिर्फ़ बुरी बात देखना	10 तारीफ़ों में 1 आलोचना याद रखना	बाक़ी 10 बातें क्या थीं?
9. Overgeneralization	एक घटना से हमेशा का नियम बनाना	“मैं हमेशा बिगाड़ देता हूँ।”	क्या यह “हमेशा” सच है?
10. Labeling	ख़ुद को एक नाम दे देना	“मैं नाकाम इंसान हूँ।”	मैंने क्या *किया* है, और मैं *क्या* हूँ*, ये एक हैं?

विचार या तथ्य? तीन-सवाल टेस्ट

किसी भी परेशान करने वाले विचार पर यह जाँच लगाइए:

- 1. क्या यह तथ्य है या व्याख्या?** (कैमरे में रिकॉर्ड होता? या यह मेरा मतलब निकालना है?)
- 2. इसके पक्ष और विपक्ष में क्या सबूत हैं?**
- 3. अगर मेरा सबसे अच्छा दोस्त यही सोच रहा होता, तो मैं उसे क्या कहता?**

तीसरा सवाल सबसे ताक़तवर है। हम दोस्तों के साथ जो नरमी और संतुलन रखते हैं, ख़ुद के साथ भूल जाते हैं।

EXAMPLE

एक विचार, दो नज़र (काल्पनिक)

विचार: “मीटिंग में मेरे सुझाव पर किसी ने कुछ नहीं कहा। मतलब सबको वह बेकार लगा।”

जाँच: *तथ्य:* सुझाव पर किसी ने टिप्पणी नहीं की। *व्याख्या:* “बेकार लगा।”
दूसरे कारण: समय कम था, अगला मुद्दा ज़रूरी था, लोग सोच रहे थे। *दोस्त को क्या कहता:* “चुप्पी का मतलब नकार नहीं होता। अगले दिन एक लाइन पूछ लो।”

नया संतुलित विचार: “मुझे नहीं पता कि उन्हें कैसा लगा। मैं चाहूँ तो पूछकर पता कर सकता हूँ।”

IMPORTANT

यह “Positive सोच” नहीं है

लक्ष्य ज़बरदस्ती अच्छा सोचना नहीं है। लक्ष्य है **सटीक** सोचना। कभी-कभी बुरी बात सच भी होती है। तब काम है उसे बढ़ा-चढ़ाकर देखने के बजाय सही आकार में देखना और अगला कदम तय करना।

WORKSHEET

मेरे Top 3 Thought Traps

पिछले हफ़्ते की अपनी सबसे परेशान करने वाली तीन सोचें लिखिए। हर एक के आगे लिखिए कि यह दस traps में से कौन-सा है, और संतुलित विचार क्या होगा।

सोच 1:

Trap: _____ संतुलित विचार:

सोच 2:

Trap: _____ संतुलित विचार:

सोच 3:

Trap: _____ संतुलित विचार:

KEY TAKEAWAY

मुख्य बातें

- Aaron Beck ने बताया कि परेशान सोच में कुछ दोहराई जाने वाली गलतियाँ होती हैं; इन्हें Thought Traps कह सकते हैं।
- दस आम traps हैं: Mind-Reading, Fortune-Telling, Catastrophizing, All-or-Nothing, Should, Personalization, Emotional Reasoning, Mental Filter, Overgeneralization, Labeling।
- तीन सवाल: तथ्य या व्याख्या? सबूत क्या है? दोस्त को क्या कहता?
- मक़सद positive सोचना नहीं, **सटीक** सोचना है।

ACTION STEP

आज का छोटा Action Task

आज कम से कम **एक** परेशान करने वाले विचार को इस अध्याय के तीन सवालों से परखिए। और अपने Top 3 Thought Traps की सूची भरिए।

CHAPTER 07

07

आपकी Overthinking Profile

“जब आप जानते हैं कि आप किस तरह के overthinker हैं, तो आप सही औज़ार चुन सकते हैं!”

इस अध्याय में

इस अध्याय में आप सीखेंगे

- अपने Overthinking Pattern की स्व-जाँच (Self-Assessment)
- अपना प्रमुख प्रकार: Replayer, Forecaster, Analyzer या Mind-Reader
- आपके profile के हिसाब से किताब के कौन-से अध्याय आपके लिए ज़्यादा काम के हैं

IMPORTANT

पहले यह पढ़ें

नीचे दी गई जाँच **लेखक द्वारा बनाई गई एक self-reflection सूची** है। यह कोई प्रमाणित (validated) psychological test नहीं है, और इससे कोई diagnosis नहीं होता। यह केवल इसलिए है कि आप अपने पैटर्न को समझ सकें। अगर आप अधिक गंभीर परेशानी महसूस करते हैं, तो किसी पेशेवर से मिलें।

हर कथन के आगे अपने पिछले एक महीने के अनुभव के हिसाब से अंक लिखिए: **0 = कभी नहीं, 1 = कभी-कभी, 2 = अक्सर, 3 = लगभग हमेशा**

समूह A: Replayer (अतीत)

1. मैं पुरानी बातचीत या ग़लती को बार-बार दोहराता/दोहराती हूँ। ☐ _ _ _
2. मैं “काश मैंने ऐसा न किया होता” वाली सोच में फँसता/फँसती हूँ। ☐ _ _ _

3. पुरानी शर्मिंदगी की बातें अचानक याद आकर मूड खराब कर देती हैं। ☐ ---

समूह B: Forecaster (भविष्य)

1. मैं भविष्य की बुरी संभावनाओं की कल्पना करता/करती हूँ। ☐ ---
2. "अगर ऐसा हो गया तो?" वाले सवाल मेरे दिमाग में बार-बार आते हैं। ☐ ---
3. आने वाली घटनाओं से पहले मेरी नींद या भूख बिगड़ जाती है। ☐ ---

समूह C: Analyzer (फ़ैसले)

1. छोटे फैसलों में भी मुझे बहुत समय लगता है। ☐ ---
2. फैसला लेने के बाद भी मैं सोचता/सोचती हूँ कि कहीं ग़लत विकल्प तो नहीं चुना। ☐ ---
3. मैं "पूरी जानकारी" जुटाने के चक्कर में काम शुरू करना टालता/टालती हूँ। ☐ ---

समूह D: Mind-Reader (दूसरों का मन)

1. मैं सोचता/सोचती रहता/रहती हूँ कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ☐ ---
2. किसी के छोटे संकेत (टोन, देरी, चुप्पी) से मैं बहुत मतलब निकाल लेता/लेती हूँ। ☐ ---
3. बातचीत के बाद मैं उसे बार-बार दोहराकर जाँचता/जाँचती हूँ कि कुछ ग़लत तो नहीं कहा। ☐ ---

स्कोर कैसे समझें

हर समूह के तीन अंकों को जोड़ें (0 से 9 के बीच):

समूह का स्कोर	मतलब
0 से 3	इस पैटर्न का असर कम है
4 से 6	मध्यम: यह कभी-कभी आपको परेशान करता है
7 से 9	ऊँचा: यह आपके जीवन पर साफ़ असर डाल रहा है

जिस समूह का स्कोर सबसे ऊँचा है, वही आपका **प्रमुख प्रकार** है। दो समूह बराबर हों तो दोनों पर ध्यान दें।

आपका Profile और आपके लिए सबसे ज़रूरी अध्याय

प्रकार	विशेषता	सबसे ज़्यादा काम के अध्याय
Replayer	अतीत में अटकता है	8, 10, 11
Forecaster	भविष्य के डर में रहता है	8, 10, 11
Analyzer	फ़ैसले टालता है	9, 12
Mind-Reader	दूसरों के मन के अंदाज़े लगाता है	6, 8, 12

यह सूची एक सुझाव है, नियम नहीं। पूरी किताब पढ़ना सबसे अच्छा रहेगा। पर अगर आपके पास कम समय है, तो अपने profile के अध्यायों से शुरू कीजिए।

CASE STUDY (ILLUSTRATIVE)

अलग-अलग लोग, अलग-अलग Profile (काल्पनिक)

- **रिया (Mind-Reader):** हर meeting के बाद सोचती है कि लोगों ने उसके बारे में क्या सोचा।
- **अमित (Replayer):** तीन साल पुरानी एक ग़लती आज भी रात को याद आती है।
- **सना (Analyzer):** नई नौकरी के दो offers हैं; दो हफ़्ते से कोई निर्णय नहीं।
- **कबीर (Forecaster):** हर नई ज़िम्मेदारी से पहले सबसे बुरे नतीजे की रिहर्सल करता है।

चारों “बहुत सोचते” हैं, पर चारों को **अलग** औज़ार चाहिए।

KEY TAKEAWAY

मुख्य बातें

- Overthinking के चार प्रमुख प्रकार: Replayer, Forecaster, Analyzer, Mind-Reader।
- यह self-assessment केवल आत्म-चिंतन के लिए है, कोई diagnosis नहीं।
- अपना प्रकार जानने से आप सही अध्यायों और औज़ारों को पहले चुन सकते हैं।

ACTION STEP

आज का छोटा Action Task

टेस्ट भरिए, स्कोर जोड़िए, और अपना प्रमुख प्रकार इस वाक्य में लिखिए: “मैं मुख्य रूप से एक _____ हूँ, और मेरा सबसे बड़ा Trigger _____ है।” इस वाक्य को अगले 3 हफ्ते के लिए अपने सामने रखिए।

भाग 3

रोकें

Loop तोड़ने, फैसले लेने और दिमाग को शांत करने के औज़ार

CHAPTER 08

08

Loop तोड़ने की पाँच तुरंत तकनीकें

“जब आग लगी हो, तब सिद्धांत नहीं, बाल्टी चाहिए”



इस अध्याय में

इस अध्याय में आप सीखेंगे

- Loop के बीच में काम आने वाली पाँच तुरंत तकनीकें
- “Distanced Self-Talk”: खुद को नाम से बुलाने का विज्ञान
- 60-सेकंड का Stop-Loop Protocol

पिछले अध्यायों में हमने समझ और पहचान बनाई अब पहली बार हम औज़ार उठाते हैं। ये पाँच तकनीकें **उस वक़्त** के लिए हैं जब आप loop के बीच में हों और तुरंत राहत चाहते हों। सब कुछ सब पर काम नहीं करता, इसलिए पाँचों आजमाइए और जो आपके लिए काम करे, उसे चुनिए।

तकनीक 1: नाम दीजिए (Name It)

जैसे ही आपको पता चले कि आप loop में हैं, मन में कहिए: **“यह overthinking है!”** या और विशिष्ट: **“यह फिर से replay चल रहा है!”**

इसका मतलब विचार को रोकना नहीं है। इसका मतलब है विचार को **एक चीज़ की तरह देखना**, जिसमें आप ख़ुद नहीं हैं। “मैं बेकार हूँ” और “मुझे यह विचार आ रहा है कि मैं बेकार हूँ” में बहुत फ़र्क़ है। दूसरे वाक्य में आप विचार के पीछे खड़े देखने वाले हैं।

तकनीक 2: 5-4-3-2-1 Grounding

Loop हमें अपने सिर में खींच ले जाता है। यह तकनीक ध्यान को वापस वर्तमान और इंद्रियों में लाती है:

1. 5 चीज़ें जो आप *देख* सकते हैं
2. 4 चीज़ें जो आप *छू* सकते हैं
3. 3 आवाज़ें जो आप *सुन* सकते हैं
4. 2 चीज़ें जिन्हें आप *सूँघ* सकते हैं
5. 1 चीज़ जिसका आप *स्वाद* ले सकते हैं

हर इंद्रिय के साथ धीरे-धीरे ठहरें। यह तकनीक विचारों से लड़ती नहीं, बस ध्यान को कहीं और ले जाती है। जब ध्यान बदलता है, तो अक्सर विचार की पकड़ भी ढीली पड़ती है।

तकनीक 3: Distanced Self-Talk (खुद को नाम से बुलाइए)

यह इस अध्याय की सबसे दिलचस्प तकनीक है और इसके पीछे सबसे ठोस research भी है। इसमें आप अपने से बात करते समय “मैं” की जगह **अपना नाम या “तुम”** इस्तेमाल करते हैं।

“मैं क्यों इतना परेशान हूँ?” की जगह: **“रिया, तुम क्यों परेशान हो?”**

2017 में *Scientific Reports* में छपे Jason Moser, Ethan Kross और उनके सहयोगियों के अध्ययन में प्रतिभागियों ने दुखद तस्वीरें देखकर और पुरानी दर्दनाक यादों पर सोचते हुए पहले “मैं” और फिर अपने नाम के साथ खुद से बात की। नाम इस्तेमाल करने पर भावनात्मक प्रतिक्रिया से जुड़ी दिमागी गतिविधि कम दिखी, और यह तरीका “मैं” वाली सोच से **ज़्यादा मेहनत वाला नहीं** था। शोधकर्ताओं ने खुद यह भी कहा कि इसे पक्का मानने के लिए और अध्ययन ज़रूरी हैं।

तर्क सरल है: जब हम अपने नाम से बात करते हैं, तो अपने बारे में वैसे सोचते हैं जैसे किसी दूसरे के बारे में सोचते। और दूसरों को सलाह देना हमें हमेशा खुद से आसान लगता है।

PRO TIP

इसे कैसे आज़माएँ

मन में या धीमी आवाज़ में कहिए: “[अपना नाम], अभी क्या हो रहा है? तुम्हें क्या चिंता है? अगले दस मिनट में तुम एक छोटा-सा क्या कर सकते हो?” लिखकर भी यह कर सकते हैं।

तकनीक 4: 10 मिनट का “Brain Dump”

कई बार दिमाग़ इसलिए घूमता है क्योंकि वह डरता है कि कुछ भूल जाएगा। उसे एक भरोसेमंद जगह दीजिए:

1. 10 मिनट का टाइमर लगाइए।
2. जो भी दिमाग़ में है, बिना सोचे-समझे कागज़ पर उतारिए: चिंताएँ, to-do, अधूरे विचार।
3. टाइमर बजने पर रुकिए। हर चीज़ के आगे एक छोटा चिह्न लगाइए: **(A)** कदम उठा सकता हूँ, **(B)** मेरे हाथ में नहीं, **(C)** छोड़ सकता हूँ।

यहीं पर दिमाग़ को राहत मिलती है: चीज़ें अब सिर में नहीं, कागज़ पर हैं।

तकनीक 5: शरीर की अवस्था बदलिए

अगर आप बैठे-बैठे सोच रहे हैं, तो **उठ जाइए**। दस मिनट की तेज़ चहलकदमी, ठंडे पानी से हाथ-मुँह धोना, खिड़की खोलकर खड़े होना, या कोई ऐसा काम जिसमें हाथ व्यस्त हों (बर्तन धोना, कुछ बनाना)। ये भरोसेमंद इसलिए हैं कि विचारों को सीधे बदलने की जगह **शरीर और माहौल बदलते हैं**, जो अपेक्षाकृत आसान है।

IMPORTANT

एक ज़रूरी सावधानी

ये तकनीकें अस्थायी राहत और ध्यान बदलने के लिए हैं। अगर आप इन्हें बार-बार **विचार से भागने** के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वह टालना है। लक्ष्य है विचार को पहचानकर, फिर किसी उपयोगी चीज़ की तरफ़ बढ़ना: आराम, काम या मदद माँगना।

60-सेकंड Stop-Loop Protocol

जब भी आप loop में फँसें, यह क्रम अपनाइए:

सेकंड	कदम
0 से 10	रुकिए और नाम दीजिए: “यह overthinking है।”
10 से 25	तीन धीमी साँसें। साँस छोड़ना, लेने से थोड़ा लंबा रखें।
25 से 45	ख़ुद को नाम से बुलाकर पूछिए: “इस वक़्त कौन-सी एक चीज़ मेरे हाथ में है?”
45 से 60	उस एक चीज़ में से सबसे छोटा कदम उठाइए, या शरीर की अवस्था बदलिए।

KEY TAKEAWAY

मुख्य बातें

- पाँच तकनीकें: नाम दीजिए, 5-4-3-2-1, Distanced Self-Talk, Brain Dump, शरीर की अवस्था बदलना।
- Distanced Self-Talk पर research उत्साहजनक है, पर शोधकर्ता खुद और अध्ययन की ज़रूरत बताते हैं।
- लक्ष्य विचार से भागना नहीं, ध्यान को उपयोगी दिशा में मोड़ना है।

ACTION STEP

आज का छोटा Action Task

आज पाँचों तकनीकों में से **दो** चुनिए और जब भी loop आए, आज़माइए। रात को लिखिए: कौन-सी तकनीक से सबसे ज़्यादा फ़र्क़ पड़ा और क्यों।

CHAPTER 09

09

सोच से फैसले तक: Decision Framework

“परफेक्ट फैसला नहीं, अच्छा फैसला। और सबसे अच्छा वह जो हो जाए।”

इस अध्याय में

इस अध्याय में आप सीखेंगे

- Maximizer और Satisficer: दो तरह के निर्णय-कर्ता
- कौन-से फैसले को कितना समय देना चाहिए
- एक 5-कदम का Decision Framework और 10/10/10 सवाल

फैसलों का जाम (Analysis Paralysis) सबसे थकाने वाला रूप है, क्योंकि उसमें हर विकल्प के पीछे एक डर छिपा होता है: “कहीं ग़लत न चुन लूँ।” पर सच यह है कि ज़्यादातर फैसले हमारी सोच जितने बड़े नहीं होते। इस अध्याय में हम फैसलों को संभालने का एक सरल ढाँचा बनाएँगे।

Maximizer बनाम Satisficer

Barry Schwartz और सहयोगियों के शोध (2002) ने दो प्रकार के निर्णय-कर्ता बताए। **Maximizer** हर चीज़ में “सर्वश्रेष्ठ” ढूँढता है और सभी विकल्प जाँचता है। **Satisficer** पहले से तय करता है कि “क्या काफ़ी अच्छा है”, और वह मिलते ही चुन लेता है। उनके अध्ययनों में maximizers अक्सर अपने चुनावों से कम संतुष्ट और ज़्यादा पछतावे वाले पाए गए।

यानी “सबसे अच्छा” ढूँढना ज़रूरी नहीं कि सबसे अच्छा नतीजा दे। कई बार वह सबसे ज़्यादा थकान देता है।

पहला सवाल: यह फैसला कितना बड़ा है?

हर फैसले को बराबर समय देना सबसे बड़ी भूल है। एक सरल वर्गीकरण:

प्रकार	उदाहरण	कितना समय?
छोटा और पलटने योग्य	खाना, कपड़े, कौन-सी फिल्म	अधिकतम 5 मिनट
मध्यम	कौन-सा phone, किस course में जाना	1 से 3 दिन की सीमा
बड़ा और कठिनाई से पलटने योग्य	नौकरी बदलना, शहर बदलना, शादी	कुछ हफ्ते, पर समय-सीमा के साथ

छोटे फैसलों पर लगा हर अतिरिक्त मिनट बड़े फैसलों के लिए आपकी ऊर्जा चुराता है।

5-कदम का Decision Framework

- 1. फैसला एक वाक्य में लिखिए।** “मुझे तय करना है कि _____।”
- 2. तीन ज़रूरी शर्तें (Must-haves) तय कीजिए।** वे चीज़ें जिनके बिना विकल्प स्वीकार्य नहीं। (अधिकतम तीन।)
- 3. विकल्प सीमित कीजिए।** अधिकतम तीन विकल्प रखिए। जो तीनों शर्तें पूरी न करें, उन्हें हटाइए।
- 4. समय-सीमा तय कीजिए।** “मैं शुक्रवार शाम 6 बजे तक तय करूँगा/करूँगी।”
- 5. “काफ़ी अच्छा” चुनिए और आगे बढ़िए।** जो विकल्प आपकी तीनों शर्तें पूरी करे, वही चुनिए।

PRO TIP

“अगर-तो” योजना से फ़ैसले को पक्का कीजिए

फ़ैसले के बाद भी दिमाग़ दोबारा बहस न शुरू कर दे, इसलिए एक if-then योजना बनाइए: **“अगर मुझे इस फ़ैसले पर दोबारा शक़ होगा, तो मैं अपनी लिखी तीन शर्तें पढ़ूँगा/पढ़ूँगी और 24 घंटे तक कुछ नहीं बदलूँगा/बदलूँगी।”**

Gollwitzer और Sheeran की 2006 की meta-analysis ने 94 अध्ययनों में पाया कि ऐसी if-then योजनाएँ लक्ष्य पूरा करने में औसतन मध्यम से बड़े स्तर का असर डालती हैं।

तीन सवाल जो अटके दिमाग़ को खोलते हैं

- **10/10/10:** यह फ़ैसला 10 मिनट बाद कैसा लगेगा? 10 महीने बाद? 10 साल बाद?
- **सबसे बुरा, सबसे अच्छा, सबसे संभावित:** तीनों नतीजे लिखिए। अक्सर “सबसे बुरा” भी सँभालने लायक निकलता है।
- **“अगर मुझे पक्का पता होता कि मैं असफल नहीं हो सकता...”** अपना जवाब देखिए। यह आपका असली झुकाव दिखा सकता है।

CASE STUDY (ILLUSTRATIVE)

सना का फ़ैसला (काल्पनिक)

सना के पास दो नौकरी के offers थे। दो हफ़्ते तक वह दोस्तों, आर्टिकल और विडियो से राय लेती रही, और हर राय के बाद पहले से ज़्यादा उलझ गई। फिर उसने ढाँचा अपनाया।

तीन शर्तें: (1) सीखने का मौका, (2) घर से 45 मिनट के भीतर, (3) वर्तमान से कम से कम बराबर तनख़्वाह। **नतीजा:** एक offer तीनों पूरी करता था, दूसरा सिर्फ़ दो। सना ने पहला चुना।

उसे “सबसे बेहतर” का भरोसा नहीं मिला। पर उसे दो हफ़्ते बाद पहली बार हल्का महसूस हुआ। उसका निर्णय परफ़ेक्ट नहीं, **काफ़ी अच्छा** था, और वह चल गया।

WORKSHEET

मेरा Decision Sheet

फ़ैसला (एक वाक्य):

मेरी 3 ज़रूरी शर्तें: 1. _____ 2. _____ 3. _____

विकल्प और शर्तों से मिलान:

मेरी समय-सीमा: _____

10/10/10 में यह कैसा दिखता है?

मेरी अगर-तो योजना:

KEY TAKEAWAY

मुख्य बातें

- Maximizers अक्सर कम संतुष्ट होते हैं; “काफ़ी अच्छा” चुनना अक्सर बेहतर रहता है।
- फ़ैसले को उसके आकार के हिसाब से समय दीजिए, सबको बराबर नहीं।
- 5 कदम: एक वाक्य, तीन शर्तें, तीन विकल्प, समय-सीमा, “काफ़ी अच्छा” चुनिए।
- फ़ैसले के बाद अगर-तो योजना बहस को दोबारा शुरू होने से रोकती है।

ACTION STEP

आज का छोटा Action Task

कोई एक अटका हुआ फ़ैसला चुनिए और Decision Sheet भर दीजिए। अगर वह छोटा फ़ैसला है, तो आज ही तय कर दीजिए। और एक समय-सीमा तय कर दीजिए।

CHAPTER 10

10

Worry Time, Journaling और CBT के औज़ार

“चिंता को भगाइए मत। उसे एक समय और एक जगह दे दीजिए।”



इस अध्याय में

इस अध्याय में आप सीखेंगे

- Worry Time (चिंता का समय): क्या कहता है research, और क्या नहीं
- लिखकर सोचने (journaling) के दो तरीके
- 5-कॉलम Thought Record

कुछ औज़ार ऐसे हैं जो तुरंत की जगह **रोज़ की आदत** के रूप में असर दिखाते हैं। इस अध्याय के तीन औज़ार लिखने और नियत समय पर आधारित हैं। इन्हें रोज़ 10 से 20 मिनट दीजिए।

औज़ार 1: Worry Time (चिंता का समय)

इस तकनीक को psychologist Thomas Borkovec और सहयोगियों ने 1980 के दशक में विकसित किया (इसे “stimulus control” भी कहा जाता है)। विचार सरल है: चिंता को दिन भर बिखरने देने की जगह, उसे **रोज़ एक तय समय और तय जगह** (जैसे शाम का 30 मिनट) तक सीमित कर दीजिए।

कैसे करें:

1. रोज़ एक **तय समय और जगह** चुनिए (सोने से कम से कम कुछ घंटे पहले)।
2. दिन भर जब भी चिंता उठे, उसे एक शब्द में **नोट कर लीजिए** और खुद से कहिए: “इसके बारे में मैं शाम को सोचूंगा/सोचूंगी।”
3. तय समय पर बैठिए, नोट्स पढ़िए, और हर चिंता पर पूछिए: “क्या इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ?” अगर हाँ, तो अगला कदम लिखिए। अगर नहीं, तो उसे छोड़ने का

अभ्यास कीजिए।

4. 30 मिनट पूरे होते ही रुक जाइए।

IMPORTANT

Research की ईमानदार तस्वीर

Worry postponement पर शोध **मिला-जुला** है। कुछ अध्ययनों में इसने रोज़मर्रा की चिंता घटाई। पर एक बड़े ऑनलाइन अध्ययन में इसका वैसा असर नहीं दिखा, और generalized anxiety disorder (GAD) वाले मरीज़ों के एक अध्ययन में भी कोई प्रभाव नहीं मिला। इसलिए इसे जादू की तरह नहीं, एक **प्रयोग** की तरह आजमाइए: 2 हफ़्ते करें और देखें कि आपके लिए काम करता है या नहीं।

औज़ार 2: दो तरह की Journaling

(क) Expressive Writing: James Pennebaker और उनके सहयोगियों ने 1980 के दशक से इस पर शोध किया। इसमें आप लगातार 15 से 20 मिनट, कई दिनों तक, किसी परेशान करने वाले अनुभव और उससे जुड़ी भावनाओं के बारे में **बिना रुके और बिना सँवारे** लिखते हैं। इसका असर अलग-अलग अध्ययनों में अलग-अलग रहा है; यह सबके लिए नहीं है, और शुरुआत में लिखने के बाद थोड़ी भारी भावना भी हो सकती है। अगर लिखते समय बहुत तकलीफ़ हो, तो रुकिए और किसी भरोसेमंद इंसान या पेशेवर से बात कीजिए।

(ख) Solution Journaling: यह ज़्यादा व्यावहारिक है और ruminating दिमाग़ के लिए सुरक्षित भी। इसमें हर चिंता के लिए तीन पंक्तियाँ लिखिए:

1. **समस्या** (एक वाक्य में)

- 2. मैं क्या कर सकता हूँ? (कम से कम एक कदम)
- 3. मैं क्या नहीं कर सकता? (इसे छोड़ने का अभ्यास)

औज़ार 3: Thought Record (CBT से)

यह CBT का सबसे मशहूर औज़ार है और अध्याय 6 की Thought Traps को पकड़ने में सीधे काम आता है। इसके पाँच कॉलम हैं:

1. स्थिति	2. स्वचालित विचार	3. भावना (0-10)	4. संतुलित विचार	5. अब भावना (0-10)
मीटिंग में किसी ने सुझाव पर कुछ नहीं कहा	"उन्हें मेरा आइडिया बेकार लगा।"	शर्म: 7	"मुझे पता नहीं। समय कम था। मैं कल पूछ सकता हूँ।"	शर्म: 4

अहम बात: दूसरे कॉलम में सिर्फ़ विचार लिखिए, फैसला नहीं। चौथे कॉलम में ज़बरदस्ती अच्छा नहीं, **सटीक** विचार लिखिए।

WORKSHEET

मेरा Thought Record (नोटबुक में 3 बार भरिए)

1. स्थिति (क्या हुआ?):

2. स्वचालित विचार:

3. भावना और तीव्रता (0-10):

4. कौन-सा Thought Trap? _____

5. संतुलित विचार:

6. अब भावना की तीव्रता (0-10): _____

KEY TAKEAWAY

मुख्य बातें

- Worry Time चिंता को एक तय समय तक सीमित करता है; evidence मिला-जुला है, इसलिए इसे 2 हफ्ते के प्रयोग की तरह आजमाइए।
- Journaling के दो रूप हैं: Expressive Writing (भावनाओं के लिए, सावधानी से) और Solution Journaling (कदमों के लिए)।
- Thought Record विचार को पकड़ने, परखने और संतुलित करने का CBT औज़ार है।

ACTION STEP

आज का छोटा Action Task

आज से अपना **Worry Time** तय कीजिए (समय और जगह लिखिए), और आज ही एक **Thought Record** भरिए।

CHAPTER 11

11

शरीर से शुरू करें: Mindfulness और Reset

“दिमाग़ को शांत करने का सबसे आसान रास्ता अक्सर शरीर से होकर गुज़रता है।”

इस अध्याय में

इस अध्याय में आप सीखेंगे

- Mindfulness का असली मतलब और उसका शोध
- “नदी में पत्ते” वाला अभ्यास
- साँस, चलना और सोने से पहले का Reset

अब तक हमने ज़्यादातर सोच पर काम किया। पर overthinking सिर्फ़ दिमाग में नहीं रहती। वह कंधों में, पेट में और साँस में भी बसती है। इसलिए इस अध्याय में हम शरीर की तरफ़ से दरवाज़ा खोलते हैं।

Mindfulness असल में क्या है

Mindfulness का मतलब “दिमाग़ ख़ाली करना” नहीं है। इसका मतलब है **वर्तमान के अनुभव पर बिना जजमेंट के ध्यान देना**। जब विचार आएँ, तो उन्हें आते हुए *देखना*, और उन्हें बहस का न्योता न देना।

इस विचार पर आधारित एक कार्यक्रम है **Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT)**, जिसे Zindel Segal, Mark Williams और John Teasdale ने बार-बार होने वाले अवसाद की वापसी रोकने के लिए बनाया। इसकी मूल बात यही है कि विचारों से “जुड़ने” की जगह उनसे “जुड़कर न बहने” का अभ्यास किया जाए। आप किसी मान्यता प्राप्त कोर्स या प्रशिक्षित शिक्षक के साथ इसे और गहराई से सीख सकते हैं।

अभ्यास 1: नदी में पत्ते (5 मिनट)

1. आराम से बैठिए और कुछ साँसें लीजिए।
2. कल्पना कीजिए कि आप एक धीमी बहती नदी के किनारे बैठे हैं।
3. जो भी विचार आए, उसे एक पत्ते पर रखकर नदी में बहते देखिए। न पत्ते को पकड़ें, न धकेलें।
4. अगर आप किसी विचार के साथ बह जाएँ, तो कोई बात नहीं। जैसे ही याद आए, **वापस किनारे** पर लौटिए।

असली अभ्यास विचारों का रुकना नहीं, बल्कि **बार-बार किनारे पर लौटना** है। हर लौटना एक repetition है, जैसे व्यायाम में।

अभ्यास 2: लंबी साँस छोड़ने वाली साँस (2 मिनट)

1. नाक से धीरे-धीरे साँस लीजिए, लगभग 4 गिनती तक।
2. मुँह या नाक से और धीरे साँस छोड़िए, लगभग 6 गिनती तक।
3. 8 से 10 बार दोहराइए।

साँस छोड़ने को थोड़ा लंबा रखने पर कई लोगों को शरीर शांत होता महसूस होता है। अगर इससे चक्कर या असहजता हो, तो रुकिए और सामान्य साँस लीजिए। फेफड़ों, दिल या anxiety की किसी समस्या में डॉक्टर की सलाह लें।

अभ्यास 3: चलने वाला ध्यान

दस मिनट बिना फ़ोन के टहलिये और सिर्फ़ तीन चीज़ें महसूस कीजिए: पैरों का ज़मीन से संपर्क, हवा का स्पर्श, और आसपास की आवाज़ें। जब दिमाग़ भटके, तो फिर पैरों पर लौटिए।

सोने से पहले का Reset

रात Overthinking की सबसे बड़ी रणभूमि है। एक सरल दिनचर्या बनाइए:

1. **सोने से 60 मिनट पहले** फ़ोन और काम से दूर होइए।
2. **5 मिनट का Tomorrow List:** कल के तीन ज़रूरी काम लिख दीजिए। इससे दिमाग़ को भरोसा होता है कि कुछ छूटेगा नहीं।
3. **धीमी साँस** या हल्का stretching।
4. अगर बिस्तर पर 20 मिनट बाद भी नींद न आए और दिमाग़ घूमे, तो उठकर किसी शांत जगह पर हल्की चीज़ पढ़िए और नींद आने पर लौटिए। बिस्तर को “सोचने की जगह” मत बनाइए।

EXAMPLE

कबीर का रात का नया तरीका (काल्पनिक)

कबीर ने दो हफ़्ते तक सोने से पहले एक नियम अपनाया: 9:45 पर फ़ोन दूर, 10:00 पर 5 मिनट की Tomorrow List, फिर 2 मिनट की लंबी-साँस वाली साँस। पहली रातों में कुछ ख़ास नहीं बदला। पर तीसरे हफ़्ते तक वह बिस्तर पर सोचते हुए बिताया समय आधे से कम गिनने लगा। सबसे बड़ा फ़र्क़ उसने इस बात में देखा कि अब घूमता विचार आने पर उसके पास **करने के लिए कुछ था।**

IMPORTANT

सब्र रखिए

शरीर वाले अभ्यास कुछ बार करने से नहीं, **रोज़ दोहराने** से असर करते हैं। दो हफ़्ते का वादा खुद से कीजिए, फिर नतीजा देखिए।

KEY TAKEAWAY

मुख्य बातें

- Mindfulness का मतलब विचार रोकना नहीं, उन्हें बिना बहस के देखना है।
- “नदी में पत्ते” अभ्यास का असली लक्ष्य बार-बार किनारे पर लौटना है।
- धीमी, लंबी साँस छोड़ना और चलने वाला ध्यान आसान body-based reset हैं।
- सोने से पहले एक छोटा Reset (Tomorrow List + साँस) रात की सोच को कम कर सकता है।

ACTION STEP

आज का छोटा Action Task

आज रात 60 मिनट वाला Bedtime Reset आज़माइए: फ़ोन दूर, 5 मिनट की Tomorrow List, और 10 धीमी साँसें।

आ ग 4

बदलें

जड़ की आदतें, रोज़ का system और आपका 21-दिन का
Reset

CHAPTER 12

12

Perfectionism, तुलना और भीतर की आवाज़

“आप दोस्त को जिस नरमी से सँभालते हैं, खुद के साथ उतनी नरमी कब रखेंगे?”

इस अध्याय में

इस अध्याय में आप सीखेंगे

- Perfectionism overthinking को कैसे ईंधन देता है
- तुलना (Comparison) का जाल और उससे बाहर आने का तरीका
- Inner Critic को Inner Coach में कैसे बदलें

अब तक के औज़ार लक्षणों पर काम करते थे। इस अध्याय में हम तीन गहरी जड़ों की तरफ़ जाते हैं, जो बहुत से लोगों में overthinking को बार-बार लौटाती रहती हैं:

perfectionism, तुलना और कठोर आंतरिक आवाज़।

Perfectionism: ऊँचे मानक या ग़लती का डर?

ऊँचे मानक रखना बुरा नहीं है। समस्या तब होती है जब मानक इतने कठोर हो जाएँ कि हर ग़लती **अपने मूल्य पर सवाल** जैसी लगे। तब दिमाग़ हर काम से पहले और बाद में जाँच-पड़ताल में लग जाता है: “क्या यह काफ़ी अच्छा है? कुछ छूट तो नहीं गया? लोग क्या कहेंगे?”

दो तरह के perfectionism की तुलना करके देखिए:

स्वस्थ उत्कृष्टता	डर-आधारित Perfectionism
“मैं बेहतर करना चाहता हूँ।”	“गलती हुई तो मैं बेकार हूँ।”
गलती से सीखती है	गलती से शर्मिंदा होती है
काम पूरा करके सुधारती है	शुरू करने या ख़त्म करने से डरती है
सफलता में संतोष	सफलता में भी “और बेहतर होना चाहिए था”

PRO TIP

80% नियम

हर काम पर पूछिए: “इसे 80% अच्छा बनाने में कितना समय लगेगा, और बाकी 20% के लिए कितना?” अक्सर आखिरी 20% पर पूरा आधा समय चला जाता है। जहाँ ज़रूरत न हो (ज़्यादातर रोज़ के काम), 80% पर रुककर भेज दीजिए। ज़रूरी जगहों (सेहत, सुरक्षा, क़ानूनी काग़ज़) पर पूरी मेहनत कीजिए।

तुलना का जाल

Social psychologist Leon Festinger ने 1954 में सामाजिक तुलना का सिद्धांत दिया: हम अपनी स्थिति परखने के लिए दूसरों से तुलना करते हैं। यह स्वाभाविक है। पर आज की दुनिया में तुलना की समस्या बदल गई है: हम दूसरों की **सबसे चमकदार झलकियों** से अपनी **पूरी, असली, बिना edit की** ज़िंदगी की तुलना करते हैं।

IMPORTANT

एक असमान तुलना

आप अपनी पूरी फ़िल्म (असफलताएँ, संदेह, थकान, पदों के पीछे का सब कुछ) की तुलना किसी और के *trailer* से कर रहे हैं। यह तुलना कभी बराबर नहीं हो सकती।

तुलना के जाल से बाहर आने के चार आसान कदम:

1. **Trigger पहचानिए:** कौन-सा app, कौन-सा व्यक्ति, कौन-सा विषय आपको तुलना में धकेलता है?
2. **Feed साफ़ कीजिए:** जो accounts हर बार आपको छोटा महसूस कराएँ, उन्हें mute या unfollow कीजिए। यह बुरे इंसान होने का संकेत नहीं।
3. **पिछली बार के “आप” से तुलना कीजिए:** “6 महीने पहले मैं कहाँ था?”
4. **प्रेरणा और तुलना में फ़र्क़ करिए:** प्रेरणा आपको कदम देती है; तुलना आपको शर्मा

Inner Critic से Inner Coach तक

अधिकांश overthinkers के भीतर एक कठोर आवाज़ रहती है जो “मदद” के नाम पर आलोचना करती है: “तुम्हें और मेहनत करनी चाहिए थी।” यह आवाज़ मानती है कि कठोरता ही प्रेरणा है। पर शोध (जैसे Kristin Neff और अन्य द्वारा self-compassion पर किया गया काम) बताता है कि खुद के प्रति दया **लापरवाही नहीं**, बल्कि मुश्किल समय में लौटकर उठ खड़े होने से जुड़ी पाई गई है। (इस क्षेत्र में शोध बढ़ रहा है, पर इसे “गारंटी” मत समझिए।)

अंतर यह है:

Inner Critic	Inner Coach
“तुम फिर बिगाड़ आए। कितने बेवकूफ़ हो।”	“यह ग़लती हुई। अगली बार क्या अलग करोगे?”
डर से चलाता है	दिशा से चलाता है
सिर्फ़ कमी देखता है	कमी और ताक़त, दोनों देखता है

दोस्त का टेस्ट: जब आप खुद से कुछ कठोर कहें, तो पूछिए: “क्या मैं यही बात अपने सबसे अच्छे दोस्त से कहता?” अगर नहीं, तो वही बात उसी लहजे में खुद से मत कहिए।

CASE STUDY (ILLUSTRATIVE)

रिया का बदलाव (काल्पनिक)

रिया हर मेल भेजने से पहले उसे आठ बार पढ़ती थी। उसने एक नियम बनाया: “रोज़ की मेल्स 2 बार पढ़ूँगी, 3 मिनट सीमा।” शुरू में बेचैनी हुई। पर तीसरे हफ़्ते तक उसने गिना कि बीते दो हफ़्तों में **एक भी** मेल में ऐसी ग़लती नहीं निकली जो आठ बार पढ़ने से बचती। सबूत ने डर को चुनौती दी, और रिया ने नियम में भरोसा करना सीख लिया।

WORKSHEET

मेरा Perfectionism और Inner Coach Sheet

1. वह एक काम जिसे मैं “परफ़ेक्ट” बनाने में सबसे ज़्यादा समय लगाता/लगाती हूँ:

2. इसे 80% पर रोकने पर सबसे बुरा क्या हो सकता है? सबसे संभावित क्या?

3. मेरे Inner Critic का सबसे आम वाक्य:

4. वही बात Inner Coach कैसे कहेगा?

KEY TAKEAWAY

मुख्य बातें

- डर-आधारित perfectionism overthinking को ईंधन देता है; 80% नियम इसे तोड़ने का सरल तरीका है।
- तुलना में हम दूसरों के trailer से अपनी पूरी फिल्म नापते हैं; feed साफ़ करना और खुद के अतीत से तुलना करना मदद करता है।
- Inner Critic की जगह Inner Coach की भाषा सीखिए; दोस्त का टेस्ट उपयोगी है।

ACTION STEP

आज का छोटा Action Task

आज एक काम चुनिए और जानबूझकर उसे **80% पर** रोककर भेज दीजिए। और एक ऐसे account को mute कीजिए जो आपको लगातार छोटा महसूस कराता है।

13

रोज़ का System: शोर कम रखने की आदतें

“बदलाव इच्छाशक्ति से कम और व्यवस्था से ज़्यादा आता है।”

इस अध्याय में

इस अध्याय में आप सीखेंगे

- If-Then योजनाओं से तकनीकों को आदत बनाना
- Digital और माहौल की सफ़ाई
- नींद, हलचल और सामाजिक सहारे के बुनियादी स्तंभ
- Setback आए तो क्या करें

आपने अब तक कई औज़ार देखे। पर औज़ार तब तक काम नहीं आते जब तक वे **सही पल पर** इस्तेमाल न हों। और सही पल पर वे तभी इस्तेमाल होते हैं जब आपने उन्हें पहले से तय कर रखा हो। इस अध्याय में हम औज़ारों को एक रोज़ के system में बाँधते हैं।

If-Then योजनाएँ: औज़ार को सही पल से जोड़िए

इसे **Implementation Intention** कहा जाता है। Peter Gollwitzer और Paschal Sheeran की 2006 की meta-analysis ने 94 अध्ययनों को जोड़कर पाया कि “अगर [स्थिति] हो, तो मैं [कार्य] करूँगा” जैसी योजनाएँ लक्ष्य पूरा करने में औसतन मध्यम से बड़ा सुधार देती हैं ($d = 0.65$)। बाद के बड़े विश्लेषण (642 परीक्षण) में भी असर बना रहा, पर उसका आकार संदर्भ के हिसाब से अलग-अलग रहा। यानी यह सबके लिए, हर जगह एक जैसा जादू नहीं है, पर भरोसेमंद है।

नीचे आपके लिए कुछ तैयार नमूने हैं:

अगर (Cue)	तो (Action)
अगर मैं मीटिंग के बाद replay शुरू करूँ	तो 60-सेकंड Stop-Loop Protocol चलाऊँगा/चलाऊँगी
अगर रात को बिस्तर पर चिंता आए	तो पास की नोटबुक में एक लाइन लिखूँगा/लिखूँगी और साँस लूँगा/लूँगी
अगर किसी का जवाब देर से आए	तो अगले 2 घंटे कोई पुराना मैसेज नहीं पढ़ूँगा/पढ़ूँगी
अगर कोई फैसला 3 दिन से अटका हो	तो Decision Sheet भरकर शाम 6 बजे तक तय करूँगा/करूँगी

Digital और माहौल की सफ़ाई

- **सोने से एक घंटा पहले screen से दूरी।** अगर यह कठिन है, तो शुरूआत 20 मिनट से कीजिए।
- **Notifications कम कीजिए।** हर “ping” एक छोटा Trigger है।
- **Read-receipts और last-seen** बंद करने पर विचार कीजिए, जो आपको जवाब का इंतज़ार करने की यातना देते हैं।
- **Search की आदत पर नज़र रखिए।** चिंता में हम बार-बार लक्षण, नतीजे और कहानियाँ गूगल करते हैं। हर खोज राहत नहीं, नई चिंता देती है।

तीन बुनियादी स्तंभ

1. नींद: रोज़ एक जैसे समय पर सोने-जागने की कोशिश, कैफ़ीन की दोपहर के बाद कटौती, और अंधेरा, ठंडा, शांत कमरा। थका हुआ दिमाग चिंता के सामने कमज़ोर होता है।

2. हलचल: रोज़ कम से कम 20 से 30 मिनट की चहलकदमी या कोई शारीरिक गतिविधि। ऐसा करने से कई लोगों को मूड और नींद में सुधार महसूस होता है। जिन्हें स्वास्थ्य समस्या हो, वे शुरू करने से पहले डॉक्टर से पूछें।

3. सामाजिक सहारा: किसी भरोसेमंद इंसान से बात करना अक्सर मदद करता है। पर एक सावधानी: हर बार वही परेशानी वही शब्दों में बार-बार दोहराना भी एक तरह की rumination बन सकता है। बातचीत में सिर्फ़ भावना नहीं, **“अब मैं क्या करूँ?”** का सवाल भी जोड़िए।

जब Setback आए

कभी न कभी loop फिर लौटेगा, ख़ासकर तनाव के समय। यह असफलता नहीं, सामान्य है। याद रखिए:

- 1. पहली प्रतिक्रिया:** “मैं फिर वहीं पहुँच गया/गई” की जगह कहिए, “पुरानी आदत लौटी है। मेरे पास औज़ार हैं।”
- 2. सबसे छोटा औज़ार चुनिए:** 60-सेकंड Protocol
- 3. खुद से कठोर मत होइए:** यहाँ Inner Coach की ज़रूरत है।
- 4. सबक़ नोट कीजिए:** क्या Trigger था? क्या अलग किया जा सकता था?

IMPORTANT

कब पेशेवर मदद लें

अगर 3 से 4 हफ्ते की लगातार कोशिश के बाद भी आपकी सोच, नींद या मूड पर गंभीर असर बना रहे, या रोज़ के काम प्रभावित हों, या खुद को नुकसान पहुँचाने के विचार आएँ, तो psychologist, psychiatrist या counselor से मिलिए। CBT और अन्य थेरेपी इसी तरह की समस्याओं के लिए बनी हैं। Tele-MANAS: **14416**। आपात स्थिति में 112।

WORKSHEET

मेरे If-Then Plans (3 बनाइए)

अगर _____ तो
_____ अगर
_____ तो
_____ अगर
_____ तो

KEY TAKEAWAY

मुख्य बातें

- If-Then योजनाएँ औज़ारों को सही पल से जोड़ती हैं; शोध इन्हें औसतन उपयोगी पाता है।
- Digital सफ़ाई, नींद, हलचल और सामाजिक सहारा overthinking को काबू में रखने के बुनियादी स्तंभ हैं।
- Setback सामान्य है; सबसे छोटा औज़ार उठाइए, खुद के साथ कठोर मत होइए।

ACTION STEP

आज का छोटा Action Task

ऊपर के Worksheet में अपने तीन If-Then Plans लिखिए और उन्हें फ़ोन के wallpaper या नोट्स में रखिए।

SECTION A

21-दिन का Reset Plan

अब तक आपने सीखा। अब करने की बारी है। यह योजना हर दिन **सिर्फ़ 10 से 20 मिनट** माँगती है। इसे तीन हफ़्तों में बाँटा गया है: पहले **पहचान**, फिर **औज़ार**, फिर **system।**

PRO TIP

कैसे इस्तेमाल करें

रोज़ का काम पूरा होने पर ☐ पर निशान लगाइए। अगर एक दिन छूट जाए, तो छोड़ दीजिए और अगले दिन से लौटिए; सब कुछ दोबारा शुरू करने की ज़रूरत नहीं।

हफ़्ता 1: पहचान (Awareness)

दिन	आज का काम	
1	Baseline लिखिए और 10-Minute Test एक बार करें	☐
2	अपना Overthinking Loop (Cue, Routine, Reward) लिखिए	☐
3	आज की सबसे घूमने वाली सोच को चार चेहरों में से पहचानिए	☐
4	Cost Audit भरिए	☐
5	Trigger Log: कम से कम 3 entries	☐
6	एक परेशान विचार को तीन-सवाल टेस्ट से परखिए	☐
7	Self-Assessment भरकर अपना Profile तय कीजिए। पूरे हफ़्ते की समीक्षा: सबसे आम Trigger क्या रहा?	☐

हफ़्ता 2: औज़ार (Tools)

दिन	आज का काम	
8	60-सेकंड Stop-Loop Protocol कम से कम 2 बार चलाइए	☐
9	Distanced Self-Talk: खुद को नाम से बुलाकर एक चिंता लिखिए	☐
10	10-मिनट का Brain Dump और A/B/C चिह्न	☐
11	Worry Time: समय तय कीजिए और 15 से 30 मिनट का सत्र कीजिए	☐
12	एक Thought Record भरिए	☐
13	एक अटके फैसले पर Decision Sheet भरकर तय कीजिए	☐
14	“नदी में पत्ते” का 5-मिनट अभ्यास। हफ़्ते की समीक्षा: कौन-से 2 औज़ार सबसे काम आए?	☐

हफ्ता 3: System (Habits)

दिन	आज का काम	
15	तीन If-Then योजनाएँ लिखिए और दिखने वाली जगह पर रखिए	☐
16	Bedtime Reset: फ़ोन दूर, Tomorrow List, 10 धीमी साँसें	☐
17	एक काम 80% पर रोककर भेजिए	☐
18	अपना social feed साफ़ कीजिए (कम से कम 3 accounts)	☐
19	20 से 30 मिनट की चहलकदमी, बिना फ़ोन के	☐
20	किसी भरोसेमंद इंसान से बात कीजिए, और “अब मैं क्या करूँ?” का सवाल भी जोड़िए	☐
21	Final Action Plan पूरा कीजिए और अपना Overthinking level दोबारा नापिए	☐

KEY TAKEAWAY

21वें दिन की समीक्षा

अपने Day 1 के Baseline से तुलना कीजिए: Overthinking level (0-10), नींद, मूड और काम। छोटा-सा सुधार भी असली है। और जो औज़ार काम आए, उन्हें रोज़ की दिनचर्या बना लीजिए।

SECTION B

आपका Final Action Plan

WORKSHEET

मेरा Final Action Plan

1. मेरा प्रमुख Overthinking प्रकार: _____

2. मेरे Top 3 Triggers: 1. _____ 2. _____ 3. _____

3. मेरे सबसे काम के 3 औज़ार:

1. _____

2. _____

3. _____

4. मेरे 3 If-Then Plans:

5. मेरा Worry Time (समय और जगह): _____

6. मेरा Bedtime Reset (समय और कदम):

7. मेरा Support Person (जिससे मैं बात करूँगा/करूँगी):

8. मेरे शुरूआती चेतावनी के संकेत (शरीर / विचार / व्यवहार):

9. अगर Setback आए, तो मैं पहले क्या करूँगा/करूँगी?

10. मेरी 30-दिन की समीक्षा की तारीख: _____

आपातकालीन Quick-Reference Card

जब परेशान सोच घेर ले, तो यह पन्ना खोलिए:

ACTION STEP

अभी क्या करें

1. रुकिए, नाम दीजिए: “यह overthinking है।”
2. तीन लंबी साँसें: लेने से छोड़ना थोड़ा लंबा।
3. खुद को नाम से बुलाइए: “[नाम], इस वक्त मेरे हाथ में क्या है?”
4. विचार या तथ्य? तथ्य है या व्याख्या? सबूत? दोस्त को क्या कहता?
5. सबसे छोटा कदम: लिखिए, चलिए, या किसी से बात कीजिए।

अंतिम शब्द: शोर रहेगा, पर आप बदलेंगे

इस किताब की शुरुआत में हमने एक वादा किया था कि आपके विचार कभी आएँगे ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा जाएगा। वह वादा अब भी वही है। दिमाग सोचता रहेगा। वह उसका काम है। बदलना यह है कि जब शोर उठे, तो **आप पहचानेंगे, रुकेंगे, और चुनेंगे** कि क्या करना है।

तीन बातें याद रखिए:

1. **सोच एक औज़ार है, मालिक नहीं।** आप उसे इस्तेमाल करते हैं; वह आपको नहीं चलाती।
2. **छोटे कदम, रोज़।** बदलाव इच्छाशक्ति के एक बड़े धमाके से नहीं, छोटे दोहराव से आता है।
3. **आप अकेले नहीं हैं।** मदद माँगना समझदारी है।

शोर को चुप कराने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस उसे सुनने के तरीके बदलने हैं।

आपका अगला कदम: आज ही अपना Final Action Plan पूरा कीजिए, और अगले 30 दिनों के बाद की तारीख़ कैलेंडर में डाल दीजिए। उस दिन आप खुद से पूछेंगे: *क्या मेरा दिमाग़ पहले से शांत है?*

शुभकामनाएँ।

SECTION C

Sources और संदर्भ

नीचे वे स्रोत हैं जिन पर किताब में दी गई research आधारित बातें टिकी हैं। जहाँ evidence मिला-जुला है, वहाँ वह मुख्य अध्यायों में बताया गया है। कृपया ध्यान रखें कि शोध समय के साथ अद्यतन होता रहता है।

1. **Trapnell, P. D., & Campbell, J. D. (1999).** Private self-consciousness and the Five-Factor Model of personality:

Distinguishing rumination from reflection. *Journal of Personality and Social Psychology, 76(2),* 284–304.

2. **Nolen-Hoeksema, S. (1991).** Responses to depression and their effects on the duration of depressive episodes. *Journal of Abnormal Psychology, 100(4),* 569–582.
3. **Nolen-Hoeksema, S., Wisco, B. E., & Lyubomirsky, S. (2008).** Rethinking rumination. *Perspectives on Psychological Science, 3(5),* 400–424.
4. **Treynor, W., Gonzalez, R., & Nolen-Hoeksema, S. (2003).** Rumination reconsidered: A psychometric analysis. *Cognitive Therapy and Research, 27(3),* 247–259.
5. **Takano, K., & Tanno, Y. (2009).** Self-rumination, self-reflection, and depression: Self-rumination counteracts the adaptive effect of self-reflection. *Behaviour Research and Therapy, 47(3),* 260–264.
6. **Moser, J. S., Dougherty, A., Mattson, W. I., Katz, B., Moran, T. P., Guevarra, D., Shablack, H., Ayduk, O., Jonides, J., Berman, M. G., & Kross, E. (2017).** Third-person self-talk facilitates emotion regulation without engaging cognitive control: Converging evidence from ERP and fMRI. *Scientific Reports.*
7. **Borkovec, T. D., Wilkinson, L., Folensbee, R., & Lerman, C. (1983).** Stimulus control applications to the treatment of worry. *Behaviour Research and Therapy, 21,* 247–251.

8. **Worry postponement पर meta-analysis और अध्ययन:** "Effects of worry postponement on daily worry: a meta-analysis" (Leiden University repository); Tallon (GAD में worry postponement अध्ययन); Worry Postponement from the Metacognitive Perspective: A Randomized Waitlist-Controlled Trial (PMC)|
9. **Gollwitzer, P. M., & Sheeran, P. (2006).** Implementation intentions and goal achievement: A meta-analysis of effects and processes. *Advances in Experimental Social Psychology, 38,* 69–119.
10. **Sheeran, P., Listrom, O., & Gollwitzer, P. M.** The when and how of planning: Meta-analysis of the scope and components of implementation intentions in 642 tests. (University of Konstanz repository)|
11. **Schwartz, B., Ward, A., Monterosso, J., Lyubomirsky, S., White, K., & Lehman, D. R. (2002).** Maximizing versus satisficing: Happiness is a matter of choice. *Journal of Personality and Social Psychology, 83(5),* 1178–1197.
12. **Beck, A. T. (1976).** *Cognitive Therapy and the Emotional Disorders.* International Universities Press.
13. **Segal, Z. V., Williams, J. M. G., & Teasdale, J. D. (2002).** *Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Depression.* Guilford Press.
14. **Pennebaker, J. W., & Beall, S. K. (1986).** Confronting a traumatic event: Toward an understanding of inhibition and disease.

Journal of Abnormal Psychology, 95(3), 274–281.

15. Festinger, L. (1954). A theory of social comparison processes.

Human Relations, 7(2), 117–140.

16. Wegner, D. M., Schneider, D. J., Carter, S. R., & White, T. L. (1987).

Paradoxical effects of thought suppression. *Journal of Personality and Social Psychology, 53(1),* 5–13.

17. Neff, K. D. (2003). Self-compassion: An alternative

conceptualization of a healthy attitude toward oneself. *Self and Identity, 2(2),* 85–101.

18. Tele-MANAS (भारत सरकार): राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य सहायता, हेल्पलाइन 14416 / 1-800-891-4416।

INFO

अंतिम सूचना

यह पुस्तक सामान्य शैक्षिक जानकारी है और किसी चिकित्सकीय, मनोवैज्ञानिक या क़ानूनी सलाह का विकल्प नहीं है। कोई भी तकनीक आज़माते समय अगर असहजता बढ़े, तो रुकिए और किसी योग्य पेशेवर से सलाह लीजिए।