

У кожному тесті правильна відповідь – А

1. 57-и річна хвора на гіпертонію звернулася до лікаря з скаргою на біль великого пальця руки. При огляді лікар констатував зниження пульсації, блідість шкіри та зниження температури у цій ділянці. Яка з артерій верхньої кінцівки найвірогідніше ушкоджена?

- A) A.princeps pollicis;
- B) A.ulnaris;
- C) A. perforans;
- D) A.digitalis communis;
- E) A.digitalis propria;

2. Спортсмен-баскетболіст скаржиться на біль вище п'яти, що підсилюється під час ходіння. Сухожилок якого м'язу ушкоджено?

- A) M. triceps surae ;
- B) M. tibialis posterior;
- C) M. flexor digitorum longus;
- D) M. fibularis longus;
- E) M. fibularis brevis;

3. Є потреба катетеризації сечового міхура у чоловіка. В якій частині уретри або структурі може виникати опір катетеру?

- A) Перетинчаста;
- B) Простатична;
- C) Губчаста;
- D) Зовнішній отвір сечівника;
- E) Внутрішній отвір сечівника;

4. В експерименті електричними імпульсами подразнюють нерв, що призводить до виділення малої кількості густої в'язкої слини підщелепною та під'язиковою залозами. Який нерв стимулюють?

- A) N.sympathicus
- B) N.glossopharyngeus
- C) N.facialis
- D) N.trigeminus
- E) N.vagus

5. В експерименті на тварині зруйнували середню частину завитки. Це призвело до порушення сприйняття звукових коливань такої частоти:

- A) Середньої
- B) Низької
- C) Високої
- D) Високої та середньої
- E) Низької та середньої

6. В онкологічне відділення поступив хворий з підозрою на пухлину легень. При обстеженні виявили локалізацію па-тології в нижній частці правої легені. Скільки бронхолегеневих сегментів має ця частка?

- A) 5
- B) 6
- C) 4
- D) 3
- E) 2

7. В результаті точкового крововиливу в сітківку ока хворий втратив здатність бачити предмети в центрі поля зору. В якому місці сітківки стався крововилив?

- A) Жовта пляма
- B) Циліарна частина сітківки
- C) Райдужна частина сітківки
- D) Сліпа пляма
- E) Судинна оболонка

8. В результаті черепно-мозкової травми у хворого були виявлені наступні ознаки: інтенційний тремор, дисметрія, адіадохокінез, дизартрія. Яка структура головного мозку пошкоджена?

- A) Мозочок
- B) Стріатум
- C) Рухова кора
- D) Біла куля
- E) Чорна речовина

9. В хірургічне відділення доставлено чоловіка 35-ти років з гнійною раною на шиї попереду трахеї (в ділянці передвісцерального простору). Куди може розповсюдитись інфекція, якщо хворому терміново не зробити операцію?

- A) В грудну порожнину - переднє середостіння
- B) В грудну порожнину - в середнє середостіння
- C) В грудну порожнину - в заднє середостіння
- D) В ретровісцеральний простір
- E) В надгрудинний міжапоневротичний простір

10. В яких лімфатичних вузлах може розвиватися запальна реакція при гінгівіті (запаленні слизової оболонки ясен)?

- A) Nodi submandibulares
- B) Nodi cervicales laterales
- C) Nodi supraclaviculares
- D) Nodi parotidei superficiales
- E) Nodi parotidei profundi

11. Випадково вдарившись ліктем об край стола, студент відчув печіння і поколювання на внутрішній поверхні передпліччя. Який нерв був травмований в цьому випадку?

- A) N. ulnaris
- B) N. radialis
- C) N. medianus
- D) N. axillaris
- E) N. musculocutaneus

12. Внаслідок вивиху нижньої щелепи у пацієнта порушена смакова чутливість передніх 2/3 язика та слиновиділення. Травмою якого нерва це викликано?

- A) Барабанна струна
- B) Великий кам'янистий нерв
- C) Малий кам'янистий нерв
- D) Глибокий кам'янистий нерв
- E) Під'язиковий нерв

13. Внаслідок травми у постраждалого відбувся перелом у зовнішній нижній третині правої гомілки. У якій кістці відбувся перелом?

- A) Малогомілкова
- B) Великогомілкова
- C) Стегнова
- D) Таранна
- E) П'яткова

14. Внаслідок травми у хворого спостерігається порушення функції слізної залози. Який нерв забезпечує її секрецію?

- A) N. petrosus major
- B) N. petrosus minor
- C) Chorda tympany
- D) N. auricularis magnus
- E) N. occipitalis minor

15. Внаслідок травми у чоловіка 35-ти років настав повний розрив спинного мозку на рівні першого шийного сегменту. Як зміниться при цьому зовнішнє дихання?

- A) Зупиниться
- B) Не зміниться
- C) Стане діафрагмальним
- D) Стане поверхневим і частим
- E) Стане рідким і глибоким

16. Дитина 3-х років надійшла до клініки з діагнозом отит. Є вірогідність поширення гною із барабанної порожнини. Куди може потрапити гній?

- A) В соскоподібну печеру
- B) У внутрішнє вухо
- C) В слухову трубу
- D) В зовнішній слуховий прохід
- E) В задню черепну ямку

17. Дитина 5-ти років поступила в ЛОР-відділення клінічної лікарні з діагнозом: гнійне запалення середнього вуха. Захворювання розпочалось з запалення носоглотки. Через який канал (каналець) скроневої кістки інфекція потрапила в барабанну порожнину?

- A) М'язовотрубний
- B) Барабанний
- C) Сонний
- D) Барабанної струни
- E) Сонно-барабанні

18. Дитина 5-ти років страждає на деформацію ший. При клінічному обстеженні виявлено такі симптоми: виражений нахил голови вліво, обличчя повернене праворуч, пасивні рухи голови в правий бік обмежені. Порушення розвитку якого м'яза мало місце при цій патології?

- A) Груднино-ключично-соскоподібний
- B) Трапецієподібний
- C) Ремінний м'яз голови
- D) Груднино-під'язиковий
- E) Довгий м'яз голови

19. Дитина під час гри отримала удар у ділянку рукоятки груднини. В результаті травми постраждав орган, що знаходиться за рукояткою груднини. Назвіть цей орган:

- A) Вилочкова залоза
- B) Щитоподібна залоза
- C) Серце
- D) Перикард
- E) Гортань

20. Для знечулення різців верхньої щелепи анестетик вводять в ділянку різцевого отвору. Який нерв залягає в цьому місці?

- A) N.nasopalatinus
- B) N.pharyngeus
- C) N.palatinus major
- D) Rr.nasales posteriores inferiores
- E) Nn.palatini minores

21. Для лікування карієсу 36 зуба необхідно здійснити провідникову анестезію. Який нерв при цьому треба знеболити?

- A) Нижній альвеолярний
- B) Верхньощелепний
- C) Надчочнямковий
- D) Підчочнямковий
- E) Підборідний

22. До відділення хірургічної стоматології надійшла новонароджена дівчинка, яка при смоктанні починала поперхуватись. При обстеженні виявлена розщілина твердого піднебіння, яка була наслідком незрощення середнього лобово-го відростка з верхньощелепним відростком I-ої зябрової дуги. Розщілина знаходилась у піднебінні між:

- A) Os incisivum et processus palatinus maxillae
- B) Processus palatinus maxillae dextrae et sinistrae
- C) Lamina horizontalis os palatinum dextrum et sinistrum
- D) Processus palatinus maxillae et lamina horizontalis os palatinum
- E) В ділянці canalis incisivus

23. До відділення хірургічної стоматології потрапив чоловік з травматичним розривом arcus venosus jugulae, яка знаходиться в spatium:

- A) Interaponeuroticum suprasternale
- B) Interscalenum
- C) Antescalenum
- D) Retropharyngeale
- E) Previscerale

24. До відділення черепно-мозкової травми надійшов хворий з пошкодженням великого крила клиноподібної кістки. Лінія перелому пройшла через остистий отвір. Яка судина постраждала?

- A) Середня оболонкова артерія
- B) Поверхнева скронева артерія
- C) Латеральна крилоподібна артерія
- D) Передня глибока скронева артерія
- E) Задня глибока скронева артерія

25. До лікарні госпіталізовано жінку в важкому стані з діагнозом геморагічний інсульт у ділянці лобної частки правої півкулі головного мозку. Ушкодження якої артерії, найбільш вірогідно, призвело до цього стану?
- A) A.cerebri anterior
 - B) A.cerebri posterior
 - C) A.communicans anterior
 - D) A.cerebri media
 - E) A.communicans posterior
26. До лікарні звернулася хвора 38-ми років із скаргами на те, що після перенесеного гострого вірусного респіраторного захворювання вона втратила відчуття дотику їжі до передніх 2/3 язика, а також відчуття болю та температури (попекла язик гарячим чаєм). Вкажіть, яка з гілок якого нерва при цьому була ушкоджена?
- A) Язиковий нерв нижньощелепної гілки трійчастого нерва
 - B) Язикові гілки язикоглоткового нерва
 - C) Язикові гілки під'язикового нерва
 - D) Барабанна струна лицевого нерва
 - E) Верхній гортанний нерв блукаючого нерва
27. До лікаря звернувся пацієнт із скаргами на підвищену больову чутливість шкіри позаду вушної раковини та зовнішнього слухового проходу. Об'єктивно: пальпація позаду груднинно-ключично-соскоподібного м'язу болісна. Подразнення якого з нервів може дати таку клінічну картину?
- A) N.auricularis magnus
 - B) N.transversus colli
 - C) N.occipitalis minor
 - D) Nn.supraclaviculares
 - E) N.vagus
28. До лікаря звернувся пацієнт зі скар-гами на біль та обмеженість зміщення нижньої щелепи праворуч. Функція яко-го м'язу порушена?
- A) M. pterygoideus lateralis sinister
 - B) M. temporalis dexter
 - C) M. pterygoideus lateralis dexter
 - D) M. zygomaticus major

E) M. masseter sinister

29. До лікаря звернувся пацієнт зі скаргами на біль та обмеженість зміщення нижньої щелепи праворуч. Функція якого м'язу порушена?

A) M. pterygoideus lateralis sinister

B) M. temporalis dexter

C) M. pterygoideus lateralis dexter

D) M. zygomaticus major

E) M. masseter sinister

30. До лікаря звернувся хворий з запаленням комірок решітчастої кістки (етмоїдит). При обстеженні виявлено порушення кровопостачання кістки. Гілками якої артерії кровопостачаються решітчасті комірки в нормі?

A) A. ophthalmica

B) A. infraorbitalis

C) A. facialis

D) A. cerebri anterior

E) A. transversa faciei

31. До стоматолога звернувся хворий зі скаргами на асиметрію лиця. Лікар побачив, що на лівій половині обличчя бро-ва стоїть нижче, на лобі немає складок, віко вужче, очне яблуко виступає вперед. Функція якої пари черепно-мозкових нервів уражена?

A) VII

B) I

C) V

D) VI

E) IV

32. До травмпункту доставлено пацієнта із кровотечею з рваної рани в ділянці кута рота. Цілісність якої артерії порушена?

A) Лицева

B) Верхньощелепна

C) Язикова

D) Передня верхньокоміркова

Е) Підочноямкова

33. До уролога звернувся чоловік 58-ми років зі скаргами на різкі болі при сечовиділенні та зменшення кількості сечі. Лікар припустив наявність сечокам'яної хвороби. В якій частині чоловічої уретри найбільш імовірно затримання каміння?

А) Pars membranacea

В) Pars prostatica

С) Pars spongiosa

Д) Pars pelvina

Е) Pars intramuralis

34. Досліджується гістологічний препарат слинних залоз, в якому окрім білкових та змішаних кінцевих відділів визначаються слизові. Яка слинна залоза досліджується?

А) Під'язикова

В) Привушна

С) Підщелепна

Д) Губна

Е) Щічна

35. Жінка 52-х років після травми. При огляді констатовано зниження пульсації, блідість шкіри і зниження температури в ділянці великого пальця правої руки. Ушкодження якої з артерій верхньої кінцівки, найімовірніше, приводить до таких наслідків?

А) A.princeps pollicis

В) A.ulnaris

С) A.radialis

Д) A.digitalis communis

Е) A.digitalis propria

36. Жінка звернулась до лікаря зі скаргами на набряклість та болючість нижньої кінцівки, припухлість вен та вузлів на медіальній поверхні стегна. Яка з вен уражена?

А) Велика підшкірна

В) Мала підшкірна

С) Стегнова

Д) Підколінна

Е) Великогомількова

37. Жінка звернулася до лікаря зі скаргами на утруднення рухів язика. Обстеження головного мозку за допомогою ЯМР показало, що у хворої є крововилив у нижньому відділі довгастого мозку. Про пошкодження якого ядра довгастого мозку можна думати?

А) Ядра під'язикового нерва

В) Нижнього слиновидільного ядра

С) Ядра додаткового нерва

Д) Подвійного ядра

Е) Поодинокого ядра

38. Жінці 58-ми років проведено повне видалення матки з придатками, після чого виділення сечі припинилося. При цистоскопії: міхур сечі не містить, з устій сечоводів сеча не надходить. Який відділ сечовидільної системи було ушкоджено під час операції?

А) Ureter

В) Uretra

С) Vesica urinaria

Д) Pelvis renalis

Е) Ren

39. Жінці 58-ми років проведено повне видалення матки з придатками, після чого виділення сечі припинилося. При цистоскопії: міхур сечі не містить, з устій сечоводів сеча не поступає. Яку структуру сечовидільної системи було ушкоджено під час операції?

Ureter

Pelvis renalis

Uretra

Vesica urinaria

Ren

40. За медичним показанням пацієнту було проведено видалення частини однієї із структур ЦНС. В результаті видалення у пацієнта розвинулися атонія, астазія, інтенційний тремор, атаксія, адіадохокінез. Частина якої структури ЦНС була вилучена?

А) Мозочок

В) Мигдалеподібний комплекс

С) Гіпокамп

D) Базальні ганглії

E) Рухова кора

41. За проханням лікаря хворий після звичайного вдиху зробив максимально глибокий видих. Які м'язи з наведених нижче беруть участь у такому видиху?

A) Живота

B) Зовнішні міжреберні

C) Діафрагма

D) Трапецієподібні

E) Грудні

42. Запальний процес з ділянки іклової ямки розповсюдився на м'які тканини очної ямки. Через який анатомічний утвір гній потрапив у очну ямку?

A) Canalis infraorbitale

B) Foramen zygomaticoorbitale

C) Foramen zygomaticofaciale

D) Canalis nasolacrimalis

E) Foramen zygomaticotemporale

43. Злоякісна пухлина привушної слинної залози спричинила пошкодження артерії, яка проходить через її паренхіму. Яка це артерія?

A) Поверхнева скронева

B) Верхньощелепна

C) Висхідна глоткова

D) Лицева

E) Задня вушна

44. Лікар виконує передній серединний розтин шиї для термінової трахеотомії. Про можливе пошкодження якої судини він повинен пам'ятати?

A) Arcus venosus juguli

B) V.jugularis externa

C) V.jugularis interna

D) V.facialis

E) V.thyroidea media

45. Лікар встановив, що у хворої втрачена смакова чутливість у ділянці задньої третини язика. Функція якої пари черепних нервів порушена?

- A) IX
- B) VIII
- C) XI
- D) V
- E) XII

46. Лікар оглянув зів хворого і встановив діагноз: тонзиліт (запалення піднебінних мигдаликів). При цьому було відзначено збільшення розмірів лімфатичних вузлів. Які це вузли?

- A) Піднижньощелепні
- B) Підпідборідні
- C) Соскоподібні
- D) –

47. Лікар прогнозує можливість запалення клітковини орбіти при наявності гнійного запалення в ділянці підочно-ямкового простору. Через яке з утворень можливе поширення інфекції?

- A) Canalis infraorbitalis
- B) Canalis pterygoideus
- C) Canalis nasolacrimalis
- D) Canalis incisivus
- E) Fissura orbitalis inferior

48. Лікар-стоматолог знайшов неглибоку порожнину з ураженням емалі між двома верхніми центральними різцями. Діагноз: карієс. На якій поверхні коронки лікар пломбує зуб?

- A) Facies contactus mesialis
- B) Facies lingualis
- C) Facies occlusialis
- D) Facies labialis
- E) Facies contactus distalis

49. Лікарю необхідно знеболити передній відділ слизової оболонки твердого піднебіння. Блокаду яких нервів йому потрібно зробити?

- A) Носопіднебінні нерви
- B) Нижні коміркові нерви
- C) Виличні нерви
- D) Глоткові нерви
- E) Підочноямкові нерви

50. Лікарю-стоматологу для знеболення необхідно ввести анестетик у крилопіднебінну ямку із ротової порожнини. В ділянці якої анатомічної структури потрібно робити ін'єкцію?

- A) Великий піднебінний отвір
- B) Піднижньоочноямковий отвір
- C) Різцевий канал
- D) Нижньощелепний отвір
- E) Підборідний отвір

51. Людина вживає суху їжу. Які слинні залози при цьому секретують найбільше слини?

- A) Привушні
- B) Щічні
- C) Підщелепні
- D) Під'язикові
- E) Піднебінні

52. На видаленому у хворого зубі лікар побачив три корені. Який це зуб?

- A) Великий кутній верхньої щелепи
- B) Малий кутній верхньої щелепи
- C) Ікло верхньої щелепи
- D) Малий кутній нижньої щелепи
- E) Великий кутній нижньої щелепи

53. На мікропрепараті, зробленому з привушної слинної залози, визначається кінцеві секреторні відділи з сероцитами, що синтезують переважно ферменти. До яких залоз згідно класифікації за хімічним складом секрету вона належить?

- A) Білкова
- B) Слизова
- C) Білково-слизова
- D) Змішана
- E) Ферментативна

54. На прийомі стоматолог виявив у пацієнта каріозні порожнини на передніх зубах, які не мають додаткових антагоністів. Назвіть ці зуби:

- A) Нижні медіальні різці
- B) Нижні латеральні різці
- C) Верхні латеральні різці
- D) Верхні медіальні різці
- E) Верхні ікла

55. небезпечно витискувати гноячки на обличчі, особливо вище ротової щілини. Через анастомози з якими венами обличчя може поширитися інфекція у порожнину черепа?

- A) Очні вени
- B) Вени крилоподібного сплетення
- C) Передні вушні вени
- D) Потилична вена
- E) Середня і глибока скроневі вени

56. Недорозвиненість яких відділів ли-цьового черепа в ембріональний період приводить до появи такої вади розвитку, як "вовча паща"?

- A) Піднебінні відростки
- B) Лобні відростки
- C) Лобні і верхньощелепні відростки
- D) Нижньощелепні відростки
- E) Нижньощелепні і піднебінні відростки

57. Оглядаючи ротову порожнину у хворого 19-ти років, стоматолог звернув увагу на зруйнований язиково-дистальний горбик жувальної поверхні лівого першого верхнього моляра. Цей горбик називається:

- A) Гіпоконус
- B) Метаконус
- C) Параконус
- D) Мезоконус
- E) Протоконус

58. Оглядаючи ротову порожнину у хворого 19-ти років, стоматолог звернув увагу на руйнований язиково-дистальний горбик жувальної поверхні лівого першого верхнього моляра. Цей горбик називається:

- A) Гіпоконус
- B) Метаконус
- C) Параконус
- D) Мезоконус
- E) Протоконус

59. Одним із методів зняття гострого болю при невралгії трійчастого нерва є створення депо анестетика в місці виходу гілок трійчастого нерва. В якій ділянці потрібно ввести анестетик для знечулення першої гілки трійчастого нерва?

- A) Надочнотімковий край
- B) Підочнотімковий край
- C) Орбітальний край виличної кістки
- D) Ділянка лобного відростка верхньої щелепи
- E) Ділянка надперенісся

60. Одним із методів зняття гострого болю при невралгії трійчастого нерва є створення депо анестетика в місці виходу гілок трійчастого нерва. В якій ділянці потрібно ввести анестетик для знечулення першої гілки трійчастого нерва?

- A) Надочнотімковий край
- B) Підочнотімковий край
- C) Орбітальний край виличної кістки
- D) Ділянка лобного відростка верхньої щелепи
- E) Ділянка надперенісся

61. Під час бійки у чоловіка виникла зупинка серця внаслідок сильного удару у верхню ділянку передньої черевної стінки. Які з зазначених рефлексів спричинили зупинку серця?

- A) Парасимпатичні безумовні
- B) Симпатичні безумовні
- C) Парасимпатичні умовні
- D) Симпатичні умовні
- E) Периферичні

62. Під час виконання вагосимпатичної блокади за Вишневським вводять розчин новокаїну по задньому краю груднино-ключично-соскоподібного м'яза вище місця перетинання її з зовнішньою яремною веною. У межах якого трикутника ший виконують блокаду?

- A) Лопатково-трапецієподібний
- B) Ключично-лопатковий
- C) Сонний
- D) Трикутник Пирогова
- E) Піднижньощелепний

63. Під час виконання операції з приводу пухлини черевної частини сечоводу у хворого, лікар повинен пам'ятати, що попереду його розташована важлива артеріальна судина. Яка саме?

- A) a. testicularis
- B) a. renalis
- C) a. ileocolica
- D) a. iliaca interna
- E) a. iliaca communis

64. Під час дослідження обличчя хворого відзначається, що правий кут рота зміщений у лівий бік, права щока і губи притиснені до зубів і ясен. Порушенням функції якого м'яза це викликане?

- A) Щічний м'яз
- B) М'яз сміху
- C) Коловий м'яз рота
- D) М'яз, що опускає кут рота
- E) Виличні м'язи

65. Під час ДТП водій отримав численні ушкодження бічної поверхні голови, серед яких був перелом виличної дуги. Функція якого з м'язів буде страждати?

- A) M.masseter
- B) M.orbicularis oris
- C) M.buccinator
- D) M.procerus
- E) M.risorius

66. Під час обстеження пацієнта 20-ти років ЛОР-лікар діагностував запалення верхньощелепних пазух. В якому носовому ході під час риноскопії був виявлений гній?

- A) Середній
- B) Верхній
- C) Нижній
- D) Загальний
- E) Найвищий

67. Під час огляду лікар виявив пришийковий карієс нижніх правих різців. При цьому відзначено збільшення у розмірах групи лімфатичних вузлів. Які лімфовузли збільшені?

- A) Підпідборідні
- B) Потиличні
- C) Поверхневі шийні
- D) Глибокі шийні
- E) Лицеві

68. Під час огляду ротової порожнини встановлено, що у пацієнта має місце дотикання ріжучих країв верхніх та нижніх різців. Для якого прикусу характерне таке розміщення зубів?

- A) Прямий прикус
- B) Ортогнатія
- C) Біпрогнатія
- D) Закритий прикус
- E) Прогенія

69. Під час огляду ротової порожнини у пацієнта спостерігається невелика щілина між верхніми та нижніми різцями. Контакт між передніми зубами немає. Якому прикусу притаманне зазначене розміщення зубів?

- A) Відкритий прикус
- B) Ортогнатія
- C) Прямий прикус
- D) Закритий прикус
- E) Прогенія

70. Під час оперативного втручання у жінки виникла необхідність перев'язати маткову артерію. Яке з утворень може бути випадково перев'язаним разом з нею?

- A) Сечовід
- B) Маткова труба
- C) Кругла зв'язка матки
- D) Внутрішня клубова вена
- E) Сечівник

71. Під час оперативного втручання у черевну порожнину хірургу необхідно проникнути до чепцевої сумки. Як може проникнути хірург до цієї частини порожнини очеревини, не порушуючи цілісність малого чіпця?

- A) Через чепцевий отвір
- B) Через праву біляободову борозну
- C) Через ліву біляободову борозну
- D) Через правий брижовий синус
- E) Через лівий брижовий синус

72. Під час операції закриття природженої щілини піднебіння (уранопластики) при збиванні долотом крилоподібного гачка ушкоджено великий піднебінний канал. Виникла кровотеча. Яку артерію ушкоджено?

- A) Низхідна піднебінна
- B) Висхідна піднебінна
- C) Висхідна глоткова
- D) Клиноподібна
- E) Задня верхня альвеолярна

73. Під час підходу до щитоподібної залози з поперечного (коміроподібного) доступу розтинається клітковинний надгруднинний простір. Пошкодження якого анатомічного утворення, що знаходиться в даному просторі, є небезпечним?

- A) Венозна яремна дуга
- B) Лімфатичні вузли
- C) Сонна артерія
- D) Підключична артерія
- E) Внутрішня яремна вена

74. Під час патологоанатомічного розтину в померлого виявлено гній у задньо-му середостінні. Через який простір поширився запальний процес, що був локалізований у передньому відділі шиї?

- A) Позавісцеральний
- B) Переддрабинчатий
- C) Міждрабинчатий
- D) Надгруднинний
- E) Передвісцеральний

75. Під час прийому їжі у новонародженої дитини спостерігається закидання молока у носову порожнину. Вкажіть на можливу причину виникнення цього порушення.

- A) Вовча паща
- B) Викривлення носової перегородки вправо
- C) Перелом основи черепа
- D) Заяча губа
- E) Викривлення носової перегородки вліво

76. Під час проведення трахеотомії у хворого 45-ти років, який потрапив до реанімаційного відділення лікарні з набряком гортані, було випадково перерізано яремну венозну дугу, яка лежить у:

- A) Spatium interaponeuroticum suprasternale
- B) Spatium pretracheale
- C) Spatium retropharyngeale
- D) Spatium interscalenum
- E) Spatium antescalenum

77. Під час рентгенівського дослідження була виявлена деформація нижньої стінки правої очниці. Який параназальний синус найімовірніше уражений?

- A) Права верхньощелепна пазуха
- B) Клиноподібна пазуха
- C) Лобна пазуха
- D) Правий решітчастий лабіринт
- E) Лівий решітчастий лабіринт

78. Після видалення II малого кутнього зуба верхньої щелепи у хворого відзначається коміркова кровотеча. Пошкодженням якої артерії воно викликане?

- A) Середня верхня альвеолярна
- B) Задня верхня альвеолярна
- C) Нижня альвеолярна
- D) Піднебінна
- E) Передня верхня альвеолярна

79. Після видалення другого великого кутнього зуба верхньої щелепи у хворого відмічається кровотеча з альвеолярної комірки. З системи якої артерії спостерігається кровотеча?

- A) Верхньощелепна
- B) Нижня альвеолярна
- C) Лицева
- D) Висхідна глоткова
- E) Щелепно-під'язикова

80. Після ДТП у водія відзначається деформація у середній третині лівої гомілки, сильний біль, особливо при спробі рухати лівою гомілкою. З рани виступають кінці кістки тригранного січення, велика крововтрата. Яка кістка може бути пошкоджена?

- A) Великогомілкова
- B) Малогомілкова
- C) Стегнова
- D) Надколінок
- E) Надп'яtkова

81. Після крововиливу в мозок у пацієнта виникло значне погіршення смакової чутливості. Яка структура мозку найбільш вірогідно пошкоджена?

- A) Постцентральної звивини
- B) Гіпокамп
- C) Гіпоталамус
- D) Чорна речовина
- E) Мигдалик

82. Після отриманої травми хворий не може змістити нижню щелепу в бік та висунути її вперед. Функція яких м'язів імовірно була пошкоджена?

- A) Бічні крилоподібні
- B) Скроневі
- C) Жувальні
- D) Щелепно-під'язикові
- E) Щічні

83. Після падіння з дерева у хлопчика утруднене відведення руки до горизонтального положення. Який із м'язів імовірно пошкоджений?

- A) M.deltoideus
- B) M.triceps brachii
- C) M.anconeus
- D) M.coracobrachialis
- E) M.supinator

84. Після перенесеної травми голови у хворого бувають напади інтенсивного болю в ділянці обличчя і судом жувальних м'язів. Який нерв найімовірніше травмований?

- A) N. trigeminus
- B) N. oculomotorius
- C) N. facialis
- D) N. olphactorius
- E) N. abducens

85. Після руйнування структур ЦНС тварина втратила орієнтувальні рефлекс. Що саме зруйнували?

- A) Чотиригорбкове тіло
- B) Червоні ядра
- C) Латеральні вестибулярні ядра
- D) Чорна речовина
- E) Медіальні ретикулярні ядра

86. Після травми м'яких тканин в області задньої поверхні медіального виростка плеча у постраждалого виникло відчуття поколювання шкіри медіальної поверхні передпліччя. Який з наведених нервів знаходиться в зоні ушкодження?

- A) N. ulnaris
- B) N. musculocutaneus
- C) N. dorsalis scapularis
- D) N. subscapularis
- E) N. radialis

87. Після травми ока виникло нагноєння м'яких тканин орбіти. Через який анатомічний утвір гнійний процес може поширитися у середню черепну ямку?

- A) Через верхню очноямкову щілину
- B) Через передній решітчастий отвір
- C) Через задній решітчастий отвір
- D) Через нижню очноямкову щілину
- E) Через вилично-очноямковий отвір

88. Після травми хворий не може розігнути руку у ліктьовому суглобі. Порушення функції якого основного м'язу може це спричинити?

- A) Musculus triceps brachii
- B) Musculus infraspinatus
- C) Musculus levator scapulae
- D) Musculus teres major
- E) Musculus subscapularis

89. Після травми хребта у пацієнта 18-ти років впродовж місяця спостерігалась відсутність самовільного сечовипускан-ня, яке пізніше відновилося. Який відділ спинного мозку був пошкоджений?

- A) Поперековий
- B) Шийний
- C) Крижовий
- D) Грудний
- E) Поперековий і крижовий

90. Після черепно-мозкової травми у хворого 38-ми років відсутнє відчуття нюху і смаку. Які коркові центри кінцевого мозку постраждали?

- A) Uncus
- B) Operculum frontale
- C) Gyrus temporalis superior
- D) Gurus postcentralis
- E) Sul. Calcarinus

91. Пацієнт звернувся до лікаря з приводу того, що він втратив здатність розрізняти смаки на корені язика. Лікар встановив, що це пов'язано з ураженням нерва. Якого саме?

- A) Язикоглотковий
- B) Блукаючий
- C) Лицьовий
- D) Верхньогортанний
- E) Трійчастий

92. Пацієнт скаржиться на біль у верхній щелепі та зубах. Об'єктивно: відмічається біль при натискуванні в ділянці підчонамкового отвору. Який нерв уражено?

- A) Друга гілка трійчастого нерва
- B) Перша гілка трійчастого нерва
- C) Третя гілка трійчастого нерва
- D) Блоковий нерв
- E) Лицевий нерв

93. Пацієнт скаржиться на швидку втомлюваність. Об'єктивно: у положенні стоячи з заплющеними очима похитується, втрачає рівновагу. Тонус скелетних м'язів знижений. Яка структура мозку найбільш вірогідно вражена у цієї людини?

- A) Мозочок
- B) Таламус
- C) Гіпоталамус
- D) Прецентральної звивини кори великих півкуль
- E) Базальні ганглії

94. Педіатр, оглядаючи порожнину рота дитини, виявив 8 зубів. Дитина розвивається нормально. Визначте вік дитини:

- A) 10-12 місяців
- B) 6-8 місяців
- C) 8-9 місяців
- D) 12-15 місяців
- E) 15-20 місяців

95. Пошкодження мозку призвело до порушення моторної функції язика. У якому відділі кори відбулося пошкодження?

- A) Нижня лобна звивина
- B) Скроневі ділянки кори
- C) Тім'яна ділянка кори
- D) Потилична ділянка кори
- E) Передня центральна звивина

96. При аускультатії серця був визначений діастолічний шум в II міжреберному проміжку по правій пригруднинній лінії. Про патологію якого клапана це свідчить?

- A) Клапан аорти
- B) Двостулковий
- C) Тристулковий
- D) Клапан легеневого стовбура
- E) –

97. При видаленні верхнього лівого тре-тього моляра виникла значна кровотеча. Ураження якої артерії призвело до кро-вотечі?

- A) A. alveolaris superioris posterioris
- B) A. infraorbitalis
- C) A. alveolaris inferior
- D) A. alveolaris superioris anterioris
- E) A. facialis

98. При втручанні з метою лікування вивиху нижньої щелепи лікар повинен пам'ятати про м'яз, який при скороченні відтягує назовні капсулу і суглобовий диск скронево-нижньощелепного сугло-ба. Який це м'яз?

- A) M. pterygoideus lateralis
- B) M. masseter
- C) M. pterygoideus medialis
- D) M. temporalis
- E) M. mylohyoideus

99. При втручанні з метою лікування вивиху нижньої щелепи лікар повинен пам'ятати про м'яз, який при скороченні відтягує назовні капсулу і суглобовий диск скронево-нижньощелепного суглоба. Який це м'яз?

- A) M. pterygoideus lateralis
- B) M. masseter
- C) M. pterygoideus medialis
- D) M. temporalis
- E) M. mylohyoideus

100. При втручанні з метою лікування вивиху нижньої щелепи, лікар повинен пам'ятати про дію м'яза, задні пучки якого тягнуть назад висунуту нижню щелепу. Про який з м'язів йдеться?

- A) M.temporalis
- B) M.masseter
- C) M.pterygoideus medialis
- D) M.pterygoideus lateralis
- E) M.mylohyoideus

101. При гнійному запаленні середнього вуха в патологічний процес втягнена артерія, яка розташована на передній стінці барабанної порожнини. Що це за артерія?

- A) A. carotis interna
- B) A. carotis externa
- C) A. meningea media
- D) A. auricularis posterior
- E) A. temporalis superficialis

102. При ендоскопічному обстеженні 12-ти палої кишки діагностовано пухлину великого сосочка. У якому відділі кишки локалізується патологічне утворення?

- A) Низхідна частина
- B) Верхня частина
- C) Горизонтальна частина
- D) Висхідна частина
- E) Верхній вигин

103. При обробці фрезою великого кутнього зуба стоматолог інструментом, що зірвався, глибоко поранив щоку, пошкодивши при цьому не лише слизову оболонку але й м'яз. Який?

- A) Щічний
- B) Великий виличний м'яз
- C) Жувальний
- D) Коловий м'яз рота
- E) Щелепно-під'язиковий м'яз

104. При обстеженні дитини виявлено: розростання глоткового мигдалика, що утруднює вихід повітря із носової порожнини. Які отвори носової порожнини перекриваються при цьому захворюванні?

- A) Хоани
- B) Ніздрі
- C) Грушоподібний
- D) Крило-піднебінний
- E) Гайморова щілина

105. При обстеженні міміки хворого виявлено, що він не може свистіти, скласти губи трубочкою; під час сміху кутки рота не піднімаються догори, ротова щілина розтягується в боки (поперечна посмішка). На атрофію якого м'яза вказують дані симптоми?

- A) Коловий м'яз рота
- B) Великий виличний м'яз
- C) Шийний м'яз
- D) М'яз сміху
- E) Жувальний м'яз

106. При обстеженні окуліст з'ясував, що пацієнт не розрізняє синій та зелений ко-льори при нормальному сприйнятті іншої кольорової гама. З порушенням функції яких структур сітківки це пов'язано?

- A) Колбочкові нейрони
- B) Паличкові нейрони
- C) Біполярні нейрони
- D) Амакринні нейрони
- E) Горизонтальні нейрони

107. При обстеженні хворого 40-ка років виявлено опущення верхньої повіки, розхідну косоокість, розширення зіниці, обмеженість рухливості очного яблука. Який нерв пошкоджений?

- A) Окоруховий
- B) Очний
- C) Блоковий
- D) Відвідний
- E) Зоровий

108. При обстеженні хворого виявлено погіршення кровопостачання передньо-го відділу міжшлуночкової перегородки серця. В якій артерії знижений кровотік?

- A) Передня міжшлуночкова
- B) Задня міжшлуночкова
- C) Права вінцева
- D) Огинаюча
- E) –

109. При обстеженні хворого похилого віку після тромбозу судин головного мозку виявлено моторну афазію. Де локалізований осередок пошкодження?

- A) Центр Брока
- B) Звивина Гешля
- C) Кутова звивина
- D) Центр Верніке
- E) Прецентральна звивина

110. При огляді 6-місячної дитини лікар виявив незакрите заднє тім'ячко. При нормальному розвитку дитини воно закривається до:

- A) 3-х місяців
- B) Народження
- C) 6-ти місяців
- D) Кінця першого року життя
- E) Кінця другого року життя

111. При огляді новонародженої дитини педіатр виявив наявність в ротовій порожнині нижніх центральних різців. В якому віці вони прорізуються в нормі?

- A) 6-8 місяців
- B) До народження
- C) Впродовж першого місяця життя
- D) 10-12 місяців
- E) До 2-х років

112. При огляді порожнини носа виявлено викривлення задньої частини носової перегородки. Яка кістка викривлена?

- A) Леміш
- B) Медіальна пластинка крилоподібного відростка
- C) Латеральна пластинка крилоподібного відростка
- D) Перпендикулярна пластинка решітчастої кістки
- E) Вертикальна пластинка піднебінної кістки

113. При огляді порожнини рота дитини педіатр виявив, що прорізалися ікла. Дитина розвивається нормально. Визначте вік дитини:

- A) 14-20 міс.
- B) 8-10 міс.
- C) 10-12 міс.
- D) 6-8 міс.
- E) –

114. При огляді порожнини рота дитини педіатр виявила наявність нижніх медіальних різців. Дитина розвивається нормально. Визначте її вік:

- A) 6-7 місяців
- B) 8-9 місяців
- C) 10-12 місяців
- D) 13-14 місяців
- E) –

115. При огляді порожнини рота дитини педіатр знайшла 8 різців. Розвиток дитини відповідає віковій нормі. Визначте вік дитини:

- A) 10-12 місяців
- B) 6-7 місяців
- C) 7-8 місяців
- D) 12-15 місяців
- E) 16-20 місяців

116. При огляді порожнини рота лікар виявив каріозну порожнину на поверхні першого малого кутнього зуба, зверненої до ікла. Як називається уражена поверхня коронки?

- A) Facies mesialis
- B) Facies distalis
- C) Facies vestibularis
- D) Facies lingualis
- E) Facies occlusalis

117. При огляді порожнини рота пацієнта стоматолог виявив каріозну порожнину на поверхні першого верхнього моляра, яка звернена до другого моляра. Яка поверхня зуба уражена?

- A) Дистальна
- B) Мезіальна
- C) Язична
- D) Жувальна
- E) Вестибулярна

118. При огляді порожнини рота стоматолог виявив каріозну порожнину на поверхні коронки нижнього ікла, зверненої до першого малого кутнього зуба. Назвіть цю поверхню.

- A) Facies distalis
- B) Facies vestibularis
- C) Facies lingualis
- D) Facies mesialis
- E) Facies occlusalis

119. При огляді ротової порожнини стоматолог виявив каріозну порожнину на поверхні коронки другого малого кутнього зуба, яка межує з першим великим кутнім зубом. Назвіть пошкоджену поверхню коронки:

- A) Facies mesialis
- B) Facies distalis
- C) Facies vestibularis
- D) Facies lingualis
- E) Facies occlusalis

120. При огляді ротової порожнини стоматолог помітив появу у дитини перших постійних бічних різців. Який вік дитини?

- A) 9 років
- B) 6 років
- C) 7 років
- D) 11 років
- E) 13 років

121. При огляді ротової порожнини у пацієнта 22-х років спостерігається нахил вперед верхніх та нижніх зубів, з перекриттям нижніх зубів верхніми. Якому прикусу характерне дане розміщення зубів?

- A) Біпрогнатія
- B) Ортогнатія
- C) Прямий прикус
- D) Закритий прикус
- E) Прогенія

122. При огляді ротової порожнини хворого виявлено карієс коронки зуба, яка звернена до власне ротової порожнини. Яка поверхня уражена?

- A) *Facies lingualis*
- B) *Facies vestibularis*
- C) *Facies contactus*
- D) *Facies mesialis*
- E) *Facies distalis*

123. При огляді травмованого у дорожній пригоді лікар встановив ураження зовнішньої стінки очної ямки. Потерпілий втратив можливість відведення очного яблука на травмованому боці. Який нерв міг бути ураженим у даному випадку?

- A) *N. abducens*
- B) *N. trochlearis*
- C) *N. oculomotorius*
- D) *N. ophthalmicus*
- E) *N. infraorbitalis*

124. При огляді хворого невропатолог відзначає асиметрію обличчя: згладженість складок шкіри лоба, око повністю не закривається, на одному боці очна щілина ширша, рот перекошений. Який нерв уражений?

- A) Лицевий
- B) Очний
- C) Верхньощелепний
- D) Нижньощелепний
- E) Додатковий

125. При остеохондрозі хребта перетискається судина, яка проходить через поперечні отвори шийних хребців. Яка це артерія?

- A) Хребтова
- B) Внутрішня сонна
- C) Зовнішня сонна
- D) Потилична
- E) Задня мозкова

127. При проведенні дуоденального зондування зонд не проходить зі шлунка в дванадцятипалу кишку. В якому відділі шлунка є перешкода (пухлина)?

- A) Воротар
- B) Кардіальний відділ
- C) Дно
- D) Тіло
- E) Мала кривизна

128. При рентгенографії виявлено руйнування і збільшення ямки турецького сідла внаслідок пухлини гіпофіза. Яка кісткова порожнина при цьому вражена?

- A) Пазуха клиноподібної кістки
- B) Сонний канал
- C) Зоровий канал
- D) Барабанна порожнина
- E) Лицевий канал

129. При рентгенологічному дослідженні встановлено проростання кореня зуба в гайморову порожнину. Визначте, який зуб міг прорости?

- A) Верхнє ікло
- B) Перший верхній премоляр
- C) Другий верхній премоляр
- D) Перший верхній моляр
- E) Другий верхній моляр

130. При рентгенологічному дослідженні кісток основи черепа виявлено збільшення порожнини турецького сідла, витончення передніх нахилених відростків, руйнування різних ділянок турецького сідла. Пухлина якої ендокринної залози може спричинити таке руйнування кістки?

- A) Гіпофіз
- B) Вилочкова залоза
- C) Епіфіз
- D) Щитоподібна залоза
- E) Наднирник

131. При розкритті глибокого абсцесу щоки був виконаний вертикальний розріз, після чого спостерігається парез (порушення функції) м'язів на боці операції. Гілки якого нерва були перерізані?

- A) Лицевий
- B) Верхньощелепний
- C) Нижньощелепний
- D) Блукаючий
- E) Під'язиковий

132. При травмі потиличної ділянки визначається тріщина в ділянці поперечного синуса. Яка частина потиличної кістки пошкоджена?

- A) Луска
- B) Ліва бокова
- C) Права бокова
- D) Основна
- E) Виросток

133. Сечокам'яна хвороба ускладнилася виходом конкременту з нирки. На якому рівні сечоводу, найімовірніше, він може зупинитися?

- A) На межі черевної та тазової частин
- B) У нирковій мисці
- C) В середній черевній частині
- D) На 2 см вище впадіння в сечовий міхур
- E) На 5 см вище тазової частини

134. У боксера, що отримав удар у ділянку скронево-нижньощелепного суглоба, відбувся травматичний вивих нижньої щелепи. Зміщення яких суглобових поверхонь вийде за межі фізіологічної норми?

- A) Голівка нижньої щелепи та нижньо-щелепна ямка
- B) Вінцевий відросток та крилоподібна ямка
- C) Вінцевий відросток та піднижньощелепна ямка
- D) Голівка нижньої щелепи та піднижньощелепна ямка
- E) Шийка нижньої щелепи та піднижньощелепна ямка

135. У військкоматі під час УЗ-діагностики у юнака 19-ти років було виявлено опущення нирки. На рівні яких хребців розташовані нирки в нормі?

- A) XI грудний та III поперековий
- B) IX-X грудні
- C) IV-V поперекові
- D) XII грудний та I поперековий
- E) IX-XII грудні

136. У дітей часто можна спостерігати утруднене носове дихання, яке пов'язане з надмірним розвитком лімфоїдної тканини слизової оболонки глотки. Розростання яких мигдаликів може спричинити це явище?

- A) Tonsilla pharyngea
- B) Tonsilla palatina
- C) Tonsilla lingualis
- D) Tonsilla tubaria
- E) Усіх названих мигдаликів

137. У дитини 2-х років після перенесеного грипу з'явилися скарги на біль у вусі. Лікар виявив зниження слуху та запалення середнього вуха. Яким шляхом інфекція потрапила до середнього вуха?

- A) Через слухову трубу
- B) Через foramen jugularis
- C) Через canalis caroticus
- D) Через atrium mastoideum
- E) Через canalis nasolacrimalis

138. У дитини вроджена розщілина нижньої губи ("заяча губа") і переднього відділу піднебіння ("вовча паща"). Незрощенням яких відростків викликаний цей дефект?

- A) Носовий, піднебінний
- B) Верхньощелепний, лобний
- C) Піднебінний, нижньощелепний
- D) Нижньощелепний, носовий
- E) Носовий, лобний

139. У дитини фарингіт (запалення слизової оболонки глотки) ускладнився запаленням середнього вуха. Через яке анатомічне утворення сталося розповсюдження запального процесу на середнє вухо?

- A) Глотковий отвір слухової труби
- B) Півканал слухової труби
- C) Півканал м'яза-натягувача барабанної перетинки
- D) Каналець барабанної струни
- E) М'язово-трубний канал

140. У людини має місце травматичне пошкодження скроневої зони кори великих півкуль. Це призведе до порушення формування таких відчуттів:

- A) Слухові
- B) Зорові
- C) Дотикові
- D) Температурні
- E) Смакові

141. У людини під час нейрохірургічної операції подразнюють потиличні частки кори великих півкуль головного мозку. Які відчуття це викликатиме у хворого?

- A) Зорові
- B) Дотикові
- C) Слухові
- D) Нюхові
- E) Смакові

142. У маленької дівчинки 5-ти років лі-кар видалив зуб на якому було два коре-ні. Який це зуб?

- A) Великий кутній нижньої щелепи
- B) Малий кутній нижньої щелепи
- C) Ікло верхньої щелепи
- D) Малий кутній верхньої щелепи
- E) Великий кутній верхньої щелепи

143. У молодой жінки виявлена аномалія рефракції ока, при якій фокусування зо-браження можливе за сітківкою. Як на-зивається ця аномалія?

- A) Гіперметропія
- B) Міопія
- C) Еметропія
- D) Астигматизм
- E) Пресбіопія

144. У молодой жінки діагностовано поза-маткову вагітність. В якому з перерахо-ваних органів відбувається запліднення?

- A) Ампула маткової труби
- B) Порожнина матки
- C) Порожнина піхви
- D) Перешийок маткової труби
- E) Порожнина малого тазу

145. У молодой жінки діагностовано позаматкову вагітність. В якому з перерахованих органів відбувається запліднення?

- A) Ампула маткової труби
- B) Порожнина матки
- C) Порожнина піхви
- D) Перешийок маткової труби
- E) Порожнина малого тазу

146. У наслідок травми в ділянці вінцевого відростка нижньої щелепи в хворого спостерігається порушення зміщення нижньої щелепи назад. Пошкодження якого м'яза найбільш вірогідно?

- A) M.temporalis
- B) M.masseter
- C) M.pterygoideus lateralis
- D) M.pterygoideus medialis
- E) M.levator anguli oris

147. У новонародженої дитини протягом першої доби педіатр помітив відсутність акту дефекації. Про яку ваду розвитку свідчить цей факт?

- A) Атрезія заднього проходу
- B) Атрезія стравоходу
- C) Заяча губа
- D) Дивертикул стравоходу
- E) Дивертикул порожньої кишки

148. У обстежуваного відзначається різке опущення кута рота зліва. Порушенням функції яких м'язів це викликано?

- A) Виличні м'язи
- B) М'яз, що опускає кут рота
- C) М'яз, що підіймає верхню губу і крило носа
- D) М'яз сміху
- E) Коловий м'яз рота

149. У пацієнта вилучений верхній медіальний різець. Гілки якої артерії його кровопостачають?

- A) A.infraorbitalis
- B) A.buccalis
- C) A.palatina descendens
- D) A.sphenopalatina
- E) A.alveolaris inferior

150. У пацієнта з пошкодженням проміжного мозку виявлено порушення слуху. Які структури при цьому ушкоджені?

- A) Медіальні колінчасті тіла таламуса
- B) Латеральні колінчасті тіла таламуса
- C) Інтраламінарні ядра гіпоталамуса
- D) Передні ядра гіпоталамуса
- E) Медіальні ядра гіпоталамуса

151. У пацієнта при рентгенологічному обстеженні виявлено грижу міжхребцевого диска грудного відділу хребта. Який вид з'єднання між хребцями зазнав патологічних змін?

- A) Синхондроз
- B) Синдесмоз
- C) Діартроз
- D) Геміартроз
- E) Синостоз

152. У пораненого кровотеча із гілок сонної артерії. Для тимчасової зупинки кровотечі сонну артерію треба притиснути до горбика поперечного відростка шийного хребця. Якого саме?

- A) VI
- B) V
- C) IV
- D) III
- E) II

153. У постраждалого - різана рана у ділянці краю нижньої щелепи попереду жувального м'яза. З рани виливається кров темно-червоного кольору. Яку судину пошкоджено?

- A) V. facialis
- B) V. retromandibularis
- C) V. jugularis anterior
- D) V. jugularis externa
- E) V. lingualis

154. У постраждалого 23-х років травма черепа з порушенням дірчастої пластинки решітчастої кістки. Який нерв може бути ушкоджений?

- A) N. olfactorius
- B) N. opticus
- C) N. ophthalmicus
- D) N. trochlearis
- E) N. abducens

155. У постраждалого 46-ти років визначається перелом у ділянці внутрішньої поверхні лівого гомілковоступневого суглоба. Де найбільш імовірно відбувся перелом?

- A) Медіальна кісточка
- B) Нижня третина малогомілкової кістки
- C) Надп'яtkова кістка
- D) Латеральна кісточка
- E) П'яtkова кістка

156. У постраждалого в дорожній пригоді лікар виявив перелом лівої ключиці та порушення кровообігу в кінцівці (немає пульсації променевої артерії). Яка з причин порушення кровообігу в кінцівці найбільш вірогідна?

- A) Стиснення підключичної артерії
- B) Стиснення пахвової артерії
- C) Стиснення підключичної вени
- D) Стиснення хребтової артерії
- E) Стиснення пахвової вени

157. У постраждалого глибока різана ра-на у ділянці зовнішньої поверхні кута нижньої щелепи. Який м'яз при цьому буде пошкоджено?

- A) M. masseter
- B) M. zygomaticus
- C) M. buccinator
- D) M. orbicularis oris
- E) M. depressor anguli oris

158. У постраждалого перелом тіла нижньої щелепи. Кровотеча з рани. Яка артерія ушкоджена?

- A) A. alveolaris inferior
- B) A. lingualis
- C) A. maxillaris
- D) A. carotis externa
- E) A. facialis

159. У постраждалого поверхнєве поранення передньої ділянки шиї, спостерігається кровотеча. Кров темного кольору. Яку судину пошкоджено?

- A) V. jugularis anterior
- B) V. jugularis externa
- C) V. jugularis interna
- D) A. carotis externa
- E) A. thyroidea superior

160. У постраждалого травма верхньої щелепи з пошкодженням підчоямкового отвору. Яка поверхня щелепи ушкоджена?

- A) Передня
- B) Носова
- C) Очна
- D) Підскронева
- E) –

161. У постраждалого травма голови, яка супроводжується артеріальною кровотечею в ділянці тім'яної кістки. Яка артерія уражена?

- A) A. temporalis superficialis
- B) A. thyroidea superior
- C) A. facialis
- D) A. maxillaris
- E) A. auricularis posterior

162. У потерпілого 24-х років з травмою голови у скроневій ділянці діагностовано епідуральну гематому. Яка з артерій найімовірніше пошкоджена?

- A) Середня оболонкова
- B) Середня мозкова
- C) Поверхнева скронева
- D) Передня оболонкова
- E) Задня вушна

163. У потерпілого артеріальна кровотеча з різаної рани в ділянці переднього краю жувального м'яза. Яку судину потрібно перев'язати?

- A) A.facialis
- B) A.maxillaris
- C) Aa.labiales inferiores
- D) A.mentalis
- E) A.lingualis

164. У потерпілого відзначається правобічний перелом і крововилив у ділянці передньої третини нижньої щелепи, втрата шкірної чутливості в ділянці підборіддя. Який нерв травмований?

- A) Підборідний нерв
- B) Щелепно-під'язикові нерви
- C) Нижній альвеолярний нерв
- D) Щічний нерв
- E) Верхні альвеолярні нерви

165. У потерпілого лівобічний уламковий перелом виличної кістки з втратою шкірної чутливості над нею. Який нерв пошкоджений?

- A) Вилично-лицевий
- B) Нижньоочномковий
- C) Мала гусяча лапка
- D) Лицевий
- E) Щічний

166. У потерпілого спостерігається кро-вотеча в ділянці верхньої губи. Яка арте-рія пошкоджена внаслідок травми?

- A) Лицева
- B) Верхньощелепна
- C) Язикова
- D) Поверхнева скронева
- E) Кутова

167. У потерпілого травма верхньої ще-лепи, вибитий перший малий кутній зуб. Який відросток верхньої щелепи пошко-джений?

- A) Альвеолярний
- B) Виличний
- C) Піднебінний
- D) Лобовий
- E) –

168. У приймальне відділення лікарні доставлений хворий з черепно-мозковою травмою, у якого серед інших симптомів встановлено порушення ковтання. Який відділ ЦНС у нього імовірно уражений?

- A) Довгастий мозок
- B) Спинний мозок на рівні CIII-IV
- C) Спинний мозок на рівні CV-VII
- D) Спинний мозок на рівні ThX-XII
- E) Гіпоталамус

169. У травмованої жінки виявлено розрив лобкового симфізу. Який тип з'єднання кісток порушений?

- A) Hemyartrosis
- B) Synartrosis
- C) Synchondrosis
- D) Synostosis
- E) Syndesmosis

170. У травмованого 27-ми років двосторонній вивих скронево-нижньощелепного суглоба. Які основні зв'язки суглоба будуть ушкоджені?

- A) Латеральні
- B) Шило-щелепні
- C) Крилоподібно-щелепні
- D) Клиноподібно-щелепні
- E) Внутрішньосуглобові

171. У хворої встановлено порушення виділення тиреотропного гормону гіпофіза. Порушення функції якої частки гіпофіза має місце у хворої?

- A) Lobus anterior
- B) Infundibulum
- C) Lobus posterior
- D) Pars intermedia
- E) –

172. У хворої з пухлиною підшлункової залози розвинулася механічна жовтяниця внаслідок стиснення жовчовивідної протоки. Яка протока піддається стисненню?

- A) Ductus choledochus
- B) Ductus cysticus
- C) Ductus hepaticus communis
- D) Ductus hepaticus dexter
- E) Ductus hepaticus sinister

173. У хворого 19-ти років після видалення верхнього лівого присереднього різця виникла кровотеча з комірки. Яка артерія зумовила кровотечу?

- A) Передня верхня коміркова
- B) Задня верхня коміркова
- C) Висхідна піднебінна
- D) Низхідна піднебінна
- E) Нижня коміркова

174. У хворого 25-ти років, який скаржився на утруднене ковтання, виявлене пухлиноподібне підвищення на корені язика 1-2 см в діаметрі, в ділянці сліпого отвору. Розростання залишків якої залози встановив лікар?

- A) Щитоподібна
- B) Прищитоподібна
- C) Аденоїдофіб
- D) Вилочкова
- E) Під'язикова

175. У хворого 26-ти років виявлений великий фурункул м'яких тканин обличчя біля кореня носа та нижньої повіки. Грізним ускладненням цього захворювання може бути розповсюдження інфекції венозними сполученнями цього регіону до пазух твердої мозкової оболонки. Яка з пазух найбільш імовірно може бути уражена?

- A) Печериста
- B) Верхня сагітальна
- C) Потилична
- D) Сигмоподібна
- E) Верхня кам'яниста

176. У хворого 28-ми років діагностовано гострий запальний процес слизової оболонки нососльозової протоки. З анамнезу відомо, що після перенесеного грипу протягом 10-ти днів були виділення із носа. З якого відділу носової порожнини інфекція могла потрапити до нососльозової протоки?

- A) Нижній носовий хід
- B) Середній носовий хід
- C) Верхній носовий хід
- D) Присінок носа
- E) Лобова пазуха

177. У хворого 35-ти років з ураженням одного із відділів ЦНС спостерігається порушення координації та амплітуди рухів, тремтіння м'язів під час виконання довільних рухів, порушення тону м'язів. Який із відділів ЦНС уражений?

- A) Мозочок
- B) Довгастий мозок
- C) Проміжний мозок
- D) Середній мозок

Е) Передній мозок

178. У хворого 35-ти років травма голови викликала втрату тактильних і температурних відчуттів. Яку звивину було пошкоджено внаслідок травми?

- А) Зацентральна
- В) Кутова
- С) Надкрайова
- Д) Передцентральна
- Е) Поясна

179. У хворого 40-а років в результаті щелепно-лицьової травми порушилася функція під'язикової і підщелепної залоз зліва - залози почали секретувати невелику кількість густої слини. Функція якого нерва порушена?

- А) Лицьовий
- В) Під'язиковий
- С) Язикоглотковий
- Д) Трійчастий
- Е) Блукаючий

180. У хворого 45-ти років виявлено зміну функції привушної слинної залози. Який з вузлів вегетативної нервової системи віддає післявузлові симпатичні волокна для неї?

- А) G.cervicale superius
- В) G. cervicothoracicum
- С) G. pterygopalatinum
- Д) G. submandibulare
- Е) G. oticum

181. У хворого 60-ти років виявлено розширення вен стравоходу, прямої кишки та підшкірних вен передньої черевної стінки. Система якої вени ушкоджена?

- А) Ворітна
- В) Нижня порожниста вена
- С) Непарна вена
- Д) Верхня порожниста вена
- Е) Верхня брижова

182. У хворого 69-ти років при гнійній інфекції носової порожнини виник абсцес лобової частки мозку. Через яке анатомічне утворення поширилася інфекція?

- A) Foramina cribrosa
- B) Foramen ovale
- C) Foramen ethmoidale posterior
- D) Foramen sphenoplatinum
- E) Foramen rotundum

183. У хворого 70-ти років діагностовано крововилив у стовбур мозку. Обстеження виявило підвищення тону м'язів-згиначів на тлі зниження тону м'язів-розгиначів. Подразненням яких структур мозку можна пояснити зміни тону м'язів?

- A) Червоні ядра
- B) Вестибулярні ядра
- C) Чотиригорбикова структура
- D) Чорна речовина
- E) Ретикулярна формація

184. У хворого інфаркт міокарда в ділянці передньої стінки лівого шлуночка. В басейні якої судини виникло порушення кровообігу?

- A) Передня міжшлуночкова гілка лівої вінцевої артерії
- B) Передня шлуночкова гілка правої вінцевої артерії
- C) Огинаюча гілка лівої вінцевої артерії
- D) Ліва крайова гілка лівої вінцевої артерії
- E) Передсердно-шлуночкова гілка лівої вінцевої артерії

185. У хворого інфаркт міокарда задньої стінки правого шлуночка. Гілки якої артерії тромбовані?

- A) Права коронарна артерія
- B) Ліва коронарна артерія
- C) Ліва та права коронарна артерія
- D) Права підключична артерія
- E) Ліва підключична артерія

186. У хворого є зміни секреторної функції слюзової залози, що пов'язано з порушенням її вегетативної іннервації. Який з вузлів вегетативної нервової системи віддає післявузлові парасимпатичні волокна для неї?

- A) Ganglion pterygopalatinum
- B) Ganglion ciliare
- C) Ganglion oticum
- D) Ganglion submandibulare
- E) –

187. У хворого в результаті травми порушене ковтання. Ураження якого з перерахованих відділів ЦНС є найбільш вірогідною причиною цього порушення?

- A) Довгастий мозок
- B) Спинний мозок, Th II-IV
- C) Спинний мозок, C V-VI
- D) Середній мозок
- E) Гіпоталамус

188. У хворого відзначається різка болючість шкіри в ділянці обличчя. Який нерв уражено?

- A) Трійчастий
- B) Лицевий
- C) Окоруховий
- D) Блукаючий
- E) Язикоглотковий

189. У хворого відкритий рот, він не може його закрити і членороздільно говорити. Яке ураження у хворого?

- A) Вивих нижньої щелепи
- B) Параліч жувальних м'язів
- C) Ураження рухового центру мови
- D) Перелом нижньої щелепи
- E) Стрес

190. У хворого видалений зуб, у якого коронка овальної форми, на жувальній поверхні два горбки. Корінь сильно здавлений у мезіодистальному напрямку, його верхівка роздвоєна. Який зуб видалений?

- A) Перший верхній премоляр
- B) Перший нижній премоляр
- C) Ікло
- D) Другий верхній премоляр
- E) Другий нижній премоляр

191. У хворого видалений зуб, у якого язикова поверхня менша за щічну. Жувальна поверхня у формі овалу. Глибока поперечна борозна розділяє щічний та язиковий горбки. Корінь сильно стиснений у мезіодистальному напрямку з поздовжніми борознами на апроксимальних поверхнях та розщеплений. Визначте, який зуб видалений:

- A) Перший верхній малий кутній зуб
- B) Верхнє ікло
- C) Нижнє ікло
- D) Перший нижній малий кутній зуб
- E) Другий верхній малий кутній зуб

192. У хворого виникають болі при жуванні, утруднення при піднятті вгору нижньої щелепи (при закриванні рота). Функція яких м'язів порушена?

- A) Скроневий, жувальний, медіальний крилоподібний
- B) Скроневий, жувальний, латеральний крилоподібний
- C) Скроневий, латеральний і медіальний крилоподібні
- D) Латеральний і медіальний крилоподібні, жувальний
- E) Скроневий, жувальний, щелепно-під'язиковий

193. У хворого виявлений фурункул у зовнішньому слуховому проході. Які з перелічених лімфатичних вузлів у першу чергу можуть відреагувати на запальний процес?

- A) Nodi lymphatici parotidei
- B) Nodi lymphatici retropharyngeales
- C) Nodi lymphatici mandibulares
- D) Nodi lymphatici cervicales superficiales
- E) Nodi lymphatici cervicales profundi

194. У хворого виявлено порушення се-креторної функції піднижньощелепної слинної залози. Який нерв забезпечує її вегетативну іннервацію?

- A) Chorda tympani
- B) N. auriculotemporalis
- C) N. mandibularis
- D) N. petrosus major
- E) N. petrosus minor

195. У хворого внаслідок інсульту утворилася гематома в коліні внутрішньої капсули, що призвело до паралічу мимічних та жувальних м'язів. Який провідний шлях ушкоджено?

- A) Tr. cortico-nuclearis
- B) Tr. cortico-spinalis
- C) Tr. cortico-thalamicus
- D) Tr. cortico-fronto-pontinus
- E) Tr. cortico-temporo-parieto-occipito-pontinus

196. У хворого внаслідок неадекватного лікування запалення середнього вуха (мезотимпаніт) виникло гнійне запалення комірок соскоподібного відростка скроневої кістки (мастоїдит). Гнійник прорвався у ложе грудино-ключично-соскоподібного м'яза. У межах якої фасції шиї локалізується патологічний процес?

- A) Поверхневий листок власної фасції
- B) Поверхнева фасція
- C) Глибокий листок власної фасції
- D) Внутрішня фасція
- E) Передхребетна фасція

197. У хворого внаслідок пошкодження шкіри в середній ділянці грудинно-ключично-соскоподібного м'яза виникла повітряна емболія. Яка вена шиї була травмована?

- A) Зовнішня яремна
- B) Передня яремна
- C) Внутрішня яремна
- D) Задня вушна
- E) Поперечна вена шиї

198. У хворого внаслідок травми порушена чутливість верхньої губи та крила носа. Який нерв, найвірогідніше, ушкоджений?

- A) N. infraorbitalis
- B) N. frontalis
- C) N. nasociliaris
- D) N. buccalis
- E) N. mandibularis

199. У хворого внаслідок черепно-мозкової травми з'явилась значна поліурія, що не супроводжувалася глюкозурією. Пошкодження якої структури може призвести до подібних змін?

- A) Задня частка гіпофізу
- B) Передня частка гіпофізу
- C) Мозкова речовина наднирників
- D) Кора наднирників
- E) Підшлункова залоза

200. У хворого діагностовано кореневу кісту, яка проросла у носову порожнину. Який зуб найбільш вірогідно уражений?

- A) Верхній медіальний різець
- B) Верхнє ікло
- C) Верхній латеральний різець
- D) Верхній перший премоляр
- E) Верхній перший моляр

201. У хворого з карієсом нижнього лівого премоляра з'явилася припухлість шиї вище під'язикової кістки. Підвищилася температура, з'явилася слинотеча, скорочення жувальних м'язів; хворий з утрудненням відкриває рот. Встановлено діагноз - флегмона дна ротової порожнини. Які м'язи будуть залучені у процес?

- A) Щелепно-під'язиковий і підборідно-під'язиковий
- B) Двочеревцевий і під'язиково-шилоподібний
- C) Під'язиково-щічний і шилоязиковий
- D) Підшкірний і шилопід'язиковий
- E) Щитопід'язиковий і груднино-під'язиковий

202. У хворого з порушенням згортання крові виявлений тромбоз однієї з гілок нижньої брижової артерії. Який відділ кишечника вражений?

- A) Colon sigmoideum
- B) Ileum
- C) Caecum
- D) Colon transversum
- E) Colon ascendens

203. У хворого з пухлиною в ділянці верхніх горбків чотиригорбкової пластинки сталося випадіння зіничного рефлексу. Функція якого ядра черепних нервів найімовірніше порушена?

- A) Додаткового ядра окорухового нерва
- B) Рухового ядра окорухового нерва
- C) Рухового ядра відвідного нерва
- D) Рухового ядра блокового нерва
- E) Рухового ядра додаткового нерва

204. У хворого з флегмоною щоки розвинувся менінгіт. Поширення інфекції, найбільш імовірно, відбулося по анастомозу між:

- A) Лицевою веною і венами очної ямки
- B) Лицевою і очною артеріями
- C) Лицевою і позадушелепною венами
- D) Скронною і надочноямковою артеріями
- E) Лицевою веною та крилоподібним сплетінням

205. У хворого з черепно-мозковою травмою спостерігається зупинка дихання. Пошкодження якого відділу мозку є найбільш вірогідним?

- A) Довгастий мозок
- B) Кінцевий мозок
- C) Середній мозок
- D) Мозочок
- E) Проміжний мозок

206. У хворого запалення середнього вуха (отит). При цьому він скаржиться на розлад відчуття смаку в передній частині язика. Який з нервів ушкоджено?

- A) N.f acialis
- B) N.trigeminus
- C) N.vestibulo – cochlearis
- D) N.vagus
- E) N.glossopharyngeus

207. У хворого запалення середнього вуха ускладнилося мастоїдитом. Виникла загроза гнійного тромбозу найближчої венозної пазухи. Якої саме?

- A) Сигмоподібна
- B) Нижня кам'яниста
- C) Верхня сагітальна
- D) Поперечна
- E) Пряма

208. У хворого запальний процес у крилопіднебінній ямці. Інфекція поширилась в носову порожнину. Через яке анатомічне утворення розповсюдилась інфекція?

- A) Foramen sphenopalatinum
- B) Foramen rotundum
- C) Canalis palatinus major
- D) Canalis palatinus minor
- E) Canalis pterygoideus

209. У хворого запальний процес у крилопіднебінній ямці. Інфекція поширилась в середню черепну ямку. Через яке анатомічне утворення розповсюдилась інфекція?

- A) Foramen rotundum
- B) Foramen sphenopalatinum
- C) Canalis palatinus major
- D) Canalis palatinus minor
- E) Canalis pterygoideus

210. У хворого затримка сечі в сечовому мі-хурі. Яка статева залоза пошкоджена?

- A) Передміхурова залоза
- B) Сім'яний міхурець
- C) Придаток яєчка
- D) Яєчко
- E) Цибулино-сечівникова залоза

211. У хворого кривошия. Який м'яз шиї уражений?

- A) M.sternocleidomastoideus
- B) M.омоhyoideus
- C) M.platysma
- D) M.sternohyoideus
- E) M.mylohyoideus

212. У хворого лікар виявив накопичення рідини в плевральній порожнині справа над куполом діафрагми. У якому анатомічному утворі накопичилась рідина?

- A) Реброво-діафрагмальний правий синус
- B) Реброво-діафрагмальний лівий синус
- C) Реброво-середостінний синус
- D) Діафрагмально-середостінний синус
- E) –

213. У хворого лікар діагностував тромбоз селезінкової артерії (інфаркт селезінки). Звідки відходить уражена артерія?

- A) Черевний стовбур
- B) Верхня брижова артерія
- C) Нижня брижова артерія
- D) Загальна печінкова артерія
- E) Ліва шлункова артерія

214. У хворого на інсульт спостерігається порушення заднього відділу задньої ніжки внутрішньої капсули. Які з провідних шляхів там проходять?

- A) Radiatio acustica et radiatio optica

- B) Tr. Corticonuclearis
- C) Tr. Corticospinalis
- D) Tr. Parietopontinae
- E) Tr. Occipitopontinae

215. У хворого під час висування язика спостерігається відхилення його кінчика ліворуч. Рухова іннервація якого черепного нерва порушена в цьому випадку?

- A) N.hypoglossus dexter
- B) N.glossopharyngeus dexter
- C) N.vagus dexter
- D) N.trigeminus sinister
- E) N.f acialis sinister

216. У хворого після застосування крапель, що містять атропін, виникло стійке розширення зіниці. Роботу якого м'яза блоковано?

- A) Звужувач зіниці
- B) Розширювач зіниці
- C) Війковий
- D) Прямий
- E) Косий

217. У хворого після застудного захворювання виникло порушення виділення слюзи. Який вегетативний вузол найбільше при цьому постраждав?

- A) Крилопіднебінний
- B) Війчастий
- C) Вушний
- D) Піднижньощелепний
- E) Під'язиковий

218. У хворого після застудного захворювання з'явилося порушення больової і температурної чутливості передніх 2/3 язика? Який із нервів при цьому постраждав?

- A) Трійчастий
- B) Під'язиковий
- C) Додатковий

D) Блукаючий

E) Язикоглотковий

219. У хворого після простудного захворювання виникло порушення виділення слюзи. Який вегетативний вузол найбільше при цьому постраждав?

A) Крилопіднебінний

B) Вушний

C) Війчастий

D) Піднижньощелепний

E) Під'язиковий

220. У хворого порушена функція м'язів гомілки. Він не може утримати своє тіло піднявшись навшпиньки. Функція якого м'яза постраждала?

A) M. triceps surae

B) M. tibialis posterior

C) M. extensor digitorum longus

D) M. flexor digitorum longus

E) M. tibialis anterior

221. У хворого порушено формування відчуття солодкого та солоного смаку на верхівці та по краях язика. Які сосочки язика уражені?

A) Papillae foliatae

B) Papillae vallatae

C) Papillae conicae

D) Papillae filiformes

E) Papillae fungiformes

222. У хворого порушилася робота жувальних м'язів. Який нерв пошкоджений?

A) Нижньощелепний

B) Язиковий

C) Вушноскроневий

D) Щічний

E) Верхньощелепний

223. У хворого при обстеженні було виявлено зміну секреторної функції привушної слинної залози, що пов'язане з порушенням її вегетативної іннервації. Який з вузлів вегетативної нервової системи віддає післявузлові парасимпатичні волокна для неї?

A) Ganglion oticum

B) Ganglion ciliare

C) Ganglion pterygopalatinum

D) Ganglion submandibulare

E) Ganglion sublinguale

224. У хворого розвинувся птоз (опущення верхньої повіки). Ураження якого нерва має місце?

A) Окоруховий

B) Лицевий

C) Трійчастий

D) Блоковий

E) Відвідний

225. У хворого травма у ділянці передньої поверхні переднього драбинчастого м'язу. Функція якого нерва може бути порушена?

A) Діафрагмальний

B) Блукаючий

C) Додатковий

D) Плечового сплетення

E) Зворотній гортанний

226. У хворого у результаті розладу мозкового кровообігу порушений акт ковтання, він може поперхнутися під час прийому рідкої їжі. Вкажіть, який відділ мозку уражений?

A) Довгастий мозок

B) Середній мозок

C) Проміжний мозок

D) Мозочок

E) Шийний відділ спинного мозку

227. У хворого утруднене щільне змикання щелеп під час жування. Відзначається часткова атрофія жувальних м'язів, що розташовані нижче виличної дуги. Гілки якого нерва іннервують вказані м'язи?

A) N.mandibularis

B) N.maxillaris

C) N.alveolaris inferior

D) N.n.alveolares superiores

E) N.inframaxillaris

228. У хворого флегмона у ділянці крило-піднебінної ямки з ураженням однойменного вегетативного вузла. Функція якої залози буде порушена у першу чергу?

- A) Слізна
- B) Піднижньощелепна
- C) Під'язикова
- D) Навколовушна
- E) –

229. У хворого фронтит. В анамнезі - за-палення верхньощелепної пазухи. Через який відділ носової порожнини могла по-трапити інфекція в лобову пазуху?

- A) Середній носовий хід
- B) Верхній носовий хід
- C) Нижній носовий хід
- D) Присінок носової порожнини
- E) Решітчасто-клиноподібна кістка

230. У хворого хронічний нежить. Набряк слизової оболонки носової порожнини призводить до порушення функції рецепторів нюхового нерва, які розташовані в нюховій ділянці носової порожнини. Через яке утворення волокна цього нерва потрапляють в передню черепну ямку?

- A) Lamina cribrosa os ethmoidale
- B) Foramen ethmoidale anterior
- C) Foramen ethmoidale posterior
- D) Foramen sphenopalatinum
- E) Foramen incisivum

231. У хлопчика водянка яєчка (накопичування рідини між оболонками яєчка). Яка саме оболонка яєчка вміщує цю рідину?

- A) Піхвова
- B) М'ясиста
- C) Білкова
- D) Зовнішня сім'яна
- E) Внутрішня сім'яна

232. У чоловіка 40-ка років запалення яєчка ускладнилось його водянкою. Необхідне оперативне втручання. Яку з оболонок яєчка останньою розтинає хірург під час операції?

- A) Парієтальний листок піхвової оболонки яєчка
- B) М'ясиста оболонка
- C) Внутрішня сім'яна фасція
- D) М'язпідіймач яєчка

Е) Зовнішня сім'яна фасція

233. У чоловіка 47-ми років за медичними показаннями була видалена одна із слинних залоз, після чого різко зменшилася активність амілази у слині. Яка залоза була видалена?

А) Привушна

В) Щічна

С) Підщелепна

Д) Ясенева

Е) Під'язикова

234. У чоловіка 52-х років при піднятті надмірної ваги виникло грижове вип'ячування в здухвинній ділянці. Через яке анатомічне утворення найімовірніше виникло грижове вип'ячування?

А) Canalis inguinalis

В) Anulus femoralis

С) Anulus umbilicalis

Д) Linea alba

Е) Lig. Inguinalis

235. У чоловіка 55-ти років діагностовано вікову далекозорість у зв'язку з послабленням акомодацийних властивостей кришталика та гладеньких м'язів судинної оболонки очного яблука. Тонус якого м'яза з віком послаблено?

А) M. ciliaris

В) M. sphincter pupillae

С) M. dilatator pupillae

Д) M. obliquus superior

Е) M. obliquus inferior

236. У чоловіка 60-ти років крововилив у головний мозок спричинив тривалий сон. Пошкодження якої структури найвірогідніше призвело до цього стану?

А) Ретикулярна формація

В) Гіпокамп

С) Чотиригорбикова структура

Д) Кора великих півкуль

Е) Чорна субстанція

237. У чоловіка під час операції з приводу пахвинної грижі хірург пошкодив вміст пахвинного каналу. Яку структуру пошкодив хірург?

А) Funiculus spermaticus

В) Urachus

C) Lig. teres uteri

D) Lig. inguinale

E) –

238. Хірург планує взяти у хворого лімфу з грудної протоки в місці її впадіння до венозного русла. Куди слід провести катетер з цією метою?

A) Лівий венозний кут

B) Правий венозний кут

C) Місце утворення нижньої порожнистої вени

D) Місце утворення верхньої порожнистої вени

E) Місце утворення ворітної вени

239. Хірург прооперував пацієнта з приводу пахвинної грижі. Нижньою стінкою пахвинного каналу є пахвинна зв'язка. Апоневрозом якого м'язу живота вона утворена?

A) Зовнішній косий

B) Внутрішній косий

C) Прямий

D) Поперечний

E) –

240. Хворій потрібно зробити пункцію прямокишково-маткової заглибини (Дугласового простору). Через яку частину склепіння піхви її здійснюють?

A) Задня

B) Передня

C) Бічна права

D) Бічна ліва

E) Будь-яка

241. Хвора госпіталізована з діагнозом плеврит. В якому місці плевральної порожнини міститься найбільша кількість ексудату?

A) Реберно-діафрагмальний синус

B) Діафрагмально-медіастинальний синус

C) Реберно-медіастинальний синус

D) Під куполом плеври

E) Під коренем легенів

242. Хвора з діагнозом пієлонефрит надійшла до урологічного відділення. Після проведення обстеження відмічено приєднання інфекції, що супроводжувалося пієловенозним рефлюксом. Ураження якої структури призвело до виникнення ускладнення?

- A) Форнікальний апарат нирки
- B) Екскреторні шляхи нирки
- C) Прямі трубочки
- D) Ниркові каналці
- E) Ниркове тільце

243. Хвора звернулася зі скаргами на припухлість в передній ділянці шиї, схуднення, випуклість очей, тахікардію, неврівноваженість. Яка залоза уражена?

- A) Щитоподібна залоза
- B) Прищитоподібні залози
- C) Тимус
- D) Гіпофіз
- E) Епіфіз

244. Хворий 24-х років звернувся до лікаря зі скаргою на біль під нижньою щелепою з правого боку. Хірург-стоматолог виявив камінь у піднижньо-щелепній залозі. Видаляючи його, він запобігав кровотечі з артерії:

- A) A. facialis
- B) A. submental
- C) A. alveolaris inferior
- D) A. labialis inferior
- E) A. lingualis

245. Хворий 27-ми років звернувся до лікаря зі скаргою на наявність твердої пухлини попереду від козелка вушної раковини. Хірург-стоматолог, видаляючи пухлину, виявив вену. Яка вена проходить у даній ділянці?

- A) V. retromandibularis
- B) V. facialis
- C) V. jugularis interna
- D) V. jugularis externa
- E) V. auricularis posterior

246. Хворий 35-ти років звернувся до приймального покою зі скаргами на біль та набряк у ділянці дна ротової порожнини. Після огляду діагностовано запальний процес у ділянці вивідної протоки піднижньощелепної слинної залози. Куди відкривається ця протока?

- A) Caruncula sublingualis
- B) Vestibulum oris
- C) Foramen caecum linguae
- D) Plica fimbriata

E) Recessus gingivalis

247. Хворий із запаленням слизової язика (глосит) скаржиться на розлад смакової чутливості передніх двох третин язика. Ураженням якого нерва воно викликане?

A) Барабанна струна

B) Барабанний

C) Малий кам'янистий

D) Язиковий

E) Язикоглотковий

248. Хворий госпіталізований з приводу небезпеки поширення запального процесу з потиличної ділянки в порожнину черепа. Крізь яке анатомічне утворення можливе це поширення?

A) Виростковий канал

B) Тім'яний отвір

C) Круглий отвір

D) Остистий отвір

E) Овальний отвір

249. Хворий госпіталізований з травмою медіальної групи м'язів стегна. Які види рухів він НЕ зможе робити?

A) Приведення стегна

B) Відведення стегна

C) Згинання стегна

D) Розгинання стегна

E) Супінація стегна

250. Хворий з запаленням слизової язика скаржиться на розлад загальної чутливості передніх двох третин язика. Ураженням якого нерва це викликано?

A) Язиковий

B) Барабанна струна

C) Язикоглотковий

D) Блукаючий

E) Барабанний

251. Хворий звернувся до лікарні із скаргами на шум та больові відчуття в вусі. Об'єктивно: у хворого гостре респіраторне захворювання, риніт. Крізь який отвір глотки інфекція потрапила до барабанної порожнини та викликала її запалення?

A) Глотковий отвір слухової труби

B) Барабанний отвір слухової труби

- С) Хоани
- Д) Зів
- Е) Вхід до гортані

252. Хворий звернувся до лікаря з гострим зубним болем в нижньому лівому іклі. Поставлено діагноз - пульпіт. Який нерв забезпечує чутливість цього зуба?

- А) Нижній комірковий
- В) Верхній комірковий
- С) Піднебінний
- Д) Виличний
- Е) Лицевий

253. Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на утруднення під час жування. При обстеженні виявлена атрофія правих скроневого і жувального м'язів. При відкриванні рота щелепа відхиляється ліворуч. Який нерв уражений?

- А) Рухова частина нижньощелепного
- В) Лицевий
- С) Нижній альвеолярний
- Д) Верхньощелепний
- Е) Щелепно-під'язиковий

254. Хворий звернувся до лікаря зі скаргою на утруднення під час жування. При обстеженні виявлена атрофія правих скроневого і жувального м'язів. При відкриванні рота щелепа відхиляється ліворуч. Який нерв уражений?

- А) Рухова частина нижньощелепного
- В) Лицевий
- С) Нижній альвеолярний
- Д) Верхньощелепний
- Е) Щелепно-під'язиковий

255. Хворий звернувся до поліклініки зі скаргами на утруднення під час сечовиділення. Після огляду виявлена гіпертрофія органу, який охоплює проксимальний відділ уретри. Що це за орган?

- А) Передміхурова залоза
- В) Бульбоуретральна залоза
- С) Цибулина статевого члена
- Д) Придаток яєчка
- Е) Сім'яні міхурці

256. Хворий надійшов до клініки з пораненням в ділянці шиї. При обстеженні виявлено пошкоджений нерв, розташований попереду переднього драбинчастого м'яза. Який нерв ушкоджено?

- A) Діафрагмальний
- B) Блукаючий
- C) Язикоглотковий
- D) Під'язиковий
- E) Шийний відділ симпатичного стовбуру

257. Хворий після травми черепа втратив зір. Яка ділянка кори великих півкуль мозку ушкоджена?

- A) Потилична
- B) Фронтальна
- C) Тім'яна
- D) Сконева
- E) Тім'яна та сконева

258. Хворий потрапив до щелепно-лицьового відділення з переломом виличної дуги. У хворого утруднене закривання рота. Порушення функції якого м'язу призвело до цього?

- A) Жувальний
- B) Присередній крилоподібний
- C) Бічний крилоподібний
- D) Двочеревцевий
- E) Виличний

259. Хворий скаржиться на біль під час жування, особливо під час висунення нижньої щелепи і зміщення її вбік. Функція яких м'язів порушена?

- A) Латеральні крилоподібні
- B) Медіальні крилоподібні
- C) Жувальні
- D) Щелепно-під'язикові
- E) Сконеві

260. Хворий скаржиться на головний біль, утруднене дихання. Рентген підтвердив діагноз - фронтит. В якому носовому ході при огляді порожнини носа можуть спостерігатися гнійні виділення?

- A) Середній
- B) Верхній
- C) Нижній

D) Загальний

E) Над верхньою носовою раковиною

261. Хворий скаржиться, що при згадуванні про минулі трагічні події в його житті, у нього виникають тахікардія, задишка і різкий підйом артеріального тиску. Які структури ЦНС забезпечують зазначені кардіореспіраторні реакції у даного хворого?

A) Кора великих півкуль

B) Мозочок

C) Латеральні ядра гіпоталамуса

D) Специфічні ядра таламуса

E) Чотиригорбкове тіло середнього мозку

262. Хворий ходить хитаючись, широко розставляючи ноги. У нього знижений тонус м'язів рук і ніг, скандована мова. У якій структурі головного мозку локалізується ураження?

A) Мозочок

B) Шкаралупа

C) Хвостате ядро

D) Моторна кора

E) Червоне ядро

263. Хворого 21-го року госпіталізовано з проникаючою травмою дна порожнини рота. Який м'яз травмований?

A) Щелепно-під'язиковий

B) Щито-під'язиковий

C) Шило-під'язиковий

D) Лопатково-під'язиковий

E) Груднино-під'язиковий

264. Хворого госпіталізовано з підозрою на пухлину верхнього відділу стравоходу. Під час рентгенологічного обстеження виявлено пухлинний процес на межі глотки та стравоходу. На рівні якого шийного хребця розташована пухлина?

A) 6

B) 1

C) 4

D) 3

E) 2

265. Хворого госпіталізовано з проникаючою травмою дна порожнини рота. Який м'яз травмований?

- A) Щелепно-під'язиковий
- B) Щито-під'язиковий
- C) Шило-під'язиковий
- D) Лопатково-під'язиковий
- E) Груднинно-під'язиковий

266. Хворого після автомобільної аварії госпіталізовано з масивною кровотечею з м'яких тканин обличчя. Яку артерію треба притиснути, щоб зупинити кровотечу?

- A) Лицева
- B) Язикова
- C) Підключична
- D) Верхньощелепна
- E) Епітелій борозни

267. Хворому 60-ти років важко формувати і рухати харчову грудку, що порушує процес їжі. При цьому язик нерухомий, мова стає неможливою. Причиною цього може бути порушення функції такого нерва:

- A) Під'язиковий
- B) Додатковий
- C) Язикоглотковий
- D) Трійчастий
- E) Лицевий

268. Хворому 60-ти років важко формувати та рухати харчову грудку, це порушує процес їжі. При цьому язик нерухомий, мова стала неможливою. Який нерв при цьому пошкоджено?

- A) XII
- B) V
- C) IX
- D) XI
- E) VII

269. Хворому з порушенням функції зовнішнього дихання необхідно зробити трахеостомію. На рівні яких хрящових кілець трахеї частіше за все може знаходитися перешийок щитоподібної залози?

- A) II-IV
- B) III-IV
- C) I-II
- D) IV-V

Е) V-VI

270. Хворому проведено лобектомію правої середньої частки легені. Які сегменти легені були уражені?

А) Бічний та присередній

В) Верхівковий, передній

С) Присередній і передній основні

Д) Задній і бічний основні

Е) Верхівково-задній та передній

271. Хворому чоловіку 60-ти років після операції потрібно вивести сечу катетером. В якому місці сечівника можна зробити прорив при недостатньо вмілій маніпуляції (найбільш звужена у нормі частина)?

А) Pars membranacea

В) Ostium uretrae externum

С) Fossa navicularis

Д) Pars spongiosa

Е) Pars prostatica

272. Чоловік 28-ми років з різаною раною шкіри лобової ділянки був доставлений до лікарні. Для зупинки кровотечі перев'язана судина, яка кровопостачає цю ділянку. Яка судина була перев'язана?

А) A.supraorbitalis

В) A.inf raorbitalis

С) A.angularis

Д) A.dorsalis nasi

Е) A.temporalis superf icialis

273. Чоловік 30-ти років звернувся до стоматолога зі скаргою на розлади жування, виникнення болю при відтягуванні щелепи назад. Лікар встановив запалення одного з жувальних м'язів. Якого саме?

А) Скроневий (задні волокна)

В) Скроневий (передні волокна)

С) Крилоподібний медіальний

Д) Крилоподібний латеральний

Е) Жувальний

274. Чоловік 65-ти років звернувся до стоматолога зі скаргою, що в нього нижня щелепа не рухається назад. Встановлено, що в нього після падіння пошкоджений м'яз:

А) Скроневий

- В) Жувальний
- С) Бічний крилоподібний
- Д) Присередній крилоподібний
- Е) Двочеревцевий

275. Чоловік скаржиться на порушення чутливості шкіри вушної раковини та зовнішнього слухового ходу. Пошкодження якого нерва викликало такий стан у хворого?

- А) N. auricularis magnus
- В) N. auriculotemporalis
- С) N. auricularis anteriores
- Д) N. facialis
- Е) –

276. Чоловіка 29-ти років непокоїть різкий біль шкіри обличчя. Який нерв уражений?

- А) Трійчастий
- В) Блукаючий
- С) Окоруховий
- Д) Лицевий
- Е) Язикоглотковий

277. Юнака 18-ти років доставлено в лікарню з ознаками внутрішньої кровотечі. Під час гри в футбол він отримав удар в ділянку лівого підребер'я. Ушкодження якого органу спричинило сильну кровотечу?

- А) Lien
- В) Cauda pancreatis
- С) Fundus ventriculi
- Д) Flexura coli sinistra
- Е) Ren sinistra

278. Юнака 18-ти років доставлено в лікарню з ознаками внутрішньої кровотечі. Під час гри в футбол отримав удар в ділянці лівого підребер'я. Ушкодження якого з органів, що проєктуються в дану ділянку, може спричинити сильну кровотечу?

- А) Lien
- В) Fundus ventriculi
- С) Flexura coli sinistra
- Д) Cauda pancreatis
- Е) Ren sinistra

279. Яка артерія може бути пошкоджена при виконанні провідникової анестезії в ділянці отвору нижньої щелепи?

- A) Нижня альвеолярна артерія
- B) Щічна артерія
- C) Язикова артерія
- D) Крилоподібні гілки
- E) Середня оболонкова артерія

280. Педіатр, оглядаючи порожнину рота дитини, виявив 8 зубів. Дитина розвивається нормально. Визначте вік дитини:

- A) 10-12 місяців
- B) 6-8 місяців
- C) 8-9 місяців
- D) 12-15 місяців
- E) 15-20 місяців

281. Пацієнт скаржиться на виділення сечі під час статевого акту. Який орган уражений?

- A) Передміхурова залоза
- B) Яєчко
- C) Сім'яні міхурці
- D) Придаток яєчка
- E) Сечовий міхур

282. Рентгенологічно встановлено скупчення гною у клиноподібній пазусі. В який носовий хід виділяється гній?

- A) Правий та лівий верхні
- B) Лівий середній
- C) Правий нижній
- D) Лівий нижній
- E) Правий середній

283. У пацієнта при рентгенологічному обстеженні виявлено грижу міжхребцевого диска грудного відділу хребта. Який вид з'єднання між хребцями зазнав патологічних змін?

- A) Синхондроз
- B) Синдесмоз
- C) Діартроз
- D) Геміартроз
- E) Синостоз

284. До стоматолога звернувся хворий зі скаргами на асиметрію обличчя. Лікар побачив, що на лівій половині обличчя брова стоїть нижче, на лобі немає складок, повіка вужча, очне яблуко виступає вперед. Функція якої пари черепно-мозкових нервів уражена?

- A) VII
- B) I
- C) V
- D) VI
- E) IV

285. Хворий скаржиться на болі під час жування, особливо при висуненні нижньої щелепи вперед і зміщенні її вбік. Функція яких м'язів порушена?

- A) Латеральні крилоподібні
- B) Медіальні крилоподібні
- C) Жувальні
- D) Щелепно-під'язикові
- E) Скроневі

286. Після травми м'яких тканин в області задньої поверхні медіального виростка плеча у постраждалого виникло відчуття поколювання шкіри медіальної поверхні передпліччя. Який з наведених нервів знаходиться в зоні ушкодження?

- A) N. ulnaris
- B) N. musculocutaneus
- C) N. dorsalis scapularis
- D) N. subscapularis
- E) N. radialis

287. Хірург пошкодив нерв, що іннервує щелепно-під'язиковий м'яз. Назвіть пошкоджений нерв:

- A) N. trigeminus
- B) N. facialis
- C) N. glossopharyngeus
- D) N. hypoglossus
- E) N. Accessorius

288. На поверхні коронки другого великого кутнього зуба, яка контактує з щогою, лікар виявив каріозну порожнину. Як називається вражена поверхня коронки?

- A) Facies vestibularis
- B) Facies lingualis
- C) Facies mesialis

D) Facies distalis

E) Facies occlusalis

289. Під час стану емоційного напруження у людини з'явилися поперечні зморшки на лобі посередині. Скорочення якого м'яза відбулося?

A) M. occipitofrontalis

B) M. procerus

C) M. corrugator supercilii

D) M. temporoparietalis

E) M. auricularis anterior

290. Дитина 5-ти років поступила в ЛОР-відділення клінічної лікарні з діагнозом: гнійне запалення середнього вуха. Захворювання розпочалось з запалення носоглотки. Через який канал (каналець) скроневої кістки інфекція потрапила в барабанну порожнину?

A) М'язовотрубний

B) Барабанний

C) Сонний

D) Барабанної струни

E) Сонно-барабанні

291. При проведенні дуоденального зондування зонд не проходить зі шлунка в дванадцятипалу кишку. В якому відділі шлунка є перешкода (пухлина)?

A) Воротар

B) Кардіальний відділ

C) Дно

D) Тіло

E) Мала кривизна

292. В клініку звернувся чоловік 45-ти років із скаргами на втрату чутливості в ділянці задньої 1/3 язика. Функція якої пари черепно-мозкових нервів порушена?

A) IX

B) X

C) VIII

D) V

E) XII

293. Щоб взяти спинномозкову рідину для дослідження, лікар повинен зробити пун-кцію підпаутинного простору спинного мозку. Між якими хребцями треба ввести голку, щоб не пошкодити спинний мозок?

A) III і IV поперекові

- В) XI і XII грудні XII
- С) грудний і I поперековий
- Д) I і II поперекові
- Е) IV і V грудні

294. Хірургу необхідно провести видалення частини травмованої ступні по лінії Лісфранкова суглоба. Яку зв'язку необхідно перетнути?

- А) Медіальна міжкісткова заплесноплеснова
- В) П'яtkово-човноподібна
- С) Роздвоєна
- Д) Таранно-човноподібна
- Е) Таранно-п'яtkова

295. До лікаря-травматолога звернувся хворий, у якого після травми стало утрудненим активне розгинання руки в ліктьовому суглобі. Який м'яз імовірно ушкоджений?

- А) M. triceps brachii
- В) M. pectoralis minor
- С) M. deltoideus
- Д) M. coracobrachialis
- Е) M. latissimus dorsi

296. У хворого при огляді порожнини рота встановлено різке почервоніння слизової оболонки кореня язика. Визначте, яке утворення залучене в запальний процес:

- А) Язиковий мигдалик
- В) Піднебінний мигдалик
- С) Трубний мигдалик
- Д) Піднебінна завіска
- Е) Глотковий мигдалик

297. У травмованого рана скроневої ділянки, з якої яскраво-червоною цівкою витікає кров. Яка судина пошкоджена?

- А) A. temporalis superficialis
- В) A. facialis
- С) A. occipitalis
- Д) A. auricularis posterior
- Е) A. maxillaris

298. До лікаря-стоматолога звернувся хворий зі скаргами на сухість в ротовій порожнині, як в стані спокою, так і під час прийому їжі. При обстеженні встановлено порушення

секреторної діяльності під'язикової і підщелепної слинних залоз. В якому випадку може бути таке явище?

- A) Пошкодження вегетативних волокон барабанної струни лицевого нерва
- B) Пошкодження язикоглоткового нерва
- C) Пошкодження піднижньощелепного нерва
- D) Пошкодження блокового нерва
- E) Пошкодження окорухового нерва

299. У потерпілого від електротравми в ділянці шиї сформувався патологічний фіксований нахил голови у бік пошкодження у поєднанні з поворотом обличчя в протилежний бік. Який м'яз шиї піддався рубцевим змінам?

- A) Груднино-ключично-соскоподібний
- B) Передній драбинчастий
- C) Трапецієподібний
- D) Під'язиково-лопатковий
- E) Двочеревцевий

300. У постраждалого з ножовим пораненням шиї кровотеча. При первинній обробці рани встановлено, що пошкоджена судина, яка розташована вздовж латерального краю груднино-ключично-соскоподібного м'яза. Визначте цю судину:

- A) V. jugularis externa
- B) V. jugularis anterior
- C) A. carotis externa
- D) A. carotis interna
- E) V. jugularis interna

301. Thoracic duct rupture has occurred in a weightlifter, when he was lifting the bar. The injury to the thoracic duct is the most likely to be localized in the area of:

- A) Aortic hiatus
- B) Lumbosacral junction
- C) Posterior mediastinum
- D) Venous angle junction
- E) Neck

302. При видаленні верхнього лівого третього моляра виникла значна кровотеча. Ураження якої артерії призвело до кровотечі?

- A) A. alveolaris superioris posterioris
- B) A. infraorbitalis
- C) A. alveolaris inferior

D) A. alveolaris superioris anterioris

E) A. facialis

303. У чоловіка гнійна рана у ділянці соскоподібного відростка черепа, внаслідок чого розвинулося запалення оболонок головного мозку. Яким шляхом проникла інфекція в порожнину черепа?

A) V. emissariae mastoidea

B) V. auricularis

C) V.v. tympanicae

D) V. facialis

E) V.v. labirinthi

304. При обстеженні хворого виявлено зниження секреторної функції залоз носової порожнини. Який нерв забезпечує парасимпатичну іннервацію даних залоз?

A) N. petrosus major

B) N. petrosus profundus

C) N. petrosus minor

D) N. maxillaris

E) N. chorda tympani

305. У дитини рана позаду соскоподібного відростка черепа. З рани витікає яскравочервона кров. Гілки якої артерії пошкоджені?

A) A. occipitalis

B) A. temporalis superior

C) A. maxillaris

D) A. carotis externa

E) A. carotis interna

306. A patient is diagnosed with frontitis. He also has a history of maxillary sinusitis. What structure of the nasal cavity is the most likely pathway through which the infection penetrated into the frontal sinus?

A) Middle nasal meatus

B) Superior nasal meatus

C) Inferior nasal meatus

D) Vestibule of the nose

E) Ethmoid and sphenoid sinus

307. After facial trauma the patient developed a buccal hematoma. What salivatory gland has its outflow blocked by the hematoma?

A) Parotid

- B) Sublingual
- C) Submandibular
- D) Lingual
- E) Buccal

308. A woman complains of painful chewing, especially when she moves her lower jaw backwards. What muscles are affected?

- A) Posterior bundles of the temporal muscles
- B) Anterior bundles of the temporal muscles
- C) Medial pterygoid muscles
- D) Lateral pterygoid muscles
- E) Masseter muscles

309. Due to sustained trauma the patient presents with unevenly dilated pupils (anisocoria). What muscle is blocked?

- A) Musculus sphincter pupillae
- B) Musculus ciliaris
- C) Musculus dilatator pupillae
- D) Musculus rectus superior
- E) Musculus rectus inferior

310. Хворий скаржиться на сильний не-жить та втрату відчуття запахів. Де в носовій порожнині пошкоджені рецептори нюхового аналізатору?

- A) Верхній носовий хід
- B) Хоани
- C) Нижній носовий хід
- D) Середній носовий хід
- E) Загальний носовий хід

311. При обстеженні у хворої виявлений заглотковий абсцес. В який простір шиї повинен проникнути хірург при розтині абсцесу?

- A) Позавісцеральний
- B) Переддрабинчастий
- C) Надгруднинний
- D) Міждрабинчастий
- E) Передвісцеральний

312. Студент перкуторно визначає межу серця, яка проектується на передню грудну клітку на рівні хрящів третього ребра. Яку межу серця визначив студент?

- A) Права
- B) Верхня
- C) Верхівка
- B) Нижня
- E) Ліва

313. Після зіштовхнення двох автомобілів у одного з водіїв відзначається деформація у середній третині лівої гомілки, сильний біль, особливо при спробі рухати лівою гомілкою. З рани виступають кінці кістки тригранного січення, при рухах посилюється кровотеча. Яка кістка може бути пошкоджена?

- A) Великогомілкова
- B) Малогомілкова
- C) Надп'яtkова
- D) Наколiнок
- E) Стегнова

314. Хвору прооперовано з приводу стегнової кили. Де проектується вихідний отвір цієї кили?

- A) Стегновий трикутник
- B) Сіднична ділянка
- C) -
- D) Пахвинна ділянка
- E) Лобкова ділянка

315. Чоловік звернувся до хірурга з варикозним розширенням вен лівої ноги. Вузли вен розташовані на задній поверхні шкіри гомілки, на задній та передній поверхнях шкіри стегна. Які поверхневі вени нижньої кінцівки пошкоджені у хворого?

- A) Велика та мала підшкірні вени
- B) Стегнова вена, велика та мала підшкірні вени
- C) Задня великогомілкова вена, велика підшкірна вена
- D) Мала підшкірна вена, глибока вена стегна
- E) Підколінна, поверхнева підшкірна вени

316. При огляді ротової порожнини хворого виявлено карієс коронки зуба, яка звернена до власної ротової порожнини. Яка поверхня уражена?

- A) *Facies lingualis*
- B) *Facies vestibularis*
- C) *Facies contactus*
- D) *Facies mesialis*

E) Facies distalis

317. Чоловіку видалили зуб. Коронка зу-ба долотоподібна, широка, край вузький. Корінь конусоподібний, стиснутий з бо-ків. Який зуб видалили?

A) Верхній різець

B) Верхній премоляр

C) Нижній різець

D) Нижній премоляр

E) Нижнє ікло

318. У хворого флегмона у ділянці крилопіднебінної ямки з ураженням одноймен-ного вегетативного вузла. Функція якої залози буде порушена у першу чергу?

A) Слізна

B) Піднижньощелепна

C) Під'язикова

D) Навколоушна

E) х

319. Чоловік 42-х років звернувся до мед-пункту з приводу різаної рани нижньої частини передньої поверхні плеча. Об'є-ктивно: утруднене згинання передпліч-чя. Які з наведених м'язів ймовірно ушкоджені у хворого?

A) M. brachialis, т. biceps brachii

B) M. coracobrachialis, т. supraspinatus

C) M. deltoideus, т. infraspinatus

D) M. biceps brachii, m. anconeus

E) M. deltoideus, m. biceps brachii

320. Результата обстеження хворого з по-рушенням слиновиділення привушною залозою вказують на можливість ушко-дження вушного вузла. Який нерв утво-рює цей вузол?

A) N. petrosus minor

B) N. vagus

C) N. hypoglossus

D) N. petrosus major

E) N. auricularis magnus

321. У постраждалого пошкоджена кам'яниста частина скроневої кістки. Лі-нія перелому пройшла позаду від вну-трішнього слухового отвору. Який канал скроневої кістки був пошкоджений?

A) Лицевий

B) Сонний

- С) Барабанний
- Д) М'язово-трубний
- Е) Каналець барабанної струни

322. При операції на шлунку хірург пере-сік ліву шлункову артерію, перев'язав її, але кров продовжує витікати з протиле-жного кінця артерії. Яка артерія анасто- мозує з нею?

- А) Права шлункова
- В) Права шлунково-чепцева
- С) Селезінкова
- Д) Верхня підшлунково-дванадцятипала
- Е) Ліва шлунково-чепцева

323. У хворого при огляді порожнини ро-та встановлено різке почервоніння сли-зової оболонки кореня язика. Визначте, яке утворення залучене в запальний про-цес:

- А) Язиковий мигдалик
- В) Глотковий мигдалик
- С) Піднебінна завіска
- Д) Трубний мигдалик
- Е) Піднебінний мигдалик

324. У пацієнта аспермія. Який орган не працює?

- А) Яєчко
- В) Простата
- С) Передміхурова залоза
- Д) Сім'яні міхурці
- Е) Придаток яєчка

325. У потерпілого в автомобільній ката-строфі гематома спинного мозку супро-воджується загруднинними болями, та-хікардією і підвищенням артеріального тиску. Ураження яких сегментів спинно-го мозку є причиною стану хворого?

- А) Th1-Th5
- В) S1-S3
- С) L1-L3
- Д) C6-C8
- Е) –

326. При операції на шії з правого боку порушилася екскурсія правого склепін-ня діафрагми. Це сталося в результаті пошкодження такого нерва:

- А) Правий діафрагмальний

- В) Надключичний нерв
- С) Правий поперечний нерв шиї
- Д) Лівий діафрагмальний
- Е) Лівий поперечний нерв шиї

327. Хворий не може підняти опущену нижню щелепу. Які м'язи голови НЕ МОЖУТЬ виконати свою функцію?

- А) Жувальні
- В) Щічні
- С) Великі виличні
- Д) Верхні вушні м'язи
- Е) Малі виличні

328. У хворого після застудного захворювання з'явилося порушення больової і температурної чутливості передніх 2/3 язика. Який із нервів при цьому постраждав?

- А) Трійчастий
- В) Барабанна струна
- С) Блукаючий
- Д) Діафрагмальний
- Е) Під'язиковий

329. Хворому призначена ендоскопія 12-палої кишки. В результаті виявлено запалення великого дуоденального сосочка і порушення виділення жовчі в просвіт кишки. У якому відділі 12-палої кишки виявлені порушення?

- А) Низхідна частина
- В) Верхня частина
- С) Горизонтальна частина
- Д) Висхідна частина
- Е) Цибулина

330. У потерпілого травма черепа з порушенням дірчастої пластинки решітчастої кістки. Який нерв може бути ушкоджений?

- А) N. olfactorius
- В) N. ophthalmicus
- С) N. opticus
- Д) N. trochliaris
- Е) N. Abducens

331. Жінці 58-ми років проведено повне видалення матки з придатками, після чого виділення сечі припинилося. При цистоскопії: міхур сечі не містить, з устів сечоводів сеча не надходить. Який відділ сечовидільної системи було ушкоджено в ході операції?

- A) Ureter
- B) Ren
- C) Pelvis renalis
- D) Esica urinaria
- E) Uretra

332. У потерпілого пошкоджений м'яз, апоневроз якого утворює пахвинну зв'язку. Назвіть цей м'яз:

- A) Зовнішній косий м'яз живота
- B) Пірамідальний м'яз
- C) Внутрішній косий м'яз живота
- D) Поперечний м'яз живота
- E) Прямий м'яз живота

333. При обстеженні хворого похилого віку виявлено моторну афазію. Де локалізований осередок пошкодження головного мозку?

- A) Центр Брока
- B) Кутова звивина
- C) Прецентральна звивина
- D) Постцентральна звивина
- E) Звивина Гешля

334. У пацієнта перфоративна виразка передньої стінки шлунка. В яке похідне очеревини потрапить вміст шлунка?

- A) Передшлункова сумка
- B) Правий брижовий синус
- C) Лівий брижовий синус
- D) Чепцева сумка
- E) Печінкова сумка

335. Після пошкодження мозку у людини порушене сприйняття зорової інформації. В якому відділі кори сталося пошкодження?

- A) Потилична ділянка кори
- B) Передня центральна звивина
- C) Задня центральна звивина

D) Сконева ділянка кори

E) Тім'яна ділянка кори

336. У хворі діагностовано пухлину го-ловки підшлункової залози, порушення венозного відтоку з деяких органів че-ревної порожнини. Яка венозна судина була здавлена пухлиною?

A) Ворітна вена печінки

B) Ліва шлункова вена

C) Нижня порожниста вена

D) Права шлункова вена

E) Ниркова вена

337. На заняттях з лікувальної фізкуль-тури лікар-фізіотерапевт запропонував юнакам відхилитися назад і дістати до-лонями до підлоги. Яка зв'язка запобі-гає надмірному розгинанню хребтового стовпа?

A) Передня поздовжня

B) Надостьова

C) Задня поздовжня

D) Жовта

E) Міжпоперечна

338. У хворого діагностовано пухлину мозку, яка розміщена в ділянці 'пта-шиної шпори'. Порушення якої функції виникне у хворого, якщо пухлина буде активно розвиватися?

A) Зір

B) Слух

C) Дотикова чутливість

D) Нюх

E) Смак

339. У чоловіка 33-х років як наслідок спинномозкової травми порушена бо-льова та температурна чутливість, що обумовлено пошкодженням такого шля-ху:

A) Спіноталамічного

B) Латерального спінокортикального

C) Переднього спіномозочкового

D) Медіального спінокортикального

E) Заднього спіномозочкового

340. Студент перкуторно визначає межу серця, яка проектується на передню гру-дну клітку на рівні хрящів третього ре-бра. Яку межу серця визначив студент?

- A) Верхню
- B) Ліву
- C) Нижню
- D) Праву
- E) Верхівку

341. В результаті травми у чоловіка 47-ми років пошкоджені передні корінці спинного мозку. Відростки яких нейронів пошкоджені?

- A) Аксони нейронів рухових соматичних та вегетативних ядер
- B) Дендрити чутливих псевдоуніполярних нейронів
- C) Дендрити й аксони чутливих псевдоуніполярних нейронів
- D) Дендрити рухових нейронів й аксони ядер бокових стовпів
- E) Аксони чутливих псевдоуніполярних нейронів

342. У дитини при обстеженні виявлено набряклість обличчя та розширення вен верхньої частини тулуба. На рентгенограмі спостерігається збільшення тіні органів середостіння. Ураження якого органу імуногенезу призвело до виникнення клінічних проявів захворювання?

- A) Тимус
- B) Кістковий мозок груднини
- C) Передні середостінні лімфатичні вузли
- D) Діафрагмальні лімфатичні вузли
- E) Задні середостінні лімфатичні вузли

343. У хворого після травми в скроневій ділянці виявлена епідуральна гематома. Яка артерія була пошкоджена?

- A) Середня оболонна артерія
- B) Нижня барабанна артерія
- C) Глибока скронева артерія
- D) Білока вушна артерія
- E) Верхня барабанна артерія

344. У хворого після травми втрачена чутливість шкіри на долонній поверхні 5-го пальця лівої кисті. Який нерв пошкоджений?

- A) N. ulnaris
- B) N. medianus
- C) N. axillaris
- D) N. radialis

Е) N. musculo-cutaneus

345. При проведенні оперативного втручання на шийі хірургу потрібно виділити зовнішню сонну артерію. Що є анатомічним орієнтиром для встановлення місця початкового відділу вказаної судини в ділянці шийі?

А) Верхній край щитоподібного хряща (Кут нижньої щелепи)

В) Місце початку грудинно-ключично-соскоподібного м'яза

С) Яремна вирізка

Д) Нижній край щитоподібного хряща

Е) х

346. У потерпілого травма внаслідок прямого удару по внутрішній поверхні середньої третини гомілки. Перелом якого анатомічного утворення найбільш імовірний?

А) Діафіз великогомілкової кістки

В) Дистальний епіфіз малогомілкової кістки

С) Проксимальний епіфіз великогомілкової кістки

Д) Проксимальний епіфіз малогомілкової кістки

Е) Дистальний епіфіз великогомілкової кістки

347. Звуження великої судини спричинило погіршення відтоку крові з лівого шлуночка серця. Яка судина зазнала патологічних змін?

А) Аорта

В) Легенева вена

С) Нижня порожниста вена

Д) Легеневий стовбур

Е) Верхня порожниста вена

348. Пацієнту віком 25 років для уточнення діагнозу треба зробити сіалографію привушної залози. Де розташований отвір, через який буде введена рентгеноконтрастна маса?

А) На щоці в ділянці навпроти 2-го верхнього великого кутнього зуба

В) На caruncula sublingualis

С) На щоці в ділянці навпроти 2-го нижнього великого кутнього зуба

Д) На щоці в ділянці навпроти 2-го верхнього малого кутнього зуба

Е) На plica sublingualis

349. Пацієнт скаржиться на біль під час жування, особливо, коли висуває нижню щелепу вперед і зміщує її у бік. Функція яких м'язів порушена?

А) Латеральних крилоподібних

В) Жувальних

- С) Скроневих
- Д) Медіальних крилоподібних
- Е) Щелепно-під'язикових

350. У пацієнта порушена парасимпатична іннервація привушної слинної залози. З боку якого вузла можлива патологія?

- А) Ganglion oticum
- В) Ganglion submandibulare
- С) Ganglion pterygopalatinum
- Д) Ganglion trigeminale
- Е) Ganglion geniculi

351. У пацієнта запалення верхньощелепного нерва. Через який отвір черепа проходить цей нерв?

- А) Круглий
- В) Остистий
- С) -
- Д) Яремний
- Е) Овальний

352. Пацієнту встановлено діагноз: гострий риногенний гайморит (запалення верхньощелепної пазухи). Як інфекція могла проникнути в гайморову пазуху?

- А) Крізь середній носовий хід
- В) Крізь нижній носовий хід
- С) Крізь середню черепну ямку
- Д) Крізь верхній носовий хід
- Е) Крізь передню черепну ямку

353. У травмованого чоловіка рана скроневої ділянки, з якої яскраво-червоною цівкою витікає кров. Яка судина пошкоджена?

- А) A. temporalis superficialis
- В) A. occipitalis
- С) A. maxillaris
- Д) A. facialis
- Е) A. auricularis posterior

354. Скільки сегментів у шийному відділі спинного мозку?

- А) 7
- В) 12

C) 5

D) 2

E) 8

355. Під час обстеження дитини лікар-педіатр виявив набряк та гіперемію лімфоїдної тканини на ділянці мигдаликової ямки. Який із мигдаликів розташований у нормі в цьому місці?

A) Tonsilla palatina

B) Tonsilla lingualis

C) Tonsilla tubaria

D) Tonsilla pharyngealis

E) -

356. Під час дослідження кровотоку в судинах головного мозку лікар встановлює датчик над артерією, що проходить у поперечних отворах шийних хребців. Яку артерію обстежує лікар?

A) A.vertebraiis

B) A. carotis interna

C) A. basilaris

D) A. carotis externa

E) A. cerebri anterior

357. "Під час видалення верхнього лівого третього моляра у пацієнта виникла значна кровотеча. Ураження якої артерії спричинило кровотечу? "

A) A. alveolaris superior posterior

B) A. facialis

C) Aa.alveolares superior es anteriores

D) A. alveolaris inferior

E) A. infraorbitalis

358. "У пацієнта об'єктивно спостерігається: права носогубна складка розгладжена, права очноямкова щілина розширена (її не вдається закрити під час примружування, тому що повіки не змикаються), виникають утруднення під час розмови та вживання їжі (їжа застрягає між щогою і зубами). Який нерв уражено? "

A) N. facialis dexter

B) N. trigeminus dexter

C) N abducens dexter

D) N. glossopharyngeus sinister

E) N. vagus dexter

359. Унаслідок пухлини гіпофіза під час рентгенографії виявлено руйнування і збільшення ямки турецького сідла. Яка кісткова порожнина при цьому уражена?

- A) Пазуха клиноподібної кістки
- B) Зоровий канал
- C) Сонний канал
- D) Лицевий канал
- E) Барабанна порожнина

360. "Під час обстеження головного мозку на комп'ютерному томографі лікар виявив пухлину, що локалізується на ділянці нижнього слиновидільного ядра. Який це відділ головного мозку? "

- A) Довгастий мозок
- B) Мозочок
- C) Міст
- D) Проміжний мозок
- E) Середній мозок

361. У пацієнта виявлено руйнування стінки барабанної порожнини з розповсюдженням гною до задньої черепної ямки. Яка зі стінок зруйнована?

- A) *Paries mastoideus*
- B) *Paries labyrinthicus*
- C) *Paries membranaceus*
- D) *Paries jugularis*
- E) *Paries tegmentalis*

362. До лікаря звернулася пацієнтка віком 38 років зі скаргами на те, що після перенесеного гострого вірусного респіраторного захворювання вона не відчуває дотику їжі, а також болю та температури на передній частині (2/3) язика (обпекла язик гарячим чаєм). Визначте, яка з гілок якого нерва була уражена.

- A) Язиковий нерв нижньощелепного нерва трійчастого нерва
- B) Барабанна струна лицевого нерва
- C) Верхній гортанний нерв блукаючого нерва
- D) Язикові гілки під'язикового нерва
- E) Язикові гілки язикоглоткового нерва

363. За три доби після пломбування першого правого малого кутнього зуба пацієнт відчув біль під правим оком та стійке закладення носа, що супроводжувалося підвищенням температури тіла до 38°C і виділенням гнійного слизу із правого носового ходу. Якої ймовірної помилки припустився лікар?

- A) Перфорації правої верхньощелепної пазухи

- В) Перфорації клиноподібної пазухи
- С) Перелому міжкоміркової перегородки
- Д) Перфорації підочномкового каналу
- Е) Перфорації правої стінки носової порожнини

364. Укажіть хрящеподібні утворення, що доповнюють конгруентність суглобових поверхонь:

- А) Меніски
- В) Диски
- С) Зв'язки
- Д) Губи
- Е) Складки

365. Пацієнту віком 55 років встановлено діагноз: гнійний отит, ускладнений менінгітом. Гній потрапив у задню черепну ямку. Яка стінка барабанної порожнини зруйнована?

- А) *Paries mastoideus*
- В) *Paries jugularis*
- С) *Paries membranaceus*
- Д) *Paries tegmentalis*
- Е) *Paries labyrinthicus*

366. Лікар-стоматолог виконує анестезію у ділянці другого верхнього моляра. Які нерви знеболює лікар у цьому разі?

- А) *Rr. alveolares superiores posteriores*
- В) *Rr. alveolares superiores anteriores*
- С) *Rr. alveolares superiores medii*
- Д) *Rr. alveolares inferiores anteriores*
- Е) *Rr. alveolares inferiores posteriors*

367. Пацієнту встановлено діагноз: фронтит. Із анамнезу відомо, що він переніс запалення верхньощелепної пазухи. Із якого відділу носової порожнини інфекція могла потрапити в лобову пазуху?

- А) Середнього носового ходу
- В) Решітчасто-клиноподібної кишені
- С) Нижнього носового ходу
- Д) Верхнього носового ходу
- Е) Присінка носової порожнини

368. У пацієнта спостерігається порушення кровопостачання медіальної поверхні правої півкулі головного мозку. Яка артерія пошкоджена?

- A) A. cerebri anterior
- B) A. communicans posterior
- C) A. cerebri posterior
- D) A. cerebri media
- E) A. choroidea

369. Під час проведення апендектомії, пацієнту перев'язали а. appendicularis. Гілкою якої артерії є ця судина

- A) A. ileocolica
- B) A. colica dextra
- C) A. mesenterica inferior
- D) A. sigmoidea
- E) A. colica media

370. Лікар-стоматолог виявив у пацієнта каріозну порожнину на поверхні коронки нижнього другого малого кутнього зуба, яка уворилась біля першого малого кутнього зуба. Укажіть уражену поверхню коронки:

- A) Facies mesialis
- B) Facies occlusalis
- C) Facies vestibularis
- D) Facies distalis
- E) Facies lingualis

371. У пацієнта діагностовано злоякісну пухлину епіфіза із проростанням в одну із цистерн підпаутинного простору головного мозку. У ділянці якої цистерни необхідно проводити оперативне втручання для видалення пухлини?

- A) Cisterna quadrigeminalis
- B) Cisterna pericallosa
- C) Cisterna ambiens
- D) Cisterna chiasmatis
- E) Cisterna interpeduncularis

372. Чоловіка віком 42 роки шпиталізовано з різаною раною нижньої частини передньої поверхні плеча. Об'єктивно спостерігається ускладнене згинання передпліччя. Які м'язи ймовірно ушкоджені у пацієнта?

- A) M. brachialis, m. biceps brachii
- B) M. biceps brachii, m. anconeus

C) M. coracobrachialis, m. supraspinatus

D) M. deltoideus, m. infraspinatus

E) M. deltoideus, m. biceps brachii

373. Пацієнтка віком 36 років звернулася до лікаря-стоматолога із приводу набряку під правим оком. Після обстеження встановлено діагноз: флегмона підочнотриважної ділянки. Від яких зубів інфекція найчастіше поширюється в цю ділянку обличчя?

A) Верхнього ікла й першого премоляра

B) Верхніх першого та другого молярів

C) Верхніх бічних та присередніх різців

D) Другого премоляра та першого моляра

E) Верхнього присереднього різця

374. До порушення якої функції призведе ураження груднинно-щитоподібного м'яза?

A) Опускання гортані

B) Підняття гортані

C) Нахилу шийі вперед

D) Підняття під'язикової кістки

E) Розгинання шийі

375. Укажіть межу серця, яка проектується на рівні хрящів третього ребра передньої грудної клітки

A) Верхня

B) Верхівка

C) Нижня

D) Права

E) Ліва

376. Пацієнту видалили зуб. Коронка зуба долотоподібна, широка, край вузький. Корінь конусоподібний, стиснутий із боків. Який зуб видалили?

A) Верхній різець

B) Верхній премоляр

C) Нижній премоляр

D) Нижній різець

E) Нижнє ікло

377. Під час проведення аускультатії у пацієнта в II міжребер'ї по парастернальній лінії справа краще прослуховується II тон, ніж I. Закриття якого клапана зумовило формування II тону?

- A) Півмісяцевого клапана аорти
- B) Правого тристулкового клапана
- C) Двостулкового та трьохстулкового клапанів
- D) Півмісяцевого клапана легеневого стовбура
- E) Лівого двостулкового клапана

378. Нормальну оклюзію зубних дуг можна посилити, відтягнувши нижню щелепу назад. Який м'яз виконує цю функцію?

- A) Скроневий
- B) Латеральний крилоподібний
- C) Грудинно-ключично-соскоподібний
- D) Жувальний
- E) Медіальний крилоподібний

379. Під час аускультатії лікар оцінює роботу мітрального клапана. Де вислуховується цей клапан?

- A) На верхівці серця
- B) У II лівому міжребер'ї біля груднини
- C) У IV-V правому міжребер'ї біля груднини
- D) У IV-V лівому міжребер'ї біля груднини
- E) У II правому міжребер'ї біля груднини

380. У пацієнта, якому видалено другий великий кутній зуб нижньої щелепи, спостерігається коміркова кровотеча. Яка артерія є джерелом кровотечі?

- A) Верхньощелепна
- B) Лицева
- C) Висхідна глоткова
- D) Очна
- E) Язикова

381. Пацієнтка скаржиться на сильний зубний біль, нестерпність до солодкого, кислого та до перепадів температури. Із анамнезу відомо: неодноразовий гайморит справа. Під час огляду ротової порожнини виявлено каріозний зуб: правий верхній перший премоляр. Лікар-стоматолог запропонував знеболити зуб для подальшого лікування. Який нерв іннервує цей зуб?

- A) N. alveolaris superior medius
- B) N. infraorbitalis
- C) N. mandibularis
- D) N. petrosus major

E) N. incisivus