复旦大学数学科学学院

2021～2022学年第一学期期末考试试卷

A 卷

课程名称： 高等数学A（上） **课程代码：** MATH120021

开课院系： 数学科学学院 **考试形式：** 闭卷

提示：请同学们秉持诚实守信宗旨，谨守考试纪律，摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为，学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

题目	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									

专业 _____ 学号 _____ 姓名 _____

一、计算下列各题(本题满分18分，每小题6分)

1. 设函数$y=y(x)$由参数方程$x=\cos t+t\sin t$及$y=\sin t-t\cos t$所确定，求$\dfrac{dy}{dx}$及$\dfrac{d^2y}{dx^2}$;

2. 设函数$f(x)=x^2\arctan x$, 求$f^{(n)}(0)$, $n\geq 1$;

3. 求曲线$xy=1$于$(1,1)$处的曲率。

二、计算下列极限(本题满分18分，每小题6分)

1. 求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt[3]{x^3+7x^2+1}-\sqrt[6]{x^6+3x^5-x^2+5}\right)$;

2. 求 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\int_0^x(e^{-(tx)^2}-1)dt}{x^5(1+\cos x)}$;

3. 设α和β是空间R^3中向量, $||\alpha||=1$, $||\beta||=4$, $\angle(\alpha,\beta)=\dfrac{\pi}{3}$, 试求极限 $\lim\limits_{h\to0}\dfrac{||\alpha+h\beta||-||\alpha||}{h}$。

姓名_____ 学号_____ 专业_____

三、计算下列各题(本题满分24分，每小题8分)

1. $\int \frac{1}{x\sqrt{1+x}}dx$;

2. $\int_{-1}^{1} \frac{\ln(1+|x|)+x\cos x}{(1+|x|)^2}dx$;

3. 若矩阵A的伴随阵 $A^* = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$, 试求$A$。

四、(本题满分8分)已知直线L_1：$\frac{x}{-2}=\frac{y-1}{0}=\frac{z+2}{1}$和直线$L_2$：$\frac{x+1}{1}=\frac{y+1}{2}=\frac{z-2}{-1}$。(1)求与$L_1$和$L_2$距离相等且平行于$L_1$和$L_2$的平面$\pi$的方程；(2)求$L_1$和$L_2$之间的距离。

专业_____

学号_____

姓名_____

五、(本题满分8分)求曲线$y=\int_0^x \sqrt{\sin t}\,dt\ (0\le x\le \pi)$ 绕y 轴旋转一周所成曲面Σ的方程及面积。

$$S=2\pi\int_0^{\pi} x\sqrt{1+\sin x}\,dx$$

$$\sqrt{1+\sin x}=\cos\frac{x}{2}+\sin\frac{x}{2}$$

六、**(本题满分8分)** 设$g(x)=\int_{x}^{x+\frac{\pi}{2}}|\sin t|dt$，求$g$的值域（要求说明理由）。

姓名_____ 学号_____ 专业_____

七、(本题满分8分) 设A是4阶方阵，并记A_{jk}为其(j,k)元素的代数余子式，列向量 $b_1 = (1,0,1,\frac{1}{2})^T$, $b_2 = (0,2,0,1)^T$ 。若$|A| = 3$, 且方程组$A\alpha_1 = b_1$和$A\alpha_2 = b_2$分别有解$\alpha_1 = (2,1,3,1)^T$和$\alpha_2 = (3,0,1,1)^T$, (1)找出实数t_1和t_2使得$t_1 b_1 + t_2 b_2 = (1,1,1,1)^T$; (2)求方程组$A\alpha = (1,1,1,1)^T$ 的解, 并求 $\sum_{k=1}^{4}(A_{k1} + A_{k4})$（要求说明理由）。

姓名_____ 学号_____ 专业_____

八、**(本题满分8分)** 设f于$(-\infty,+\infty)$上具有连续导函数,$f(0)=\dfrac{4\pi}{3}$,且当$x\in(-\infty,+\infty)$时满足

$$f'(x)=\frac{\sin f(x)}{\sqrt{(f(x))^2+1}}.$$

(1)判断数列$a_n=\displaystyle\int_{-n}^{n}\frac{|\sin f(x)|^2dx}{(f(x))^2+1}$, $n\geq 1$,是否收敛，并对所作出的判断给予证明;

(2)试确定$f(x)$的单调区间以及$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$、$\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$,并对所作出的论断给予证明。

复旦大学数学科学学院

2021～2022学年第一学期期末考试试卷

A 卷（参考答案）

课程名称：高等数学A（上）　　课程代码：MATH120021

开课院系：数学科学学院　　考试形式：闭卷

题　目	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得　分									

专业　学号　姓名

一、计算(每题6分，共18分)

1. $\dfrac{dy}{dx}=\tan t$, $\dfrac{d^2y}{dx^2}=\dfrac{1}{t\cos^3 t}$

2. 由计算得到 $\arctan x=\sum\limits_{k=0}^{n}\dfrac{(-1)^k x^{2k+1}}{2k+1}+o(x^{2n+1})$, 及

$$x^2\arctan x=\sum_{k=0}^{n}\frac{(-1)^k x^{2k+3}}{2k+1}+o(x^{2n+3}),$$

于是 当$0\le n\le 2$或n为偶数时$f^{(n)}(0)=0$; 当$n=2k+3$ $(k\ge 0)$时， $f^{(n)}(0)=\dfrac{(-1)^k(2k+3)!}{2k+1}$.

3. 曲率$=\sqrt{2}$。

二、计算下列极限(每题6分，共18分)

1.（法一） 由中值定理，存在$\xi=\xi(x)\in[(x^6+3x^5-x^2+5),(x^3+7x^2+1)^2]$使得

$$\begin{aligned}&\sqrt[3]{x^3+7x^2+1}-\sqrt[6]{x^6+3x^5-x^2+5}\\&=\frac{1}{6}\xi^{-5/6}\Big((x^3+7x^2+1)^2-(x^6+3x^5-x^2+5)\Big)\end{aligned}$$

于是, 原式$=11$。

（法二）两式分别关于$1/x$展开。

2.原式$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{x^2}(e^{-y^2}-1)dy}{2x^6}$, 再用L'Hospital法则得到$-\dfrac{1}{6}$。

3.原式$=\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{||\alpha+h\beta||^2-||\alpha||^2}{h(||\alpha+h\beta||+||\alpha||)}=2.$

三、计算下列各题(每题8分，共24分)

1. $\ln\left|\dfrac{\sqrt{1+x}-1}{\sqrt{1+x}+1}\right|+C;$

2. $2\displaystyle\int_0^1\frac{\ln(1+x)}{(1+x)^2}dx=2-\ln 2;$

3. 第一步：由 $AA^*=|A|I_3$得到 $A=|A|(A^*)^{-1}$及$|A|=\pm\sqrt{5}$。

第二步：计算

$$(A^*)^{-1}=\begin{pmatrix}2 & -3 & \frac{1}{5}\\ -1 & 2 & -\frac{1}{5}\\ 0 & 0 & \frac{1}{5}\end{pmatrix},$$

$A=\pm\sqrt{5}(A^*)^{-1}$。

四、(8分)

解：(1) 记直线方向$l_1=(-2,0,1)$, $l_2=(1,2,-1)$, 点$P_1(0,1,-2)$, $P_2(-1,-1,2)$。

计算：$l_1\times l_2=(-2,-1,-4)$。显然π的法向为$l_1\times l_2$, 且过线段P_1P_2的中点$M=(-\dfrac{1}{2},0,0)$, 于是π的方程为$2x+y+4z+1=0$。

(2)计算：$\overrightarrow{P_1P_2}=(-1,-2,4)$,

$|\overrightarrow{P_1P_2}\cdot(l_1\times l_2)|=12$, $||l_1\times l_2||=\sqrt{21}$,

所以L_1和L_2之间的距离为$\frac{12}{\sqrt{21}}$。

或在L_1上取点$P_1(0,1,-2)$, 并计算P_1到平面π的距离，再得出L_1与L_2之间的距离。

五、(8分)

解：第一步：Σ的方程为：$y=\displaystyle\int_0^{\sqrt{x^2+z^2}}\sqrt{\sin t}dt$, $0\le x^2+z^2\le\pi$。

第二步：弧长微元 $ds=\sqrt{(dx)^2+(dy)^2}=\sqrt{1+\sin x}\,dx=(\sin\dfrac{x}{2}+\cos\dfrac{x}{2})dx$。

旋转曲面面积为

$$\begin{aligned}A &= 2\pi\int_0^{\pi}xds=2\pi\int_0^{\pi}x\big(\sin\frac{x}{2}+\cos\frac{x}{2}\big)dx\\ &= (\pi)^2\int_0^{\pi}\big(\sin\frac{x}{2}+\cos\frac{x}{2}\big)dx=4\pi^2.\end{aligned}$$

六、(8分)

解：第一步：显然$g(x)$是周期为π的连续函数，只需考虑$x\in[0,\pi]$。

第二步：$g'(x)=|\cos x|-|\sin x|=0$得到驻点$x=\frac{\pi}{4}+k\pi$及 $x=\frac{3\pi}{4}+k\pi$ (k为整数)。

第三步：计算$g(\frac{\pi}{4})=\sqrt{2},\ g(\frac{3\pi}{4})=2-\sqrt{2},\ g(0)=g(\pi)=1$, 所以$g$ 的值域为$[2-\sqrt{2},\sqrt{2}]$。

七、(8分)

解：(1)$b_1+\frac{1}{2}b_2=(1,1,1,1)^T$;

(2)由于$A(\alpha_1+\frac{1}{2}\alpha_2)=b_1+\frac{1}{2}b_2=(1,1,1,1)^T$, 所以由Cramer法则可知$\alpha=\alpha_1+\frac{1}{2}\alpha_2=(\frac{7}{2},1,\frac{7}{2},\frac{3}{2})$是$A\alpha=(1,1,1,1)^T$的唯一解。

另一方面，记$\alpha=(a_1,a_2,a_3,a_4)$, 再由Cramer法则

$$a_k=|A_k|/|A|,$$

其中A_k为矩阵A中第k列换为$(1,1,1,1)^T$, 即$|A_k|=\sum_{j=1}^{4}A_{jk}$。

于是$\sum_{k=1}^{4}(A_{k1}+A_{k4})=|A|(a_1+a_4)=15$。

八、(8分)

解：(1)显然a_n是关于n的单调递增数列，另一方面，

$$a_n\le\int_{-n}^{n}\frac{|\sin f(x)|^2}{\sqrt{(f(x))^2+1}}dx\le\int_{-n}^{n}f'(x)\sin f(x)dx=\cos f(n)-\cos f(-n)\le 2.$$

或者

$$a_n=\int_{-n}^{n}\frac{f'(x)\sin f(x)}{(f(x))^2+1}dx\le\int_{-n}^{n}f'(x)\sin f(x)dx=\cos f(n)-\cos f(-n)\le 2.$$

这里用到了

$$\Big(-\cos f(x)\Big)'=f'(x)\sin f(x)=\frac{|\sin f(x)|^2}{\sqrt{(f(x))^2+1}}\ge 0.$$

于是$\{a_n\}$是收敛数列。

(2) 第一步：先证明对$x\in R^1$成立$f(x)\le 2\pi$, 用反证法，若存在点x_0使得$f(x_0)>2\pi$, 则由$f(0)=4\pi/3$ 及f 的连续性可知：存在x_1介于0和x_0之间使得$f(x_1)=2\pi$。于是$\cos f(x_1)=1>\cos f(0)$,再结合$\cos f(x)$ 的单调递减性质可知$x_1<0$。所以$x_0<x_1<0$。

再次用$\cos f(x)$的单调递减性推出：当$x\le x_1$时$\cos f(x)=\cos f(x_1)=1$，结合f的连续性知当$x\le x_1$时$f(x)=2\pi$,这个论断与假设“$f(x_0)>2\pi$”矛盾。故对$x\in R^1$成立$f(x)\le 2\pi$。

第二步：同样理由得到：对$x \in R^1$成立$\pi \leq f(x)$。于是可得$f(x)$的单调递减性。

第三步：证明$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \pi$、$\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = 2\pi$,可用用反证法。否则$\lim\limits_{x\to+\infty} \sin f(x) < 0$或$\lim\limits_{x\to-\infty} \sin f(x) < 0$,将导致（1）中积分不收敛。