

INFORME DE COMPOSICIÓN CORPORAL

NOMBRE: LUIS ENRIQUE NOGUERA GIL **FECHA:** 06/10/2025 **EDAD:** 28.0

	1 ° Vez	Subsecuente
Peso (Kg)	59.7	
Masa Magra (Kg)	50.7	
% Grasa	15.2	
Grasa (kg)	9.0	
% Músculo	42.7	
Músculo (Kg)	25.5	
% Óseo	18.0	
Masa Ósea (Kg)	10.8	
% Residual	24.1	
Masa Residual (Kg)	14.4	

ESTIMACIÓN DE CONTROL DE GRASA

% GRASO deseado	12%	15%
Disminuir grasa (Kg)	3.4	0.1
Peso Ideal (Kg):	56.3	59.6

ESTIMACIÓN DE CONTROL DE MÚSCULO


Masa Muscular Ideal (Kg)	30.1
Aumentar (Kg)	4.6

Peso FORMA (Kg)	60.9	64.2
------------------------	------	------

IMC (kg/m2)	
1° Vez	Subsecuente
19.5	
NORMAL	

ICC	
1° Vez	Subsecuente
0.79	
BAJO	

SOMATOTIPO



Somatotipo: ECTOMORFO - ENDOMORFO



1° Vez	4.3	2.6	4.2
Subsecuente			
	ENDO	MESO	ECTO

Comentarios:

Se presenta un **15,2 % de MG** por lo que se considera **ADECUADO**, además se observa un inadecuado balance entre **MM y MG** en segmentos (**brazo, muslo y pierna**)

El estudio del Phantom nos muestra que se deberá **INCREMENTAR** la **MM** en todos los segmentos.

El tiempo determinado para llegar a un **15 % de MG** que sería un optima es de **1 mes.**, y en cuanto a llegar al **% de MM ideal** sería un proceso más largo.



Nota: El porcentaje de grasa fue obtenido de la Ecuación de Jackson-Pollock (1985); el porcentaje de masa muscular de la Ecuación de Matiegka el porcentaje de masa ósea de la Ecuación de Von Döbeln (Rocha 1974) y el porcentaje de masa residual de la Constante de Würch.