

INFORME DE COMPOSICIÓN CORPORAL

NOMBRE: LUIS ENRIQUE NOGUERA GIL **FECHA:** 31/01/2026 **EDAD:** 28.4

	1° Vez	Subsecuente
Peso (Kg)	59.7	58.7
Masa Magra (Kg)	50.6	52.0
% Grasa	15.2	11.5
Grasa (kg)	9.1	6.7
% Músculo	42.7	46.1
Músculo (Kg)	25.5	27.0
% Óseo	18.0	18.3
Masa Ósea (Kg)	10.8	10.8
% Residual	24.1	24.1
Masa Residual (Kg)	14.4	14.1

ESTIMACIÓN DE CONTROL DE GRASA

% GRASO deseado	12%	15%
Disminuir grasa (Kg)	3.4	0.1
Peso Ideal (Kg):	56.3	59.6

ESTIMACIÓN DE CONTROL DE MÚSCULO

Masa Muscular Ideal (Kg)	30.1
Aumentar (Kg)	4.7


Peso FORMA (Kg)

60.9	64.2
------	------

IMC (kg/m2)	
1° Vez	Subsecuente
19.5	19.2
NORMAL	NORMAL

ICC	
1° Vez	Subsecuente
0.79	0.79
BAJO	BAJO

SOMATOTIPO



Somatotipo:

ECTOMORFO - ENDOMORFO



1° Vez	4.3	2.6	4.2
Subsecuente	3.5	2.3	4.3
	ENDO	MESO	ECTO

Comentarios:

Se presenta un **11,5 % de MG** por lo que se considera **ADECUADO**, en comparación a la medición pasada se puede observar una **DISMINUCIÓN del 0.6 % de MG**.

El estudio del Phantom nos muestra que se **DEBERÁ** incrementar la **MM (masa muscular)** en los segmentos.

El tiempo determinado para llegar a un **11 % de MG** que sería un optima es de **1 mes.**, y en cuanto a llegar al **% de MM ideal** sería un proceso más largo.



Nota: El porcentaje de grasa fue obtenido de la Ecuación de Jackson-Pollock (1985); el porcentaje de masa muscular de la Ecuación de Matiegka el porcentaje de masa ósea de la Ecuación de Von Döbeln (Rocha 1974) y el porcentaje de masa residual de la Constante de Würch.