

INFORME DE COMPOSICIÓN CORPORAL

NOMBRE: LUIS ENRIQUE NOGUERA GIL **FECHA:** 06/06/2026 **EDAD:** 28.7

	1° Vez	Subsecuente
Peso (Kg)	59.7	60.5
Masa Magra (Kg)	50.6	52.5
% Grasa	15.2	13.2
Grasa (kg)	9.1	8.0
% Músculo	42.6	44.9
Músculo (Kg)	25.5	27.2
% Óseo	18.0	17.8
Masa Ósea (Kg)	10.8	10.8
% Residual	24.1	24.1
Masa Residual (Kg)	14.4	14.6

ESTIMACIÓN DE CONTROL DE GRASA

% GRASO deseado	12%	15%
Disminuir grasa (Kg)	3.5	0.2
Peso Ideal (Kg):	56.2	59.5

ESTIMACIÓN DE CONTROL DE MÚSCULO


Masa Muscular Ideal (Kg)	30.1
Aumentar (Kg)	4.7

Peso FORMA (Kg) **60.9** **64.2**

IMC (kg/m2)	
1° Vez	Subsecuente
19.5	19.8
NORMAL	NORMAL

ICC	
1° Vez	Subsecuente
0.79	0.78
BAJO	BAJO

SOMATOTIPO



Somatotipo: ECTOMORFO - ENDOMORFO



1° Vez	4.3	2.6	4.2
Subsecuente	3.9	2.5	4.0
	ENDO	MESO	ECTO

Comentarios:

Se presenta un **13,2 % de MG** por lo que se considera **ADECUADO**, en comparación a la medición pasada se puede observar un **AUMENTO del 0,5 % de MG**.

El estudio del Phantom nos muestra que se **DEBERÁ** incrementar la **MM (masa muscular)** en los segmentos.

El tiempo determinado para llegar a un **12 % de MG** que sería un optima es de **1 - 2 meses.**, y en cuanto a llegar al **% de MM ideal** sería un proceso más largo.



Nota: El porcentaje de grasa fue obtenido de la Ecuación de Jackson-Pollock (1985); el porcentaje de masa muscular de la Ecuación de Matiegka el porcentaje de masa ósea de la Ecuación de Von Döbeln (Rocha 1974) y el porcentaje de masa residual de la Constante de Würch.