

Final Strike

直击高考

普通高

姓名

座号

准考证号

注意

1. 答题前，考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚，并认真核对条形码上的姓名、准考证号。
2. 选择题必须用 2B 铅笔填涂，不得用铅笔或圆珠笔答题。
3. 请按题号顺序在各题目的答题区域内作答，超出区域书写的答案无效；在草稿纸、答题卡上答题无效。
4. 保持卡面整洁，不要折叠、不要弄破。

选择题 (须用 2B 铅笔填涂)

一、单项选择题 (本题共 12 小题，每题 5 分，共 60 分)

1 [A][B][C][D]	5 [A][B][C][D]	9 [A][B][C][D]
2 [A][B][C][D]	6 [A][B][C][D]	10 [A][B][C][D]
3 [A][B][C][D]	7 [A][B][C][D]	11 [A][B][C][D]
4 [A][B][C][D]	8 [A][B][C][D]	12 [A][B][C][D]

非选择题 (须用 0.5 毫米的黑色签字笔书写)

二、填空 (本题共 4 小题，每题 5 分，共 20 分)

13. _____

14. _____

15. _____

16. _____

三、解答题 (一) 必考题

17. (12 分)

普通高

姓名

座号

准考证号

注意

1. 答题前，考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚，并认真核对条形码上的姓名、准考证号。
2. 选择题必须用 2B 铅笔填涂；非选择题必须用 0.5 毫米黑色签字笔答题，不得用铅笔或圆珠笔答题；字体工整、笔迹清晰。
3. 请按题号顺序在各题目的答题区域内作答，超出区域书写的答案无效；在草稿纸、答题卡上答题无效。
4. 保持卡面整洁，不要折叠、不要弄破。

贴条形码区

由考生本人负责粘贴

考生禁填

缺考标记 ☐

缺考考生由监考人员贴条形码并用 2B 铅笔填涂缺考标记

选择题 (须用 2B 铅笔填涂)

一、单项选择题 (本题共 12 小题，每题 5 分，共 60 分)

1 [A][B][C][D]	5 [A][B][C][D]	9 [A][B][C][D]
2 [A][B][C][D]	6 [A][B][C][D]	10 [A][B][C][D]
3 [A][B][C][D]	7 [A][B][C][D]	11 [A][B][C][D]
4 [A][B][C][D]	8 [A][B][C][D]	12 [A][B][C][D]

非选择题 (须用 0.5 毫米的黑色签字笔书写)

二、填空 (本题共 4 小题，每题 5 分，共 20 分)

13. _____

14. _____

15. _____

16. _____

三、解答题 (一) 必考题

17. (12 分)

普通高等学校招生全国统一考试

数学答题卡

姓名

座号

准考证号

注意

1. 答题前，考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚，并认真核对条形码上的姓名、准考证号。
2. 选择题必须用 2B 铅笔填涂；非选择题必须用 0.5 毫米黑色签字笔答题，不得用铅笔或圆珠笔答题；字体工整、笔迹清晰。
3. 请按题号顺序在各题目的答题区域内作答，超出区域书写的答案无效；在草稿纸、答题卡上答题无效。
4. 保持卡面整洁，不要折叠、不要弄破。

贴条形码区

由考生本人负责粘贴

考生禁填

缺考标记 ☐

缺考考生由监考人员贴条形码并用 2B 铅笔填涂缺考标记

18. (12 分)

TutorCat

今日压轴，今日秒解。



由 导学猫教育教研团队 实时更新
抖音搜索高考专题首批受邀创作者



直击高考

TutorCat特别出品

2025高考压轴题 实时解析专栏

考场风云，唯快不破。

高考题刚落地，我们已上线。

《直击高考》由导学猫教育出品，专注实时更新全国各地高考压轴题解析

- 当日更新 | 高考当天即更压轴题解
- 题目原文+逐步推理 | 秒懂高分思路

新高考I卷

第19题 三角压轴

万题千法，一眼识真

题目 函数 $f(x) = 5 \cos x - \cos 5x$.

(1) 求 $f(x)$ 在 $[0, \frac{\pi}{4}]$ 的最大值;

(2) 给定 $\theta \in (0, \pi)$ 和 $\alpha \in R$, 证明: 存在 $y \in [\alpha - \theta, \alpha + \theta]$, 使得 $\cos y \leq \cos \theta$;

(3) 设 $b \in R$, 若存在 $\varphi \in R$ 使得 $5 \cos x - \cos(5x + \varphi) \leq b$ 对 $x \in R$ 恒成立, 求 b 的最小值.

第一问解析 (1) $f'(x) = 5 \sin(5x) - 5 \sin x$, 当 $\frac{\pi}{4} \geq x \geq \frac{\pi}{6}$ 时, $f'(x) \geq 0$, $f(x)$ 单调递增, 当 $\frac{\pi}{6} \geq x \geq 0$ 时, $f(x)$ 单调递减; $f(x) \leq f(\frac{\pi}{6}) = 3\sqrt{3}$;



第二问解析

$\cos y$ 为偶函数，故原题等价于证明：

– $\alpha \geq 0$ 时，存在 $y \in [\theta + \alpha, \theta - \alpha]$ ，使得 $\cos y \leq \cos \theta$ ；


– $\alpha < 0$ 时，存在 $y \in [\theta - \alpha, \theta + \alpha]$ ，使得 $\cos y \leq \cos \theta$ ；

证明： $\alpha \geq 0$ 时， $\cos \theta$ 单调递减，故存在 $y \in [\theta, \theta + \alpha]$ 使得 $\cos y \leq \cos \theta$ ；

$\alpha < 0$ 时， $\cos \theta$ 单调递减，故存在 $y \in [\theta, \theta - \alpha]$ 使得 $\cos y \leq \cos \theta$.


命题思路

在 $y = \cos x$ 上取一点 $(a, \cos a)$ ，构造以 a 为中点的区间



$$[a - \delta, a + \delta]$$

若 a 在递减的开区间上，



在 a 右侧一个极小的距离内，必定存在 $y > a$ 使得 $\cos y < \cos a$.

第三问解析



记 $F(x) = 5 \cos x - \cos(5x + \varphi)$, 记 $F(x)$ 极值点为 x_n , 则

$$F'(x_n) = -5 \sin x_n + 5 \sin(5x_n + \varphi) = 0$$

$$\sin x_n = \sin(5x_n + \varphi)$$

由 $\cos^2(5x_n + \varphi) + \sin^2(5x_n + \varphi) = 1$ 得:

$$\cos^2(5x_n + \varphi) = 1 - \sin^2(5x_n + \varphi) = 1 - \sin^2 x_n = \cos^2 x_n$$

$$\cos(5x_n + \varphi) = \pm \cos x_n$$

故 $F(x_n) = 5 \cos x_n \pm \cos x_n$, 具体的

$$\text{若 } x_p \text{ 为极大值点, } F(x_p) = 6 \cos x_p$$

$$\text{若 } x_q \text{ 为极小值点, } F(x_q) = 4 \cos x_q$$

原题等价于求 $F(x_p)$ 的最小值, $F(x_p)$ 周期为 2π , 记 $F(x) = h(\varphi)$, $h(\varphi)$ 周期为 2π , 故只需研究

$$x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{3}{2}\pi), \varphi \in (=\pi, \pi)$$

由 $F'(x_n) = 0$ 得:

$$x_{p1} = -\frac{\pi}{6} - \frac{\varphi}{6}, x_{q1} = 0 - \frac{\varphi}{6}, x_{p2} = \frac{\pi}{6} - \frac{\varphi}{6}$$

$$x_{p3} = \frac{5}{6}\pi - \frac{\varphi}{6}, x_{q2} = \pi - \frac{\varphi}{6}, x_{p4} = \frac{7}{6}\pi - \frac{\varphi}{6}$$

又 $x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 时, $F(x_p) > 0$, $x \in (\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2})$ 时, $F(x_p) < 0$, 故

$$F(x_{p1}), F(x_{p2}) > F(x_{q2}) > 0 > F(x_{q2}) > F(x_{p3}), F(x_{p4})$$

故只需考虑 $F(x_{p1}), F(x_{p2})$, 即 $6 \cos(-\frac{\pi}{6} - \frac{\varphi}{6})$ 与 $6 \cos(\frac{\pi}{6} - \frac{\varphi}{6})$,

记 $m = -\frac{\varphi}{6} \in (-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6})$, 即

$$\cos(m - \frac{\pi}{6}) \text{ 与 } \cos(m + \frac{\pi}{6})$$

以 m 为自变量, 根据对称性:

当 $m \in (0, \frac{\pi}{6})$ 时, 记 m 为 m_1 , $\cos(m_1 - \frac{\pi}{6}) > \cos(m_1 + \frac{\pi}{6})$, 此时

$F(x_p)$ 的最小值在 $x = m_1 + \frac{\pi}{6}$ 处取得



当 $m \in (-\frac{\pi}{6}, 0)$ 时, 记 m 为 m_2 , $\cos(m_2 - \frac{\pi}{6}) < \cos(m_2 + \frac{\pi}{6})$,

$F(x_p)$ 的最小值在 $x = m_2 - \frac{\pi}{6}$ 处取得

以 m 为自变量, 根据单调性:

$$m \in (0, \frac{\pi}{6}) \text{ 时, } \cos(-\frac{\pi}{6}) > \cos(m_1 + \frac{\pi}{6})$$

$$m \in (-\frac{\pi}{6}, 0) \text{ 时, } \cos(-\frac{\pi}{6}) > \cos(m_2 - \frac{\pi}{6})$$

故 $F(x_p)$ 的最小值在 $m = 0$, $x = \pm \frac{\pi}{6}$ 处取得

$$F_{\min}(x_p) = 6 \cos(\pm \frac{\pi}{6}) = 3\sqrt{3}.$$


命题思路

1. 极值点坐标轨迹

若 $f(x)$ 极值点为 x_1 , 利用 $f(x_1) = f'(x_1) = 0$ 解出 $a = h(x_1)$, 则 $(x_1, f(x_1))$ 的轨迹为

$$y = f(x, h(x)) \quad (\text{将} f(x) \text{中的} a \text{替换为} h(x))$$

2. 第二问的推论





新高考I卷

第14题 统计压轴

指示变量法，锋利暴击

一个箱子里有5个球，分别以1 ~ 5标号，若有放回取三次，记至少取出一次的球的个数 X ，则 $E(X) = \underline{\hspace{2cm}}$.

第一步：定义指示变量

我们定义 I_k 表示 第 k 个球是否出现过：

$$I_k = \begin{cases} 1 & \text{如果球 } k \text{ 在3次抽取中至少出现过一次} \\ 0 & \text{否则} \end{cases}$$

显然， X 就是这5个指标变量之和：

$$X = I_1 + I_2 + I_3 + I_4 + I_5$$

第二步：利用期望的线性

$$E(X) = E(I_1) + E(I_2) + E(I_3) + E(I_4) + E(I_5)$$

这就转化为：计算每个球在3次抽取中至少出现一次的概率。

由于抽球是均匀独立随机，每个球被抽到的概率是一样的，所以：

$$E(I_k) = P(\text{第 } k \text{ 个球至少出现一次})$$

第三步：计算单个球出现的概率



$$P(\text{球 } k \text{ 从未出现}) = \left(\frac{4}{5}\right)^3 = \frac{64}{125}$$

因此，球 k 至少出现一次的概率为：

$$E(I_k) = 1 - \left(\frac{4}{5}\right)^3 = 1 - \frac{64}{125} = \frac{61}{125}$$

第四步：求 $E(X)$

因为每个球独立，且都有相同的出现概率，所以：

$$E(X) = 5 \cdot \frac{61}{125} = \frac{61}{25}.$$



第18题 送分圆锥 还没开始就结束了

设椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$)，记 A 为椭圆下端点， B 为右端点，

$$|AB| = \sqrt{10}, \text{ 且椭圆 } C \text{ 的离心率为 } \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

(1) 求椭圆的标准方程；

(2) 设点 $P(m, n)$ ，设 R 是射线 AP 上一点， $|AR| \cdot |AP| = 3$ ，

(i) 求 R 的坐标 (用 m, n 表示)；

(ii) 设直线 OR 的斜率为 k_1 ，直线 OP 的斜率为 k_2 ，若 $k_1 = 3k_2$ ， Q 为椭圆上一点，求 $|PQ|$ 的最大值.

解析 (1) $\frac{x^2}{9} + y^2 = 1$;

(2) (i) 设 $\overrightarrow{AP} = (m, n+1)$ ， $\overrightarrow{AR} = \lambda \overrightarrow{AP} = \lambda(m, n+1)$ ，由题 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AR} = 3$ ，可得

$$\lambda = \frac{3}{|\overrightarrow{AP}|^2} = \frac{3}{m^2 + (n+1)^2}$$

则 $R[\frac{3m}{m^2 + (n+1)^2}, \frac{3(n+1)}{m^2 + (n+1)^2} - 1]$;

(ii) 由题 $k_{OR} = 3k_{OP}$ ，解得 $2n = 1 - \frac{1}{\lambda}$ ，代入得 $m^2 + (n+4)^2 = 18$;

设圆心为 $T(0, -4)$ ，要求 $|PQ| \leq |QT| + R = |QT| + 3\sqrt{2}$ ，设 $Q(3\cos\alpha, \sin\alpha)$ ，则

$$|QT|^2 = 9\cos^2\alpha + (\sin\alpha + 4)^2 = -8\sin^2\alpha + 8\sin\alpha + 25$$

当 $\sin\alpha = \frac{1}{2}$ 时， $|QT|_{\max} = 3\sqrt{3}$ ，故 $|PQ|_{\max} = 3\sqrt{2} + 3\sqrt{3}$.



第19题 概率压轴

全国最难？其实不然

甲、乙两人乒乓球练习，每个球胜者得1分，负者得0分，设每个球甲胜概率为 p ($\frac{1}{2} < p < 1$)，乙胜概率为 q ， $p + q = 1$ ，且各球胜负独立，对正整数 $k \geq 2$ ，记 p_k 为打完 k 个球后甲比乙至少多得2分的概率， q_k 为打完 k 个球后乙比甲至少多得2分的概率。

(1) 求 p_3, p_4 (用 p 表示)；

(2) 若 $\frac{p_4 - p_3}{q_4 - q_3} = 4$ ，求 p ；

(3) 证明：对任意正整数 m ， $p_{2m+1} - q_{2m+1} < p_{2m} - q_{2m} < p_{2m+2} - q_{2m+2}$ 。

先证左例

设在比赛 k 局后，甲比乙恰好多2分的概率为 P_k

$$p_{2m+1} = (p_{2m} - P_{2m}) + P_{2m} \cdot p$$

同理，设在比赛 k 局后，乙比甲恰好多2分的概率为 Q_k

$$q_{2m+1} = (q_{2m} - Q_{2m}) + Q_{2m} \cdot q$$

故 $p_{2m+1} - q_{2m+1} = (p_{2m} - P_{2m}) + P_{2m} \cdot p - (q_{2m} - Q_{2m}) - Q_{2m} \cdot q$ ，即证明

$$(p_{2m} - P_{2m}) + P_{2m} \cdot p - (q_{2m} - Q_{2m}) - Q_{2m} \cdot q < p_{2m} - q_{2m}$$

$$P_{2m} \cdot q > Q_{2m} \cdot p$$

又 $P_{2m} = C_{2m}^{m+1} p^{m+1} q^{m-1}$ ， $Q_{2m} = C_{2m}^{m+1} p^{m-1} q^{m+1}$ ，代入化简即： $p > q$ ，成立。

再证右侧



设在比赛 k 局后，甲比乙恰好多4分的概率为 A_k

$$p_{2m+2} = (p_{2m} - A_{2m}) + A_{2m} \cdot p^2$$

设在比赛 k 局后，乙比甲恰好多4分的概率为 B_k

$$Q_{2m+2} = (q_{2m} - B_{2m}) + B_{2m} \cdot q^2$$

同理只需证： $A_{2m}(p^2 - 1) > B_{2m}(q^2 - 1)$,

又 $A_{2m} = C_{2m}^{m+2} p^{m+2} q^{m-2}$, $B_{2m} = C_{2m}^{m-2} p^{m-2} q^{m+2}$, 代入即

$$p^4(p^2 - 1) > q^4(q^2 - 1)$$

$$p^4(p - 1)(p + 1) > q^4(q - 1)(q + 1)$$

$$p^3(p + 1) > q^3(q + 1)$$

$x^3(x + 1)$ 单调递增，故 $p^3(p + 1) > q^3(q + 1)$ ，成立。

命题思路

非对称随机游走模型，其实并没有太大难度，比较老套；

假设我们在一维空间中进行非对称随机游走，定义状态为 X_t ，其中 X_t 表示在时间 t 时刻的位置。每次步伐的变化量 ΔX_t 可以取两个可能的值：

- +1（前进），以概率 p ；
- -1（后退），以概率 $1 - p$ ，其中 $p \neq 0.5$ ，即非对称。

在这种情况下，随机游走的递推关系可以表示为：

$$X_{t+1} = X_t + \Delta X_t$$

其中， ΔX_t 是一个随机变量，它可以取值+1或-1，分别对应前进和后退。

- 偏移现象：非对称随机游走常常用来模拟有方向性、偏移的过程，例如股市价格变动中多头或空头市场的趋势。
- 非平衡态：由于步伐的概率不相等，非对称随机游走往往会偏向某一方向，从而形成持久的非平衡态。
- 长时间行为：在长时间尺度下，非对称随机游走通常会趋向某种稳态分布，但其偏移方向和速度受到步伐概率差异的影响。

压轴不压心，破局靠真解。

评论区等你亮绝招，快把你的解答/看法发在评论区一起讨论
和进步，也可进主页粉丝群深聊。

