IMMUNOTHÉRAPIE ORALE (ITO)
Directives sécuritaires pour prendre la dose d'allergène chaque jour

PRISE QUOTIDIENNE

- Prendre la dose prescrite chaque jour à un moment permettant 60 minutes d'observation après la prise.
- Ne pas augmenter la dose à la maison sans l'accord de la clinique d'allergie.
- Prendre la dose avec une collation ou un repas, en respectant les autres allergies alimentaires.
- Prendre les médicaments prescrits avant la dose, par exemple un antihistaminique, selon les directives.

EN CAS D'OUBLI

- **1-24 heures :** Prendre la dose quotidienne habituelle. Ne JAMAIS donner deux doses la même journée.
- **2 à 4 jours :** Prendre la MOITIÉ de la dose habituelle, puis reprendre la pleine dose le lendemain.
- **Plus de 5 jours :** Communiquer avec la clinique par courriel allergie@centreup.ca avant de recommencer. La reprise devra se faire sous supervision. Cette interruption peut entraîner un retard dans la progression du traitement.

La prise quotidienne est essentielle pour maintenir l'efficacité du traitement et réduire le risque de réactions.

COFACTEURS POUVANT AUGMENTER LE RISQUE DE RÉACTION

- Éviter l'exercice intense, l'alcool, et les bains chauds 1 heure avant et 2 heures après la dose.
- Lorsque possible, privilégier **l'acétaminophène** plutôt que les anti-inflammatoires comme ~~*l'ibuprofène*~~.
- Certaines sont plus à risque pendant les menstruations. Au besoin, aviser la clinique par courriel (allergie@centreup.ca) pour ajustement.

EN CAS DE MALADIE

1. Vomissements ou gastro-entérite

Ne PAS donner la dose. Lorsque les vomissements sont complètement résolus depuis plus de 24 heures, reprendre avec une demi-dose, puis la pleine dose le lendemain. Aviser la clinique par courriel (allergie@centreup.ca) si les vomissements durent plus de 3 jours.

2. Fièvre ou maladie importante

En présence d'une fièvre de 38,5 °C ou plus, d'une fatigue importante ou d'une maladie significative, réduire la dose de MOITIÉ. Reprendre la pleine dose une journée après la résolution des symptômes.

EN CAS DE RÉACTION

- **Symptômes légers :** Des démangeaisons dans la bouche ou des maux de ventre peuvent survenir. S'ils sont incommodants, prendre l'antihistaminique prescrit 30 minutes avant la dose. Communiquer avec la clinique si cela ne suffit pas allergie@centreup.ca. Ne PAS cesser les doses sauf indication contraire.
- **Réaction sévère :** Administrer immédiatement l'auto-injecteur d'épinéphrine et appeler le 911. Une fois stabiliser, informe la clinique par courriel allergie@centreup.ca pour planifier la prochaine dose.

Ce document fournit de l'information générale et ne remplace pas les conseils individualisés de votre professionnel de la santé.

© 2026