centre d'urgences pédiatriques et soins spécialisés

Provocation à l'œuf cuit

PRÉPARATION D'UN TEST DE PROVOCATION ORALE À L'ŒUF CUIT AU FOUR

Préparez les muffins à la maison et apportez-en au moins DEUX (2) au rendez-vous. N'utilisez pas cette recette si elle contient un autre aliment auquel votre enfant est allergique; utilisez uniquement des substituts tolérés. N'ajoutez pas de fruits frais ou séchés, car ils peuvent nuire à une cuisson uniforme.

MUFFINS DE BASE À L'ŒUF CUIT (6 MUFFINS)

Quantité	Ingrédient
1 tasse	Farine tout usage (blé)
½ tasse	Sucre
¼ c. à thé	Sel
1 c. à thé	Poudre à pâte
2 c. à soupe	Huile de canola ou autre huile végétale tolérée
½ c. à thé	Extrait de vanille
2 gros	Œufs battus
½ tasse	Boisson de riz ou autre boisson végétale tolérée; lait de vache si toléré

PRÉPARATION

1. Préchauffer complètement le four à 180 °C (350 °F).
2. Déposer 6 caissettes dans un moule à muffins.
3. Mélanger les ingrédients liquides : boisson végétale ou lait, huile, vanille et œufs battus.
4. Dans un autre bol, mélanger la farine, le sucre, le sel et la poudre à pâte.
5. Ajouter les ingrédients liquides aux ingrédients secs en une seule fois. Mélanger délicatement, environ 15 à 20 mouvements. Ne pas trop mélanger; quelques petits grumeaux sont acceptables.
6. Répartir toute la pâte également dans les 6 caissettes.
7. Cuire 30 à 35 minutes, jusqu'à ce que les muffins soient bien dorés et fermes au toucher. Laisser refroidir complètement.

SI VOTRE ENFANT RÉUSSIT LE TEST

- La consommation régulière de produits contenant de l'œuf bien cuit est importante pour maintenir la tolérance.
- Les muffins, gâteaux et petits gâteaux doivent être cuits à 180 °C (350 °F) pendant au moins 20 minutes, avec 1 ou 2 œufs incorporés à la pâte.
- Éviter les glaçages, garnitures ou crèmes pouvant contenir de l'œuf cru ou insuffisamment cuit.
- Lorsque les produits maison sont tolérés, les produits commerciaux peuvent être consommés si l'œuf apparaît comme troisième ingrédient ou plus loin dans la liste.
- Continuer d'éviter les œufs crus ou peu cuits : brouillés, au plat, à la coque ou pochés, ainsi que la mayonnaise, les sauces à base d'œufs, la vinaigrette César, les crèmes dessert, le glaçage, la meringue, la quiche, les boulettes contenant de l'œuf, les aliments panés à base d'œuf et le pain doré.

Ce document fournit de l'information générale et ne remplace pas les conseils individualisés de votre professionnel de la santé.
© 2026