centre d'urgences pédiatriques et soins spécialisés

Provocation à LAIT cuit

PRÉPARATION D'UN TEST DE PROVOCATION AU LAIT CUIT AU FOUR

Préparez les muffins à la maison. Apportez 2 muffins de format régulier a votre rendez-vous. N'ajoutez pas de fruits frais ou séchés ni de pépites de chocolat. Suivez attentivement la recette afin que le test contienne suffisamment de protéines de lait.

MUFFINS AU LAIT CUIT (6 MUFFINS)

Quantité	Ingrédient
1 tasse	Lait de vache à 2 %
2 c. à soupe	Huile de canola
1 c. à thé	Extrait de vanille
1	Œuf, ou substitut approprié si nécessaire
1¼ tasse	Farine tout usage
½ tasse	Sucre
¼ c. à thé	Sel
2 c. à thé	Poudre à pâte

PRÉPARATION

1. Préchauffer complètement le four à 180 °C (350 °F) et déposer 6 caissettes dans un moule.
2. Fouetter le lait, l'huile, la vanille et l'œuf ou son substitut.
3. Dans un autre bol, mélanger la farine, le sucre, le sel et la poudre à pâte.
4. Ajouter les ingrédients liquides aux ingrédients secs et fouetter jusqu'à homogénéité. Quelques petits grumeaux sont acceptables.
5. Répartir toute la pâte dans les 6 caissettes. Il ne doit rester aucune pâte.
6. Cuire 30 à 35 minutes, jusqu'à ce que les muffins soient bien dorés et fermes. Un cure-dent inséré au centre doit ressortir propre. Si les muffins ne sont pas complètement cuits, le test pourrait être annulé.

SI VOTRE ENFANT RÉUSSIT LE TEST

- La consommation régulière de produits contenant du lait dans un mélange cuit est importante pour maintenir la tolérance.
- Les muffins, gâteaux et petits gâteaux doivent être cuits à 180 °C (350 °F) pendant au moins 20 minutes, avec le lait ou les produits laitiers incorporés à la pâte.
- Éviter les glaçages, garnitures ou crèmes. Continuer d'éviter les produits laitiers frais ou moins cuits.

Ce document fournit de l'information générale et ne remplace pas les conseils individualisés de votre professionnel de la santé.
© 2026