centre d'urgences pédiatriques et soins spécialisés

# SOINS POUR L'ECZÉMA

**Vous (votre enfant) vient de recevoir des soins pour une affection eczémateuse et une ordonnance a été envoyée à votre pharmacie pour des corticostéroïdes topiques. Voici des principes généraux pour accompagner la prescription et aider à maximiser l'efficacité des soins.**

## QU'EST-CE QU'UNE UNITÉ DE BOUT DE DOIGT (FTU, en anglais, fingertip unit) ?

- Une FTU est la quantité de stéroïde topique qui est extraite d'un tube standard le long du bout d'un doigt d'un adulte.
- Le bout du doigt s'étend de l'extrémité du doigt jusqu'au premier pli du doigt.
- Une FTU suffit à traiter une surface de peau deux fois plus grande qu'une "empreinte de main", c'est-à-dire le plat d'une main d'adulte avec les doigts rapprochés.



- Si vous êtes le parent d'un enfant, vous pouvez évaluer la quantité de stéroïdes topiques à utiliser en utilisant votre main (d'adulte) pour mesurer la surface de peau affectée sur l'enfant. A partir de là, vous pouvez calculer la quantité de stéroïdes topiques à utiliser sur la base d'une empreinte de main d'adulte de 2 fois FTU.
    - Exemple : si l'eczéma de votre enfant couvre une surface de 4 empreintes de main d'adulte, il faudra 2 FTU de crème stéroïdienne.

## QUEL EST LE NOMBRE ESTIMATIF FTU HABITUELLEMENT NÉCESSAIRES ?

| | <1 an d'âge | 1-2 ans | 3-5 ans | 6-10 ans | 11-17 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| Visage et cou | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 |
| Bras et main | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
| Jambe et pied | 1.5 | 1.5 | 3 | 4.5 | 4 |
| Thorax et abdomen (avant) | 1 | 1 | 3 | 3.5 | 3 |
| Dos et fesses | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 5 | 5 |

## QUAND DOIS-JE CESSER D'APPLIQUER LA CRÈME DE STÉROÏDES ?

- La plupart des médecins prescrivent d'appliquer la crème stéroïdienne pendant une " éruption d'eczéma " (définie comme une rougeur et des démangeaisons) pendant au moins deux (2) semaines ou jusqu'à ce que la situation s'améliore ou se résorbe.
- Toutefois, il est préférable de ne pas arrêter brusquement. Une fois que la situation s'est améliorée, appliquez la crème sur les zones affectées tous les deux jours pendant encore deux (2) semaines, puis arrêtez.
- Des variations de ce qui précède peuvent être conseillées par votre médecin.

## QUAND DOIS-JE CESSER D'APPLIQUER LA CRÈME HYDRATANTE ?

- Jamais. Il est essentiel de veiller à ce que la peau soit toujours hydratée. Le faire le plus souvent possible permet de prévenir les exacerbations de l'eczéma.

*Les recommandations fournies dans ce document sont basées sur les connaissances générales. Cependant, le matériel éducatif présenté ici ne remplace PAS le jugement clinique nécessaire pour répondre aux différents besoins des patients.