centre d'urgences pédiatriques et soins spécialisés

Procédure Pilonidal Gips

Qu'est-ce qu'une procédure de sinus pilonidal Gips?

Le procédure Gips est une technique chirurgicale mineure utilisée pour traiter la maladie pilonidale, qui se manifeste par un kyste ou un abcès douloureux près du coccyx. La procédure est réalisée sous anesthésie locale, généralement en moins d'une heure. Voici comment cela fonctionne :

1. **Identification des fosses** : Le chirurgien identifie les petites ouvertures ou fosses à la surface de la peau, qui sont les sources de la maladie pilonidale.
2. **Curetage** : À l'aide d'une petite curette, le chirurgien nettoie les fosses et retire les poils, les débris et les tissus infectés.
3. **Incisions minimales** : De petites incisions peuvent être faites pour faciliter le drainage en cas de présence d'un abcès, mais elles sont minimales par rapport aux excisions traditionnelles.
4. **Cicatrisation** : Les plaies sont généralement laissées à guérir d'elles-mêmes, ce qui réduit le besoin de sutures extensives et favorise une récupération plus rapide.

Que dois-je attendre dans les jours suivant la procédure ?

- La douleur est normalement minime et limitée à quelques jours. Prenez de l'ibuprofène ou de l'acétaminophène au besoin. Suivez la posologie indiquée sur le contenant.
- Vous pouvez retourner à l'école le lendemain, et également reprendre le sport et la natation dès que vous vous sentez à l'aise.
- Vous pouvez ressentir un certain écoulement ou saignement pendant 1 à 2 semaines ; une serviette hygiénique peut être utilisée pour éviter de salir vos sous-vêtements.
- La guérison complète peut prendre jusqu'à 4 semaines.

Que devriez-vous faire dans les jours suivant la procédure ?

- **REPOS** : Au cours des 24 premières heures, reposez-vous et évitez les activités physiques. Laissez le pansement en place.
- **RETIRER LE PANSEMENT** : Le 2ème jour après la chirurgie, retirez le pansement.
- **COMMENCER À TREMPER LA ZONE 3 fois par jour** : Trempez la zone dans de l'eau tiède (bain ou bain de siège) pendant 15 minutes chaque fois. Continuez ces bains jusqu'à ce que les trous que nous avons faits se soient refermés (cela peut prendre jusqu'à 2 semaines).
- **VÉRIFIER LES POILS** : Faites inspecter la zone quotidiennement par quelqu'un pour vous assurer qu'aucun poil ne s'est incrusté dans les plaies. Utilisez une loupe et une lampe de poche si nécessaire. Retirez tous les poils avec une pince à épiler.
- **RASER LA ZONE** : Gardez la zone rasée pour éviter que de nouveaux poils ne pénètrent.
- **ENVISAGEZ L'ÉPILATION AU LASER** : Après la cicatrisation de la plaie (un mois plus tard), l'épilation au laser peut aider à prévenir le retour du sinus chez votre esthéticien (non couvert par la RAMQ).

Quelles complications devrais-je surveiller ?

- Il y a une rougeur qui se propage de la coupure à la peau environnante.
- La plaie fait plus mal qu'avant.
- Il y a du pus (liquide jaune/vert, parfois avec une mauvaise odeur) qui sort de la plaie.
- L'un des signes ci-dessus accompagnés de fièvre (> 38 degrés Celsius).
- Un saignement que vous ne pouvez pas arrêter avec un pansement compressif.

Quoi faire en cas de complication de plaie ?

- Retournez au Centre UP entre 8h et 20h ; aucun rendez-vous n'est nécessaire.
- Si vous remarquez quelque chose pendant la nuit, à moins d'un saignement important ou d'une douleur sévère, vous pouvez vous présenter le lendemain au matin.

*Les recommandations fournies dans ce document sont basées sur les connaissances générales et l'expérience dans le domaine. Cependant, le matériel pédagogique contenu dans ce document ne remplace PAS le jugement clinique nécessaire pour répondre aux différents besoins des patients.