centre d'urgences pédiatriques et soins spécialisés

Onychectomie | Ongle Incarné

Qu'est-ce qu'une onychectomie avec la procédure de van den Bos?

Une onychectomie est une chirurgie pour enlever une partie ou la totalité de votre ongle de pied, indiquée lorsque les mesures conservatrices n'ont pas réussi à résoudre un orteil sévèrement enflammé par un ongle incarné persistant. Nous ajoutons généralement la procédure Van den Bos pour enlever également une partie de la peau autour afin de prévenir la récidive.

Que dois-je attendre dans les jours suivant la procédure ?

- **Douleur :** Vous pouvez ressentir de la douleur la première semaine, qui peut être soulagée par de l'ibuprofène ou de l'acétaminophène (suivez les instructions sur la bouteille).
- **DANS LES 24 PREMIÈRES HEURES :** Ne retirez pas le bandage de pression et gardez votre pied surélevé autant que possible pour aider à minimiser la douleur et le saignement post-opératoires. Si le sang s'infiltre à travers, appliquez simplement de la gaze supplémentaire sur le pansement de pression. NE RETIREZ PAS le bandage original pendant 24 heures.
- **RETOUR à l'école :** Vous pouvez retourner à l'école le lendemain.

Que devriez-vous faire dans les jours suivant la procédure ?

- **RETRAIT DU BANDAGE :** Le deuxième jour après la chirurgie, faites tremper votre bandage de pression dans de l'eau tiède puis retirez-le lentement.
- **COMMENCEZ À TREMPEZ LA ZONE** 3 fois par jour :
    - Trempez la zone dans de l'eau tiède (dans une baignoire ou un bain de siège) pendant 15 minutes à chaque fois.
    - Gardez votre orteil propre et sec entre les trempages.
- **PANSEMENT :** Un pansement léger (ex. gaze ou pansement adhésif) peut être appliqué au besoin.
    - Vous pouvez constater de petites quantités de suintement, de saignement ou de rougeur pendant jusqu'à 4 semaines, après quoi la guérison complète devrait être achevée.
- **ÉVITEZ LES CHAUSSURES SERRÉES** qui appuient sur votre orteil.
- **ÉVITEZ LES SPORTS** pendant 1 semaines suivant la procédure.

Quelles complications devrais-je surveiller ?

- Il y a une rougeur qui se propage de la coupure à la peau environnante.
- La plaie fait plus mal qu'avant.
- Il y a du pus (liquide jaune/vert, parfois avec une mauvaise odeur) qui sort de la plaie.
- L'un des signes ci-dessus accompagnés de fièvre (> 38 degrés Celsius).
- Un saignement que vous ne pouvez pas arrêter avec un pansement compressif.

Quoi faire en cas de complication de plaie ?

- Retournez au Centre UP entre 8h et 20h ; aucun rendez-vous n'est nécessaire.
- Si vous remarquez quelque chose pendant la nuit, à moins d'un saignement important ou d'une douleur sévère, vous pouvez vous présenter le lendemain au matin.

*Les recommandations fournies dans ce document sont basées sur les connaissances générales et l'expérience dans le domaine. Cependant, le matériel pédagogique contenu dans ce document ne remplace PAS le jugement clinique nécessaire pour répondre aux différents besoins des patients.