centre d'urgences pédiatriques et soins spécialisés

PURPURA DE HENOCH-SCHÖNLEIN

Vous (ou votre enfant) a reçu un diagnostic de Purpura de Henoch-Schönlein (PHS). Le PHS est une inflammation des vaisseaux sanguins. On ne connaît pas exactement sa cause. Chez plusieurs enfants, elle semble survenir après une infection récente, lorsque le système immunitaire réagit de façon inhabituelle. **Il n'est pas contagieux** et, dans la très grande majorité des cas, les enfants guérissent complètement.

QUELS SYMPTÔMES LE PHS PEUT-IL CAUSER?

Le PHS peut toucher différentes parties du corps :

- **LA PEAU** : Petites taches ou plaques rouges ou violettes, surtout sur les jambes et les fesses. L'éruption peut apparaître par poussées pendant plusieurs semaines.
- **LES ARTICULATIONS** : Douleur ou enflure des genoux, des chevilles ou d'autres articulations. Certains enfants boitent ou refusent temporairement de marcher.
- **LE VENTRE** : Douleurs abdominales, souvent sous forme de crampes. Nausées ou vomissements. Plus rarement, présence de sang dans les selles.
- **LES REINS** : Une inflammation des reins peut survenir sans symptôme. Le seul signe peut être la présence de sang ou de protéines dans l'urine.
- **PLUS RAREMENT** : Douleur ou enflure d'un testicule chez les garçons. Exceptionnellement, d'autres organes peuvent être atteints.

EST-CE UNE MALADIE GRAVE?

- **NON**. La plupart des enfants se rétablissent complètement en quelques semaines.
- Toutefois, une atteinte des reins peut apparaître même lorsque l'éruption et les douleurs ont disparu. C'est pourquoi un suivi est essentiel pendant 6 mois.

COMMENT TRAITE-T-ON LE PHS?

Il n'existe pas de traitement qui fasse disparaître immédiatement le PHS. Les soins visent surtout à soulager les symptômes :

- Repos selon les besoins et une bonne hydratation.
- Médicaments contre la douleur recommandés par votre professionnel de la santé.
- Dans certains cas, un traitement par Cortisone peut être prescrit pour des douleurs abdominales importantes ou certaines complications.

QUAND CONSULTER RAPIDEMENT?

- Une douleur abdominale importante ou qui s'aggrave.
- Des vomissements répétés.
- Du sang dans les selles ou dans l'urine.
- Une douleur ou un gonflement important d'un testicule.
- Une somnolence inhabituelle ou tout symptôme qui vous inquiète.

*Les recommandations fournies dans ce document sont basées sur les connaissances générales et l'expérience dans le domaine. Cependant, le matériel pédagogique contenu dans ce document ne remplace PAS le jugement clinique nécessaire pour répondre aux différents besoins des patients. © 2026

centre d'urgences pédiatriques et soins spécialisés

PURPURA DE HENOCH-SCHÖNLEIN

QUE DOIS-JE SURVEILLER À LA MAISON?

L'atteinte des reins est souvent silencieuse. Votre enfant peut sembler aller très bien alors qu'une inflammation est présente. Un simple test d'urine permet de la détecter tôt et d'assurer un traitement ou un suivi approprié au besoin.

COMMENT SURVEILLER LES URINES?

Vérifiez **la première urine du matin** à l'aide des bandelettes prescrites :


✅ **Chaque lundi matin pendant les 6 premières semaines**

✅ **Puis le premier lundi matin de chaque mois jusqu'à 6 mois après le diagnostic**

QUE FAIRE SI LE TEST D'URINE EST ANORMAL?

Si les bandelettes détectent du **sang ou des protéines**, demandez une évaluation par un professionnel de la santé **dans les prochains jours**, même s'il semble aller bien.

Une consultation à l'urgence n'est généralement PAS nécessaire, sauf si votre enfant présente *également* des symptômes inquiétants.



BONNE NOUVELLE !

La très grande majorité des enfants guérissent complètement du PHS. La surveillance des urines est une mesure préventive visant à détecter précocement les rares cas où les reins sont touchés.

*Les recommandations fournies dans ce document sont basées sur les connaissances générales et l'expérience dans le domaine. Cependant, le matériel pédagogique contenu dans ce document ne remplace PAS le jugement clinique nécessaire pour répondre aux différents besoins des patients. © 2026