centre d'urgences pédiatriques et soins spécialisés

# PLAN D'URGENCE POUR L'ANAPHYLAXIE

**Vous (ou votre enfant) présentez un risque d'anaphylaxie, une réaction allergique sévère qui peut être mortelle. Voici des recommandations pour reconnaître et gérer une réaction anaphylactique.**

## COMMENT RECONNAÎTRE UNE RÉACTION ANAPHYLACTIQUE ?

**La détection précoce des symptômes et le traitement immédiat pourraient sauver une vie**

- **PEAU** : Urticaire, rougeur, démangeaisons, enflure (visage, lèvres, langue).
- **RESPIRATION** : Toux, respiration sifflante (silement), essoufflement, serrement de la gorge, voix rauque, difficulté à avaler, congestion nasale ou symptôme de type rhume des foins (nez qui coule ou qui pique, larmoiement, éternuements).
- **DIGESTION** : Nausées, vomissements, diarrhée, douleurs abdominales.
- **CIRCULATION** : Peau pâle ou bleutée, pouls faible, étourdissements, perte de conscience.
- **AUTRES** : Anxiété, sentiment de détresse.

Si vous avez une **apparition soudaine et/ou rapide de n'importe quelle combinaison de DEUX** (2) catégories de symptôme **OU si vous avez une difficulté respiratoire sévère** ou malaise sévère ou perte de conscience, utiliser votre auto0injecteur d'épinéphrine.

## QUE FAIRE EN CAS DE RÉACTION ANAPHYLACTIQUE ?

1. **ADMINISTREZ IMMÉDIATEMENT L'ÉPINÉPHRINE** avec un auto-injecteur
2. **APPELEZ LE 9-1-1**
3. Administrez une 2$^{eme}$ dose après 5 minutes si les symptômes continuent ou s'aggrave.
4. Allez à l'urgence. Une surveillance médicale est nécessaire pendant au moins 4 heures**.**
5. INFORMEZ UN PROCHE (parent, tuteur, etc.)




## OÙ GARDER VOTRE AUTO-INJECTEUR ?

- Ayez toujours avec vous (sac à dos, poche, sac).
- Ne pas laisser dans une voiture (température extrême altère l'efficacité).
- Assurez-vous que les personnes autour de vous savent où le trouver.
- **Vérifiez la date d'expiration** de votre auto-injecteur et remplacez-le à temps.

## COMMENT PRÉVENIR UNE RÉACTION ALLERGIQUE ?

- Portez un bracelet d'alerte médicale indiquant vos allergies.
- Évitez tout contact avec vos allergènes connus.
- Informez votre entourage (famille, amis, enseignants) sur l'utilisation de l'épinéphrine.

*Les recommandations fournies dans ce document sont basées sur les connaissances générales et l'expérience dans le domaine. Cependant, le matériel pédagogique contenu dans ce document ne remplace PAS le jugement clinique nécessaire pour répondre aux différents besoins des patients.