



ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE

Analyse III - Lebesgue

MATH-208

Note de

Anthony Gabino

Professeur : Krieger Joachim

Dernière mise à jour 23 septembre 2026
Bachelor Mathématique
Lausanne

Table des matières

Cours	5
1 Analyse vectorielle dans $\mathbb{R}^n$	7
1.1 Notions d'intégration	7
1.1.1 Intégrale curviligne	7
1.1.2 Circulation d'un champ vectoriel	8
1.1.3 Concepts topologiques	10
1.1.4 Green-Riemann et potentiels scalaires	10

TABLE DES MATIÈRES

Cours

Cours n° 1– 7 septembre	7
Cours n° 2– 10 septembre	9
Cours n° 3– 14 septembre	11
Cours n° 4– 17 septembre	14

TABLE DES MATIÈRES

Analyse vectorielle dans $\mathbb{R}^n$

Définition 1.1 (Définition de base). Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un **domaine**, c'est-à-dire un sous-ensemble ouvert et connexe, on appelle

1. $f \in C^k(U, \mathbb{R})$, $k \geq 0$ un **champ scalaire**.
2. $\mathbf{f} \in C^k(U, \mathbb{R}^n)$ un **champ vectoriel**.

Définition 1.2 (Gradient). Soit $g \in C^1(U, \mathbb{R})$ un champ scalaire. Alors on appelle

$$\mathbf{f} = \nabla g$$

le **gradient** de g . Dans ce cas, on dit que $\mathbf{f}$ dérive d'un champ scalaire $\mathbf{f}$.

1.1 Notions d'intégration

Définition 1.3 (chemin). Un **chemin** est une application continue

$$\gamma : I \rightarrow U$$

où $I = [s, t]$, $s < t \in \mathbb{R}$, et tel qu'il existe une partition de $I = \bigcup_{j=1}^N I_j$ où les I_j sont des intervalles fermés et d'intérieurs disjoints, tel que les restrictions

$$\gamma|_{I_j} \in C^1(I_j, U)$$

autrement dit γ est *continue par morceaux*. De plus on dira que γ est un **lacet** ou **chemin fermé** si $\gamma(s) = \gamma(t)$.

1.1.1 Intégrale curviligne

Définition 1.4 (Intégrale curviligne). Soit $f \in C^0(U, \mathbb{R})$ un champ scalaire, et soit $\gamma : I \rightarrow U$ un chemin, alors on définit l'**intégrale curviligne** de f le long de γ par

$$\int_{\gamma} f \, ds = \int_I f(\gamma(t)) \|\gamma'(t)\| \, dt =: \sum_{j=1}^N \int_{I_j} f(\gamma(t)) \|\gamma'(t)\| \, dt$$

où $\|\gamma'(t)\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n \gamma'_i(t)^2}$.

Définition 1.5 (Reparamétrisation d'un chemin). Soit $\gamma : [s, t] \rightarrow U$ un chemin et soit

$$\varphi : [\tilde{s}, \tilde{t}] \rightarrow [s, t]$$

un difféomorphisme de classe C^1 tel que $\varphi' > 0$. Alors la composition $\gamma \circ \varphi : [\tilde{s}, \tilde{t}] \rightarrow U$ est encore un chemin.

Théorème 1.1 (Invariance par reparamétrisation). Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un domaine, $f \in C^0(U)$ un champ scalaire, $\gamma : I \rightarrow U$ et $\gamma \circ \varphi : \tilde{I} \rightarrow U$ une reparamétrisation. Alors

$$\int_{\gamma \circ \varphi} f \, ds = \int_{\gamma} f \, ds$$

DÉMONSTRATION :

Soit $\tilde{I} = [\tilde{s}, \tilde{t}]$, $I = [s, t]$. Alors

$$\int_{\gamma \circ \varphi} f \, ds = \int_{\tilde{I}} f(\gamma \circ \varphi(x)) \|(\gamma \circ \varphi)'(x)\| \, dx = \int_{\tilde{s}}^{\tilde{t}} f(\gamma \circ \varphi(x)) \|\gamma' \circ \varphi(x) \varphi'(x)\| \, dx = \int_{\tilde{s}}^{\tilde{t}} f(\gamma \circ \varphi(x)) \varphi'(x) \|\gamma' \circ \varphi(x)\| \, dx$$

et donc par changement de variable on a bien,

$$\int_{\gamma \circ \varphi} f \, ds = \int_{\varphi(\tilde{s})}^{\varphi(\tilde{t})} f(\gamma(y)) \|\gamma'(y)\| \, dy = \int_{\gamma} f \, ds$$

d'où le résultat. $\square$

1.1.2 Circulation d'un champ vectoriel

Définition 1.6 (Circulation). Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un domaine et $\mathbf{f} \in C^0(U, \mathbb{R}^n)$ un champ vectoriel et $\gamma : I \rightarrow U$ un chemin, alors on définit la **circulation** du champ vectoriel le long de γ par

$$\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot ds = \int_I \mathbf{f}(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) \, dt$$

où $\cdot$ désigne le produit scalaire euclidien.

Remarque 1.1. L'intégrale est invariante par reparamétrisation. Mais si on change le sens de parcours, alors le signe change. Par exemple, soit $\gamma : [0, 1] \rightarrow U$ un chemin et $\varphi : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$, $\varphi(t) = 1 - t$ alors on trouve bien

$$\int_{\gamma \circ \varphi} \mathbf{f} \cdot ds = - \int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot ds$$

alors on peut noter plus simplement $\gamma \circ \varphi = -\gamma$.

Définition 1.7 (Concaténation de chemin). Soit $\gamma : [a, b] \rightarrow U$ et $\tilde{\gamma} : [b, c] \rightarrow U$ des chemins tels que $\gamma(b) = \tilde{\gamma}(b)$, alors on définit la **concaténation** $\gamma \oplus \tilde{\gamma}$ par

$$\begin{aligned} \gamma \oplus \tilde{\gamma} : [a, c] &\longrightarrow U \\ t &\longmapsto \begin{cases} \gamma(u), & u \in [a, b] \\ \tilde{\gamma}(u), & u \in [b, c] \end{cases} \end{aligned}$$

Il est facile de voir que $\gamma \oplus \tilde{\gamma}$ est bien C^1 par morceaux et donc il s'agit bien d'un chemin.

On se demande s'il existe des champs vectoriels $\mathbf{f}$ tels que $\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot ds$ ne dépend que du point initial et du point final de γ .

Lemme 1.1. Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un domaine, $\mathbf{f} \in C^k(U)$ un champ vectoriel. Alors $\mathbf{f}$ à la propriétés que $\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot ds$ ne dépend que des extrémités des chemins si et seulement si $\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot ds = 0$ pour chaque lacet $\gamma : I \rightarrow U$.

DÉMONSTRATION :

Si $\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot ds$ ne dépend que des extrémités, on considère un lacet γ arbitraire. Alors on sait qu'il existe γ_1

et γ_2 tel que $\gamma = \gamma_1 \oplus -\gamma_2$ et donc a

$$\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\gamma_1 \oplus -\gamma_2} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\gamma_1} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} - \int_{\gamma_2} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = 0$$

Et inversement, alors si $\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = 0$ pour tout lacet $\gamma : I \rightarrow U$ et si γ_1, γ_2 lient $\mathbf{p}$ et $\mathbf{q}$, alors on peut introduire le lacet qui la concaténation de γ_1 et $-\gamma_2$ et donc

$$\int_{\gamma_1} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} - \int_{\gamma_2} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\gamma_1 \oplus -\gamma_2} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = 0$$

et donc on a bien la propriété voulue. □

Cours n° 2

7

Théorème 1.2. Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un domaine, et $\mathbf{f} \in C^k(U)$ un champ vectoriel, alors $\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = 0$ pour tout lacet γ si et seulement si $\mathbf{f}$ dérive d'un potentiel, donc s'il existe $g \in C^{k+1}(U, \mathbb{R})$ tel que $\mathbf{f} = \nabla g$.

DÉMONSTRATION :

Supposons que $\mathbf{f} = \nabla g$, et que $\gamma : [0, 1] \rightarrow U$ est un lacet, alors

$$\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \int_0^1 \nabla g(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt = \int_0^1 \frac{d}{dt} g(\gamma(t)) dt = g(\gamma(1)) - g(\gamma(0))$$

mais comme γ est un lacet alors $\gamma(1) = \gamma(0)$ et donc on a bien

$$\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = 0$$

Réciproquement supposons que $\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = 0$ pour tout lacet, alors il faut exhiber $g \in C^1(U)$ avec $\mathbf{f} = \nabla g$. Par connexité de U , on considère $p \in U$, et on pose

$$g(x) = \int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s}$$

où γ est un chemin arbitraire en U qui relie p à x . D'après les hypothèse, alors g est bien défini. Il est facile de voir que g est C^0 , il reste donc à montrer que g est C^1 et qu'on a bien $\nabla g = \mathbf{f}$. Or pour montrer que $\nabla g = \mathbf{f}$, et donc à fortiori que $g \in C^1(U)$ on calcule les dérivées partielles de g . Alors on a

$$\frac{\partial g}{\partial x_j}(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x + he_j) - g(x)}{h}$$

or

$$g(x + he_j) = \int_{\tilde{\gamma}} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s}$$

avec $\tilde{\gamma}$ est un chemin arbitraire qui lie p à $x + he_j$. Or par concaténation on peut écrire, $\tilde{\gamma} = \gamma \oplus \gamma_1$ où $\gamma_1 : [0, 1] \rightarrow U$, $\gamma_1(t) = x + the_j$ Et donc par hypothèse

$$g(x + he_j) = \int_{\gamma \oplus \gamma_1} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} + \int_{\gamma_1} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s}$$

Et donc on a

$$g(x + he_j) - g(x) = \int_{\gamma_1} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \int_0^1 \mathbf{f}(x + the_j) \cdot he_j dt = h \int_0^1 f_j(x + the_j) dt = h \int_0^1 f_j(x) dt + h \int_0^1 r_j(t, h, x) dt$$

où $r_j(t, h, x) = f_j(x + t h e_j) - f_j(x) \rightarrow 0$ et donc $h \int_0^1 r_j(t, h, x) dt = o(h)$ et donc

$$\frac{\partial g}{\partial x_j}(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x + h e_j) - g(x)}{h} = f_j(x)$$

Ainsi les dérivées partielles existent, sont continues, et g est continue, ainsi $g \in C^1(U)$ et $\nabla g = \mathbf{f}$. $\square$

Remarque 1.2. On voit que si $\mathbf{f} = \nabla g$ avec $g \in C^2(U)$ alors

$$\frac{\partial f_j}{\partial k} = \frac{\partial^2 g}{\partial x_k \partial x_j} = \frac{\partial^2 g}{\partial x_j \partial x_k} = \frac{\partial f_k}{\partial x_j}$$

Ainsi on condition nécessaire pour que $\mathbf{f} \in C^1(U, \mathbb{R}^n)$ dérive d'un potentiel est alors que

$$\forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad \frac{\partial f_j}{\partial x_i} - \frac{\partial f_i}{\partial x_j}$$

Cependant dans le cadre de ce cours, on va se restreindre au cas $n = 2$ ou $n = 3$, alors on a la condition nécessaire

$$\mathbf{f} = \nabla g \implies \text{rot } \mathbf{f} = 0$$

1.1.3 Concepts topologiques

Définition 1.8 (Homotopie). Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un domaine, et soient $\gamma_1, \gamma_2 : [0, 1] \rightarrow U$ deux lacets dans U possédant les mêmes points d'extrémité. Alors on dit que γ_1 est **homotope** à γ_2 s'il existe une application continue

$$\Gamma : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow U$$

telle que $\Gamma(0, t) = \gamma_1(t)$ et $\Gamma(1, t) = \gamma_2(t)$ et pour chaque $s \in [0, 1]$ fixé, $\Gamma(s, t)$ est un chemin qui lie les mêmes point d'extrémité que γ_1 et γ_2 . La définition est analogue pour les lacets.

Définition 1.9 (Contractibilité et simplement connexe). Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un domaine, et $\gamma : [0, 1] \rightarrow U$ un lacet, alors on dit que γ est **contractible** pourvu qu'il soit homotope à un lacet constant en U . En plus si $U \subset \mathbb{R}^n$ dont tous les lacets sont contractibles, alors on dira que U est **simplement connexe**.

Définition 1.10 (Étoilé). ON appelle un domaine $U \subset \mathbb{R}^n$ **étoilé**, pourvu qu'il existe un $p \in U$ tel que pour tout $x \in U$, le segment de ligne droite $[p, x]$ est inclus dans U . De plus on dira que U est **convexe** pourvu que U est étoilé par rapport à chacun de ses points.

Lemme 1.2. Si U est étoilé alors U est simplement connexe.

DÉMONSTRATION :

Soit $\gamma : [0, 1] \rightarrow U$ un lacet. Soit p dans la définition, alors on pose

$$\Gamma(s, t) = sp + (1 - s)\gamma(t), \quad s \in [0, 1], t \in [0, 1]$$

Si $s = 1$, $\Gamma(1, t) = p$ donc c'est un lacet constant. Et $\Gamma(s, t) \in U$ pour tout $(s, t) \in [0, 1]^2$. $\square$

1.1.4 Green-Riemann et potentiels scalaires

Proposition 1.1 (Partition de l'unité). Soit $K \subset \mathbb{R}^n$ un sous-ensemble compact, soit U_i, V_i pour $i = 1, \dots, N$ des domaines tels que $\overline{U_i} \subset V_i$, chaque U_i est borné, et

$$K \subset \bigcup_{i=1}^N U_i$$

Alors, il existe des fonctions $\phi_j \in C_0^\infty(V_j)$, $\phi_j \geq 0$ et telles que

$$\forall x \in K, \quad \sum_{j=1}^N \phi_j(x) = 1$$

Cours n° 3

DÉMONSTRATION :

On construit les fonctions $g_i \in C_0^\infty(V_i)$ avec $g_i|_{\overline{U_i}} = 1$ pour tout $i \in \llbracket 1, N \rrbracket$. Pour arriver à g_i , on va considérer la composition de la fonction $\text{dist}(x, U_i)$ avec une autre fonction. Ainsi soit $\varepsilon_i = \text{dist}(U_i, V_i^c) = \text{dist}(\overline{U_i}, V_i^c) > 0$ car $\overline{U_i}$ est compact, V_i^c fermé, et $\overline{U_i} \cap V_i^c = \emptyset$. Donc soit $\varepsilon = \min_{i \in \llbracket 1, N \rrbracket} \varepsilon_i$. On définit la fonction suivante

$$\zeta : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R} \\ t \mapsto \begin{cases} 1 & 0 \leq t \leq \varepsilon/4 \\ (\varepsilon/2 - t)/(\varepsilon/4) & \varepsilon/4 < t < \varepsilon/2 \\ 0 & t \geq \varepsilon/2 \end{cases}$$

Ainsi il nous suffit de poser $g_i(x) = \zeta(\text{dist}(x, U_i))$. On a $g_i \in C^0(\mathbb{R})$.

Il reste donc à régulariser les g_i . Soit $\psi \in C_0^\infty(B_1(0))$, de plus on peut supposer que $\psi \geq 0$ et $\int_{\mathbb{R}^n} \psi(x) dx = 1$. Pour chaque $\delta > 0$, on définit $\psi_\delta(x) = \delta^{-n} \psi(\frac{x}{\delta})$. On choisit en particulier $\delta < \varepsilon/4$. On remplace les fonctions g_i par les intégrales paramétrées,

$$\tilde{\varphi}_i(x) = \int_{\mathbb{R}^n} g_i(x - y) \psi_\delta(y) dy$$

Il faut vérifier que $\tilde{\varphi}_i$ satisfait encore $\tilde{\varphi}_i|_{\overline{U_i}} = 1$, et $\tilde{\varphi}_i|_{V_i^c} = 0$. En effet, si $x \in \overline{U_i}$, on a

$$\text{dist}(x - y, U_i) \leq \text{dist}(x, U_i) + \|y\| \leq \text{dist}(x, U_i) + \delta < \varepsilon/4$$

par le choix de δ . Ainsi on a

$$\forall x \in \overline{U_i}, \quad \tilde{\varphi}_i(x) = \int_{B_\delta(0)} g_i(x - y) \psi_\delta(y) dy = \int_{B_\delta(0)} \psi_\delta(y) dy = 1$$

De la même manière si $x \in V_i^c$ et $y \in B_\delta(0)$ alors

$$\text{dist}(x - y, U_i) \geq \text{dist}(x, U_i) - \|y\| \geq \varepsilon_i - \varepsilon/4 \geq \varepsilon - \varepsilon/4 = \frac{3\varepsilon}{4}$$

Ainsi $\zeta(\text{dist}(x - y, U_i)) = 0$ si $x \in \overline{U_i}$, $y \in V_i^c$ et donc $g_i(x - y) = 0$. Ainsi

$$\forall x \in V_i^c, \quad \tilde{\varphi}_i(x) = \int_{B_\delta(0)} g_i(x - y) \psi_\delta(y) dy = 0$$

Ainsi les propriétés des g_i sont conservées sur les $\tilde{\varphi}_i$ sauf que désormais $\tilde{\varphi}_i \in C_0^\infty$.

On construit à présent les φ_i à partir de $\tilde{\varphi}_i$ de sorte que $\sum_{i=1}^N \varphi_i(x) = 1$ sur K . On pose pour tout $i \in \llbracket 1, N \rrbracket$,

$$\varphi_i = (1 - \tilde{\varphi}_1)(1 - \tilde{\varphi}_2) \cdots (1 - \tilde{\varphi}_i)$$

Par récurrence immédiate on vérifie que

$$1 - \sum_{i=1}^N \varphi_i(x) = (1 - \tilde{\varphi}_1)(1 - \tilde{\varphi}_2) \cdots (1 - \varphi_N)$$

Et donc si $x \in K \subset \bigcup_{i=1}^N U_i$, alors il existe j tel que $x \in U_j$, donc $\tilde{\varphi}_j(x) = 1$ et par conséquent $1 - \sum_{i=1}^N \varphi_i(x) = 0$. Ainsi $\sum_{i=1}^N \varphi_i(x) = 1$ sur K . $\square$

Lemme 1.3 (Green-Riemann sur des régions de type I ou II). Soit V une région de type I,

c'est-à-dire qu'il existe $h_{1,2} \in C^1([a, b], \mathbb{R})$ avec $h_1 < h_2$ tel que

$$V = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in [a, b], \quad h_1(x) < y < h_2(x)\}$$

Alors la conclusion de Green-Riemann s'applique

$$\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \iint_V \text{rot } \mathbf{f} \, dx \, dy$$

pour tout $\mathbf{f} \in C^1$, où γ est une paramétrisation de ∂V entourant V au sens positif.

DÉMONSTRATION :

On calcule explicitement les deux cotés, ainsi on pour le coté droite

$$\iint_V \partial_x f_2 - \partial_y f_1 \, dx \, dy = \underbrace{\int_a^b \int_{h_1(x)}^{h_2(x)} \partial_x f_2(x, y) \, dx \, dy}_A - \underbrace{\int_a^b \int_{h_1(x)}^{h_2(x)} \partial_y f_1(x, y) \, dx \, dy}_B$$

Ainsi pour A on trouve

$$\begin{aligned} A &= \int_a^b \frac{\partial}{\partial x} \left[\int_{h_1(x)}^{h_2(x)} f_2(x, y) \, dy \right] dx - \int_a^b h'_2(x) f_2(x, h_2(x)) \, dx + \int_a^b h'_1(x) f_2(x, h_1(x)) \, dx \\ &= \int_{h_1(b)}^{h_2(b)} f_2(b, y) \, dy - \int_{h_1(a)}^{h_2(a)} f_2(a, y) \, dy - \int_a^b h'_2(x) f_2(x, h_2(x)) \, dx + \int_a^b h'_1(x) f_2(x, h_1(x)) \, dx \end{aligned}$$

et pour B on a plus simplement,

$$B = \int_a^b \left(\int_{h_1(x)}^{h_2(x)} \partial_y f_1(x, y) \, dy \right) dx = \int_a^b f_1(x, h_2(x)) \, dx - \int_a^b f_1(x, h_1(x)) \, dx$$

Ensuite par concaténation on pose $\gamma_1 = \{(x, h_1(x)) \mid x \in [a, b]\}$, alors

$$\int_{\gamma_1} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \int_a^b \mathbf{f}(x, h_1(x)) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ h'_1(x) \end{pmatrix} dx = \int_a^b f_1(x, h_1(x)) \, dx + \int_a^b h'_1(x) f_2(x, h_1(x)) \, dx$$

De plus on pose $\gamma_2 = \{(b, y) \mid y \in [h_1(b), h_2(b)]\}$ ainsi

$$\int_{\gamma_2} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \int_{h_1(b)}^{h_2(b)} \mathbf{f}(b, y) \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} dy = \int_{h_1(b)}^{h_2(b)} f_2(b, y) \, dy$$

En posant $-\gamma_3 = \{(x, h_2(x)) \mid x \in [a, b]\}$ alors

$$\int_{\gamma_3} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = - \int_{-\gamma_3} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = - \int_a^b f_1(x, h_2(x)) + h'_2(x) f_2(x, h_2(x)) \, dx$$

Et finalement avec $\gamma_4 = \{(a, y) \mid y \in [h_2(a), h_1(a)]\}$ alors

$$\int_{\gamma_4} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = - \int_{h_1(a)}^{h_2(a)} f_2(a, y) \, dy$$

Et donc par concaténation on a bien

$$\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\gamma_1} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} + \int_{\gamma_2} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} + \int_{\gamma_3} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} + \int_{\gamma_4} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = A - B = \iint_V \text{rot } \mathbf{f} \, dx \, dy$$

D'où le lemme. La preuve des domaines de types II est analogue. $\square$

Théorème 1.3 (Green-Riemann). Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un domaine, et soit $V \subset U$ un sous-domaine borné, avec $\bar{V} \subset U$, borné pour un lacet γ régulier, simple, orienté positivement. Alors on a que

$$\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \iint_V \text{rot } \mathbf{f} dx dy$$

Remarque 1.3. Un lacet γ est dit **simple** si $\gamma : [0, 1] \rightarrow U$ est injective à la condition près $\gamma(0) = \gamma(1)$. Un lacet γ est dit **régulier** si $\gamma \in C^1([0, 1], U)$ avec $\gamma'(t) \neq 0$ pour tout $t \in [0, 1]$ et $\gamma'(1) = \gamma'(0)$.

DÉMONSTRATION :

Soit γ et V comme donnée dans l'énoncé, et $\mathbf{f} \in C^1$, alors par régularité de γ , on a que

$$\gamma'(t) = \begin{pmatrix} \gamma'_1(t) \\ \gamma'_2(t) \end{pmatrix} \neq 0, \quad \forall t \in I$$

Soit $t_* \in I$ tel que $\gamma'_1(t_*) \neq 0$. Ainsi par le théorème des fonctions implicite, il existe un intervalle ouvert J tel que $\gamma_1(t_*) \in J$, ainsi qu'un autre intervalle ouvert $\tilde{J}$ tel que $t_* \in \tilde{J}$, tel que

$$\forall x \in J, \exists ! t \in \tilde{J}, \quad \gamma_1(t) = x$$

En plus, si on pose $t = t(x) \in C^1(J, \tilde{J})$, on peut écrire $y = \gamma_2(t) = \gamma_2(t(x)) := h(x) \in C^1(J)$. Ainsi localement on a

$$\{\gamma(x) \mid t \in \tilde{J}\} = \{(x, h(x)) \mid x \in J\}$$

Pour chaque $t \in I$ on considère le point $\gamma(t)$, et on prend un rectangle V ouvert aligné avec les axes de coordonnées, tel que $V \cap \gamma$ est le graphe d'une fonction par rapport à x ou à y . On peut aussi choisir un rectangle ouvert U tel que $\bar{U} \subset V$ et $\gamma(t) \in U$. On fait ça pour tout $t \in I$, ainsi les $\{U\}$ forment un recouvrement de $\gamma(I)$ par des ouverts. Ainsi par compacité de $\gamma(I)$, d'après Heine-Borel, on peut choisir un nombre fini $\{U_i, V_i\}_{i=1}^N$ tels que $\bar{U}_i \subset V_i$ et

$$\gamma(I) \subset \bigcup_{i=1}^N U_i$$

Pour obtenir un recouvrement de tout $\bar{V}$. On rajoute encore une paire U_{N+1}, V_{N+1} construit comme suit ; par construit les U_i déjà choisies forment un recouvrement ouvert de $\gamma(I)$, on peut se convaincre qu'il existe $\delta > 0$ tel que

$$\{x \in V \mid \text{dist}(x, \gamma(I)) < \delta\} \subset \bigcup_{i=1}^N U_i$$

Ensuite on pose,

$$U_{N+1} = \{x \in V \mid \text{dist}(x, \gamma(I)) > \frac{\delta}{2}\} \quad \text{et} \quad V_{N+1} = \{x \in V \mid \text{dist}(x, \gamma(I)) > \frac{\delta}{4}\}$$

Maintenant qu'on a un recouvrement, on utilise la **Proposition 1.1** précédente avec $K = \bar{V}$, et (U_i, V_i) , $i \in \llbracket 1, N+1 \rrbracket$. On obtient alors des fonctions

$$\varphi_j \in C_0^\infty(V_j), \quad \varphi_j \geq 0, \quad \sum_{j=1}^{N+1} \varphi_j(x) = 1, \quad \forall x \in \bar{V}$$

On a alors, pour le champ $\mathbf{f}$,

$$\mathbf{f} = \sum_{j=1}^{N+1} \varphi_j \mathbf{f}$$

Il s'ensuit alors que

$$\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\gamma} \sum_{j=1}^{N+1} \varphi_j \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \sum_{j=1}^{N+1} \int_{\gamma} \varphi_j \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s}$$

et de même

$$\iint_V \operatorname{rot} \mathbf{f} \, dx \, dy = \iint_V \operatorname{rot} \sum_{j=1}^{N+1} \varphi_j \mathbf{f} \, dx \, dy = \sum_{j=1}^{N+1} \iint_V \operatorname{rot}(\varphi_j \mathbf{f}) \, dx \, dy$$

Donc il suffit de montrer l'égalité terme par terme. En appliquant le **Lemme 1.3** alors

$$\int_{\partial(V \cap V_j)} \varphi_j \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \iint_{V \cap V_j} \operatorname{rot}(\varphi_j \mathbf{f}) \, dx \, dy$$

Mais comme $\varphi_j \mathbf{f}$ est nul en dehors de V_j , alors

$$\iint_V \operatorname{rot}(\varphi_j \mathbf{f}) \, dx \, dy = \iint_{V \cap V_j} \operatorname{rot}(\varphi_j \mathbf{f}) \, dx \, dy$$

De plus le bord de $V \cap V_j$ est constitué de deux morceaux, un morceau de γ et un morceau de bord de V_j . Or comme φ_j est à support compact dans V_j , alors elle nulle sur ∂V_j et donc

$$\int_{\gamma} \varphi_j \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\partial(V \cap V_j)} \varphi_j \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s}$$

On a donc montré que $\int_{\gamma} \varphi_j \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \iint_V \operatorname{rot}(\varphi_j \mathbf{f}) \, dx \, dy$ pour tout $j = 1, 2, \dots, N$. De plus si $j = N + 1$, alors

$$\int_{\gamma} \varphi_{N+1} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = 0$$

parce que φ_{N+1} n'intersecte pas le lacet γ . De plus on a

$$\iint_V \operatorname{rot}(\varphi_{N+1} \mathbf{f}) \, dx \, dy = \iint_{\mathbb{R}^2} \operatorname{rot}(\varphi_{N+1} \mathbf{f}) \, dx \, dy = 0$$

car le support de φ_{N+1} est un sous-ensemble de V . Et donc on a bien l'égalité souhaité

$$\forall j \in \llbracket 1, N + 1 \rrbracket, \quad \int_{\gamma} \varphi_j \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \iint_V \operatorname{rot}(\varphi_j \mathbf{f}) \, dx \, dy$$

Ce qui conclut la preuve. □

Proposition 1.2. Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un domaine et $\mathbf{f} \in C^1(U, \mathbb{R}^n)$. Supposons que $\operatorname{rot} \mathbf{f} = 0$.

1. Soient $\gamma_1, \gamma_2 : [0, 1] \rightarrow U$ deux chemines en U avec les mêmes extrémités qui sont homotopes, alors

$$\int_{\gamma_1} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\gamma_2} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s}$$

2. Soit $\gamma : [0, 1] \rightarrow U$ un lacet contractible, alors

$$\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = 0$$

3. Si U est simplement connexe, alors $\mathbf{f}$ dérive d'un potentiel, c'est-à-dire

$$\mathbf{f} = \nabla g$$