

您需要知道的资讯

新冠疫苗



- 在加州，人们因为新冠肺炎不得不保持距离。
- 注射新冠疫苗可以结束新冠肺炎并且保护您和您爱的人。



1

谁应该注射新冠疫苗？

- 当疫苗充足时，每一个人都应该注射疫苗。

2

您什么时候可以注射疫苗？

- 不同的县有不同发放疫苗的时间 不同的阶段

阶段 1a



医疗工作者

在长期护理中心的病人
(疗养院)

阶段 1B



一线必要工作人员



65 岁及以上的人

阶段 1C



16到64岁并且有潜在疾病的人及其其他必要工作人员

- 在这些高危人群注射疫苗后，
 - 所有16岁及以上的人可以注射Pfizer新冠疫苗。
 - 所有18岁及以上的人可以注射Moderna新冠疫苗。

3

宁在哪可以注射新冠疫苗？

- 请到公共卫生部门的网站了解疫苗注射地点的资讯。
- 您本地的药房可能会提供疫苗注射。



4


您需要注射多少针？

- Pfizer-BioNTech疫苗，您需要间隔21天注射2针。
- Moderna疫苗，您需要间隔28天注射2针。

5

疫苗有哪些副作用？

- 注射疫苗后产生的一些副作用是正常的生理反应。
- 一些轻微到中度的副作用说明您的身体正在产生对抗新冠肺炎的免疫系统。



常见的副作用



注射部位酸痛



红肿



肿胀

疲惫，头痛，发烧/发抖
肌肉及关节疼痛

- 以上症状有多于10-30%的几率会发生于第二次注射之后。
- 请马上联系您的医生，如果您有任何严重，危及生命的症状，比如严重的过敏反应。



SCAN ME

想了解更多资讯？
新冠肺炎及其他疾病的
资讯

[HTTPS://TINYURL.COM/AMCPHEALTHHELPER](https://tinyurl.com/amcphealthhelper)

请发短信到 (402) 732-2627 了解更多关于
新冠肺炎的资讯



Last Updated 2/1/21