

no requiere



Subsecuencia #2

Folio Asignado:SLMV042506

Fecha: 2022-10-02 Hora: 11:53:00

Usuario: cduron Via						
Datos del paciente						
Nombre: NORMA IDALIA RESENDIZ NARVAEZ			Edad: 48 años	Sexo: Femenino		
Tipo de trabajo: Ama de d	casa	Estado civil: Unión libre		Obs. Religión: Ninguna		
Fecha de nacimiento: 23	-07-1974	Tel. Domicilio: 4443591149		E-Mail: renni0423@hotmail.com		
Datos del siniestro						
Fecha de siniestro: 2022-23:33:43	-09-04	Fecha de primera atención: 2022-09-04 23:43:27		Médico de primera atención: Cristóbal Duron Ovalle		
Diagnóstico inicial:		ESGUINCE CERVICAL GRADO II ESGUINCE LUMBAR GRADO III				
Datos subsecuencia						
Signos y síntomas						
PERSITE DOLOR EN ESPALDA BAJA Y AMBAS CADERAS MAS E DERECHA PERSITE DOLOR EN TOBILLO DERECHO Y DOLOR PUNZANTE OCASIONAL EN TOBILLO						
Evolución						
ACCIDENTE EL 4 DE SEPTIEMBRE 2022						
Estudios solicitados						
Rx Ob:	Observaciones		Interpretación Ortopédica			

Diagnostico

ESGUINCE CERVICAL GRADO 2 Y DORSOLUMBAR RODILLA DERECHA Y TOBILLO DERECHO GRADO 1

Suministros					
Cantidad	Suministro	Indicaciones			
3	TRIBEDOCE COMPUESTO (DICLOFENACO/COMPLEJO B) (DICLOFENACO 75MG/2ML / COMPLEJO B 100MG/100MG/5MG/1ML CAJA CON 3 AMP)	APLICAR UNA INYECCIÃ⊡N INTRAMUSCULAR CADA 48 HORAS			
2	DIPOFEN (IBUPROFENO) (ibuprofeno 400mg CAJA CON 10)	UNA TABLETA CADA 12 HORAS POR 10 DIAS			
1	FENAGEL GEL (DICLOFENACO) (Diclofenaco 1% TUBO CON 60G)	APLICAR DE DOS A TRES VECES AL D̸A SOBRE EL ̸REA AFECTADA			

Ortesis					
Cantidad	Ortesis	Presentación	Indicaciones		
	SOPORTE PARA TOBILLO M	Según Item	USO POR 1 A 3SEMANAS SEGUN EVOLUCION		

Indicaciones generales

EJERCICIOS DE FORTALECIMIENTO MUSCULAR Y ESTIRAMIENTO DOS VECES AL DÃ\[\text{DA}\].

CONTRASTES DE HIELO Y CALOR DOS VECES AL DÃ□A, ALTERNANDOLOS CADA 5 10 MINUTOS.

Criterios de Waddell





Subsecuencia #2

Folio Asignado:SLMV042506

Fecha:2022-10-02 Hora:11:53:00

Observaciones					
Firmas					
Dr. Cristóbal Duron Ovalle Cédula: Med:1942573 Esp:AEIE35068		Firma del paciente			
		Firma del paciente al recibir resultado radiográfico, medicamentos, órtesis diagnóstico.			