

# Trabajo Final de Licenciatura en Ciencias de la Computación

Antonio Mondejar

14 de junio de 2025

## 1. Marco Teórico: Lógica 'Knowing How' multi-agente

Durante toda la sección, consideraremos a  $\text{Prop}$  como un conjunto no vacío de variables proposicionables con cardinalidad contable y a  $\text{Agt}$  como un conjunto no vacío de agentes con cardinalidad contable.

**Definición 1.1** El lenguaje  $L_{\text{Kh}_i}$  está compuesto por las fórmulas dadas por la gramática:

$$\varphi ::= p \mid \neg\varphi \mid \varphi \vee \varphi \mid \varphi \wedge \varphi \mid L_{\text{Kh}_i}(\varphi, \varphi),$$

donde  $p \in \text{Prop}$  e  $i \in \text{Agt}$ . Las constantes booleanas son definidas de la forma usual. Las fórmulas de la pinta  $L_{\text{Kh}_i}(\psi, \varphi)$  deben ser leídas como "cuando vale  $\psi$ , el agente  $i$  sabe cómo hacer que  $\varphi$  valga".  $\dashv$

A las fórmulas de  $L_{\text{Kh}_i}$  las interpretaremos sobre grafos dirigidos etiquetados (o digo sistemas de transiciones etiquetados?), en donde las aristas representarán las acciones disponibles para los agentes.

**Definición 1.2 (Acciones y planes)** Sea  $\text{Act}$  un conjunto enumerable de nombres de acciones, y sea  $\text{Act}^*$  el conjunto de secuencias finitas de elementos de  $\text{Act}$ . A los elementos de  $\text{Act}^*$  los llamaremos planes, siendo  $\epsilon$  el plan vacío. Sea  $\sigma \in \text{Act}^*$ , denotaremos  $|\sigma|$  al largo de  $\sigma$  (notar  $|\epsilon| = 0$ ). Para un plan  $\sigma$  y  $0 \leq k \leq |\sigma|$ , el plan  $\sigma_k$  es el prefijo de  $\sigma$  hasta la  $k$ -ésima posición inclusive. Para  $0 < k \leq |\sigma|$ , la acción  $\sigma[k]$  es la que se encuentra en la  $k$ -ésima posición de  $\sigma$ .  $\dashv$

Esta definición revisar que entra en conflicto con la demo de contracción por bisimulación, porque uso  $\sigma_1, \dots, \sigma_k$  para enumerar un conjunto de planes.

Todavía no defino bien bien lo que son los modelos.

**Definición 1.3** Sea  $\{R_a \subseteq W \times W \mid a \in A, \text{ para algún } A \subseteq \text{Act}\}$  una colección de relaciones binarias sobre  $W$ . Definimos  $R_\epsilon := \{(w, w) \mid w \in W\}$  y, para  $\sigma \in \text{Act}^*$  y  $a \in \text{Act}$ ,  $R_{\sigma a} := \{(w, v) \in W \times W \mid \text{existe } u \in W \text{ tal que } (w, u) \in R_\sigma \text{ y } (u, v) \in R_a\}$ . Luego sea  $u \in W$  y  $\sigma \in \text{Act}^*$ , definimos  $R_\sigma(u) := \{v \in W \mid (u, v) \in R_\sigma\}$ , y para  $U \subseteq W$  definimos  $R_\sigma(U) := \bigcup_{u \in U} R_\sigma(u)$   $\dashv$

## 2. Contracción por Bisimulación para Lógica 'Knowing How'

**Lema 1** Sea  $\mathcal{M} = \langle W, R, \{S_i\}_{i \in \text{Agt}}, V, \text{Act} \rangle$  un modelo, y sean  $w, v \in W$  tales que  $V(w) = V(v)$  entonces para toda  $\varphi$  proposicional se cumple que,

$$\mathcal{M}, w \models \varphi \quad \text{si y sólo si} \quad \mathcal{M}, v \models \varphi \quad \triangleleft$$

*Demostración.* 1 Sea  $\mathcal{M} = \langle W, R, \{S_i\}_{i \in \text{Agt}}, V, \text{Act} \rangle$  y  $w, v \in W$  tales que  $V(w) = V(v)$ . La demostración es por inducción estructural sobre  $\varphi$ . Recordar que  $\varphi$  es una fórmula **proposicional**.

- Caso base:  $\varphi = p$  donde  $p \in \text{Prop}$ .  
 Notar que  $\mathcal{M}, w \models \varphi$  si y sólo si  $p \in V(w)$ .  
 Ahora bien, como  $V(w) = V(v)$ ,  $p \in V(w)$  si y sólo si  $p \in V(v)$ .  
 Finalmente, por la definición de  $\models$ ,  $p \in V(v)$  si y sólo si  $\mathcal{M}, v \models \varphi$ .
- Caso inductivo: La hipótesis inductiva establece que, para  $\psi$  una subfórmula de  $\varphi$ , se cumple que  $\mathcal{M}, w \models \psi$  si y sólo si  $\mathcal{M}, v \models \psi$ .
  - Caso  $\varphi = \psi_1 \vee \psi_2$ .  
 Por definición de  $\models$ ,  $\mathcal{M}, w \models \psi_1 \vee \psi_2$  si y sólo si  $\mathcal{M}, w \models \psi_1$  o  $\mathcal{M}, w \models \psi_2$ .  
 Por hipótesis inductiva,  $\mathcal{M}, w \models \psi_1$  o  $\mathcal{M}, w \models \psi_2$  si y sólo si  $\mathcal{M}, v \models \psi_1$  o  $\mathcal{M}, v \models \psi_2$ .  
 Pero notar que, nuevamente por definición de  $\models$ ,  $\mathcal{M}, v \models \psi_1$  o  $\mathcal{M}, v \models \psi_2$  si y sólo si  $\mathcal{M}, v \models \psi_1 \vee \psi_2$ .
  - Caso  $\varphi = \neg\psi$ .  
 La demostración es similar a la del caso analizado anteriormente. ■

**Definición 2.1** Sea  $\mathcal{M} = \langle W, R, \{S_i\}_{i \in \text{Agt}}, V, \text{Act} \rangle$  un modelo entonces se define,

$$A_{\mathcal{M}} := \{(w, v) \in W \times W \mid V(w) = V(v)\}$$

Notar que  $A_{\mathcal{M}}$  es una relación de equivalencia sobre  $W$  (hace falta probarlo? es medio directo). Luego se denotará,

$$\rho_{\mathcal{M}} := \{[w] \mid w \in W \text{ y } [w] \text{ su clase de equivalencia respecto a } A_{\mathcal{M}}\} \quad \dashv$$

**Lema 2** Sea  $\mathcal{M} = \langle W, R, \{S_i\}_{i \in \text{Agt}}, V, \text{Act} \rangle$  un modelo finito y sea  $U \subseteq W$  entonces,

existe  $S \in \mathcal{P}(\rho_{\mathcal{M}})$  finito tal que  $(U = \bigcup_{s_i \in S} s_i)$  si y sólo si  $U$  es proposicionalmente definible. ◀

Intuitivamente, lo que nos dice este lema es que todo conjunto proposicionalmente definible viene de tomar una cierta cantidad de clases de equivalencia de  $\rho_{\mathcal{M}}$  y unir las. Y, a su vez, cualquier unión de una cierta cantidad de clases de equivalencia es un conjunto proposicionalmente definible.

*Demostración. 2* Se demostrará por separado los casos  $(\rightarrow)$  y  $(\leftarrow)$ .

Sea  $\mathcal{M} = \langle W, R, \{S_i\}_{i \in \text{Agt}}, V, \text{Act} \rangle$  un modelo finito y sea  $U \subseteq W$ . Un primer detalle a tener en cuenta es que, dado que  $\mathcal{M}$  es finito, existen un número finito de variables proposicionales  $p_1, \dots, p_n$  tales que  $\{p_1, \dots, p_n\}$  es la imagen de  $V$ .

- $(\rightarrow)$  Notemos primero que si  $U = \emptyset$ , luego la fórmula  $\varphi := \perp$  define a  $U$ . Entonces supongamos que  $U \neq \emptyset$ . (esto se podría analizar por separado o capaz permitir que  $S$  sea vacío y que en ese caso  $\varphi$  sea una disyunción de 0 cosas por lo que sería el elemento neutro de la disyunción o sea  $\perp$ ).

Sea  $S = \{s_1, \dots, s_m\}$  finito tal que  $S \in \mathcal{P}(\rho_{\mathcal{M}})$  y  $U = \bigcup_{s_i \in S} s_i$ , demostremos que

$U$  es proposicionalmente definible.

Recordar que cada  $s_i$  es una clase de equivalencia de la relación  $A_{\mathcal{M}}$ . A su vez, para cada  $w, v \in s_i$  se cumple que  $V(w) = V(v)$ . Se utilizará  $V(s_i)$  para hacer referencia a  $V(w)$  para cada  $w \in s_i$ .

Sea  $\varphi_i := \bigwedge_{j=1}^n l_i(p_j)$  donde  $l_i(p_j) = \begin{cases} p_j & \text{si } p_j \in V(s_i) \\ \neg p_j & \text{si } p_j \notin V(s_i) \end{cases}$ .

Veamos que por la forma en la que construimos  $\varphi_i$ , se cumple que  $\mathcal{M}, w \models \varphi_i$  si y sólo si  $w \in s_i$ . (\*) (esto podría explicarlo/demostrarlo un poco más en profundidad si no es algo claro).

Demostremos entonces que  $\varphi := \bigvee_{i=1}^m \varphi_i$  define a  $U$ . Primero, notar que sea  $w \in W$ ,  $\mathcal{M}, w \models \varphi$  si y sólo si  $\mathcal{M}, w \models \varphi_i$  para algún  $i \in \{1, \dots, m\}$ .

Queremos ver entonces que,  $w \in U$  si y sólo si  $\mathcal{M}, w \models \varphi$ .

Sea  $w \in U$ , por hipótesis, existe  $s_i$  tal que  $w \in s_i$ . Ahora bien, por (\*),  $\mathcal{M}, w \models \varphi_i$ , por lo que  $\mathcal{M}, w \models \varphi$ .

Sea  $w \in W$  tal que  $\mathcal{M}, w \models \varphi$ , entonces existe  $i \in \{1, \dots, m\}$  tal que  $\mathcal{M}, w \models \varphi_i$ . Luego por (\*),  $w \in s_i$ , lo que nos dice que  $w \in U$ .

Luego  $\varphi$  define a  $U$ .

Como  $\varphi$  es proposicional,  $U$  es proposicionalmente definible.

- $(\leftarrow)$  Sea  $\varphi$  la fórmula proposicional que define a  $U$ , se quiere demostrar que existe  $S = \{s_1, \dots, s_m\}$  finito, tal que  $S \in \mathcal{P}(\rho_{\mathcal{M}})$  tal que  $U = \bigcup_{s_i \in S} s_i$ .

Definamos  $U' = \bigcup_{w \in U} [w]$ , siendo  $[w]$  la clase de equivalencia de  $w$  con respecto a  $A_{\mathcal{M}}$ . Notemos que por la definición de  $U'$ , existe  $S \in \mathcal{P}(\rho_{\mathcal{M}})$  finito tal que  $U' = \bigcup_{s_i \in S} s_i$  dado que  $U'$  está definido como una unión finita de elementos de  $\mathcal{P}(\rho_{\mathcal{M}})$ .

Demostremos ahora que  $U' = U$ . Es claro que  $U \subseteq U'$ , dado que  $w \in [w]$  para cada  $w \in W$ .

Queda demostrar que  $U' \subseteq U$ .

Sea  $w' \in U'$ , existe  $w \in U$  tal que  $w' \in [w]$ . Ahora bien, como  $w \in U$ ,  $\mathcal{M}, w \models \varphi$ . Luego, notemos que por Lema 1,  $\mathcal{M}, v \models \varphi$  para cada  $v \in [w]$ , pues  $V(w) = V(v)$  para cada  $v \in [w]$ . Pero como  $w' \in [w]$  esto nos dice que  $\mathcal{M}, w' \models \varphi$ . Luego  $w' \in U$ .

Finalmente  $U' = U$ , lo cual demuestra  $(\leftarrow)$ . ■

**Corolario 1** Sea  $\mathcal{M} = \langle W, R, \{S_i\}_{i \in \text{Agt}}, V, \text{Act} \rangle$  un modelo finito y sea  $U \subseteq W$  entonces el problema de decidir si  $U$  es proposicionalmente definible está en  $P$ .

Más aún, en caso de ser definible, encontrar una fórmula  $\varphi$  que define a  $U$  es realizable en tiempo polinomial en el tamaño de  $\mathcal{M}$ . ◀

(este corolario es una idea que se me ocurrió que no es central central al problema)

**Demostración. 3** Queremos encontrar un algoritmo que dado  $\mathcal{M} = \langle W, R, \{S_i\}_{i \in \text{Agt}}, V, \text{Act} \rangle$  un modelo finito y  $U \subseteq W$  decida en tiempo polinomial en el tamaño de  $\mathcal{M}$  si  $U$  es proposicionalmente definible. ■

Por Lema 2, sabemos que basta con encontrar  $S \in \mathcal{P}(\rho_{\mathcal{M}})$  tal que  $U = \bigcup_{s_i \in S} s_i$  o determinar que no existe tal  $S$ .

Como  $\rho_{\mathcal{M}}$  es la partición de  $W$  con respecto a la relación de equivalencia  $A_{\mathcal{M}}$ , dicho  $S \in \mathcal{P}(\rho_{\mathcal{M}})$  existirá si y sólo si ocurre que para cada  $s_i \in \rho_{\mathcal{M}}$  se cumple que  $s_i \subseteq U$  o  $s_i \cap U = \emptyset$ . (Puedo desarrollar esto acá o incluso probar un lema más que enuncie esto, pero la idea intuitiva es que como queremos chequear que  $U$  es unión de clases de equivalencia, entonces si o si tiene que ocurrir que para cada clase de equivalencia están todos sus nodos en  $U$  o ninguno está en  $U$ )

Entonces notemos que basta con dar un algoritmo que encuentre las clases de equivalencia de  $\rho_{\mathcal{M}}$  y para cada una de ellas chequee que, o todos sus nodos pertenecen a  $U$  o ninguno de ellos lo hace.

Luego, en caso de ser  $U$  definible, tendremos computado ya el conjunto  $S \in \mathcal{P}(\rho_{\mathcal{M}})$  tal que  $U = \bigcup_{s_i \in S} s_i$ , que estaría formado por las clases de equivalencia que encontramos en el paso anterior que están completamente contenidas en  $U$ .

Ahora bien, a partir de dicho conjunto  $S = \{s_1, \dots, s_m\}$ , podemos computar una fórmula que define a  $U$  siguiendo la misma estrategia mencionada en la demostración del Lema 2.

Es decir, podemos computar  $\varphi := \bigvee_{i=1}^m \varphi_i$ , con  $\varphi_i := \bigwedge_{j=1}^n l_i(p_j)$  donde  $l_i(p_j) = \begin{cases} p_j & \text{si } p_j \in V(s_i) \\ \neg p_j & \text{si } p_j \notin V(s_i) \end{cases}$ .

Notar que la cantidad de disyunciones ( $m$ ) de  $\varphi$  está acotada por la cantidad de elementos de  $W$  y por otro lado la cantidad de conjunciones de cada término ( $n$ ) es la cantidad de variables proposicionales que aparecen en la imagen de  $V$ . Juntando estos dos argumentos, podemos deducir que el tamaño de  $\varphi$  es  $O(|W| * |V|)$ , lo cuál es polinomial en el tamaño de  $\mathcal{M}$ .

Falta escribir el algoritmo y probar su complejidad. ■

**Teorema 1** Sea  $\mathcal{M} = \langle W, R, \{S_i\}_{i \in \text{Agt}}, V, \text{Act} \rangle$  un modelo, entonces se cumple que,

1.  $A_{\mathcal{M}}$  es una autobisimulación de  $\mathcal{M}$ .
2. Sea  $Z \subseteq W \times W$  una autobisimulación de  $\mathcal{M}$  entonces  $Z \subseteq A_{\mathcal{M}}$ . Es decir,  $A_{\mathcal{M}}$  es la máxima autobisimulación de  $\mathcal{M}$ . ◀

**Demostración. 4** Sea  $\mathcal{M} = \langle W, R, \{S_i\}_{i \in \text{Agt}}, V, \text{Act} \rangle$  un modelo, probaremos (1) y (2) por separado:

1. Queremos ver que  $A_M$  es una autobisimulación de  $\mathcal{M}$ , para ello debemos verificar que:

- (Atom) Dado  $(w, v) \in A_M$ , por definición de  $A_M$ , se cumple que  $V(w) = V(v)$ .
- (A-Zig) Notemos que  $A_M$  es una relación de equivalencia, luego para cada  $w \in W$  se cumple que  $(w, w) \in A_M$ .
- (A-zag) Podemos utilizar el mismo argumento que en (A-zig) para demostrar este caso.
- ( $L_{Kh_i}$ -Zig) Queremos ver que para cada  $U \subseteq W$  proposicionalmente definible, si  $U \xrightarrow{i} T$  para algún  $T \subseteq W$ , entonces existe  $T' \subseteq W$  tal que
  - $A_M(U) \xrightarrow{i} T'$ ,
  - $T' \subseteq A_M(T)$ .

Sean  $U, T$  subconjuntos de  $W$  tales que  $U \xrightarrow{i} T$  y  $U$  proposicionalmente definible, queremos encontrar  $T' \subseteq W$  que cumpla lo mencionado. Como  $U$  es proposicionalmente definible, entonces existe  $\varphi$  proposicional tal que  $w \in U$  si y sólo si  $\mathcal{M}, w \models \varphi$ .

Demostremos por un lado que  $U = A_M(U)$ :

( $\subseteq$ ) Siguiendo el argumento usado en (A-Zig), es claro que para  $w \in U$  se cumple que  $w \in A_M(U)$ , pues  $(w, w) \in A_M$  para cada  $w \in W$ .

( $\supseteq$ ) Sea  $v \in A_M(U)$ , queremos ver que  $v \in U$ . Como  $v \in A_M(U)$ , entonces existe  $w \in U$  tal que  $(w, v) \in A_M$ . Luego, como  $(w, v) \in A_M$  entonces  $V(w) = V(v)$ .

Ahora bien, como  $w \in U$  y  $\varphi$  define a  $U$ , esto nos dice que  $\mathcal{M}, w \models \varphi$ . Pero por Lema 1, como  $V(w) = V(v)$  y  $\varphi$  es proposicional entonces  $\mathcal{M}, v \models \varphi$ , luego  $v \in U$ .

Entonces demostramos que  $U = A_M(U)$ .

Ahora bien, notemos que siendo  $X \subseteq W$  entonces  $X \subseteq A_M(X)$ , pues como analizamos anteriormente  $(w, w) \in A_M$  para cada  $w \in W$ .

Juntando lo mencionado, podemos afirmar que  $T' = T$  cumple que:

- $A_M(U) \xrightarrow{i} T'$ , pues dijimos  $A_M(U) = U$ , y por hipótesis,  $U \xrightarrow{i} T = T'$ .
- $T' \subseteq A_M(T)$  pues esto se cumple para todo  $X \subseteq W$ .

Luego queda demostrado que  $A_M$  satisface ( $L_{Kh_i}$ -Zig).

- ( $L_{Kh_i}$ -Zag) Análogo a ( $L_{Kh_i}$ -Zig), pues notemos que como  $A_M$  es una relación de equivalencia, es simétrica. ■

Luego  $A_M$  es una autobisimulación de  $\mathcal{M}$ .

2. Queremos ver que dada  $Z \subseteq W \times W$  autobisimulación de  $\mathcal{M}$ , entonces  $Z \subseteq A_M$ .

Supongamos que no es cierto, es decir, existe  $Z \subseteq W \times W$  autobisimulación de  $\mathcal{M}$  tal que hay  $w, v \in W$  que cumplen que  $(w, v) \in Z$  y  $(w, v) \notin A_M$ .

Como  $Z$  es una autobisimulación entonces satisface (atom), es decir,  $V(w) = V(v)$ . Pero notemos que por definición de  $A_M$ ,  $(w, v) \in A_M$ , lo cuál es absurdo, pues dijimos que  $(w, v) \notin A_M$ .

El absurdo vino de suponer que  $Z \not\subseteq A_M$ .

Luego queda demostrada la propiedad.

Algo interesante es que hay varias contracciones que no funcionan:

Por ejemplo, dejar las estrategias y las acciones iguales y usar como aristas  $R' = \{(a, [w], [v]) \mid (a, w, v) \in R\}$ . Esta sería la contracción de la lógica modal básica

(Poner gráfico de un contraejemplo).

Otro ejemplo de contracción que no funciona es dejar las estrategias y las acciones iguales y usar como aristas  $R = \{(a, [w], [v]) \mid \text{para todo } w' \in [w] \text{ existe } v' \in [v] \text{ tal que } (a, w', v') \in R\}$ .

(Poner gráfico de un contraejemplo).

Otro ejemplo sería definir  $R = \{(a, [w], [v]) \mid \text{para todo } w' \in [w] \text{ se cumple que } R_a(w') \neq \emptyset \text{ y } (w', v) \in R_a\}$  y esto tampoco funcionaría.

(Poner gráfico de un contraejemplo).

Todo este resultado se puede hacer con caso infinito, reescribiendo el lema en vez de si y sólo si a implica, porque lo finito solo se necesita para encontrar la fórmula que en realidad no interesa

**Definición 2.2** Sea  $M = \langle W, R, \{S_i\}_{i \in \text{Agt}}, V, \text{Act} \rangle$  un modelo finito. Se define su contracción por bisimulación como el modelo  $M' = \langle W', R', \{S'_i\}_{i \in \text{Agt}'}, V', \text{Act}' \rangle$  donde

- $W' := W/A_M$
- $R' := \{R'_{a_\sigma} \subseteq W' \times W' \mid a_\sigma \in \text{Act}'\}$  donde  $([w], [v]) \in R'_{a_\sigma}$  si y sólo si
  1. existen  $w' \in [w]$  y  $v' \in [v]$  tal que  $(w', v') \in R_\sigma$
  2.  $\sigma$  es fuertemente ejecutable para cada  $w' \in [w]$ .
- $S'_i := \{\pi' = \{a_{\sigma_1}, \dots, a_{\sigma_k}\} \mid \text{existe } \pi \in S_i \text{ tal que } \pi = \{\sigma_1, \dots, \sigma_k\}\}$
- $V'([w]) := V(w)$
- $\text{Act}' := \{a_\sigma \mid \text{existe } \pi \in S_i \text{ tal que } \sigma \in \pi \text{ para algún } i \in \text{Agt}\}$  -1

**Teorema 2** Sea  $M = \langle W, R, \{S_i\}_{i \in \text{Agt}}, V, \text{Act} \rangle$  un modelo finito y sea  $M'$  su contracción por bisimulación entonces  $\langle M, w \rangle$  y  $\langle M', [w] \rangle$  son  $L_{K_{h_i}}$ -bisimilares para cada  $w \in W$ .  $\triangleleft$

*Demostración.* 5 Sea  $M = \langle W, R, \{S_i\}_{i \in \text{Agt}}, V, \text{Act} \rangle$  un modelo finito y sea  $M'$  su contracción por bisimulación, basta ver que  $Z = \{(w, [w]) \in W \times W'\}$  es una  $L_{K_{h_i}}$ -bisimulación para demostrar la propiedad.

Dado que  $W$  es no vacío entonces es claro que  $Z$  es no vacío también.

Por otro lado, notemos que por la definición de  $V'$ , es claro que  $Z$  satisface (Atom).

A su vez, por cómo definimos  $Z$ , es fácil ver que también (A-zig) y (A-zag) son satisfechos.

Demostremos entonces que se satisfacen  $(L_{K_{h_i}}\text{-zig})$  y  $(L_{K_{h_i}}\text{-zag})$ .

- $(L_{K_{h_i}}\text{-zig})$  Sean  $U, T$  subconjuntos de  $W$  tales que  $U \xrightarrow{i} T$  y  $U$  proposicionalmente definible, queremos encontrar  $T' \subseteq W'$  que

- $Z(U) \xrightarrow{i} T'$ ,
- $T' \subseteq Z(T)$ .

Veamos que  $T' = \{[w] \mid w \in T\}$  cumple con lo mencionado. Por como definimos  $Z$ , es claro que  $T' = Z(T)$ , por lo que  $T' \subseteq Z(T)$ . Entonces demostremos  $Z(U) \xrightarrow{i} T'$ .

Como  $U \xrightarrow{i} T$ , existe  $\pi = \{\sigma_1, \dots, \sigma_k\} \in S_i$  tal que cada plan de  $\pi$  es fuertemente ejecutable en cada nodo de  $U$  y  $R_\pi(U) \subseteq T$ .

Ahora bien, sabemos por la definición de  $\mathcal{M}'$  que existe  $\pi' = \{a_{\sigma_1}, \dots, a_{\sigma_k}\} \in S'_i$ . Luego, basta ver que cada  $a_{\sigma_i}$  es fuertemente ejecutable en  $Z(U)$  y que además  $R'_{\pi'}(Z(U)) \subseteq T'$ , pues, juntando las dos afirmaciones concluiríamos que  $Z(U) \xrightarrow{i} T'$ .

Notemos que los planes de  $\pi'$  son simplemente de un paso, es decir, deberíamos chequear que para cada elemento de  $Z(U)$  existe una arista con cada una de las acciones de  $\pi'$  y que cada arista de  $Z(U)$  con alguna de las etiquetas de  $\pi'$  se dirige hacia un nodo de  $T'$ .

Por Lema 2, existe  $S \in \mathcal{P}(\rho_M)$  tal que  $U = \bigcup_{s_i \in S} s_i$ . Luego, por como está definido  $Z$ , notemos que  $Z(U) = S$ .

Sean entonces  $a_{\sigma_i} \in \pi'$  y  $s_j \in S$  queremos ver que  $a_{\sigma_i}$  es fuertemente ejecutable en  $s_j$ . Como cada nodo de  $s_j$  está en  $U$  y  $\sigma_i$  es fuertemente ejecutable en todo nodo de  $U$  entonces para cada nodo  $w$  de  $s_j$  existe  $v$  tal que  $(w, v) \in R_{\sigma_i}$ . A su vez, juntando lo mencionado, se puede ver que por la definición de  $R'$  entonces existe  $v \in W$  tal que  $(s_j, [v]) \in R'_{a_{\sigma_i}}$ , luego  $a_{\sigma_i}$  es fuertemente ejecutable en  $s_j$ . Como  $a_{\sigma_i}$  y  $s_j$  eran elementos fijos pero arbitrarios de  $\pi'$  y  $S$  respectivamente, vale que  $\pi'$  es fuertemente ejecutable en todo  $S$ .

Ya demostramos entonces que  $\pi'$  es fuertemente ejecutable en  $S$ , queda demostrar que  $R'_{\pi'}(S) \subseteq T'$ .

Sean  $s_j \in S$  y  $a_{\sigma_i} \in \pi'$  tales que  $(s_j, [v]) \in R'_{a_{\sigma_i}}$  entonces existen  $w \in s_j$  y  $v' \in [v]$  tales que  $(w, v') \in R_{\sigma_i}$ . Recordemos que  $R_\pi(U) \subseteq T$ . Luego, como  $w \in U$  y  $\sigma_i \in \pi$  entonces  $v' \in T$ , lo que nos dice que  $[v] \in T'$ . Entonces queda demostrado que  $R'_{\pi'}(S) \subseteq T'$ , dado que  $s_j$  y  $a_{\sigma_i}$  son elementos fijos pero arbitrarios de  $S$  y  $\pi'$  respectivamente.

Probamos entonces que  $\pi'$  es fuertemente ejecutable en  $S$  y que  $R'_{\pi'}(S) \subseteq T'$ , luego esto nos dice que  $S \xrightarrow{i} T'$ . Y como  $S = Z(U)$ ,  $Z(U) \xrightarrow{i} T'$ .

Queda demostrado entonces  $L_{K_{hi}}$ -zig. (MEJORAR ESTA DEMO).

- ( $L_{K_{hi}}$ -zag) Sean  $U, T \in W'$  tales que  $U \xrightarrow{i} T$  con  $U$  proposicionalmente definible, queremos encontrar  $T' \subseteq W$  tal que

- $Z^{-1}(U) \xrightarrow{i} T'$ ,
- $T' \subseteq Z^{-1}(T)$ .

Notar que  $U = \{[w_1], \dots, [w_n] \mid w_i \in W\}$  y  $T = \{[v_1], \dots, [v_m] \mid v_i \in W\}$ .

Veamos que  $T' = \bigcup_{[v_i] \in T} [v_i]$  cumple con lo mencionado. Notar que por la definición de  $Z$ , es claro que  $T' = Z^{-1}(T)$ , lo que nos dice que  $T' \subseteq Z^{-1}(T)$ . Demostremos entonces que  $Z^{-1}(U) \xrightarrow{i} T'$ .

Como  $U \xrightarrow{i} T$ , entonces existe  $\pi' = \{a_{\sigma_1}, \dots, a_{\sigma_k}\} \in S'_i$  tal que  $\pi'$  es fuertemente ejecutable en cada elemento de  $U$  y  $R'_{\pi'}(U) \subseteq T$ .

Luego por como está definido  $\mathcal{M}$  entonces existe  $\pi = \{\sigma_1, \dots, \sigma_k\} \in S_i$ . Veamos entonces que  $\pi$  es fuertemente ejecutable en cada nodo de  $Z^{-1}(U)$  y a su vez que  $R_\pi(Z^{-1}(U)) \subseteq T'$ .

Sean  $w \in Z^{-1}(U)$  y  $\sigma_i \in \pi$ , veamos que  $\sigma_i$  es fuertemente ejecutable en  $w$ . Notemos que como  $w \in Z^{-1}(U)$  entonces  $[w] \in U$  y, a su vez, como  $a_{\sigma_i}$  es fuertemente ejecutable en  $U$ ,  $a_{\sigma_i}$  también es fuertemente ejecutable en  $[w]$ . Luego, existe  $[v]$  tal que  $([w], [v]) \in R'_{a_{\sigma_i}}$ . Ahora bien, notemos que por la definición de  $R'$ , como existe esa arista entonces se cumple que  $\sigma_i$  es fuertemente ejecutable en todo nodo de  $[w]$ . En particular,  $\sigma_i$  es fuertemente ejecutable en  $w$ . Finalmente, demostramos que  $\pi$  es fuertemente ejecutable en  $Z^{-1}(U)$ .

Demostremos ahora que  $R_\pi(Z^{-1}(U)) \subseteq T'$ .

Sean  $w, v \in W$  tales que  $w \in Z^{-1}(U)$  y  $(w, v) \in R_{\sigma_i}$ , queremos ver que  $v \in T'$ . Notemos que como  $w \in Z^{-1}(U)$ , entonces  $[w] \in U$ . Ahora bien como  $a_{\sigma_i}$  es fuertemente ejecutable en  $U$ ,  $a_{\sigma_i}$  también es fuertemente ejecutable en  $[w]$ .

Como  $a_{\sigma_i}$  es fuertemente ejecutable en  $[w]$  entonces existe  $[v']$  tal que  $([w], [v']) \in R_{a_{\sigma_i}}$ . Ahora bien, como existe dicha arista, por la definición de  $R'$ , ocurre que  $\sigma_i$  es fuertemente ejecutable en todo nodo de  $[w]$ . Pero como  $\sigma_i$  es fuertemente ejecutable en todo nodo de  $[w]$  y  $(w, v) \in R_{\sigma_i}$  entonces  $([w], [v]) \in R'_{a_{\sigma_i}}$ . Pero como  $R'_{\pi'}(U) \subseteq T$ , entonces  $[v] \in T$ , lo que nos dice que  $v \in T'$ .

Luego demostramos que  $R_{\sigma_i}(Z^{-1}(U)) \subseteq T'$ . Como  $\sigma_i$  era un elemento fijo pero arbitrario de  $\pi$  entonces vale para todo  $\pi$ . Luego  $R_\pi(Z^{-1}(U)) \subseteq T'$ , lo cual demuestra  $L_{K_{h_i}}$ -zag. ■

Demostremos entonces que  $Z$  es una  $L_{K_{h_i}}$ -bisimulación. Luego  $\langle \mathcal{M}, w \rangle$  y  $\langle \mathcal{M}', [w] \rangle$  son  $L_{K_{h_i}}$ -bisimilares para cada  $w \in W$ .

**Teorema 3** *La contracción por bisimulación de un modelo finito  $\mathcal{M}$  tiene cardinalidad mínima entre los modelos  $L_{K_{h_i}}$ -bisimilares a  $\mathcal{M}$ .* ◀

(este no estoy seguro de cómo probarlo pero estaría bueno que sea cierto para demostrar que efectivamente estamos minimizando el modelo).

update de esto: cardinalidad es bastante directo, pero cantidad de aristas debe ser bastante más complicado, por lo que me contaste de cocientar las clases de estrategias.

**Teorema 4** *Sea  $\mathcal{M}$  un modelo finito, encontrar su contracción por bisimulación  $\mathcal{M}'$  es realizable en tiempo polinomial en el tamaño de  $\mathcal{M}$ .* ◀

(la mejor complejidad con la que se podría hacer no estoy seguro, porque tampoco definimos bien cómo va a ser la contracción, pero lo de encontrar los nodos strongly executable de cada camino se me ocurre que puede salir en  $O(\sum_i |S_i| * n * (n + m))$ )

Esta definición va a ir en los preliminares pero la escribo acá para tenerla a mano al ver esta demo



**Definición 2.3** Supongamos  $\text{Act}$  un conjunto de acciones no vacío enumerable. Sea  $\mathcal{M} = \langle W, \{R_a\}_{a \in \text{Act}}, V \rangle$  un modelo de Kripke. Sea  $Z_{\mathcal{M}}$  su autobisimulación máxima en Lógica Modal Básica (LMB) entonces definimos su contracción por LMB-bisimulación como  $\mathcal{M}_{\text{LMB}} = \langle W', \{R'_a\}_{a \in \text{Act}}, V \rangle$  donde

- $W' := W/Z_{\mathcal{M}}$
- $R'_a := \{([w], [v]) \mid \text{existen } w' \in [w] \text{ y } v' \in [v] \text{ tal que } (w', v') \in R_a\}$
- $V'([w]) := V(w)$  ◄

Notar que en el contexto de esta definición,  $[w]$  se refiere a la clase de equivalencia de  $w$  en la relación de equivalencia dada por  $Z_{\mathcal{M}}$ .

**Lema 3** Sea  $\mathcal{M} = \langle W, \{R_a\}_{a \in \text{Act}}, V \rangle$  un modelo de Kripke, y sea  $\mathcal{M}_{\text{LMB}} = \langle W', \{R'_a\}_{a \in \text{Act}}, V' \rangle$  su contracción por LMB-bisimulación,

Si  $([w], [v]) \in R'_a$  entonces para cada  $w' \in [w]$  existe  $v' \in [v]$  tal que  $(w', v') \in R_a$  ◄

*Demostración.* 6 Sea  $\mathcal{M} = \langle W, \{R_a\}_{a \in \text{Act}}, V \rangle$  un modelo de Kripke, y sea  $\mathcal{M}_{\text{LMB}} = \langle W', \{R'_a\}_{a \in \text{Act}}, V' \rangle$  su contracción por LMB-bisimulación. Sea  $([w], [v]) \in R'_a$ , veamos que para cada  $w' \in [w]$  existe  $v' \in [v]$  tal que  $(w', v') \in R_a$ .

Como  $([w], [v]) \in R'_a$  existen  $w_0 \in [w]$  y  $v_0 \in [v]$  tales que  $(w_0, v_0) \in R_a$ . Ahora bien, sea  $w' \in [w]$ , por estar ambos  $w_0$  y  $w'$  en  $[w]$ , existe una LMB-bisimulación  $Z$  tal que  $(w_0, w') \in Z$ . Pero notemos que, por (zig) de  $Z$ , como  $(w_0, v_0) \in R_a$  entonces existe  $v'$  tal que  $(w', v') \in R_a$  y, a su vez,  $(v_0, v') \in Z$ , es decir,  $v' \in [v]$ . Como demostramos esto para un  $w'$  arbitrario en  $[w]$ , vale para todo elemento de  $[w]$ . ■

**Teorema 5** Sea  $\mathcal{M} = \langle W, R, \{S_i\}_{i \in \text{Agt}}, V, \text{Act} \rangle$  un modelo y sea  $\mathcal{M}_{\text{LMB}} = \langle W', \{R'_a\}_{a \in \text{Act}}, V' \rangle$  la contracción por LMB-bisimulación del modelo  $\langle W, \{R_a\}_{a \in \text{Act}}, V \rangle$ , entonces  $\langle \mathcal{M}, w \rangle$  y  $\langle \mathcal{M}', [w] \rangle$  son  $\mathcal{L}_{\text{K}_{h_i}}$ -bisimilares para cada  $w \in W$  siendo  $\mathcal{M}' = \langle W', R', \{S_i\}_{i \in \text{Agt}}, V', \text{Act} \rangle$ . ■

Notar que en este teorema, al fijar  $\mathcal{M} = \langle W, R, \{S_i\}_{i \in \text{Agt}}, V, \text{Act} \rangle$  inmediatamente fijamos a  $\text{Act}$  como el conjunto no vacío enumerable de acciones para la Lógica Modal Básica.

*Demostración.* 7 Queremos ver que  $Z = \{(w, [w]) \mid w \in W\}$  es una  $\mathcal{L}_{\text{K}_{h_i}}$ -bisimulación. ■

Por definición de la contracción por bisimulación en (LMB) se puede ver que se satisface (atom). Luego, por definición de  $Z$ , es fácil ver que (A-zig) y (A-zag) son satisfechas. Demostremos entonces  $(\mathcal{L}_{\text{K}_{h_i}}\text{-zig})$  y  $(\mathcal{L}_{\text{K}_{h_i}}\text{-zag})$ .

- $(\mathcal{L}_{\text{K}_{h_i}}\text{-zig})$ . Sean  $U, T$  ambos subconjuntos de  $W$  tales que  $U$  es proposicionalmente definible y  $U \xrightarrow{i} T$ . Queremos ver que existe  $T' \subseteq W'$  tal que
  - $Z(U) \xrightarrow{i} T'$ , •  $T' \subseteq Z(T)$ .

Veamos que  $T' = \{[w] \mid w \in T\}$  cumple con lo mencionado. Notemos que  $T' = Z(T)$ , por lo que solo debemos demostrar  $Z(U) \xrightarrow{i} T'$ .

Como  $U \xrightarrow{i} T$ , existe  $\pi \in S_i$  tal que  $\pi$  es fuertemente ejecutable en  $U$  y a su vez  $R_{\pi}(U) \subseteq T$ .

Demostremos que  $\pi$  es fuertemente ejecutable en  $Z(U)$  y que  $R'_\pi(Z(U)) \subseteq T'$ .

Supongamos que  $\pi$  no es fuertemente ejecutable en  $Z(U)$ . Luego existe  $\sigma \in \pi$  y  $[w_1], \dots, [w_k]$  con  $0 \leq k \leq |\sigma|$  tal que  $[w_1] \in Z(U)$ ,  $([w_i], [w_{i+1}]) \in R'_{\sigma[i]}$  y  $R'_{\sigma[k]}([w_k]) = \emptyset$ .

Ahora bien, como  $[w_1] \in Z(U)$ , existe  $w'_1 \in U$  tal que  $w'_1 \in [w_1]$ . Luego notemos que aplicando sucesivamente el Lema 3 en todo el camino, existen  $w'_1, \dots, w'_k$  tales que  $w'_i \in [w_i]$  y  $(w'_i, w'_{i+1}) \in R_{\sigma[i]}$ .

Pero veamos que esto nos dice que  $R_{\sigma[k]}(w'_k) = \emptyset$ . Pues, si existiera  $v$  tal que  $(w'_k, v) \in R_{\sigma[k]}$  entonces ocurriría que  $([w_k], [v]) \in R'_{\sigma[k]}$ . Luego  $\sigma \in \pi$  no es fuertemente ejecutable en  $w'_1 \in U$ , lo cuál es absurdo, pues dijimos que  $\pi$  es fuertemente ejecutable en todo  $U$ .

Esto nos dice que  $\pi$  es fuertemente ejecutable en  $Z(U)$ .

Veamos ahora que  $R'_\pi(Z(U)) \subseteq T'$ .

Sea  $[v] \in R'_\pi(Z(U))$ , entonces existen  $\sigma \in \pi$  y  $[w_1], \dots, [w_{|\sigma|+1}]$  tales que  $[w_1] \in Z(U)$ ,  $([w_i], [w_{i+1}]) \in R'_{\sigma[i]}$  y  $[w_{|\sigma|+1}] = [v]$ .

Ahora bien, como  $[w_1] \in Z(U)$ , entonces existe  $w'_1 \in U$  tal que  $w'_1 \in [w_1]$ . Luego notemos que aplicando sucesivamente el Lema 3 sobre el camino, existen  $w'_1, \dots, w'_{|\sigma|+1}$  tales que  $w'_i \in [w_i]$  y  $(w'_i, w'_{i+1}) \in R_{\sigma[i]}$ . Como  $R_\pi(U) \subseteq T$  esto nos dice que  $w'_{|\sigma|+1} \in T$ . Finalmente, por definición de  $T'$ ,  $[w_{|\sigma|+1}] \in T'$ . Luego como  $[v] = [w_{|\sigma|+1}]$ ,  $[v] \in T'$ .

Entonces demostramos que  $\pi$  es fuertemente ejecutable en  $Z(U)$  y que  $R'_\pi(Z(U)) \subseteq T'$ . Juntando ambos resultados, concluimos que  $Z(U) \xrightarrow{i} T'$ , lo cuál demuestra  $(L_{\text{K}h_i}\text{-zig})$ .

- $(L_{\text{K}h_i}\text{-zag})$  Sean  $U, T$  ambos subconjuntos de  $W'$  tales que  $U$  es proposicionalmente definible y  $U \xrightarrow{i} T$ . Queremos ver que existe  $T' \subseteq W$  tal que

$$\bullet Z^{-1}(U) \xrightarrow{i} T', \quad \bullet T' \subseteq Z^{-1}(T).$$

Veamos que  $T' = \{w \mid [w] \in T\}$  cumple con lo mencionado. Notemos que  $T' = Z^{-1}(T)$  por lo que solo debemos demostrar  $Z^{-1}(U) \xrightarrow{i} T'$ .

Como  $U \xrightarrow{i} T$ , existe  $\pi \in S_i$  tal que  $\pi$  es fuertemente ejecutable en todo  $U$  y a su vez  $R'_\pi(U) \subseteq T$ .

Veamos que  $\pi$  es fuertemente ejecutable en  $Z^{-1}(U)$  y que  $R_\pi(Z^{-1}(U)) \subseteq T'$ .

Supongamos que  $\pi$  no es fuertemente ejecutable en  $Z^{-1}(U)$ . Luego existe  $\sigma \in \pi$  y  $w_1, \dots, w_k$  con  $0 \leq k \leq |\sigma|$  tal que  $w_1 \in Z^{-1}(U)$ ,  $(w_i, w_{i+1}) \in R_{\sigma[i]}$  y  $R_{\sigma[k]}(w_k) = \emptyset$ .

Ahora bien, notemos entonces que por la definición de  $R'$ ,  $[w_1], \dots, [w_k]$  cumple que  $([w_i], [w_{i+1}]) \in R'_{\sigma[i]}$  y, a su vez, que  $[w_1] \in U$ , pues  $w_1 \in Z^{-1}(U)$ . Pero notemos que como  $R_{\sigma[k]}(w_k) = \emptyset$ , por la contrarrecíproca del Lema 3, podemos ver que  $R'_{\sigma[k]}([w_k]) = \emptyset$ , lo que nos dice que  $\sigma \in \pi$  no es fuertemente ejecutable en  $[w_1] \in U$ . Absurdo, pues dijimos que  $\pi$  es fuertemente ejecutable en todo  $U$ .

Esto nos dice que  $\pi$  es fuertemente ejecutable en todo  $Z^{-1}(U)$ .

Veamos ahora que  $R_\pi(Z^{-1}(U)) \subseteq T'$ .

Sea  $v \in R_\pi(Z^{-1}(U))$ , entonces existen  $\sigma \in \pi$  y  $w_1, \dots, w_{|\sigma|+1}$  tales que  $w_1 \in Z^{-1}(U)$ ,  $(w_i, w_{i+1}) \in R_{\sigma[i]}$  y  $w_{|\sigma|+1} = v$ .

Ahora bien, por la definición de  $R'$ , esto nos dice que  $[w_1], \dots, [w_{|\sigma|+1}]$  cumple que  $([w_i], [w_{i+1}]) \in R'_{\sigma[i]}$  y, a su vez, como  $w_1 \in Z^{-1}(U)$  entonces  $[w_1] \in U$ . Luego notemos que como  $R'_\pi(U) \subseteq T$ , esto nos dice que  $[w_{|\sigma|+1}] \in T$ , lo cuál implica que  $w_{|\sigma|+1} \in T'$ . Como  $v = w_{|\sigma|+1}$  entonces  $v \in T'$ .

Entonces demostramos que  $\pi$  es fuertemente ejecutable en todo  $Z^{-1}(U)$  y que  $R'_\pi(Z^{-1}(U)) \subseteq T'$ . Juntando ambos resultados, concluimos que  $Z^{-1}(U) \xRightarrow{i} T'$ , lo cuál demuestra  $(L_{Kh_i}\text{-zag})$ . ■

Demostramos entonces que  $Z$  es una  $L_{Kh_i}$ -bisimulación. Luego  $\langle M, w \rangle$  y  $\langle M', [w] \rangle$  son  $L_{Kh_i}$ -bisimilares para cada  $w \in W$ .

### 3. $L_{Kh_i}$ -Bisimulación entre dos modelos

**Lema 4** Sean  $\mathcal{M}_1 = \langle W, R, \{S_i\}_{i \in \text{Agt}}, V, \text{Act} \rangle$  y  $\mathcal{M}_2 = \langle W', R', \{S'_i\}_{i \in \text{Agt}}, V', \text{Act}' \rangle$  dos modelos tales que existe  $Z \subseteq W \times W'$   $L_{Kh_i}$ -bisimulación entre ellos, entonces

$$Z' = \{(w, w') \in W \times W' \mid V(w) = V'(w')\}$$

es una  $L_{Kh_i}$ -bisimulación entre  $\mathcal{M}_1$  y  $\mathcal{M}_2$ . ◀

Notemos que este teorema nos dice que para decidir si existe una  $L_{Kh_i}$ -bisimulación entre dos modelos  $\mathcal{M}_1$  y  $\mathcal{M}_2$  basta con verificar que  $Z'$  es una  $L_{Kh_i}$ -bisimulación.

*Demostración.* 8 Queremos ver que  $Z'$  es una  $L_{Kh_i}$ -bisimulación entre  $\mathcal{M}_1$  y  $\mathcal{M}_2$ , dado que existe  $Z \subseteq W \times W'$ ,  $L_{Kh_i}$ -bisimulación entre ellos.

Notemos que como  $Z$  es una bisimulación, entonces cumple (atom). Luego, notemos que por la definición de  $Z'$ ,  $Z \subseteq Z'$ , pues  $Z'$  contiene todos los pares de  $W \times W'$  que satisfacen (atom). Esto nos dice que  $Z'$  satisface (A-zig) y (A-zag). A su vez, cómo mencionamos,  $Z'$  contiene todos los pares que satisfacen (atom).

Demostremos entonces que  $Z'$  cumple  $(L_{Kh_i}\text{-zig})$  y  $(L_{Kh_i}\text{-zag})$ .

- $(L_{Kh_i}\text{-zig})$  Sean  $U, T \subseteq W$  tales que  $U$  es proposicionalmente definible y  $U \xRightarrow{i} T$  queremos ver que existe  $T' \subseteq W'$  tal que:

$$\bullet Z'(U) \xRightarrow{i} T', \quad \bullet T' \subseteq Z'(T).$$

Notemos que como  $Z$  es una bisimulación, entonces existe  $T'' \subseteq W'$  tal que:

$$\bullet Z(U) \xRightarrow{i} T'', \quad \bullet T'' \subseteq Z(T).$$

Demostremos que  $T' := T''$  cumple con lo mencionado. Es claro que como  $Z \subseteq Z'$  y  $T'' \subseteq Z(T)$  entonces  $T'' \subseteq Z'(T)$ . Entonces, nos queda demostrar que  $Z'(U) \xRightarrow{i} T''$ .

Esto lo demostraremos analizando que  $Z(U) = Z'(U)$ . Nuevamente, como  $Z \subseteq Z'$  entonces  $Z(U) \subseteq Z'(U)$ . Luego, solo queda demostrar que  $Z'(U) \subseteq Z(U)$ .

Sea  $w' \in Z'(U)$ , entonces existe  $w \in U$  tal que  $(w, w') \in Z'$ , por lo que  $V(w) = V'(w')$ . Ahora bien, como  $Z$  cumple (A-zag), existe  $v \in W$  tal que  $(v, w') \in Z$ , y cómo  $Z$  cumple (atom) entonces  $V(v) = V'(w')$ . Luego  $V(w) = V(v)$ .

Notemos que como  $U$  es proposicionalmente definible entonces existe una fórmula  $\varphi$  proposicional que lo define. Como  $w \in U$ , esto nos dice que  $\mathcal{M}, w \models \varphi$ . Luego por Lema 1,  $\mathcal{M}, v \models \varphi$ , por lo que  $v \in U$ . Como  $v \in U$  y  $(v, w') \in Z$  entonces  $w' \in Z(U)$ .

Lo cuál demuestra que  $Z(U) = Z'(U)$ . Por lo que  $Z'(U) \xrightarrow{i} T''$ . Finalmente, concluimos que  $Z'$  cumple  $(L_{Kh_i}\text{-zig})$ .

- $(L_{Kh_i}\text{-zag})$  Análogo a  $(L_{Kh_i}\text{-zig})$ .

Queda demostrado que  $Z'$  es una  $L_{Kh_i}$ -bisimulación. ■

**Teorema 6** *El problema de decidir si existe una  $L_{Kh_i}$ -bisimulación entre dos modelos  $\mathcal{M}_1$  y  $\mathcal{M}_2$  ( $L_{Kh_i}$  - bisimilitud) es  $co - NP$  completo.* ◀

*Demostración.* 9 Debemos demostrar que  $L_{Kh_i} - bisimilitud \in co - NP$  y que es  $co - NP$  hard.

Para demostrar que está en  $co - NP$  debemos dar un algoritmo  $A$  y un polinomio  $p$  tal que dos modelos  $\mathcal{M}_1$  y  $\mathcal{M}_2$  son  $L_{Kh_i}$ -bisimilares si y sólo si para todo  $x \in \{0, 1\}^*$  con  $|x| \leq p(|\mathcal{M}_1| + |\mathcal{M}_2|)$ ,  $A(\mathcal{M}_1, \mathcal{M}_2, x) = 1$ . Esencialmente, a los  $x$  los llamaremos “contraejemplos” y sólo nos interesarán los que representen un subconjunto del dominio de  $\mathcal{M}_1$  o del dominio de  $\mathcal{M}_2$ .

Dados que los contraejemplos que nos interesan son subconjuntos de los dominios de ambos modelos, un polinomio que nos sirve para acotar los largos de los contraejemplos es  $p(x) = x$ .

El algoritmo  $A$  que propondremos hará lo siguiente:

Dados  $\mathcal{M}_1, \mathcal{M}_2$  y  $x$ , verificar que el conjunto  $Z'$  mencionado en el lema 4 sea una  $L_{Kh_i}$ -bisimulación entre los dos modelos recibidos. Notar que podemos verificar polinomialmente que  $Z'$  cumple (A-zig) y (A-zag).

Luego el algoritmo verificará que  $Z'$  cumpla con  $(L_{Kh_i}\text{-zig})$  o  $(L_{Kh_i}\text{-zag})$  con respecto al subconjunto  $x$ , dependiendo de si  $x$  es un subconjunto del dominio de  $\mathcal{M}_1$  o del dominio de  $\mathcal{M}_2$ . Notar que sólo nos interesarán los  $x$  que sean proposicionalmente definibles, así que el algoritmo deberá encargarse de chequear que  $x$  efectivamente sea un conjunto proposicionalmente definible.

En caso de serlo, simplemente analizará a qué conjunto se puede llegar desde  $x$  utilizando cada plan del modelo y para cada uno de ellos, verificar que  $Z'(x)$  tenga algún plan con el que cumpla la condición deseada.

(Queda escribir este algoritmo y demostrar más en profundidad el si y sólo si mencionado).

Luego  $L_{Kh_i} - bisimilitud \in co - NP$ .

Ahora demosmos que  $L_{K_{hi}} - bisimilitud$  es  $co - NP$  hard.

Para demostrarlo, reduciremos el problema  $DNF - TAUT$  a  $L_{K_{hi}} - bisimilitud$ . El problema  $DNF - TAUT$  está compuesto por las fórmulas  $\varphi$  proposicionales en forma disyuntiva normal que son tautologías.  $DNF - TAUT$  es  $co - NP$  completo, por lo que si encontramos una reducción en tiempo polinomial de  $DNF - TAUT$  a  $L_{K_{hi}} - bisimilitud$  habremos demostrado que  $L_{K_{hi}} - bisimilitud$  es  $co - NP$  hard.

Es decir, queremos encontrar una reducción  $f$  que transforme una  $\varphi$  proposicional en forma disyuntiva normal a un par de modelos  $(M_1, M_2)$  en tiempo polinomial en el tamaño de  $\varphi$  tal que  $\varphi \in DNF - TAUT$  si y sólo si  $(M_1, M_2) \in L_{K_{hi}} - bisimilitud$ .

Describamos entonces a  $f$ .

Sea  $\varphi$  una fórmula proposicional en forma disyuntiva normal, entonces es de la forma  $\varphi = \varphi_1 \vee \dots \vee \varphi_m$ . Sean a su vez  $p_1, \dots, p_n$  las variables proposicionales que aparecen en  $\varphi$ , definimos los siguientes conjuntos:

- $W := \{p_i \mid i \in \{1, \dots, n\}\} \cup \{\varphi_i \mid i \in \{1, \dots, m\}\} \cup \{e\}$
- $Act := \{in_{\varphi_i} \mid i \in \{1, \dots, m\}\} \cup \{out_{\varphi_i} \mid i \in \{1, \dots, m\}\}$
- $S := \{\{in_{\varphi_i}, out_{\varphi_i}\} \mid i \in \{1, \dots, m\}\}$
- $R := \{(p_i, \varphi_j, in_{\varphi_j}) \mid p_i \text{ no aparece en forma negativa en } \varphi_j\} \cup \{(\varphi_j, p_i, out_{\varphi_j}) \mid p_i \text{ aparece en forma positiva en } \varphi_j\} \cup \{(\varphi_j, e, out_{\varphi_j}) \mid \varphi_j \text{ no tiene variables positivas}\}$

Notar que decimos que  $p_i$  aparece en forma ‘positiva’ en  $\varphi_j$  si  $\varphi_j = \dots \wedge p_i \wedge \dots$ . A su vez, decimos que  $p_i$  aparece en forma ‘negativa’ en  $\varphi_j$  si  $\varphi_j = \dots \wedge \neg p_i \wedge \dots$ .

Ahora,  $f$  mapeará a  $\varphi$  a  $(M_1, M_2)$ , los cuáles son definidos de la siguiente manera:

- En el caso de que  $\varphi$  evalúe a *false* en la asignación que asigna a  $p_1, \dots, p_n$  el valor *false*:
  - $M_1 = \langle \{1\}, \{\}, \{\}, \{(1, p)\}, \{a\} \rangle$
  - $M_2 = \langle \{1\}, \{\}, \{\}, \{(1, q)\}, \{a\} \rangle$

Notar que estos dos modelos son claramente no  $L_{K_{hi}}$ -bisimilares, dado que no existe relación binaria no vacía que satisfaga (atom). Pero es correcto porque sólo utilizaremos esta definición en uno de los casos donde  $\varphi \notin DNF - TAUT$ .

- En el caso de que  $\varphi$  evalúe a *true* en la asignación que asigna a  $p_1, \dots, p_n$  el valor *false*:
  - $M_1 = \langle W, R \cup \{(p_i, p_i, test) \mid i \in \{1, \dots, n\}\} \cup \{(p_i, e, test) \mid i \in \{1, \dots, n\}\}, \{S \cup \{test\}\}, V, Act \cup \{test\} \rangle$
  - $M_2 = \langle W, R, \{S\}, V, Act \rangle$

V no sé cómo definirlo pero básicamente me gustaría que le asignara a cada nodo una variable proposicional distinta (V inyectiva), así la única bisimulación posible sería  $\{(w, w) \mid w \in W\}$ .

Un detalle importante es que los modelos tienen un único conjunto de clases de planes (se considera un solo agente), en el que cada clase de equivalencia está formada por un único plan (singletons).

Un poco la intuición de esto es que quiero usar los conjuntos proposicionalmente definibles de este modelo para considerar cada posible asignación de valores a las variables  $p_1, \dots, p_n$ . Dado un conjunto  $U$  proposicionalmente definible, es como que considero que a las variables dentro de  $U$  se les asignó *true* y a las de fuera de  $U$  se les asignó *false*.

El plan *test* que sólo aparece en  $\mathcal{M}_1$  es la clave de la reducción. Lo que provoca es que dada una asignación (un conjunto proposicionalmente definible  $U$ ), a  $\mathcal{M}_2$  le hago buscar algún término  $\varphi_i$  al cuál pueda moverse (ninguna variable de  $U$  aparezca negada en  $\varphi_i$ ) y a su vez todo variable que aparecía positiva en  $\varphi_i$  estaba en  $U$ . (Porque el plan *test* es como que simplemente va de  $U$  a  $U \cup \{e\}$ ), el  $e$  es como que considera los términos que no tienen ninguna variable positiva ( $e$  de empty set).

Si  $\mathcal{M}_2$  no encuentra ningún término al cuál moverse es que dicho  $U$  sirve como contraejemplo para afirmar que  $\varphi$  no es una tautología.

Notemos que ambos modelos son polinomiales en el tamaño de  $\varphi$ .

Ahora queremos demostrar que  $\varphi \in DNF - TAUT$  si y sólo si  $(\mathcal{M}_1, \mathcal{M}_2) \in L_{Kh_i} - bisimilitud$ .

- ( $\rightarrow$ ) Sea  $\varphi \in DNF - TAUT$ , donde  $\varphi = \varphi_1 \vee \dots \vee \varphi_m$  y  $p_1, \dots, p_n$  son las variables proposicionales que aparecen en  $\varphi$ , veamos que  $(\mathcal{M}_1, \mathcal{M}_2) \in L_{Kh_i} - bisimilitud$ .

Algo que debemos notar es que hay una única posible bisimulación  $Z$  entre  $\mathcal{M}_1$  y  $\mathcal{M}_2$ , dado que toda bisimulación debe satisfacer (A-zig), (A-zag) y (atom), y cada nodo tiene un único nodo en el modelo contrario con la misma imagen de  $V$ .

Esta bisimulación es  $Z := \{(w, w) \mid w \in W\}$ . Es claro que  $Z$  cumple (atom), (A-zig) y (A-zag).

Veamos que que toda arista y todo plan que está en  $\mathcal{M}_2$  también está en  $\mathcal{M}_1$ , motivo por el cuál podemos afirmar que  $Z$  satisface ( $L_{Kh_i}$ -zag).

Luego solo queda ver que  $Z$  cumple ( $L_{Kh_i}$ -zig).

Sea  $U, T \subseteq W$  tal que  $U$  proposicionalmente definible y  $U \xrightarrow{i} T$ , queremos ver que existe  $T' \subseteq W$  tal que:

- $Z(U) \xrightarrow{i} T'$ ,
- $T' \subseteq Z(T)$ .

Un detalle a tener en cuenta es que al ser  $Z = \{(w, w)\}$ , entonces siempre  $Z(X) = X$  para todo  $X \subseteq W$ .

Notemos primero que si el plan que utiliza el agente es de la forma  $in_{\varphi_i} out_{\varphi_i}$ , entonces  $T$  sirve como  $T'$  dado que ese mismo plan y las mismas aristas con dichas etiquetas están en  $\mathcal{M}_2$ .

Entonces consideremos el caso en el que el plan utilizado fue *test*. En dicho caso, si analizamos la definición de  $R$ , ese plan puede ser fuertemente ejecutable sólo si  $U \subseteq \{p_1, \dots, p_n\}$  dado que son los únicos nodos que tienen aristas con etiqueta *test*. Así que solo necesitamos considerar los casos donde  $U \subseteq \{p_1, \dots, p_n\}$ .

Notemos que  $R_{test}(U) = U \cup \{e\}$ , entonces necesariamente  $U \cup \{e\} \subseteq T$ . Luego, basta encontrar algún plan en  $\mathcal{M}_2$  que lleve de  $Z(U) = U$  a algún  $T' \subseteq Z(T)$ .

Consideremos ahora la asignación  $\vec{a}$  que asigna *true* a las variables en  $U$  y *false* a las variables en  $\{p_1, \dots, p_n\}/U$ . Como  $\varphi$  es una tautología, entonces existe  $\varphi_j$  que se vuelve verdadero a partir de  $\vec{a}$ , es decir, en  $\varphi_j$  las variables que aparecen en forma positiva son algún subconjunto de  $U$  y las variables que aparecen en forma negativa son algún subconjunto de las variables de  $\{p_1, \dots, p_n\}/U$ .

Como las variables que aparecen de forma negativa no están en  $U$ , entonces podemos ver, analizando la definición de  $R$ , que el plan  $in_{\varphi_j}out_{\varphi_j}$  es fuertemente ejecutable en  $U$ .

En particular, la aristas con etiqueta  $in_{\varphi_j}$  llevarían de cada nodo de  $U$  al nodo  $\varphi_j$ .

Ahora bien, notemos que la arista  $out_{\varphi_j}$  lleva del nodo  $\varphi_j$  a las variables que aparecen en forma positiva o al nodo  $e$  en caso de no tener variables positivas. Pero, como dijimos, las variables positivas que aparecen en  $\varphi_j$  son un subconjunto de  $U$ . Entonces necesariamente de  $\varphi_j$  iremos a un conjunto  $X \subseteq U \cup \{e\}$ , es decir,  $R_{in_{\varphi_j}out_{\varphi_j}}(U) = X \subseteq U \cup \{e\} \subseteq T$ . Finalmente,  $T' := X$  nos sirve para demostrar que  $Z(U) \xrightarrow{i} T'$  y, a su vez,  $T' \subseteq Z(T)$ .

Lo cual demuestra que  $Z$  satisface  $(L_{Kh_i}\text{-zig})$ .

Juntando los puntos mencionados, demostramos que  $Z$  es una  $L_{Kh_i}$ -bisimulación entre  $\mathcal{M}_1$  y  $\mathcal{M}_2$ , por lo que  $(\mathcal{M}_1, \mathcal{M}_2) \in L_{Kh_i} - bisimilitud$ .

- ( $\leftarrow$ ) Para demostrar este caso, veremos que siendo  $\varphi \notin DNF - TAUT$ , donde  $\varphi = \varphi_1 \vee \dots \vee \varphi_m$  y  $p_1, \dots, p_n$  son las variables proposicionales que aparecen en  $\varphi$ , entonces  $(\mathcal{M}_1, \mathcal{M}_2) \notin L_{Kh_i} - bisimilitud$ .

Como  $\varphi \notin DNF - TAUT$ , existe una asignación  $\vec{a}$  sobre las variables  $p_1, \dots, p_n$  que hace fallar cada  $\varphi_j$ . Sea  $U$  el conjunto de variables a las que se le asigna *true* en  $\vec{a}$ .

Si  $U = \emptyset$ , es claro que  $(\mathcal{M}_1, \mathcal{M}_2) \notin L_{Kh_i} - bisimilitud$ , dado que en este caso se construyen dos modelos concretos que no son  $L_{Kh_i}$ -bisimilares.

Así que consideremos el caso donde  $U \neq \emptyset$ . Notemos que como mencionamos anteriormente, la única bisimulación posible entre  $\mathcal{M}_1$  y  $\mathcal{M}_2$  es  $Z := \{(w, w) \mid w \in W\}$ . Veamos que  $Z$  no es una  $L_{Kh_i}$ -bisimulación.

Notemos que el conjunto  $U$  es proposicionalmente definible, dado que la función  $V$  está definida de forma inyectiva, podemos ver que  $U$  cumple que es unión de clases de equivalencias de  $\rho_M$ , luego por Lema es proposicionalmente definible.

A su vez, como  $U \subseteq \{p_1, \dots, p_n\}$  entonces el plan *test* es fuertemente ejecutable en  $U$  y  $R_{test}(U) = U \cup \{e\}$ , por lo que  $U \xrightarrow{i} U \cup \{e\}$ .

Veamos que no existe  $T'$  tal que:

- $Z(U) \xrightarrow{i} T'$ ,
- $T' \subseteq Z(U \cup \{e\})$ .

Notemos que los planes que tiene a su disposición  $Z(U)$  son de la forma  $in_{\varphi_j} out_{\varphi_j}$ .

Sea entonces  $\varphi_j$ , analicemos qué sucede en relación al plan  $in_{\varphi_j} out_{\varphi_j}$ . Un primer detalle a tener en cuenta es que como  $\vec{a}$  hace fallar a  $\varphi_j$ , entonces ocurre que existe una variable en  $U$  que aparece en forma negativa en  $\varphi_j$ , o existe una variable en  $\{p_1, \dots, p_n\}/U$  que aparece en forma positiva en  $\varphi_j$ .

Si ocurre que una variable de  $U$  aparece en forma negativa en  $\varphi_j$  entonces el plan  $in_{\varphi_j} out_{\varphi_j}$  no será fuertemente ejecutable en dicha variable y, por lo tanto, no será fuertemente ejecutable en  $U$ . Así que este plan no permitiría encontrar un  $T'$  adecuado.

Por otro lado, si ninguna variable de  $U$  aparece en forma negativa en  $\varphi_j$  entonces  $in_{\varphi_j} out_{\varphi_j}$  es fuertemente ejecutable en  $U$ . Sin embargo, notemos que entonces existe una variable  $p_k$  en  $\{p_1, \dots, p_n\}/U$  que aparece en forma positiva en  $\varphi_j$ . Ahora bien, como  $p_k$  aparece en forma positiva en  $\varphi_j$  entonces  $p_k \in R_{in_{\varphi_j} out_{\varphi_j}}(U)$ . Luego  $R_{in_{\varphi_j} out_{\varphi_j}}(U) \not\subseteq U \cup \{e\}$ , por lo que dicho plan no nos permite encontrar un  $T'$  adecuado.

Hemos analizado entonces todos los planes posibles y ninguno encuentra un  $T'$  que cumpla con lo requerido, luego  $Z$  no satisface  $(L_{Kh_i}\text{-zig})$ .

Hemos demostrado entonces que  $Z$  no es una  $L_{Kh_i}$ -bisimulación.

Lo cual demuestra que  $(M_1, M_2) \notin L_{Kh_i} - \text{bisimilitud}$ . ■

Hemos demostrado que  $f$  es una reducción de  $DNF - TAUT$  a  $L_{Kh_i} - \text{bisimilitud}$ , la cuál puede ser computada en tiempo polinomial. Lo cuál demuestra que  $L_{Kh_i} - \text{bisimilitud}$  es  $co - NP$  hard.

Finalmente, como  $L_{Kh_i} - \text{bisimilitud} \in co - NP$  y  $L_{Kh_i} - \text{bisimilitud}$  es  $co - NP$  hard, podemos concluir que  $L_{Kh_i} - \text{bisimilitud}$  es  $co - NP$  completo.

## 4. Ideas sueltas

**Teorema 7** Sea  $M = \langle W, R, \{S_i\}_{i \in \text{Agt}}, V, \text{Act} \rangle$  un modelo, y sea  $Z \subseteq W \times W$  una relación binaria que satisface (atom) y  $\text{Id} := \{(w, w) \in W\} \subseteq Z$ , entonces  $Z$  es una autobisimulación. ◀

No se si dice mucho este teorema, pero al menos caracteriza un poco las autobisimulaciones.

Resumen de lo trabajado:

Conclusiones positivas acerca de las contracciones, nos dicen cosas sobre la expresividad de la lógica, en el sentido de que demostramos que dado un modelo siempre existe otro en el que la función de valuación es inyectiva (no hay dos nodos que satisfagan exactamente el mismo conjunto de variables proposicionales), usa planes de solo un paso y las clases de equivalencia de planes que conoce cada agente son simplemente singletons y aún así la lógica no sabe cómo diferenciarlos (son lógicamente equivalentes).



También, logramos contraer un modelo a otro donde chequear strong executability se logra en un solo paso, por lo que potencialmente se ahorra cómputo al no necesitar cada paso intermedio de un plan.

Ambas contracciones son computables en tiempo polinomial en el tamaño del modelo lo cuál es muy bueno.

Conclusiones negativas, no logramos encontrar una contracción que de verdad minimice el **tamaño** del modelo en cuestión. Si bien, seguro encontramos un modelo lógicamente equivalente que minimiza la cantidad de nodos, puede darse el caso que la contracción aumente considerablemente la cantidad de aristas (sin embargo, hay que considerar el trade-off del ahorro en el chequeo de strong executability).

Cosas a analizar:

- Hay una contracción mejor?
- Puede tener que ver la definición de bisimulación con el hecho de que no encontramos una contracción totalmente convincente (ver teorema de esta sección capaz)?
- Como dijo Carlos, puede tener que ver con la naturaleza de los modelos donde se interpreta la lógica? En ese caso considerar hacer un análisis desde teoría de modelos.