346 (GB)

2022

भौतिक विज्ञान

समय: तीन घण्टे 15 मिनट।

(पूर्णांक : 70

निर्देश :

- (i) प्रारम्भ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न-पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं।
- (ii) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- (iii) इस प्रश्न-पत्र में **पाँच** खण्ड हैं खण्ड **अ, खण्ड ब, खण्ड स,** खण्ड **द** और खण्ड **य** ।
- (iv) खण्ड अ बहुविकल्पीय है तथा प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है.1
- (v) खण्ड व अति लघु-उत्तरीय है तथा प्रत्यंक प्रश्न का 1 अंक है।
- (vi) खण्ड स लघु-उत्तरीय प्रकार-I के हैं तथा प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक हैं ।
- (vii) **खण्ड द** लघु-उत्तरीय प्रकार-II के हैं तथा प्रत्येक प्रश्न के **3 अंक** हैं।
- (viii) **खण्ड य** विस्तृत-उत्तरीय है। प्रत्येक प्रश्न के **5** अंक हैं। इस खण्ड के सभी चारों प्रश्नों में आन्तरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्नों में आपको दिए गए चयन में से केवल एक प्रश्न ही करना है।

346 (GB)

1

P.T.O.

खण्ड अ

- (क) अर्धचालक में संयोजकता बैण्ड एवं चालन बैण्ड के बीच ऊर्जा अन्तराल लगभग होता है:

 (i) 5 eV (ii) 1 eV (iii) 15 eV (iv) शून्य
 - (ख) हाइड्रोजन परमाणु की दो उत्तरोत्तर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग में अन्तर होता है:
 - (i) $\frac{h}{\pi}$

(ii) $\frac{h}{2}$

(iii) $\frac{h}{2\pi}$

- (iv) 2h
- (ग) 5000 इलेक्ट्रॉन-बोल्ट (eV) ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन का दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्ध्य है :
 - (i) 50 Å

(ii) 0·380 Å

1

1

- (iii) 0·173 Å
- (iv) 1.03 Å
- (घ) विद्युत-चुम्बकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में रेडियो आवृत्ति का परास है:
 - (i) $3 \times 10^6 3 \times 10^{10} \text{ c/s}$
 - (ii) $3 \times 10^{12} 3 \times 10^{14} \text{ c/s}$
 - (iii) $3 \times 10^{14} 3 \times 10^{16} \text{ c/s}$
 - (iv) $3 \times 10^{16} \text{ c/s }$ से ऊपर
- (ङ) 200 ओम प्रतिरोध तथा 1 हेनरी प्रेरकत्व के श्रेणी संयोजन पर प्रत्यावर्ती वोल्टता $V=10\sqrt{2}\,\sin{(200t)}$ लगायी गयी है । तो V तथा i के बीच कलान्तर होगा :
 - (i) 90°

(ii) 45°

(iii) 60°

(iv) 30°

1.48	 जब एक प्रकाश किरण बायु से काँच में जाती है, तो 			खुण्ड स
, -	.सकी:	1	3. (⁷	क) एक द्वि-उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या एँ क्रमश: 15 सेमी तथा 30 सेमी हैं। 1·65 अपवर्तनांक वाले
	(i) तरगदैध्यं कम हो जाती है(ii) तरगदैध्यं बढ़ जाती है			दव में डबोने पर इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए।
	(iii) आवृत्ति बढ़ जाती है			काँच का अपवर्तनांक 1.5 है। द्रव में लेंस की
	(iv) न तो तरंगदैर्घ्य तथा न ही आवृत्ति बदलती है		/	प्रकृति क्या है ?) परमाणु के बोहर मॉडल के अभिगृहीत लिखिए ।
	खण्ड ब		(ख (ग	
2. (क ⁾	स्थिर-वैद्यतिकी का गाँस का नियम लिखिए।	1		दिखाइए ।
खु ।	कम विभवान्तर पर धात्विक चालक एवं टार्च के बल्ब के लिए, विभवान्तर और धारा के बीच ग्राफ खींचिए।	1	(ঘ)	विखण्डित करने के लिए न्यूनतम कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी ? हाइड्रोजन परमाणु, एक न्यूट्रॉन और
,π)	V विभवान्तर से त्वरित एक आवेशित कण के लिए दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्ध्य का सूत्र लिखिए।			₂ He ⁴ परमाणु के परमाणु द्रव्यमान मात्रक (amu) क्रमश: 1·007825, 1·008665 तथा 4·002603 हैं।
	द ब्राग्ला तरगद्द्य का सूत्र ।लाखए ।	1.		खण्ड द
. प्र i	एक चालक पर $2\cdot 4\times 10^{-18}$ कूलॉम धनात्मक आवेश हैं । बताइए कि इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है ।	1	4. (क)	,
(ঙ্)	उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेमी है तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेमी है। दोनों लेंस सम्पर्क में रखे हैं। इस संयोजन से 25 सेमी की दूरी पर वस्तु रखी है। वस्तु के प्रतिबिम्ब की स्थिति ज्ञात कीजिए।		(평)	एक '50 वाट और 100 वोल्ट' लैम्प को 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज़ विद्युत् मेन्स से जोड़ा गया है। लैम्प को जलाने के लिए उसके श्रेणीक्रम में जुड़े आवश्यक संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए।
(च)	कला-सम्बद्ध स्रोत से आप क्या समझते हैं ?	1	(ग)	विभवमापी का सिद्धान्त परिपथ चित्र की सहायता से समझाइए।
6 (GB)	3 P.T		346 (GB)	4

(멸)	रेल की दो पटरियाँ आपस में तथा ज़मीन से प्र थक्त हैं । इन्हें एक मिलीबोल्टमीटर से जोड़ा गया है । जब	
	है इन्हें एक मिलाबाट्टमाट से जाएँ इन पर एक ट्रेन 180 किलोमीटर/प्रति घण्टा की चाल से	
	- े को के तो फिलीवोल्टमीटर को पाठधाक क्या	
	होगा १ दिया गया है पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र का	
	$_{3}$ ध्वाध्यः अवयव $0.2 imes 10^{-4}$ वेबर/मी. 2 है तथा	
	पटियां परस्पर 1 मीटर की दूरी पर हैं।	3
·>	प्रकाश-विद्युत प्रभाव से क्या तात्पर्य है ? इस प्रभाव की	
(ङ)	आइन्स्टीन द्वारा दी गर्बी व्याख्या लिखिए ।	3
(क)	एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व L, धारिता C	
(")	तथा ओमीय प्रतिरोध R श्रेणीक्रम में जुड़े हैं । परिपर्थ	_
	की प्रतिबाधा का व्यंजक प्राप्त कीजिए ।	3
(평)	एक समान्तर प्लेट संधारित्र की प्लेट का व्यास 6 सेमी	
(3)	तथा उसमें परावैद्यत के रूप में वायु है । यदि इस	
	संधारित्र की धारिता 200 सेमी व्यास वाले गोले के	
	समान हो, तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात	
	कीजिए ।	3
(ग)	वृत्ताकार धारावाही कुण्डली के केन्द्र पर चुम्बकीय क्षेत्र	
	का व्यंजक निगमित कीजिए।	3
(घ)	दो बिन्दु आवेश +9 e तथा + e परस्पर 'a' दूरी पर	
(7)	हैं । बताइए कि एक तीसरे बिन्दु आवेश 'q' को दोनों	
	विन्दु आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखा	
	जाए कि वह सन्तुलन में हो ?	3
1	अथवा	
		,
	भू-चुम्बकत्व के विभिन्न अवयव क्या हैं ? इन्हें	
	परिभाषित कीजिए ।	3
(홍)	यौगिक सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिम्ब का बनना स्वच्छ	5
!	किरण आरेख बनाकर समझाइए ।	3
346 (GB)	5 P	.T.O.
J40 (GD)		

खुण्ड य

हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के अपवर्तन के नियम की व्याख्या कीजिए।

अथवा

एक पतली एकल झिरीं द्वारा एकवर्णीय प्रकाश के विवर्तन की विवेचना कीजिए । केन्द्रीय उच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई का व्यंजक ज्ञात कीजिए ।

7. सौर सेल क्या हैं ? सौर सेल की संरचना एवं कार्यविधि लिखिए।


अथवा

एक समतल-उत्तल लेंस का व्यास 6 सेमी है तथा मोटाई 3 मिमी है । इस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए । लेंस के पदार्थ में प्रकाश की चाल 2×10^8 मी./से. है ।

8. एकसमान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल-युग्म के आधूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए । इसकी सहायता से वैद्युत द्विध्रुव आधूर्ण की परिभाषा दीजिए ।

अथवा

दिए गए परिपथ के लिए प्रत्येक शाखा में बहने वाली धारा की गणना कीजिए :



346 (GB)

हाना सन्धि डाबोड के लिए अग्रदिशिक अभिनत एवं उत्क्रम अधिनत से क्या तात्पर्य है ? यह पूर्ण-तरंग दिष्टकारी के रूप में कैसे एवक होता है ? परिपथ आरेख बनाकर समझाइए ।

5

5

अथवा

हेल्का-कण के प्रकीर्णन प्रयोग का वर्णन कीजिए । इस प्रयोग से प्राप्त परिणामों पर आधारित रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लिखिए ।

भौतिक नियतांक

इलेक्ट्रॉन पर आवेश $= 1.6 imes 10^{-19}$ कूलॉम

प्लांक नियतांक $h = 6.6 \times 10^{-34}$ जूल-से.

प्रकाण की चाल $c = 3 \times 10^8$ मी./से.

 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ Tesla mA}^{-1}$

इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान $\mathbf{m_e}^- = 9.1 imes 10^{-31}$ किग्रा

 $\varepsilon_0 = -8.86 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{Nm}^2$

(English Version)

Instructions:

- (i) First 15 minutes are allotted for the candidates to read the question paper.
- (ii) All the questions are compulsory.
- (iii) This question paper consists of five Sections

 Section A, Section B, Section C, Section D and
 Section E.
- (iv) Section A is of multiple choice type and each question carries 1 mark.
- (v) Section B is of very short-answer type and each question carries 1 mark.
- (vi) Section C is of short-answer type-I and each question carries 2 marks.
- (vii) **Section D** is of short-answer type-II and each question carries 3 marks.
- (viii) Section E is of long-answer type. Each question carries 5 marks. All four questions of this section have been given internal choice. You have to do only one question from the choices given in the question.

SECTION A

- (a) In a semiconductor, the energy gap between valence band and conduction band is nearly:
 - (i) 5 eV

(ii) 1 eV

1

1

P.T.O.

(iii) 15 eV

- (iv) Zero
- (b) The difference in angular momentum of electrons between two successive orbits of hydrogen atom is:
 - (i) $\frac{h}{\pi}$

(ii) $\frac{h}{2}$

(iii) $\frac{h}{2\pi}$

- (iv) 2h
- (c) The de Broglie wavelength of electron of energy 5000 eV is :
 - (i) 50 Å

- (ii) 0·380 Å
- (iii) 0·173 Å
- (iv) 1.03 Å
- (d) The range of radio frequency in the spectra of electromagnetic radiation is:
 - (i) $3 \times 10^6 3 \times 10^{10} \text{ c/s}$
 - (ii) $3 \times 10^{12} 3 \times 10^{14} \text{ c/s}$
 - (iii) $3 \times 10^{14} 3 \times 10^{16} \text{ c/s}$
 - (iv) Above 3×10^{16} c/s
- (e) An alternative voltage $V = 10\sqrt{2} \sin{(200t)}$ is applied on a series combination of resistance of 200 ohm and inductance of 1 henry. Then the phase difference between V and i will be:
 - (i) 90°

(ii) 45°

(iii) 60°

(iv) 30°

- (f) When a light ray enters from air to glass then its:
 - (i) Wavelength decreases
 - (ii) Wavelength increases
 - (iii) Frequency increases
 - (iv) Neither wavelength nor frequency changes

SECTION B

- 2. (a) Write Gauss's law of electrostatics.
 - (b) Draw the graph between potential difference and current for metallic conductor and bulb of a torch at low potential difference.
 - (c) Write down the formula for the de Broglie wavelength for a charged particle accelerated by potential difference of V.
 - (d) There is 2.4×10^{-18} coulomb positive charge on a conductor. State how many electrons are decreased or increased on the conductor. https://www.upboardonline.com/1
 - (e) The focal lengths of convex and concave lenses are 10 cm and 50 cm respectively. Both lenses are kept in contact. An object is placed at a distance of 25 cm from this combination. Find the position of the image of the object.
 - (f) What do you understand by coherent source?

SECTION C

(a) The radius of curvatures of a double convex lens are 15 cm and 30 cm respectively. Find its focal length when it is immersed in a liquid of refractive index 1.65. Refractive index of glass is 1.5. What is the nature of lens in the liquid?

2

(b) Write down the postulates of Bohr model of atom.

2

drawing its propagation diagram, show the electric field and magnetic field components in it.

2

(d) What is the minimum energy required to break a ₂He⁴ nucleus into free protons and neutrons? Masses of hydrogen atom, a neutron and ₂He⁴ atom in a.m.u. are 1.007825, 1.008665 and 4.002603 respectively.

2

SECTION D

- 4. (a) Deduce the formula for refractive index n for the material of a prism in terms of angle of minimum deviation and angle of prism.
 - (b) A '50 watt and 100 volt' lamp is connected to electric mains of 200 volt and 50 Hertz. Find the capacity of condenser required in the series of lamp in order to glow it.
 - (c) Explain the principle of potentiometer with help of circuit diagram.
 - (d) Two rail tracks are isolated with each other and from the earth. They are connected with a millivoltmeter. What will be the reading of millivoltmeter when a train runs on it with speed 180 km/hour? Given that the vertical component of Earth's magnetic field is 0.2 × 10⁻⁴ weber/m² and tracks are at a distance of 1 meter apart.
 - (e) What is meant by photoelectric effect? Write the explanation given by Einstein for this effect.
- 5. (a) Inductance L, capacitance C and resistance R are connected in series in alternative current circuit. Obtain the expression for the impedance of the circuit.

β46 (GB)

11

P.T.O.

346 (GB)

12

- (b) The diameter of parallel plate condenser is 6 cm and it is filled with air as dielectric. If capacity of this condenser be the same as that of a sphere of diameter 200 cm, then find the distance between its plates.
- (c) Deduce the expression for magnetic field at the centre of a current carrying circular coil.
- (d) Two point charges +9 e and + e are at a distance 'a' apart. For the equilibrium position, where would a third point charge 'q' be placed on the line joining the two charges?

OR

What are the different elements of Earth's magnetism? Give their definitions.

(e) Draw a neat ray diagram of compound microscope to explain the image formation.

3

3

3

3

3

P.T.O.

SECTION E

 Explain the laws of refraction of light waves on the basis of Huygens' principle of secondary wavelets.

OR

5

5

5

5

Discuss the diffraction of monochromatic light through a narrow single slit. Find out the expression for angular width of central maxima.

7. What are solar cells? Write the construction and working of solar cell.


OR

The diameter of a plano-convex lens is 6 cm and its thickness is 3 mm. Determine the focal length of the lens. Speed of light in the material of lens is 2×10^8 m/s.

8. Obtain the expression for moment of couple acting on electric dipole placed in a uniform electric field. Define electric dipole moment on its basis.

OR

Calculate the currents in each branch of the given circuit:



346 (GB)

14

13

346 (GB)

What is meant by forward bias and reverse bias for p-n junction diode? How is it used as a full-wave rectifier? Explain with circuit diagram.

OR

Describe α -particle scattering experiment. Write the Rutherford atomic model based on the results of this experiment.

Physical constants

Charge on electron = 1.6×10^{-19} Coulomb

Planck's constant $h = 6.6 \times 10^{-34}$ Joule-s

Speed of light $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$

 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ Tesla mA}^{-1}$

Mass of electron $m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$

 $\epsilon_0 = 8.86 \times 10^{-12} \, \text{C}^2/\text{Nm}^2$

5

5

अ**नुक्रमांक**

नाम

151

345(GC)

2024

भौतिक विज्ञानं

समय : तीन घण्टे 15 मिनट]

[Turn over

प्रारम्भ के 15 मिनट परीक्षार्थित को प्रश्नपत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं ।

First 15 minutes are allotted Note candidates to read the question paper.

निर्देश :

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

- इस प्रश्नपत्र में 5 खण्ड हैं : खण्ड 'अ', खण्ड **'ਛ'**, 'खण्ड **'स'**, खण्ड **'द'** तथा खण्ड 'य'।
- iii) खण्ड 'अ' बहुविकल्पीय है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के हैं।
- खण्ड 'ब' अति लघु उत्तरीय है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के हैं।
- खण्ड 'स' लघु उत्तरीय । प्रकार के है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं।
- खण्ड 'द' लघु उत्तरीय II प्रकार के है, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के हैं।

346(GC)

- vii) खण्ड '**य**' विस्तृत उत्तरोय है, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के हैं। इस खण्ड के चारों प्रश्नों में ॲन्तिरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया है। एस प्रश्नों में आपको दिए गए चयन में से केवल एक प्रश्न ही करना है।
- viii) प्रश्न में प्रयुक्त प्रतीकों के सामान्य अर्थ हैं।

Instructions:

- All questions are compulsory.
- This question paper has 5 sections: Section A, Section B, Section C, Section D and Section E.
- iii) Section A is of multiple choice type and each question carries 1 mark.
- Section B is of very short answer type and each question carries l mark.
- Section C is of short answer I type and carries 2 marks each.
- Section D is of short answer II type and carries 3 marks each.
- Section E is of long answer type. Each question carries 5 marks. In all four questions of this section internal choices have been given. You have to do only one question from, the choices given in the question.
- viii) The symbols used in the question paper have usual meaning.

Section - A

1. क) यो बिन्दु आवेश k, परावैद्युताक वाले माध्यमन्में रखे हैं। उनके मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युतिक बल F है। यदि मध्यम का परावैद्युतांक-बदल कर k_2 हो जाय तब, इनके मध्य स्थिर वैद्युतिक बल होगा

i)
$$\frac{k_2}{k_1}F$$
 ii) $\frac{2k_1}{k_2}F$
iii) $\frac{k_1}{k_2}F$ $\frac{1}{k_2}F$

यदि किसी उत्तल लेंस की लाल एवं बैंगनी प्रकाश के लिए फोकस दूरियाँ क्रमशः f_{μ} एवं f_{μ} हों,

i)
$$f_v = f_v$$
 (ii) $f_v < f_r$
iii) $f_r < f_v$ iv) $f_v \ge f_r$

ं वैद्युत चुम्बकीय तरंगों के वैद्युत एवं चुम्बकीय क्षेत्र सदिशों में कलान्तर होता है।

> i) Ο ii) π iii) $\pi/2$ iv) $3\pi/2$

I Turn over

किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन हेतु आवश्यकं प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 2000 Â है। 1000 Á का विकिरण आप्रतित होने पर उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा होगी

12:4 cV ii) 6.2 eV.

iii) 10.0 eV iv) 3.1 eV

1 लम्बाई के तार में i एम्पियर की धारा प्रवाहित है। तार B वेबर/मो² चुम्बकीय क्षेत्र से 30° पर झुका है। तार पर चुम्बलीय क्षेत्र के कारण लगे बल का ्रान होगा

i) *iBl* ii) *iBl*/2

iii) $2 iBl^-$ iv) $\frac{\sqrt{3}}{2}iBl$

6 वोल्ट वि॰ वां॰ ब॰ के तीन सेलों को समान्तर क्रम में जोड़ा गया है। संयोजन का वि० वा० ब० होगा (सेलों के आन्तरिक प्रतिरोध नगन्यं हैं)

ii) 3 वोल्ट , ii) 2 वोल्ट iii) 4 वोल्ट iv) 6 वोल्ट 1

346(GC)

a) Two point charges are placed in the medium of dielectric constant k_1 . Electrostatic Torce between them is F. If the dielectric constant of the medium changes to kar the electrostatic force between them will be

If focal lengths of a convex lens for red and violer lights are f_{μ} and f_{μ} respectively then

 $i) f_r = f_v ii) f_v < f_r$

iii) $f_r < f_v$ iv) $f_v \ge f_r$

Phase difference between electric and magnetic field vectors of an electromagnetic wave is

i) 0

iii) $\pi/2$ iv) $3\pi/2$

The wavelength of light necessary to emit photoelectrons from a metal is 2000 Å. On incidence of a radiation 1000 Å kinetic energy photoelectrons will be

12:4.eV ii) 6:2 eV

iii) 10.0 eV iv) 3.1 eV

Current i is flowing in a wire of length l. Wire is inclined at an angle of 30% with the magnetic field B W-m⁻². The force on the wire due to magnetic field will be

iii) 2 iBl iv) $\frac{\sqrt{3}}{2}iBl$

Three cells each of 6 V e.m.f. are connected in parallel. E.M.F. of the combination will be (internal resistances of the cells are negligible)

i) 3 volt ii) 2 volt

iii) 4 volt iv) 6 volt

खण्ड - ब

Section - B

गतिशीलता को परिभाषित कीजिए।

प्रकाश के विवर्तन के प्रयोग में केन्द्रीय उच्चिष्ठ की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि प्रयोग जल में रख दिया जाय 🤈

वैद्युत क्षेत्र रेखाएँ पुरस्पर प्रतिच्छेदन नहीं करती हैं। समझाइए ।

यदि प्रत्यावर्ती धारा को वर्ग माध्य मूल मान $\sqrt{2}$ एम्पीयर हो तो धारा का शिखर मान क्या होगा ?

346(GC)

ক্ত)	समस्थानिक एवं	समभारिक : नाभिकों	में	अन्तर
	समझाइए ।			1

च) किसी गकान में 200 बोल्ट के मेन्स से 60 बाट के 200 बल्ब सेमान्तर क्रम में जुड़े हैं। प्रतिदिन (24 घंटे) <u>ब्युग हुई विद्युत कर्जा</u> की गणना कीजिए।

2. a) Define mobility.

- b) What will be the effect on the width of central maxima of diffraction of light in the experiment if the experiment is placed in water?
- c) Electric field lines do not intersect each other. Explain.
- d) What will be the peak value of current when rms value of alternating current is √2 A? https://www.upboardonline.com 1
- e) Explain the difference between isotopic and isobaric nuclei. I
- f) In a house 200 bulbs each of 60 W are connected in parallel with the mains of 200 V. Calculate the consumption of electrical energy per day (24 hrs).

खण्ड - स५

Section - C

- 3. क) p-n संधि डायोड के अवशय प्रस्त तथा विभव-प्राचीर पर: पश्च अभिनित का क्या प्रभाव पड़ता है ?
 - ख) प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों को लिखए। 2
 - ग) किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन 0.7 Å त्रिज्या की कक्षा में 6.6×10^4 मौ/से की चाल से गति कर रहा है। कक्ष्म में तुल्य धारा ज्ञात कीजिए। 2
- 3. a) What is the effect of the reverse biasing on the depletion layer and potential barrier in a p-n junction diode?
 - b) State the laws of photoelectric effect.

2

346(GC) In an atom electron is moving with


the speed of $6.6 \times 10^4 \text{ ms}^{-1}$ in the orbit of radius 0.7 A. Find the equivalent current in the orbit. 2

Mention any two properties of an electromagnetic wave. magnetic wave of 25 MHz is propagating in x-direction. At any point electric field vector is $\vec{E} = 6.3\hat{j}$ V/m. Find the value of magnetic field vector (B) at that point.

Section - D

किसी अवतल गोलीय पुष्ठ से अपवर्तन का सुत्र निगमित कीजिए।

> किसो चालक की वैद्युत धारिता से क्या अभिप्राय है ? दिये गये चित्र में A एवं B के मध्य तल्य धारिता $2\mu F$ है। संधारित्र C की धारिता ज्ञात कीजिए।




एक लम्बी परिनालिका के स्व-प्रेरकत्व का सुत्र स्थापित कीजिए।

प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या होते हैं ? इसका इतोक चिह्न बनाइये। इसकी कार्यविधि का संक्षिप्त विवरण दीजिए।

किसी अनुबर्धी दूरेदशी द्वारा किसी दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिम्ब अनन्त पर बनता है। उपयुक्त किरण आरेख द्वारा इसे दर्शाइए। यदि इस दूरदर्शी के अभिदृश्यक लेंस एवं नेत्रिका की फोकस दूरियाँ क्रमशः 250 सेमी तथा 5 सेमी हों, तब दूरदर्शी की अञ्चित समता तथा नेत्रिका एवं अभिदृश्यक के बीच दूरी ज्ञात कीजिए।

Derive the formula for the refraction at a spherical concave surface.


> What is the meaning of electrical capacity of a conductor? In the given figure equivalent capacitance between A and B is $2\mu F$. Find the capacity of the capacitor C.



346(GC)

- Derive the formula for the selfc) inductance of a long solenoid.
- What are light emitting diodes? Draw d) its symbol. Give a brief description of its working. 3
- The image of a distant object formed by a refracting telescope lies at infinity. Show it by a suitable ray diagram. If focal lengths of objective lens and eye lens of this telescope are 250 cm and 5 cm, respectively, findthe magnifying power of the telescope and separation between the objective and eye lens.
- अर्धचालक क्या हैं ? मादन (अपिमश्रण) के कारण 5. अर्द्धचालक की चालकता पर पड़ने वाले प्रभाव को समझाउए।
 - वैद्युत द्विभुव क्या होते हैं ? एक समरूप वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से θ कोण पर रखे वैद्युत द्विश्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए।

- यंग द्वि-झिरों प्रयोग में शुन्य क्रम एवं 10 वां क्रम को दीप्त क्रिंजुं-किसी संदर्भ बिन्दु से क्रमशः 11·50 मिमी एवं 14·50 मिमी की दूरी पर प्राप्त होती हैं। प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैघ्यं 6000 Å है। यदि प्रकार की तरगदैध्य-5000 Å हो जाय. तब उसी समायोजन हेतु शून्य क्रम एवं 10 वीं दीप्त फ्रिंजों की स्थिति ज्ञात कीजिए।
- दिवे गये प्रत्यावर्ती परिपथ में परिणामी बोल्टता. केल्टता एवं करा में कलान्तर ज्ञात कीजिए।




दो समान्तर धाराबाही तारों के बीच लगने वाले बल हेतु व्यंजक प्राप्त कीजिए। यदि दोनों तारों में धारा की दिशाएँ विपरीत हों, तब उनके बीच लगने वाले बल की प्रकृति क्या होगी ?

3

3599

ङ) मोटर सेतु किस सिद्धान्त पर कार्य करता है ? अज्ञात प्रतिरोध X ज्ञात करने के मीटर सेतु का परिपथ आरेख निम्नवत् है। सेतु संतुलन की अवस्था में है। X का मान ज्ञात कीजिए।




5. a) What are semiconductors 2 Explain the effect of doping on the conductivity of a semiconductor. 3

b) What is an electric dipole? Derive the formula for the potential energy of an electric dipole placed at an angle θ from the direction of a uniform electric field.

c) In Young's double slit experiment, zero order and 10th order bright fringes are obtained at distances of 11.50 mm and 14.50 mm from some reference point. Wavelength of light used is 6000 Å. If wavelength of light becomes 5000 Å, find the positions of zero order and 10th order bright fringes for the same arrangement. 3

 $\star \star z$


d) Find the resultant voltage and phase difference between voltage and current in the given alternating circuit.



OR

Find the expression for the force acting between two parallel current carrying wires. What will be the nature of force if the currents in the two wires are in opposite directions?

e) On which principle does the metre bridge work? Following is the circuit diagram of a metre bridge for finding the unknown resistance X. Bridge is in balanced condition. Find the value of X.



3

खण्ड - य

Section - E

6. हाइड्रोजन परमाणु के n वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा $E_n = \frac{-13 \cdot 6}{n^2}$ eV है। हाइड्रोजन परमाणु हेतु ऊर्जा-स्तर आरेख बनाकर बामर एवं लाइमन श्रेणी के वर्ण रेखाओं के लिए संक्रमण दर्शाइए। दोनों श्रेणी के प्रथम वर्ण रेखाओं की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन-वोल्ट में दर्शाइये। हाइड्रोजन की आयनन ऊर्जा भी प्राप्त कीजिए।

अथवा

 $_{29}$ Cu⁶³ के किसो सिक्के का द्रव्यमान 5 ग्राम-है शिसक्के _के-सभी न्यूट्रॉनों एवं प्रोटॉनों को एक दूसरे से अलग करने हेतु आवश्यक ऊर्जा की गणना MeV में कीजिए जबिक, $_{29}$ Cu⁶³ का द्रव्यमान = 62·92960 amu, $_{p}$ =1·00783 amu और $_{n}$ =1·00867 amu.


In hydrogen atom, energy of electron in n^{th} orbit is $E_n = \frac{-13 \cdot 6}{n^2}$ eV. Draw energy level diagram for hydrogen atom and show transitions corresponding to spectral lines of Balmer and Lyman series. Express the energy of 1^{st} spectral lines of both the

series in eV. Also, find the ionization energy of hydrogen.

Mass of a coin of $_{29}$ Cu⁶³ is 5 gm. Calculate the energy in MeV necessary to separate out all the protons and neutrons of the coin from one another. Given, mass of $_{29}$ Cu⁶³ = 62.92960 amu,

 $m_p = 1.00783$ amu and $m_n = 1.00867$ amu.

7. संधि डायोड क्या हैं ? p-n संधि के अग्र अभिनित और पश्च अभिनित हैत व्यंछित परिपथ बनाइए तथा दोनों स्थितियों में अभिलाक्षणिक वक्र भी दर्शाइए। दिये गर्थ परिपथ में एमीटर A_1 एवं A_2 का पाठ्यांक क्या होगा ? डायोड D एक आदर्श डायोड है।



अथवा

346(GC)

द्रव्य तरंगें क्या हैं ? डो ऑगली तरंगदैछ्यं का सूत्र लिखिए। सिद्ध कीजिए कि विद्युत चुम्बकीय विकरण हेतु तरंगदैछ्यं संगत फोटॉन के डी ऑगली तरंगदैछ्यं के बराबर होती है।

7. What is a junction diode? Draw necessary circuit diagram for forward and reverse bias of a p-n junction and show characteristic curves in both the situations. What will be the reading of ammeters A_1 and A_2 in the given circuit? Diode D is an ideal diode.

What are matter waves? Write the formula for de Broglie wavelength. Prove that the wavelength for electromagnetic radiation is equal to the de Broglie wavelength of the corresponding photon.

5

Turn over

3599

ठु. सम्पर्क में रखे दो पतलें लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र ज्ञात कीजिए। + 5D तथा - 2D क्षमता के दो लेंस सन्पर्क में रखे जाते हैं। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी की गणना कीजिए।

अथवा -

हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए। इसके आधार पर प्रकाश अपवर्तन के नियमों को प्रतिपादित कीजिए।

8. Find out the formula for the focal length of the combination of two thin lenses placed in contact. Two lenses of powers + 5D and - 2D are placed in contact. Find out the focal length of the combined lens.

OR

Explain Huygens' principle of secondary wavelets. Establish the laws of refraction of light on its basis.

9. किसी धारामापी की सुग्रहिकता का अर्थ समझाइए। किसी धारामापी को चाल्टमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे, समझाइए। किसी धारामापी में 1-0 एम्पियर की धारा पूर्ण पैमाने पर विक्षेप उत्पन्न करती है। इसे 10 A परास के एमीटर में परिवर्तित करने हेतु वांछित शन्ट एवं धारामापी के प्रतिरोध में सम्बन्ध ज्ञात कीजिए।

अथवा

वैद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। सिद्ध कोजिए कि, किसी वन्द पृष्ठ से निर्गत् सम्पूर्ण वैद्युत फ्लक्स (ф) सतह द्रारा आबद्ध सम्पूर्ण आवेश (q) का $\frac{1}{\epsilon_0}$ गुना होता है।

वैद्युत क्षेत्र $\overrightarrow{E}=14\hat{i}+3\hat{j}-5\hat{k}$ बो/मी में स्थित क्षेत्रफल $\overrightarrow{A}=4\hat{j}$ मी 2 से गुजरने वाले सम्पूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए।

9. Explain the meaning of sensitivity of a galvanometer. Explain, how a galvanometer can be converted into a voltmeter. In a galvanometer full scale deflection is produced by a current of 1.0 A. Find the relation between the shunt required to convert into ammeter of range 10 A and the resistance of the galvanometer.

Define electric flux. Prove that the electric flux (ϕ) through a closed surface is $\frac{1}{\epsilon_0}$ times the total charge (q) enclosed by the surface. Find the total flux passing through a surface of area $\vec{A} = 4\hat{j} \, \text{m}^2$ placed in an electric field $\vec{E} = 14\hat{i} + 3\hat{i} - 5\hat{k}$ V/m.

भौतिक नियतांक

प्लांक नियतांक $(h) = 6.6 \times 10^{-34}$ जूल-से प्रकाश की निर्वात में चाल $(c) = 3 \times 10^8$ मी/से गुरुत्वीय त्वरण g = 10 मी/से 2 इलेक्ट्रॉन पर आवेश $(e) = 1.6 \times 10^{-19}$ कूलॉम 1 a.m.u. = 931 MeV एवोगाड्रो संख्या $(N) = 6.02 \times 10^{23}$ रिडबर्ग नियतांक $R = 1.097 \times 10^7$ मीटर $^{-1}$ निर्वात की वैद्युतशीलता $(\epsilon_0) = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{N-m}^2$

Physical constants:

Planck's constant (h) = 6.6×10^{-34} J-s Speed of light in vacuum (c) = 3×10^8 m/s Acceleration due to gravity g = 10 m/s² Charge on electron (e) = 1.6×10^{-19} C 1 a.m.u. = 931 MeV Avogadro Number (N) = 6.02×10^{23} Rydberg constant $R = 1.097 \times 10^7$ m⁻¹. Permittivity of free space (ϵ_0) = 8.85×10^{-12} C²/N-m²

346(GC)- 2,30,000

2

151

346(GD)

2022

भौतिक विज्ञान

[पूर्णांक : 70

समय : तीन घण्टे 15 मिनट | प्रारम्भ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्नपत्र पढ़ने क्रे

नोट 🗀 लिए निर्धारित हैं ।

First 15 minutes are allotted for the candidates to read the question paper. Note:

निर्देश :

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

इस प्रश्नपत्र में 5 खण्ड हैं : खण्ड खण्ड 'ब', खण्ड 'स', खण्ड 'द' तथा खण्ड **'य'**।

खण्ड 'अ' बहुविकल्पीय है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के हैं।

खण्ड 'ब' अति लघु उत्तरीय है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के हैं।

खण्ड 'स' लघु उत्तरीय । प्रकार के है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं।

खण्ड 'द' लघु उत्तरीय II प्रकार के है, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के हैं।

4877

Turn over

आन्तरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्नों में आपको दिए गए चयन में से केवल एक प्रश्न ही करना है। viii) प्रश्न में प्रयुक्त प्रतीकों के सामान्य अर्थ हैं।

5 अंक के हैं। इस खण्ड के चारों प्रश्नों में

Instructions:

All questions are compulsory.

ii) This question paper has 5 sections: Section A, Section B, Section C, Section D and Section E.

Section A is of multiple choice type and each question carries 1 mark.

Section B is of very short answer type and each question carries 1 mark.

Section C is of short answer I type and carries 2 marks each.

Section D is of short answer II type and carries 3 marks each.

vii) Section E is of long answer type. Each question carries 5 marks. In all four questions of this section internal choices have been given. You have to do only one question from the choices given in the question.

viii) The symbols used in the question paper have usual meaning.

4877

 $\star \star v$

खण्ड - अ Section - A

- क) बराबर द्रव्यमान के गोलों A एवं B को क्रमश: + q एवं - q आवेश दिया गया है। यदि आवेशन के पश्चात् इनके द्रव्यमान क्रमशः $m_A^{}$ एवं m_B हों तो m_A एवं m_B में सम्बन्ध होगा
 - i) $m_A = m_B$ ii) $m_A > m_B$
 - iii) $m_A < m_B$ iv) $m_A >> m_B$
 - प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन कर रहीं है। आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर है। अपवर्तन कोण का मान होगा
 - i) 45° · ii) 90°
 - iii) O° iv) 135°
 - हाइड्रोजन परमाणु के वर्णक्रम में प्राप्त पाश्चन श्रेणी की वर्ण रेखाओं का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होगा
 - i) $\frac{9}{R}$
 - iii) 9R iv) $\frac{R}{3}$
 - किसी धातु का कार्यफलन 4 eV है। शून्य गतिज ऊर्जा के प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन हेतु आवश्यक विकिरण का तरंगदैर्घ्य होगा
 - 1700 Å
- ii) 1550 Å
- iii) 3108 Å

4877 '

- i**v)** 750 Å

विद्युत चुम्बकीय तरंग के वैद्युत एवं चुम्बकीय क्षेत्र सिंदश क्रमशः \overrightarrow{E} एवं \overrightarrow{B} हैं। तरंग संचरण की दिशा प्रदर्शित होगी \vec{B} द्वारा ii) \vec{E} द्वारा

4

- iii) \overrightarrow{B} . \overrightarrow{E} giti iv) $\overrightarrow{E} \times \overrightarrow{B}$ giti

आवेश q एक समान चुम्बकीय क्षेत्र \overrightarrow{B} के समान्तर ਚ) वेग v से गति कर रहा है। आवेश पर लगने वाले बल का मान है

- qv
- ii) qB
- iii) O
- iv) $\frac{Bv}{q}$
- 1

Spheres A and B having equal masses a) are given charges + q and - qrespectively. If after charging their respective masses are respectively m_A and m_B , relation of m_A and m_B will be

- i) $m_A = m_B$ ii) $m_A > m_B$
- iii) $m_A < m_B$ iv) $m_A >> m_B$

A light ray is propagating from a - b) denser to a rarer medium. Angle of incidence is equal to critical angle. Value of angle of refraction will be

- 45° ii) 9.0°
- iii) 0° iv) 135°

Turn over

https://www.upboardonline.com

4877

https://www.upboardonline.com

 $\star\star \Upsilon$

c) Minimum wavelength of the spectral line obtained in the Paschen series in the spectrum of hydrogen atom will be

iii), 9R

d) Work function of a metal is 4 eV. The wavelength of radiation necessary to emit photoelectrons with zero kinetic energy is

1700 Å

ii) 1550 Å

iii) 3108 Å

iv) 750 Å

Electric and magnetic field vectors of an electromagnetic wave are \overrightarrow{E} and \dot{B} respectively. Direction propagation of the wave will be represented by

i)

ii) É

iii) $\overrightarrow{B} \cdot \overrightarrow{E}$ iv) $\overrightarrow{E} \times \overrightarrow{B}$

A charge q is moving parallel to f) uniform magnetic field B with a velocity v. Value of force acting on the charge is

qv

ii) qB

О 111)

4877

| Turn over

खण्ड - ब

Section - B


एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। 2. क)

> वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीज़िए तथा इसके ख) द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र भी लिखिए।

> एक प्रोटान एवं एक α-कण समान वेग से गति कर ग) रहे हैं। इनसे सम्बद्ध डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य में सम्बन्ध ज्ञात कीजिए।

> 6000 Å तरंगदैर्घ्य की समान्तर किरण पुंज ਬ) 3 × 10 ⁻⁶ मी चौड़े झिर्री पर लम्बवत् आपतित हं रही है। प्राप्त विवर्तन प्रारूप में केन्द्रीय उंच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए।

> दिये गये परिपथ में D_1 एवं D_2 आदर्श डायोड हैं ङ) 3 Ω प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए।



किसी वैद्युत सेल के विद्युत वाहक बलं का अध ਚ) समझाइए ।

4877

 $\star \star \Upsilon$


a) State Ampere's circuital law.

b) Define electric dipole and write the formula for its dipole moment.

c) A proton and an α-particle are moving with the same velocity. Find the relation between de Broglie wavelengths associated with them. 1

d) A parallel beam of light of wavelength 6000 Å is incident perpendicularly on a slit of width 3×10^{-6} m. Find the angular width of the central maxima in the diffraction pattern.

e) D_1 and D_2 are the ideal diodes in the given circuit. Find the value of current flowing in the 3Ω resistance.



f) Explain the meaning of the e.m.f. of a cell.

खण्ड - स


Section - C

 क) LED का पूरा रूप लिखिए। इसके महत्व का उल्लेख कीजिए।

ख) प्रेरित विद्युत बाहक बल का अर्थ समझाइए। 10 H
प्रेरकत्व तथा 10 Ω प्रतिरोध वाली एक कुण्डली
15 V के बैंटरी से जुड़ी है। यदि परिपथ की कुंजी
को दबाने में 0·1 सेकेन्ड का समय लगता हो, तब
कुण्डली में प्रेरित औसत वि० वा० बल ज्ञात
कीजिए।

ग) प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान (i_{ms}) से आप क्या समझते हैं ? प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान (i₀) में स्मबन्ध लिखिए।

घ) एक समान दो वृत्तीय पाश चित्रानुसार व्यवस्थित हैं।



दोनों पाश में प्रवाहित धारा एवं उनकी त्रिज्याएँ बराबर हैं। बिन्दु O पर उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए।

4877

* *Y

https://www.upboardonline.com

[Turn over

4877

**Y


10

3. Give the full form of LED. Mention its importance.

b) Explain the meaning of induced electromotive force. Α coil inductance 10 H and resistance 10 Ω is connected to a battery of 15 V. If time taken in pressing the key in the circuit is 0.1 s then find the average e.m.f. induced in the coil.

c) What do you understand by root mean square value (i_{ms}) of an alternating current? Write down the relation between root mean square value and peak value (i_0) of an alternating current.

Two similar circular loops arranged as shown in the figure. are



Current flowing in the two loops and their radii are equal. Find the magnitude and direction of magnetic field produced at point O.

 $\star \star \Upsilon$

https://www.upboardonline.com


4877

I Turn over

346(GD)

खण्ड - द Section - D

- किसी प्रत्यावर्ती स्रोत से प्रतिरोध, प्रेरक एवं संधारित्र श्रेणीक्रम में जुड़े हैं। परिपथ आरेख 4. बनाइए। इस परिपथ की प्रतिबाधा एवं अनुनादी आवृत्ति ज्ञात कीजिए।
 - दिये गये संजाल में बिन्दु A एवं B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। यदि A एवं B के मध्य 15 V की बैटरी जोड़ दें, तब संधारित्रों पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए।



- विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है ? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सम्बन्धी फैराडे के नियमों को लिखकर समझाइए।
- किसी सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता से क्या तात्पर्य है ? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए जबकि अन्तिम प्रतिबिम्ब अनन्त पर बनता हो। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका एव

 $\star \star \Upsilon$

अभिदृश्यक की फोकस दूरियाँ क्रमशः 6-25 सेमी एवं 2.0 सेमी हैं। दोनों के बीच दूरी 15 सेमी है। अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी क्या हो ताकि अन्तिम प्रतिबिम्ब अनन्त पर बने 2

द्रव्यमान-क्षति एवं बन्धन-ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। बन्धन-ऊर्जा एवं द्रव्यमान-क्षति में सम्बन्ध लिखिए। हीलियम ($_2\mathrm{He}^4$) नाभिक के लिए द्रव्यमान-क्षति 0.0304 amu है। इस नाभिक की बन्धन-ऊर्जा ज्ञात कीजिए।

Resistance, inductor and capacitor 4. are connected in series with an alternating source. Draw the circuit diagram. Find the impedance and resonant frequency of the circuit. b)

Find the equivalent capacitance between points A and B of the given network. If a battery of 15 V is connected between A and B, find the magnitude of charge the capacitors.

Turn over

- What is electromagnetic induction ? State and explain Faraday's laws of electromagnetic induction. 3
- What is the meaning of magnifying d) power of a microscope ? Write the formula for magnifying power of a compound microscope, when final image is formed at infinity. In a compound microscope focal lengths of eye lens and objective lens are 6.25 cm and 2.0 cm, respectively. Distance between them is 15 cm. What should be the distance of object from objective so that final image is formed at infinity? 3
- Define mass defect and binding energy. Give relation between binding and mass defect. Mass defect for helium nuclei (2He4) is 0.0304 amu. Find the binding energy of this nuclei.

4877

आइन्स्टीन के प्रकाश वैद्युत प्रभाव सम्बन्धी 5. समीकरण का उल्लेख कीजिए। इसके आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या कीजिए।

> ख) नाभिकीय विखण्डन एवं नाभिकीय संलयन को समझाइए तथा दोनों में अन्तर लिखिए। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा किस क्रिया का परिणाम है ?

ग) वैद्युत चुम्बकीय तरंगों के किन्हीं चार अभिलक्षणों को लिखिए। एक वैद्युत चुम्बकीय तरंग निर्वात में z-अक्ष में संचारित है। इसके वैद्युत एवं चुम्बकीय क्षेत्र सदिशों के बारे में आप क्या कहेंगे ? यदि इसका तरंगदैर्घ्य 10 मी हो, तो इसकी आवृत्ति क्या होगी 2

आँख की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है 2 ਬ) दूर-दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए निकट-बिन्द आँख से 150 सेमी दूर है। वह 25 सेमी दूर रखी पस्तक को पढ़ना चाहता है। किस प्रकार के कितने फोकस दरी के लेंस का प्रयोग करना होगा ?

अथवी

किसी पतले उत्तल लेंस के लिए लेंस मेकर सत्र व्यत्पन्न कीजिए।

Turn over

https://www.upboardonline.com

4877

346(GD)

वैद्युत परिपथ सम्बन्धी किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए। इसके आधार पर ह्वीटस्टोन सेतु 퍙) की संतुलन अवस्था के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। 3 Einstein's equation

Mention photoelectric effect. Explain the laws a) 5. of photoelectric effect on the basis of it.

Explain nuclear fission and nuclear b) fusion and give difference between them. Energy obtained from the sun is the result of which process?

Write down any four characteristics of electromagnetic waves. Electromagnetic wave is propagating along z-axis in vacuum. What will you say about electric and magnetic field vectors of the wave? If its wavelength is 10 m what will be its frequency? 3 d)

What is the meaning of power of accommodation of eye? For a man with hypermetropia near point is at distance of 150 cm from the eye. He wishes to read a book placed at a

distance of 25 cm. Which type and of what focal length of lens should he use?

OR

Derive lens maker formula for a thin convex lens.

e) State Kirchhoff's laws for electrical circuits. On its basis find the formula for the balanced condition of Wheatstone's bridge.

खण्ड - य Section - E

6. स्थिर वैद्युतिकी में गाउस का प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए। किसी खोखले बेलन के भीतर $17 \cdot 7 \times 10^{-12}$ कूलॉम आवेश है। इसके वक्र पृष्ठ से सम्बद्ध वैद्युत फ्लक्स $1 \cdot 5$ न्यूटन-मी 2 -कू $^{-1}$ है। इसके किसी एक समतल पृष्ठ से सम्बद्ध वैद्युत फ्लक्स का क्या मान होगा ?

अथवा

किसी धात्वीय चालक की वैद्युत धारिता का अर्थ समझाइए। किसी समान्तर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, जबकि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो।

4877

* *Y

Turn over

5

6. State and prove Gauss's theorem in electrostatics. 17.7×10^{-12} C charge is present inside a hollow cylinder. Electric flux associated with its curved surface is $1.5 \text{ N-m}^2\text{-C}^{-1}$. What will be the value of electric flux associated with either of its plane surfaces?

OR

Explain the meaning of electric capacity of a metallic conductor. Find the expression for the capacity of a parallel plate condenser, when a dielectric substance is partially filled in between its plates. 5

7. यंग के द्वि-झिर्री प्रयोग में क्राप्त दीप्त एवं अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए व्यंजक प्राप्त क्लीजिए। 5

अथवा

सम्पर्क में रखे दो पतले उत्तल लेंसों के संयोजन के लिए फोकस दूरी का सूत्र निगमित कीजिए। यदि दूसरा लेंस समान-फोकस दूरी का अवतल लेंस ले लिया जाय तब, संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी ? एक उत्तल लेंस और एक समतल दर्पण परस्पर 20 सेमी की दूरी पर हैं। लेंस पर आपतित समान्तर किरण पुंज द्वारा अंतिम प्रतिबिम्ब लेंस के प्रकाशिक केन्द्र पर बनता है। उपयुक्त किरण आरेख बनाकर लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए।

4877

* *3

Find the expression for the width of bright 7. and dark fringes in Young's double slit 5

OR

Derive an expression for the focal length of the combination of two thin convex lenses placed in contact. What will be the focal length of the combination, if one lens is concave and is of the same focal length? A convex lens and a plane mirror are at 20 cm apart. Final image formed by a parallel beam of light incident on the lens is at the optical centre of the lens. Find focal length of the lens drawing suitable ray diagram. https://www.upboardonline.com 5 p-n संधि डायोड के अवक्षय परत एवं विभव प्राचीर पर अग्र अभिनति का क्या प्रभाव पड़ता है ? संधि डायोड का उपयोग करके पूर्ण तरंग दिष्टकारी का परिपथ आरेख

अथवा

बोर के परमाणु प्रारूप के अभिगृहीतों को लिखिए। इसके आधार पर हाइड्रोजन परमाणु के बोर कक्षा की त्रिज्या के लिए सूत्र निगमित कीजिए।

बनाइए तथा दिष्टकारी की कार्यविधि का उल्लेख संक्षेप में

What is the effect of forward biasing on the depletion layer and potential barrier of a p-n junction diode? Draw circuit diagram of a full wave rectifier using junction diode and briefly mention the working of the rectifier. OR State the postulates of Bohr's atomic

model. Derive the formula for the radius of the Bohr orbit of hydrogen atom on its basis. चुम्बकीय क्षेत्र में किसी धारावाही कुण्डली पर लगने वाले

बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। किसी धारामापी को एमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे ? 20 μA/div सुग्राहिकता वाले धारामापी के पैमाने में 30 खाने हैं और इसका प्रतिरोध 20 Ω है। इसे 1 एम्पियर तक धारा मापने वाले एमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे ?

विभवमापी एक वोल्टमीटर से श्रेष्ठ क्यों माना जाता है ? एक विभवमापी के तार की लम्बाई 200 सेमी और इसमें प्रवाहित धारा 3×10^{-2} A है। 1.5 V की 10 Ω आंतरिक प्रतिरोध वाले सेल से संतुलन बिन्दु 50 सेमी पर प्राप्त होता है। सेल से एक वोल्टमीटर जोड़ने पर संतुलन बिन्दु 49 सेमी पर आ जाता है। विभवमापी के तार का प्रतिरोध, वोल्टमीटर का प्रतिरोध एवं इसके पाठ्यांक की 5 गणना कीजिए।

4877

 $\star \star \Upsilon$

कीजिए।

9.

Find the expression for the torque acting on a current carrying coil in a magnetic field. How will you convert a galvanometer into an ammeter? Number of divisions in the scale of a galvanometer of sensitivity 20 μA/div is 30. Its resistance is 20 Ω. How will it be converted into an ammeter capable of measuring up to 1 A of current?

5

OR

Why is a potentiometer considered superior to a voltmeter? The length of a potentiometer wire is 200 cm and a current of 3×10^{-2} A is flowing in it. Balance point is obtained at 50 cm when connected with the cell of 1.5 V and internal resistance 10 Ω . When a voltmeter is connected with the cell balance point is obtained at 49 cm. Calculate the resistance of potentiometer wire, resistance and reading of voltmeter. 5

भौतिक नियतांक

प्लांक नियतांक (h) = 6.6×10^{-34} जूल-से प्रकाश की निर्वात में चाल (c) = 3×10^8 मी/से गुरुत्वीय त्वरण g = 10 मी/से 2 इलेक्ट्रॉन पर आवेश (e) = 1.6×10^{-19} कूलॉम 1 a.m.u. = 931 MeV एवोगाड्रो संख्या (N) = 6.02×10^{23} रिडबर्ग नियतांक R = 1.097×10^7 मीटर $^{-1}$ निर्वात की वैद्युतशीलता (ϵ_0) = 8.85×10^{-12} C. 2 /N- m^2

Physical constants:

Planck's constant (h) $\sim 6.0 \times 10^{-34}$ J-s Speed of light in vacuum (c) = 3×10^8 m/s Acceleration due to gravity g = 10 m/s² Charge on electron (e) = 1.6×10^{-19} C 1 a.m.u. = 931 MeV Avogadro Number (N) = 6.02×10^{23} Rydberg constant $R = 1.097 \times 10^7$ m⁻¹. Permittivity of free space (ϵ_0)= 8.85×10^{-12} C²/N-m²

346(GD)- 2,30,000

https://www.upboardonline.com Whatsapp @ 9300930012 Send your old paper & get 10/-अपने पुराने पेपर्स भेजे और 10 रुपये पार्य,

4877

Paytm or Google Pay से

अनुक्रमांव

नाम ..

151

346(GE)

2022

भौतिक विज्ञान

समय : तीन घण्टे 15 मिनट |

्रपणींक : 70

Turn over

नोट 🐠 प्रारम्भ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्नपत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं । 🥆

Note: First 15 minutes are allotted for the candidates to read the question paper.

निर्देश :

5922

- सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- इस प्रश्नपत्र में 5 खण्ड हैं : खण्ड 'आ'. खण्ड 'ब', खण्ड 'स', खण्ड 'द' तथा खण्ड **'य'**।
- iii) खण्ड 'अ' बहुविकल्पीय है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के हैं।
- खण्ड 'ब' अति लघु उत्तरीय है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के हैं।
- खण्ड 'स' लघु उत्तरीय । प्रकार के है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं।
- खण्ड 'द' लघु उत्तरीय II प्रकार के है, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के हैं।

vii) खण्ड 'य' विस्तृत उत्तरीय है, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के हैं। इस खण्ड के चारों प्रश्नों में आन्तरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्नों में आपको दिए गए चयन में से केवल एक प्रश्न ही करना है।

viii) प्रश्न में प्रयुक्त प्रतीकों के सामान्य अर्थ हैं।

Instructions:

- All questions are compulsory. i)
- This question paper has 5 sections: Section A, Section B, Section C, Section D and Section E.
- iii) Section A is of multiple choice type and each question carries 1 mark.
- iv) Section B is of very short answer type and each question carries 1 mark.
- Section C is of short answer I type and carries 2 marks each.
- Section D is of short answer II type and carries 3 marks each.
- vii) Section E is of long answer type. Each question carries 5 marks. In all four questions of this section internal choices have been given. You have to do only one question from the choices given in the question.
- viii) The symbols used in the question paper have usual meaning.

खण्ड - अ

Section - A

- f फोकस दूरी का उत्तल लेंस 2f फोकस दूरी वाले 1. क) अवतल लेंस के सम्पर्क में रखा जाता है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है
 - - -2f ii) +2f

 - iii) + 3f iv) + 2f/3

- प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति (v) तथा निरोधी विभव (V) के बीच खींचें गए ग्राफ की ढलान होगी
 - h
- ii) e/h
- iii) h/e iv) v/V

- प्रदर्शित p-n सन्धि डायोड में कौन-सा अग्र अभिनत है ?
 - i)
 - ii) -10 V
 - iii)
 - iv) +10 V

बल कार्य करता है। यदि आवेशों को K परावैद्युतांक के माध्यम में रख दिया जाए तब यह बल होगा KFii) *K/F*

दो बिन्दु आवेशों के बीच F न्यूटन स्थिर वैद्युत

iv) F/K


- । लम्बाई के तार को वृत्ताकार कुण्डली में मोड़ा जाता है। कुण्डली में वैद्युत धारा i प्रवाहित करने पर केन्द्र पर उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र है

iii) F

- यदि λ_1, λ_2 तथा λ_3 क्रमशः दृश्य प्रकाश, X-किरणें तथा सूक्ष्म तरंगों की तरंगदैर्घ्य निरूपित करती हों, तब
 - i) $\lambda_1 > \lambda_2 > \lambda_3$
 - ii) $\lambda_2 > \lambda_3 > \lambda_1$
 - iii) $\lambda_3 > \lambda_2 > \lambda_1$
 - iv) $\lambda_3 > \lambda_1 > \lambda_2$

- 1. a) A convex lens of focal length f, is placed in contact with a concave lensof focal length 2f. Focal length of the combination is
 - 2f
- ii) + 2f
- iii) + 3f iv) + 2 f/3

- The slope of the graph between the b) frequency (v) and the stopping potential (V) of incident light in the experiment of photoelectric effect, is
 - hi)
- ii) *e/h*
- iii) h/e iv) v/V
- Which of the following p-n junction c) diodes, is forward biased, as shown below?



- ii) -10 V
- iii)
- iv)

- Electrostatic force of F newton acts between two point charges. If the charges are placed in a medium of dielectric constant K, then the force will be
- ii) *K/F*

iii)

iv) F/K

- A wire of length l is bent in the form of a circular coil. Magnetic field at the centre of the coil on flowing electric current i in it, is

- If λ_1, λ_2 and λ_3 represent the wavelengths of visible light, X-rays and microwaves respectively, then
 - $\lambda_1 > \lambda_2 > \lambda_3$

 - iv) $\lambda_3 > \lambda_1 > \lambda_2$

		Section - B
2.	क)	जर्मेनियम को कैसे p-प्रकार का अर्द्धचालक बनाया
		जाता है ?
	ন্ত্ৰ)	नाभिक्रीय विखण्डन में शृंखला अभिक्रिया क्या है ?
		1
	ग)	पराबैंगनी किरणों के किन्हीं दो उपयोग को लिखिए।
		1
	घ)	यदि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान
		√2 एम्पीयर हो तब धारा का शिखर मान क्या
		होगा ?

- फ्लेमिंग का बाँयें हाथ का नियम क्या है ?
- 1 फैराड वैद्युत धारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए।
- 2. How is germanium made as a semiconductor of p-type?
 - What is chain reaction in nuclear fission?
 - Write down any two applications of ultraviolet rays.
 - If root mean square value of a.c. is d) $\sqrt{2}$ A, then what will be the peak value of the current?
 - What is Fleming's left hand rule?
 - Find out the radius of a spherical conductor of 1 farad electrical capacitance.

Turn over

खण्ड - स

Section - C

- बोहर मॉडल की सहायता से सिद्ध कीजिए कि 3. किसी परमाणु के भीतर किसी स्थायी कक्षा की परिधि उस कक्षा के संगत इलेक्ट्रॉन के दी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य के पूर्ण गुणज में होती है।
 - संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए।
 - किसी धातु प्लेट पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति दो गुनी बढ़ाने पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है ?
 - ताँबे के तीन तारों के द्रव्यमान 1 : 3 : 5 के अनुपात में तथा उनकी लम्बाइयाँ 5 : 3 : 1 के अनुपात में हैं। उनके वैद्युत प्रतिरोधों में क्या अनुपात होगा ?
- 3. Prove that the circumference of a stable orbit inside an atom is in integral multiple of de Broglie's wavelength of the corresponding electron of that orbit with the help of Bohr's model.
 - Draw labelled ray diagram of a compound microscope.
 - What is the effect on the kinetic energy of the emitted photoelectrons by increasing the frequency of the incident light by two times on a certain metal plate?


346(GE)

d) Masses of three wires of copper are in the ratio of 1:3:5 and their lengths are in the ratio of 5:3:1. What will be the ratio of their resistances? 2

खण्ड - द


Section - D

- 4. क) नाभिकीय संलयन से क्या तात्पर्य है ? यह क्रिया नाभिकीय विखण्डन से किस प्रकार से भिन्न है ? प्रकृति में नाभिकीय संलयन का एक उदाहरण दीजिए।
 - ख) निम्न प्रदर्शित परिपथ की सहायता से धारायें i, i₁, i₂ तथा i₃ के मान ज्ञात कीजिए : 3



 ग) जब एक धातु पृष्ठ पर λ तरंगदैर्घ्य का एक-वर्णीय प्रकाश आपितत होता है, तब प्रकाश वैद्युत धारा के लिए निरोधी विभव 3 V होता है। इसी पृष्ठ पर 2λ तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपितत करने पर निरोधी विभव V प्राप्त होता है। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए देहली तरंगदैष्ट्यं ज्ञात कीजिए। 3

- एकल स्लिट के विवर्तन प्रतिरूप में केन्द्रीय उच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई किन कारकों पर निर्भर करती है ? विवर्तन प्रतिरूप में प्रकाश का तीव्रता विभाजन चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए।
- ड) विभवमापी की सुग्राहिता से क्या तात्पर्य है ? सुग्राहिता का विभव-प्रवणता से क्या सम्बन्ध है ? एक विभवमापी के 5 मीटर लम्बे तार के सिरों के बीच 2 वोल्ट का विभवान्तर लगाया जाता है। तार में विभव-प्रवणता का मान ज्ञात कीजिए।
- a) What is meant by nuclear fusion? How is it different from the nuclear fission? Give one example of nuclear fusion in nature.
 - b) Find, the values of currents i, i_1 , i_2 and i_3 with the help of the circuit diagram shown below:




★★X

[Turn over

346(GE)

- When c) monochromatic light wavelength λ , is incident on a metal surface, then the stopping potential for the photoelectric current is 3 V. Stopping potential V is obtained for the same surface for the incident light of wavelength 2\(\lambda\). Find out the threshold wavelength for the photoelectric emission. 3
- d) On which factors, does the angular width of central maxima depend in the diffraction pattern of a single slit? Show the intensity distribution of light in the diffraction pattern with the help of diagram.
- e) What is meant by the sensitivity of a potentiometer? What is the relationship between sensitivity and the potential gradient? Voltage of 2 V is applied between the ends of a 5 m long wire of a potentiometer. Find the value of the potential gradient in the wire.

- 5. क) विद्युत द्विभुव की अक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। 3
 - ख) एक गोलीय पृष्ठ से प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र $\frac{n_2}{v} \frac{n_1}{u} = \frac{n_2 n_1}{R} \quad \text{स्थापित कीजिए, जहाँ }$ प्रतीकों का सामान्य अर्थ है।
 - ग) बायां-संवर्ट का नियम क्या है ? इसकी सहायता से वृत्ताकार धारावाही कुण्डली के केन्द्र पर चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए।
 - घ) ह्वीटस्टोन ब्रिज का सिद्धान्त क्या है ? दिया गया परिपथ आरेख सन्तुलित ह्वीटस्टोन ब्रिज प्रदर्शित करता है। R के मान की गणना कीजिए।



ङ) फोटो डायोड की क्रिया विधि चित्र द्वारा समझाइए।

अथवा

सौर सेल की कार्य प्रणाली समझाइए तथा इसकी उपयोगिता लिखिए।

5922

5922


5. Obtain the expression for the intensity of electric field on the axial line of an electric dipole.

> Derive the formula for the refraction of light at a spherical surface,

$$\frac{n_2}{v} - \frac{n_1}{u} = \frac{n_2 - n_1}{R}$$

where, the symbols have their usual meanings.

- What is Biot-Savart law? Obtain the c) expression for the intensity of magnetic field at the centre of a circular current carrying coil with its help.
- What is the principle of Wheatstone's bridge? The given circuit diagram shows a balanced Wheatstone's bridge. Calculate the value of R.



3

Turn over

Explain the working process of a photo-diode with the help of a diagram.

OR

Explain the working process of a solar cell. Write down its applications.

Section - E

नाभिकीय रिएक्टर का सिद्धान्त क्या है ? इसके मुख्य , 6. भागों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसकी सहायता से प्लूटोनियम का उत्पादन कैसे होता है ? 5

अथवा

दी गई नाभिकीय अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा Q का मान ज्ञात कीजिए :

$$_{92}$$
 $^{U^{235}} + _{0}n^{1} \rightarrow _{54}Xe^{140} + _{38}Sr^{94} + 2(_{0}n^{1}) + Q$
दिया है,

5

5922

 $\star \star x$

6. What is the principle of nuclear reactor? Describe the main parts in brief. How plutonium is produced with its help?

5

OR.

Find out the energy Q, released in the given nuclear reaction:

$$_{92}^{\text{U}^{235}} + _{0}^{1} n^{1} \rightarrow _{54}^{\text{Xe}^{140}} + _{38}^{\text{Sr}^{94}} + 2(_{0}^{1}n^{1}) + Q$$
 Given,

Mass of $_{92}U^{235} = 235.0439$ amu


Mass of $_{54}$ Xe¹⁴⁰ = 139·9054 amu

Mass of $_{38}$ Sr⁹⁴ = 93.9063 amu

Mass of $_0 n^1 = 1.00867$ amu

1 amu = 931 MeV

- 7. दिए गए प्रत्यावर्ती धारा परिपर्थ की सहायता से ज्ञात कीजिए:
 - i) वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान
 - ii) प्रेरण प्रतिघात
 - iii) धारितीय प्रतिघात
 - iv) परिपथ की प्रतिबाधा
 - v) धारा तथा वोल्टेज में कलान्तर।



अथवा

अवना

[Turn over

5


प्रत्यावर्ती **धारा ज**नित्र का नामांकित चित्र की सहायता से उसकी कार्य प्रणाली समझाइए। 5

7. From the given A.C. circuit, find out:

i) rms value of voltage

346(GE)

- ii) inductive reactance
- iii) capacitive reactance
- iv) impedance of the circuit
- v) phase difference between current and voltage.



OR

Explain the working process of A.C. generator with the help of a labelled diagram.

 60° अपवर्तक कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक √2 है। अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए:

- i) अल्पतम विचलन कोण
- ii) आपतन कोण
- iii) अपवर्तन कोण
- iv) निर्गत कोण।

5

अथवा


 $\star\star x$

5922

 $\star \star x$

18

क्रांतिक कोण से क्या अभिप्राय है ? प्रकाश की किरण माध्यम (1) अपवर्तनांक n_1 से माध्यम (2) अपवर्तनांक n_2 में प्रवेश करती है। यदि $n_2 > n_1$ तथा अपवर्तित तथा परावर्तित किरणें परस्पर लम्बवत हों तब सिद्ध कीजिए कि क्रांतिक कोण n_2 माध्यम में होगा $i_c = \sin^{-1}(\cot r').$



5 8. Refractive index for the yellow light for a prism of refracting angle 60°, is $\sqrt{2}$. Find out for the minimum deviation position:

- angle of minimum deviation i)
- angle of incidence ii)
- angle of refraction iii)
- angle of emergence. iv)

5


OR

 $\star\star x$

Turn over

What is meant by critical angle? A ray of light enters in medium (2) of refractive index n_0 from medium (1) of refractive index n_1 . If $n_2 > n_1$ and refracted and reflected rays are mutually perpendicular to each other, then prove that the critical angle in n_2 medium will be

 $i_c = \sin^{-1}(\cot r').$



समान्तर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र ज्ञात कीजिए जबिक उसकी प्लेटों के बीच आंशिक परावैद्युत पट्टिका रखी जाती है। परावैद्युत पट्टिका के स्थान पर धातु की प्लंट रखने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

5

अथवा

Turn over

किसी सेल के आन्तरिक प्रतिरोध का क्या अर्थ है ? यह किन कारकों पर निर्भर करता है ?

एक बैटरी R_1 प्रतिरोध में t समय तक i_1 धारा प्रवाहित करती है तथा एक अन्य प्रतिरोध R_2 में उतने ही समय तक i_2 धारा प्रवाहित करती है। यदि दोनों दशाओं में प्रतिरोधों में समान ऊष्मा उत्पन्न हो तब सिद्ध कीजिए कि बैटरी का आन्तरिक प्रतिरोध $r=\sqrt{R_1R_2}$.

9. Find out the formula for the capacitance of a parallel plate capacitor, when it is partially filled with a dielectric slab in between the plates. What will be the effect on the capacitance, when a metal plate is placed instead of the dielectric slab?

OR

What is the meaning of internal resistance of a cell? On which factors does it depend?

A battery passes current i_1 in a resistor R_1 up to a time t and in another resistor R_2 for the same time, current is i_2 . If heat produced in the resistors be the same in

both the conditions then prove that the internal resistance of the battery is $r = \sqrt{R_1 R_2}$.

भौतिक नियतांक

प्लांक नियतांक $(h) = 6.6 \times 10^{-34}$ जूल-से प्रकाश की निर्वात में चाल $(c) = 3 \times 10^8$ मी/से गुरुत्वीय त्वरण g = 10 मी/से 2 इलेक्ट्रॉन पर आवेश $(e) = 1.6 \times 10^{-19}$ कूलॉम 1 a.m.u. = 931 MeV एवोगाड्रो संख्या $(N) = 6.02 \times 10^{23}$ रिडबर्ग नियतांक $R = 1.097 \times 10^7$ मीटर $^{-1}$ निर्वात की वैद्युतशीलता $(\epsilon_0) = 8.85 \times 10^{-12} \, \text{C}^2 / \text{N-m}^2$

Physical constants:

Planck's constant (h) = 6.6×10^{-34} J-s 5 peed of light in vacuum (c) = 3×10^8 m/s Acceleration due to gravity g = 10 m/s² Charge on electron (e) = 1.6×10^{-19} C 1 a.m.u. = 931 MeV Avogadro Number (N) = 6.02×10^{-23} Rydberg constant $R = 1.097 \times 10^7$ m⁻¹. Permittivity of free space (ϵ_0) = 8.85×10^{-12} C²/N-m².

346(GE)- 2,30,000

अनक्रमांक नाम

151

346(GF)

2022

भौतिक विज्ञान

समय : तीन घण्टे 15 मिनट |

। पूर्णांक : 70

प्रारम्भ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्नपत्र पढ़ने के नोट : िलए निर्धारित हैं ।

First 15 minutes are allotted for the Note: candidates to read the question paper.

निर्देश :

6799

- **सभी** प्रश्न आंनवार्य हैं।
- इस प्रश्नपत्र में 5 खण्ड हैं : खण्ड 'अ'. खण्ड 'ब', खण्ड 'स', खण्ड 'द' तथा खण्ड 'य'।
- खण्ड 'अ' बहुविकल्पीय है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के हैं।
- खण्ड 'ब' अति लघु उत्तरीय है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के हैं।
- खण्ड 'स' लघु उत्तरीय । प्रकार के है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं।
- खण्ड 'द' लघु उत्तरीय II प्रकार के है, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के हैं।

[Turn over

vii) खण्ड **'य'** विस्तृत उत्तरीय है, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के हैं। इस खण्ड के चारों प्रश्नां में आन्तरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्नों में आपको दिए गए चयन में से केवल एक प्रश्न ही करना है।

viii) प्रश्न में प्रयुक्त प्रतीकों के सामान्य अर्थ हैं। Instructions:

- All questions are compulsory. i)
- This question paper has 5 sections: Section A, Section B, Section C, Section D and Section E.
- Section A is of multiple choice type and each question carries 1 mark.
- Section B is of very short answer type and each question carries 1 mark.
- Section C is of short answer I type and carries 2 marks each.
- Section D is of short answer II type and carries 3 marks each.
- vii) Section E is of long answer type. Each question carries 5 marks. In all four questions of this section internal choices have been given. You have to do only one question from the choices given in the question.

viii) The symbols used in the question paper have usual meaning.

346(GF)

खण्ड - अ

Section - A

श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के क) प्रकाश का अधिकतम विचलन होता है ?

- बैंगनी
- ii) लाल
- पोला : iii)
- iv) हरा

वैद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं ख)

- अनुदैर्घ्य
- अनुप्रस्थ ii)
- iii) अनुदैर्घ्य व अनुप्रस्थ दोनों
- iv) इनमें से कोई नहीं

- एक कुण्डली के सिरों के बीच 40 V का प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित करने पर 80 mA की धारा प्रवाहित होती है। कुण्डली का प्रेरण-प्रतिघात होगा
 - 20 ओम ii) 3·2 ओम
 - 2 मिली-ओम iv) 500 ओम
- O K ताप पर शुद्ध अर्द्धचालक है ਬ) प्रतिरोधक
 - ii) चालक
 - iv) विद्युतरोधी iii) अतिचालक
- निम्नलिखित कण एक ही वेग से गतिमान हैं। ङ) न्यूनतम डी-ब्रागली तरंगदैर्घ्य वाला कण है
 - प्रोटॉन

- ii) ड्यूट्रॉन
- lpha-कण iii)
- iv) न्यूट्रॉन

Turn over

सन्त्लित ह्वीट-स्टोन ब्रिज की प्रत्येक भुजा तथा धारामापी का प्रतिरोध R ओम है। नगण्य आन्तरिक प्रांतरांध वाली बैटरी के सिरों के बीच प्रतिरोध होगा

0·5 R ओम ii) R ओम

iii) 4 R ओम

iv) 2 R ओम

Which colour of light is deviated 1. a) maximum after passing white light through a prism?

- Violet
- Red ii)
- iii) Yellow
- iv) Green

Electromagnetic waves are

- Longitudinal
- Transverse
- Both longitudinal and transverse
- None of these

When 40 V of alternating voltage is capplied across a coil, then current of 80 mA flows in it. The inductize reactance of the coil will be

- 20 Ω
- ii) 3·2 Ω
- $2 \text{ m } \Omega$
- iv) 500 Ω

Intrinsic (pure) semi-conductor at d) 0 K temperature is

- Conductor i)
- Resistor ii)
- Superconductor
- Insulator iv)

- i) Proton
- ii) Deuteron
- iii) α-particle iv) Neutron
- The resistance of each arm and that of galvanometer of a balanced Wheatstone's bridge is R Ω . The resistance between the ends connected with the battery of negligible internal resistance will be
 - i) $0.5 R \Omega$ ii) $R \Omega$
 - iii) $4 R \Omega$ iv) $2 R \Omega$ 1

खण्ड - ब

Section - B


- क) प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली तरंगदैर्घ्य से क्या नात्पर्य है ?
 - ख) हाइड्रोजन परमाणु के वर्णक्रम में कौन-सी श्रेणी पराबैंगनी भाग में होती है ?
 - ग) 1 हेनरी अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। 1
 - प) एक तार को खींचकर दो गुनी लम्बाई कर देते हैं। तार की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? 1 https://www.upboardonline.com

346(GF)

- डः) 5 सेमी लम्बे तार को 2 × 10⁻⁴ टेरला के चुम्बकीय क्षेत्र में रखा जाता है। 3 मिली-एम्पीयर की धारा तार में प्रवाहित करने पर तार पर आधकतम कितना बल आरोपित होगा ? 1
- च) परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की मुख्य किमयाँ क्या हैं ?
- 2. a) What is meant by the threshold wavelength in photoelectric effect? 1
 - b) Which series is in the ultraviolet part in the spectrum of hydrogen atom? 1
 - c) Define 1 henry of coefficient of mutual induction.
 - d) A wire is stretched by two times of its length. What will be the effect on its resistivity?
 - e) A wire of 5 cm length is placed in a magnetic field of 2×10^{-4} tesla. What will be the maximum force exerted on the wire by passing 3 mA of current?
 - f) What are the main drawbacks of Rutherford's atom model?

Section - C

- क) हाईगेन्स के तरंग सिद्धान्त से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कीजिए।
- ग्व) वैण्ड अन्तराल ऊर्जा के आधार पर चालक, विद्युत-रोधी तथा अर्द्धचालक में अन्तर बताइए। 2
- ग) दिए गए वैद्युत परिपथ की सहायता से प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की गणना कीजिए:



घ) परावर्ती दूरदर्शी का नामांकित किरण आरेख वनाइए।


Explain reflection of light by Huygens' wave theory.

Give the difference between conductor, insulator and semi-conductor on the basis of energy band gap.

[Turn over

346(GF)

Calculate the charge on each capacitor with the help of the given electrical circuit:



d) Draw a labelled ray diagram of a reflecting telescope.


खण्ड - द

Section - D

- - ख) एक 90° कोण वाले प्रिज्म के पृष्ठ AB पर एक वर्णीय प्रकाश की किरण चित्रानुसार आपितत होती है। अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण पृष्ठ BC से

https://www.upboardonline.com

रमर्शवत निकलती है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए।



परिपथ चित्र की सहायता से p-n संधि डायोड की 11) अर्द्धतरंग दिष्टकरण क्रिया समझाइए।

एम्पीयर का परिपथीय नियम क्या है ? इसकी ਬ) सहायता से अनन्त लम्बाई के सीधे धारावाही तार से 'r' दूरी पर स्थित किसी बिन्दु पर चुम्बकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए।

स्व-प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। एक कुण्डली ङ) में वैद्युत धारा 5 मिली-सेकण्ड में 2 एम्पीयर से 12 एम्पीयर हो जाती है। यदि कुण्डली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल 48 वोल्ट उत्पन्न हो तब कुण्डली का स्व-प्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए।


6799

[Turn over

346(GF)

What is the principle of Wheatstone's bridge? Obtain it with the help of 4. Kirchhoff's law.

Monochromatic light ray is incident on the surface AB of a prism of 90° angle as shown in the figure. The is transmitted ray emergent tangentially through the surface BC. Find out refractive index of the prism material.



c) Explain, half wave rectification process of p-n junction diode with the help of circuit diagram.

What is Ampere's circuital law? Derive the formula for the magnetic field at a point 'r' distance from a straight current carrying conductor of infinite length.

6799

e) Define coefficient of self-induction. Current in a coil becomes 2 A to 12 A in 5 ms. If induced e.m.f. produced in the coil is 48 V, then find out the coefficient of self induction of the coil.

1.5 अपवर्तनांक वाले एक समतल अवतल लेन्स 5. क अवतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 10 सेमी है। 1.6 अपवर्तनांक वालं द्रव में लेन्स को ड्बाने पर इसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति क्या होगी ? 3

> प्रकाश का विवर्तन क्या है ? एकल झिरीं की सहायता से विवर्तन प्रतिरूप में केन्द्रीय उच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई का सूत्र प्राप्त कीजिए।

मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है ? एक चालक में अनुगमन वेग व प्रवाहित धारा 🏸 के सम्बन्ध का सूत्र प्राप्त कीजिए। े वाहर के परमाणु मॉडल के आधार पर सिद्ध काजिए कि परमाणु की स्थायी कक्षाओं की त्रिज्याएँ

^{मृख्य} ^{क्यान्ट}म संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती

अथवा

होती है।

[Turn over

346(GF)

दी गई नाभिकीय अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा का परिकलन कीजिए : $_{3}\text{Li}^{6} + _{0}\text{n}^{1} \rightarrow {}_{2}\text{He}^{4} + _{1}\text{H}^{3}$ दिया है, ₃Li⁶ का द्रव्यमान = 6·015126 amu ₂He⁴ का द्रव्यमान = 4·002604 amu _{, H}³ का द्रव्यमान = 3·016049 amu _{o.n}1 का द्रव्यमान = 1·008665 amu 1 amu = 931 MeV.

ङ) किसी समतल वैद्युत चुम्बकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का समीकरण है $E_z = 90 \sin(0.5 \times 10^3 x + 1.5 \times 10^{11} t) V / m$ ज्ञात कीजिए :

तरंग की आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य

ii) चुम्बकीय क्षेत्र का समीक्र्ण।

5. Radius of curvature of the concave surface of a planoconcave lens of 1.5 refractive index, is 10 cm. What would be the focal length and nature of the lens, when it is immersed in a liquid of 1.6 refractive index?...

6799

- What is diffraction of light? Obtain the formula for the angular width of central maxima in the diffraction pattern with the help of a single slit. 3
- What is meant by the drift velocity of c) free electrons? Obtain the formula for the relationship between drift velocity and the current flowing in a conductor.
- Prove that the radii of the stable d) orbits of the atom are directly proportional to the square of the principal quantum number on the basis of Bohr's atom model.

OR

Compute the energy released in the given nuclear reaction:

$$_{3}\text{Li}^{6} + _{0}\text{n}^{1} \rightarrow _{2}\text{He}^{4} + _{1}\text{H}^{3}$$

Given,

6799

Mass of $_{3}\text{Li}^{6} = 6.015126 \text{ amu}$

Mass of $_{2}\text{He}^{4} = 4.002604 \text{ amu}$

Mass of $_{1}H^{3} = 3.016049$ amu

Mass of $_0 n^1 = 1.008665$ amu 3

1 amu = 931 MeV.

[Turn over


346(GF)

- The equation of electric field in a plane electromagnetic wave is $E_2 = 90 \sin(0.5 \times 10^3 x + 1.5 \times 10^{11} t) \text{V/m}$ Find out:
 - Frequency and wavelength of the wave
 - Equation of the magnetic field. 3

खण्ड - य

Section - E

- दिए गए परिपथ की सहायता **से ज्ञात कीजिए** :
 - प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा
 - E, सेल के सिरों की वोल्टता।



अथवा

विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। 20 सेमी लम्बे तार को खींचकर इसकी लम्बाई में 25% की वृद्धि की जाती है। नये तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए।


5

5

679g

´ **★ ★ W** https://www.upboardonline.com 6. Find out, with the help of the given circuit

- i) current in each resistor
- ii) voltage across the cell E_1 .



5

OR

Write down the definition and unit of specific resistance. Length of wire of 20 cm length, is increased by 25% on stretching it. Calculate the percentage increase in the resistance of the new wire.

5

अनन्त लम्बाई के दो समान्तर धारावाही तारों के बीच लगने वाले बल का सूत्र स्थापित कीजिए। इसके आधार पर एक एम्पीयर वैद्युत धारा की परिभाषा दीजिए। 5

अथवा

 $\mathfrak{h}_{\mathcal{G}_{\mathcal{G}}}$


* ≠W

[Turn over

https://www.upboardonline.com

346(GF)


दिए गए परिपथ से प्रेरक तथा संधारित्र के प्रतिघात की गणना कीजिए। आरोपित वोल्टता की आवृत्ति क्या हो तािक अनुनाद हो सके ? अनुनाद की स्थिति में परिपथ की प्रतिबाधा कितनी होगी ?



7. Derive the formula for the force acting between two parallel current carrying wires of infinite length. Define one ampere of electric current on its basis.

OR

Calculate the reactance of the inductor and that of capacitor from the given circuit. What should be the frequency of the applied voltage for the resonance? What will be the impedance of the circuit in the state of resonance?




5

6799

8.

एक 10 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेन्स के बायीं ओर 20 सेमी की दूरी पर एक वस्तु स्थित है। इस लेन्स से 30 सेमी की दूरी पर 12.5 सेमी फोकस दूरी का दूसरा उत्तल लेन्स रखा है। चित्र देखें। अन्तिम प्रतिबिम्ब की स्थिति, प्रकृति तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए।



अथवा


यंग के प्रकाश के व्यतिकरण प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र प्राप्त कीजिए। फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि प्रयोग को जल में रख दिया जाए ? 5

An object is placed 20 cm to the left of a convex lens of 10 cm focal length. Another convex lens of 12.5 cm focal length is placed at a distance of 30 cm from this Turn over

https://www.upboardonline.com

346(GF)

lens. See the figure. Find out the position. nature and magnification of the final image.



OR


Obtain the formula for the fringe width in Young's experiment for the interference of light. What would be the effect on the fringe width, when the experiment is placed in water?

स्थिर वैद्युतिकी का गाउस-नियम क्या है ? इसकी सहायता से एक बिन्दु आवेश के कारण किसी बिन्दु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए।

अथवा

एक बिन्दु आवेश के कारण किसी बिन्दु पर वैद्युत विभव का सूत्र प्राप्त कीजिए। चित्र में प्रदर्शित वर्ग के विभिन्न

5799




What is Chuss law of electrostance of Oblain the expression for the intensity of electric field at a point due to a point charge with its help.

Obtain the formula for the electric potential at a point due to a point charge

Find out the electric potential at the centre P of the square due to the charges placed at different points of the square as shown

in the figure.



https://www.upboardonline.com

भौतिक नियतांक

प्लांक नियतांक $(h) = 6.6 \times 10^{-34}$ जूल-से प्रकाश की निर्वात में चाल $(c) = 3 \times 10^8$ मी/से गुरुत्वीय त्वरण g = 10 मी/से 2 इलेक्ट्रॉन पर आवेश $(e) = 1.6 \times 10^{-19}$ कूलॉम 1 a.m.u. = 931 MeV एवोगाड्रो संख्या $(N) = 6.02 \times 10^{23}$ रिडवर्ग नियतांक $R = 1.097 \times 10^7$ मीटर $^{-1}$ निर्वात की वैद्युतशीलता $(\epsilon_0) = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{N-m}^2$

Physical constants:

Planck's constant (h) = 6.6×10^{-34} J-s Speed of light in vacuum (c) = 3×10^8 m/s Acceleration due to gravity g = 10 m/s² Charge on electron (e) = 1.6×10^{-19} C 1 a.m.u. = 931 MeV Avogadro Number (N) = 6.02×10^{23} Rydberg constant $R = 1.097 \times 10^7$ m⁻¹. Permittivity of free space (ϵ_0) = 8.85×10^{-12} C²/N-m²

^{346(G}F)- 2,30,000

अनुक्रमांक

नाम

151

346(GG)

2022

भौतिक विज्ञान

समय : तीन घण्टे 15 मिनट]

[पूर्णांक : 70

नोट : प्रारम्भ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्नपत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं ।

Note: First 15 minutes are allotted for the candidates to read the question paper.

निर्देश:

i) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

- ii) इस प्रश्नपंत्र में 5 खण्ड हैं : खण्ड **'अ'**, खण्ड **'ब'**, खण्ड **'स'**, खण्ड **'द'** तथा खण्ड **'य'**।
- iii) खण्ड ं 'अ' बहुविकल्पीय है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के हैं।
- iv) खण्ड 'ब' अति लघु उत्तरीय है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के हैं।
- v) खण्ड **'स'** लघु उत्तरीय I प्रकार के है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं।
- vi) खण्ड 'द' लघु उत्तरीय II प्रकार के है, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के हैं।

7500

vii) खण्ड 'य' विस्तृत उत्तरीय है, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के हैं। इस खण्ड के चारों प्रश्नों में आन्तरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्नों में आपको दिए गए चयन में से केवल एक प्रश्न ही करना है।

viii) प्रश्न में प्रयुक्त प्रतीकों के सामान्य अर्थ हैं। Instructions :

- All questions are compulsory.
- ii) This question paper has 5 sections: Section A, Section B, Section C, Section D and Section E.
- iii) Section A is of multiple choice type and each question carries 1 mark.
- iv) Section B is of very short answer type and each question carries 1 mark.
- v) Section C is of short answer I type and carries 2 marks each.
- vi) Section D is of short answer II type and carries 3 marks each.
- vii) Section E is of long answer type. Each question carries 5 marks. In all four questions of this section internal choices have been given. You have to do only one question from the choices given in the question.
- viii) The symbols used in the question paper have usual meaning.

7500

**V

[Turn over

* *V

7500


खण्ड - अ

Section - A

- 1. क) निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक है
 - i) $-\frac{1}{4}$ z- $\frac{1}{4}$ z- $\frac{1}{$
 - ii) कूलॉम 2 / न्यूटन-मीटर 2
 - iii) न्यूटन / कूलॉम्
 - iv) न्यूटन-बोल्ट / मीटर 2

1

 ख) नीचे दिये गये चित्र में A और B बिन्दुओं के बीच तुल्य धारिता है



- i) 12 μF
- ii) 6 μF
- iii) 4 μF
- iv) 3 μF

1

 ग) L-C-R श्रेणी परिपथ के लिये अनुनाद अवस्था में लगाये गये विभवान्तर और धारा के बीच कलान्तर है

- i) π
- ii) $\pi/2$
- iii) $\pi/4$
- iv) शून्य

1

- घ) न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंग है
 - i) पराबैंगनी किरणें
 - ii) *X*-किरणें
 - iii) गामा-किरणें
 - iv) माइक्रो तरंगें

1

- ङ) किसी प्रिज्म के प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण के मान बराबर A हों तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होगा
 - i) $2\sin\frac{A}{2}$ ii) $2\cos\frac{A}{2}$
 - iii) $2\tan\frac{A}{2}$ iv) $2\cot\frac{A}{2}$

1

7500

[Turn over

https://www.upboardonline.com

_ c)

d)

e)

i)

iii)

ii)

iii)

The

π

 $\pi/4$

X-rays

circuit at resonance is

minimum frequency is

gamma-rays

microwaves.

ultraviolet rays

The phase difference between current

and applied voltage for a L-C-R series

ii) $\pi/2$

iv) zero.

The angle of prism and angle of

minimum deviation of a prism are

wave


of

electromagnetic

- जर्मेनियम को p-type अर्द्धचालक बनाने के लिए 핍) अपद्रव्य पदार्थ को मिलाया जाना है
 - फारफोरस
 - एन्ट्रीमनी ii)
 - एल्यमिनियम
 - नाइट्राजन iv)

- The unit of permittivity of free space a) is
 - newton-metre²/coulomb²
 - coulomb² / newton-metre² ii)
 - newton/coulomb
 - newton-volt/metre²

The equivalent capacity between the b) points A and B in the given figure is



- $12 \mu F$ i)
- 6 µF
- 4 μF

7500

 $3 \mu F$

Turn over

7500

★★V

- equal to A. Then refractive index of the material of prism will be $2\sin\frac{A}{2}$ ii) $2\cos\frac{A}{2}$ $2\tan\frac{A}{2}$ iv) $2\cot\frac{A}{2}$
- impurity to be doped f) germanium to make it a p-type semiconductor is
 - Phosphorus
 - ii) Antimony
 - iii) Aluminium
 - iv) Nitrogen


https://www.upboardonline.com

346(GG)

खण्ड - ब

Section - B

- क) अनंत विस्तार के आवेशित चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए।
 - ख) समभारीक का अर्थ समझाइए।
 - ग) दिये गये किसी पृष्ठ के लिए आपितत प्रकाश की आवृत्ति और निरोधी विभव का ढाल कितना होगा ?



घ) दो समान्तर धारावाही चालकों के बीच बल के
 आधार पर एम्पीयर की परिभाषा दीजिए।


ङ) विवर्तन प्राप्त करने के लिए रेखा छिद्र की चौड़ाई लगभग कितनी होनी चाहिए ?

च) आवेश की गतिशीलता की परिभाषा लिखिए।

(e. a) Write down the expression for electric field intensity near an infinitely charged sheet.

b) Explain the meaning of isobar.

What will be the slope of frequency of incident light and stopping potential for a given surface?



d) Define ampere on the basis of force acting on two parallel current carrying conductors.

e) What should be the approximate width of slit to observe diffraction with it?

f) Define mobility of charge.

7500

* *V

★V [Turn over

7500

9

Section - C

खण्ड - स

- एक अनन्त रेखीय आवेश 2.0 मी दूरी पर 4.5×10^4 न्यूटन/कुलॉम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए।
 - दिखाइये कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण के तरंगदैर्घ्य, इसके फोटॉन के डी-ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के बराबर होती है।
 - हाइड्रोजन परमाणु के आयनन विभव तथा प्रथम उत्तेजन विभव से आप क्या समझते हैं ? 2
 - भँवर धारायें क्या होती हैं ? 2 ਬ)
- An infinite line of charge produces an 3. electric field of 4.5 × 10⁴ N/C at a distance of 2.0 m. Find the linear charge density.
 - that the wavelength Show electromagnetic radiation is equal to the de Broglie wavelength of its photon.

Turn over

- What is meant by ionisation potential and the first excitation potential of hydrogen atom? 2
- What are Eddy currents? 2

खण्ड - द

Section - D

- आँख के सामान्य समंजन के लिए अपवर्तनी खगोलीय दुरदर्शी द्वारा दर स्थित वस्तु के प्रतिबिम्ब बनने के लिए किरण आरेख बनाइए और इस दशा में दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कौ सूत्र लिखिए। 3
 - एक समतल विद्युत-चुम्बकीय तरंग में दोलनी चम्बकीय क्षेत्र निम्न में दिया गया है :

 $B_y = 8 \times 10^{-6} \sin(2 \times 10^{11} t + 300 \pi x)$ टेस्ला गणना कीजिए :

- विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य i)
- दोलनी चुम्बकीय क्षेत्र का आयाम įi)
- दोलनी वैद्युत क्षेत्र का आयाम।

3

7500

https://www.upboardonline.com

★★V

7500

- हाइड्रोजन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन 0-5 Å त्रिज्या के एक कक्षा में 10¹⁷साईकल/सेकण्ड से घृमता है। इसके कारण चुम्बकीय द्विध्रव आघूर्ण की गणना कीजिए।
- किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर केन्द्र से r दूरी पर ਬ) वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। 3
- ह्वीट स्टोन ब्रिज का परिपथ आरेख बनाइये और ङ) इसके संतुलन की शर्त ज्ञात कीजिए।
- Draw a ray diagram for the formation of image of a distant object by a refracting astronomical telescope for normal adjustment of the eye and write the formula for magnifying power of the telescope for this condition.
 - The oscillating magnetic field in a b) plane electromagnetic wave is given by

 $B_y = 8 \times 10^{-6} \sin (2 \times 10^{11} t + 300 \pi x) \text{ tesla}$ Calculate

> wavelength of the the i) electromagnetic wave

Turn over

https://www.upboardonline.com

7500

	amplitude	of	the	oscillating
	magnetic field			

- amplitude of the oscillating electric field. 3
- An electron of hydrogen atom is . c) revolving in an orbit of radius 0.5 Å with 1017 cycle/second. Calculate the magnetic dipole moment due to it. 3
- Derive an expression for electric field d) intensity due to an electric dipole on the axis at a distance r from its centre.
- Draw circuit diagram of Wheatstone e) obtain its balanced bridge and 3 condition.

7500

346(GG)

- हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धान्त की 3 परिकल्पनायें समझाइये।
- दो कुण्डलियों के अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। इसका मात्रक बताइये और मात्रक 3 की परिभाषा लिखिए।

346(GG)

ग) एम्पीयर के परिपथीय नियम के प्रयोग से एक अनन्त लम्बाई के सीधे धारावाही चालक (तार) के कारण चुम्बकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। 3
घ) एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुण्डली से कितनी धारा ली जाती है जो 220 ओम प्रतिरोध के एक मशीन को चलाने के लिये 220 बोल्ट को 22 बोल्ट में परिवर्तित करता है ?
3

13

अथवा

चल कुण्डली धारामापी में कुण्डली एक एल्यूमिनियम फ्रेम पर क्यों लपेटी जाती है ? $12.0~\Omega$ प्रतिरोध की कुण्डली का एक धारामापी 2.5~ मिली-एम्पीयर की धारा के लिए पूर्ण स्केल विक्षेप प्रदर्शित करता है। इसे 0~ से 7.5~ A के परास के अमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे ? 3~ p-n संधि डायोड का उपयोग करते हुए अर्द्ध-तरंग दिष्टकारी के लिए परिपथ आरेख बनाइये तथा इसकी कार्यविधि समझाइए।

https://www.upboardonline.com

- 5. a) Explain the postulates of Huygens' principle of secondary wavelets. 3
 - b) Define coefficient of mutual induction of two coils. Write down its unit and also define unit.
 - c) Derive an expression for magnetic field due to an infinitely long straight current carrying conductor (wire) using Ampere's circuital law. 3
 - d) How much current is drawn by the primary coil of a transformer which changes 220 volt to 22 volt to operate a machine with resistance of 220 ohm?

OR

Why is the coil in a moving coil galvanometer wound on an aluminium frame? A galvanometer with a coil of resistance $12.0~\Omega$ shows a full scale deflection for a current of 2.5~mA. How will you convert it into an ammeter of range 0 to 7.5~A?

v [Turn over

7500

* * V

346(GG)

16

e) Draw the circuit diagram for a half-wave rectifier using p-n junction diode and explain its working.


खण्ड - य

Section - E

6) समान्तर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिये व्यंजक प्राप्त कीजिए जबिक प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा हो। संधारित्र की धारिता किन-किन बातों पर निर्भर करती है ?

अथवा

वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम लिखिए। दिये गये परिपथ में, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा की गणना कीजिए।



6. Obtain an expression for the capacitance of a parallel plate capacitor filled with dielectric material between the plates. On which factors does the capacity of capacitor depend?


OR

7500

×v

[Turn over

State the Kirchhoff's laws for electric circuit. In the given circuit calculate the current in each resistance.



5

5

7. दिये गये परिपथ में ज्ञात कीजिए :

i) संधारित्रीय प्रतिघात

- ii) प्रेरकीय प्रतिघात
- iii) परिपथ की प्रतिबाधा
- iv) धारा और वोल्टेज के बीच कलान्तर

7500

* *V

18


त्र्योलीय अपवर्तक पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन के लिए सूत्र लिखिए और इसकी सहायता से पतले लेंस के लिए सूत्र

$$\frac{1}{f} = (n-1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$
 का निगमन कीजिए।

In the given circuit find 7.

- capacitive reactance i).
- inductive reactance
- impedance of the circuit iii)
- phase difference between current and iv) voltage

5 r.m.s value of the voltage.. 20µF



Write down the formula for refraction through a spherical refracting surface and with the help of this derive the formula

$$\frac{1}{f} = (n-1)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)$$
 for a thin lens.

7500

Turn over

कला सम्बद्ध तथा कला असम्बद्ध प्रकाश के स्रोतों से आप क्या समझते हैं ? यंग के द्वि-झिरीं प्रयोग में झिरियों के . बीच की दूरी 0∙28 मिमी है तथा परदा 1∙4 मी की दरी पर रखा गया है। केन्द्रीय दीप्त फ्रिंज एवं चतुर्थ दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी 1.0 सेमी नापी गयी है। प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। 5

अथवा

्रएक धातु का कार्यफलन 2-0 इलेक्ट्रॉन-बोल्ट है और 5000 Å तरंगदैर्घ्य के एकवर्णीय प्रकाश से प्रदीप्त है। गणना कीजिए :

- देहली तरंगदैर्घ्य
- प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा
- निरोधी विभव।

5

What do you mean by coherent and incoherent sources of light? In Young's double slit experiment the distance between slits is 0.28 mm and the screen is placed at a distance of 1.4 m. The distance between central bright fringe and fourth bright fringe is measured as 1.0 cm. Find the wavelength of light used in the 5 experiment.

OR

7500

★★V

A metal has work function of 2.0 eV and is illuminated by monochromatic light of wavelength 5000 Å. Calculate:

- i) the threshold wavelength
- ii) maximum kinetic energy of photoelectrons https://www.upboardonline.com
- iii) stopping potential.
- 9. फोटो डायोड क्या है ? इसके कार्य सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए। फोटो डायोड के कुछ महत्वपूर्ण उपयोग बताइये।

अधवा

हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तर आरेख बनाइये तथा इसके विभिन्न श्रेणियों के संक्रमणों को प्रदर्शित कीजिए। लाइमन श्रेणी की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए।

What is a photodiode? Explain its working principle. Give some important uses of photodiode.

OR

Draw an energy level diagram for hydrogen atom and show transitions for its different series. Calculate the shortest and the longest wavelengths of Lyman series.

Turn over

भौतिक नियतांक

प्लांक नियतांक (h) = 6.6×10^{-34} जूल-से प्रकाश की निर्वात में चाल (c) = 3×10^8 मी/से गुरुत्वीय त्वरण g = 10 मी/से 2 इलेक्ट्रॉन पर आवेश (e) = 1.6×10^{-19} कूलॉम 1 a.m.u. = 931 MeV एवोगाड्रो संख्या (N) = 6.02×10^{23} रिडबर्ग नियतांक $R = 1.097 \times 10^7$ मीटर $^{-1}$ निर्वात की वैद्युतशीलता (ϵ_0) = 8.85×10^{-12} C 2 /N-m 2

Physical constants:

Planck's constant (h) = 6.6×10^{-34} J-s Speed of light in vacuum (c) = 3×10^8 m/s Acceleration due to gravity g = 10 m/s² Charge on electron (e) = 1.6×10^{-19} C 1 a.m.u. = 931 MeV Avogadro Number (N) = 6.02×10^{-23} Rydberg constant $R = 1.097 \times 10^7$ m⁻¹. Permittivity of free space (ϵ_0) = 8.85×10^{-12} C²/N-m²

346(GG)- 2,30,000