

# 《概率统计 I》 半期考

## 答案

1.

| 分数 | 阅卷人 |
|----|-----|
|    |     |

(10分) 设事件  $A, B, C$  满足:

$P(A) = 0.5, P(B) = 0.8, P(A \cup B) = 0.9, P(C) = 0.9;$   
 $C$  与  $A \cup B$  独立.

(i) 证明  $A, B$  独立;

(ii) 求  $P(A \cup B \cup C)$ .

解: (i) 由  $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$

$$\text{则有 } P(AB) = P(A) + P(B) - P(A \cup B)$$

$$= 0.5 + 0.8 - 0.9$$

$$= 0.4 \quad (14\text{分})$$

$$\text{以及 } P(A)P(B) = 0.5 \cdot 0.8 = 0.4$$

$$\text{即 } P(AB) = P(A)P(B)$$

因此  $A, B$  独立 (1分)

$$(ii) \quad P(A \cup B \cup C) = P(A \cup B) + P(C) - P((A \cup B) \cap C)$$

$$= 0.9 + 0.9 - P(A \cup B)P(C)$$

$$= 0.9 + 0.9 - 0.9 \cdot 0.9$$

$$= 0.99 \quad (15\text{分})$$

2.

| 分数 | 阅卷人 |
|----|-----|
|    |     |

(12分) 设有一批产品，其中3个不合格品，7个合格品。现在进行产品检测。注意此时的产品检测是破坏性检测，也即检测后，合格品变成不合格品，不合格品仍为不合格品。现从中随机抽取一个产品，进行上述破坏性检测，检测后，将检测后的产品放回去，然后再从中随机抽取一个产品进行检测。

(i) 第二次抽到的产品为合格品的概率为多少？

(ii) 已知第二次抽到的产品为合格品条件下，第一次抽到的产品为合格品的条件概率为多少？

解：设  $A_1, A_2$  分别表示第一次，第二次抽到合格品。

$$\text{则有 } P(A_1) = \frac{7}{10} = 0.7, \quad P(\bar{A}_1) = 0.3$$

$$P(A_2|A_1) = \frac{6}{10} = 0.6, \quad P(A_2|\bar{A}_1) = \frac{7}{10} = 0.7$$

(4分)

$$(i) \quad P(A_2) = P(A_1)P(A_2|A_1) + P(\bar{A}_1)P(A_2|\bar{A}_1)$$

$$= 0.7 \times 0.6 + 0.3 \times 0.7$$

$$= 0.42 + 0.21$$

$$= 0.63$$

(4分)

$$(ii) \quad P(A_1|A_2) = \frac{P(A_1 A_2)}{P(A_2)} = \frac{P(A_2|A_1)P(A_1)}{P(A_2)}$$

$$= \frac{0.6 \times 0.7}{0.63}$$

$$= \frac{6}{9}$$

$$= \frac{2}{3}$$

(4分)

3.

| 分数 | 阅卷人 |
|----|-----|
|    |     |

(10分)已知某大学的女生体重 $X$  (单位: 斤)服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ , 并且根据该大学体检数据估计得到 $\mu = 100$ , 以及 $P(90 \leq X \leq 100) = 34.13\%$ , 试求另一个参数 $\sigma$ . (已知 $\Phi(1) = 0.8413, \Phi(2) = 0.9772, \Phi(3) = 0.9987$ ).

$$\text{解: } P(90 \leq X \leq 100) = P\left(-\frac{10}{\sigma} \leq \frac{X-100}{\sigma} \leq 0\right)$$

$$= \Phi(0) - \Phi\left(-\frac{10}{\sigma}\right)$$

$$= 0.5 - \left[1 - \Phi\left(\frac{10}{\sigma}\right)\right]$$

$$= \Phi\left(\frac{10}{\sigma}\right) - 0.5 \quad (17 \text{分})$$

$$\Rightarrow \Phi\left(\frac{10}{\sigma}\right) - 0.5 = 0.3413$$

$$\Rightarrow \Phi\left(\frac{10}{\sigma}\right) = 0.8413 = \Phi(1)$$

$$\Rightarrow \frac{10}{\sigma} = 1$$

$$\Rightarrow \sigma = 10 \quad (3 \text{分})$$

4.

|    |     |
|----|-----|
| 分数 | 阅卷人 |
|    |     |

(12分) 假设随机变量  $X$  的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} 2xe^{-x^2}, & x > 0; \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

(i) 求  $X$  的分布函数;

(ii) 求随机变量  $Y = X^2$  的密度函数;

解: (i)  $F_X(x) = P\{X \leq x\}$

$$= \begin{cases} \int_0^x 2te^{-t^2} dt, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 1 - e^{-x^2}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (6\text{分})$$

(ii) 由  $y = x^2$ ,  $x > 0$

$$\Rightarrow x = \sqrt{y}, \quad y > 0$$

$$\Rightarrow f_Y(y) = \begin{cases} f(\sqrt{y}) \cdot |(\sqrt{y})'_y|, & y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 2\sqrt{y} \cdot e^{-y} \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}}, & y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} e^{-y}, & y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (6\text{分})$$

5.

|    |     |
|----|-----|
| 分数 | 阅卷人 |
|    |     |

(12分)已知随机变量 $X$ 服从参数为0.2的(0-1)分布, 随机变量 $Y$ 服从参数为0.3的(0-1)分布, 并且 $X, Y$ 相互独立。

(i) 求二维随机变量 $(X, Y)$ 的联合分布律;

(ii) 求随机变量 $Z = X + Y$ 的分布律.

解: (i)  $X \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0.8 & 0.2 \end{pmatrix} \quad Y \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0.7 & 0.3 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow$

| $Y \backslash X$ | 0                | 1                | $P\{Y=j\}$ |
|------------------|------------------|------------------|------------|
| 0                | $0.8 \times 0.7$ | $0.2 \times 0.7$ | 0.7        |
| 1                | $0.8 \times 0.3$ | $0.2 \times 0.3$ | 0.3        |
| $P\{X=i\}$       | 0.8              | 0.2              |            |

$\Rightarrow (X, Y)$ 的联合分布律为

| $Y \backslash X$ | 0    | 1    |
|------------------|------|------|
| 0                | 0.56 | 0.14 |
| 1                | 0.24 | 0.06 |

(6分)

(ii)  $Z = X + Y$ 的取值如下:

| $Y \backslash X$ | 0 | 1 |
|------------------|---|---|
| 0                | 0 | 1 |
| 1                | 1 | 2 |

$$\Rightarrow P\{Z=0\} = P\{X=0, Y=0\} = 0.56$$

$$\begin{aligned} P\{Z=1\} &= P\{X=0, Y=1\} + P\{X=1, Y=0\} \\ &= 0.24 + 0.14 = 0.38 \end{aligned}$$

$$P\{Z=2\} = P\{X=1, Y=1\} = 0.06$$

$$\Rightarrow Z \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0.56 & 0.38 & 0.06 \end{pmatrix} \quad (6分)$$

|    |    |     |
|----|----|-----|
| 6. | 分数 | 阅卷人 |
|    |    |     |

(10分) 已知二维连续型随机变量  $(X, Y)$  的密度函数如下:

$$f(x, y) = \begin{cases} x, & 1 \leq x \leq 2, \frac{1}{x} \leq y \leq \frac{2}{x}; \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

求  $Z = XY$  的密度函数。

解: 由  $f_{XY}(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{|x|} f(x, \frac{z}{x}) dx$  (2分)

被积函数  $\frac{1}{|x|} f(x, \frac{z}{x})$  不为0的区域如下:

$$\begin{cases} 1 \leq x \leq 2 \\ \frac{1}{x} \leq \frac{z}{x} \leq \frac{2}{x} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 1 \leq x \leq 2 \\ 1 \leq z \leq 2 \end{cases} \quad (4分)$$

$$\Rightarrow f_{XY}(z) = \begin{cases} \int_1^2 \frac{1}{x} \cdot x dx, & 1 \leq z \leq 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 1, & 1 \leq z \leq 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (4分)$$

7.

| 分数 | 阅卷人 |
|----|-----|
|    |     |

(9分)已知随机变量 $X$ 的密度函数如下:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3}e^{-\frac{1}{3}(x-1)}, & x > 1; \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

求期望 $E[3e^{-\frac{2}{3}(x-1)}]$ .

解:  $E[3e^{-\frac{2}{3}(x-1)}]$

$$= \int_1^{+\infty} 3e^{-\frac{2}{3}(x-1)} \cdot \frac{1}{3}e^{-\frac{1}{3}(x-1)} dx \quad (6分)$$

$$= \int_1^{+\infty} e^{-(x-1)} dx$$

$$= -e^{-(x-1)} \Big|_1^{+\infty}$$

$$= 0 - (-1)$$

$$= 1 \quad (3分)$$

8.

| 分数 | 阅卷人 |
|----|-----|
|    |     |

(10分) 已知随机变量 $X$ 服从参数为1的泊松分布, 随机变量 $Y$ 服从区间 $(0, 2)$ 的均匀分布, 并且 $X, Y$ 相互独立。

(i) 求 $E(X^2), E(Y^2), E[(X-Y)^2]$ ;

(ii) 求 $D(X-Y)$ .

解: (i)  $E(X^2) = DX + (EX)^2 = 1 + 1^2 = 2$  (2分)

$$E(Y^2) = DY + (EY)^2 = \frac{(2-0)^2}{12} + \left(\frac{0+2}{2}\right)^2$$

$$= 1\frac{1}{3} \quad (2分)$$

$$E[(X-Y)^2] = E(X^2 + Y^2 - 2XY)$$

$$= E(X^2) + E(Y^2) - 2EXEY$$

$$= 2 + 1\frac{1}{3} - 2 \cdot 1 \cdot 1 = 1\frac{1}{3} \quad (3分)$$

(ii)  $D(X-Y) = DX + DY$

$$= 1 + \frac{1}{3}$$

$$= 1\frac{1}{3} \quad (3分)$$



9.

| 分数 | 阅卷人 |
|----|-----|
|    |     |


(15分) 已知二维随机变量  $(X, Y)$  的概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{A}, & -1 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x^2; \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

其中  $A$  为常数.

- (i) 试求常数  $A$ ;
- (ii) 求边缘概率密度  $f_Y(y)$ ;
- (iii) 求条件概率密度  $f_{X|Y}(x|y)$ .

解:

(i)  $A$  为上述阴影部分面积, 即

$$A = 2 \int_0^1 x^2 dx = 2 \cdot \frac{1}{3} x^3 \Big|_{x=0}^1 = \frac{2}{3} \quad (5 \text{分})$$

$$\Rightarrow f(x, y) = \begin{cases} \frac{3}{2}, & -1 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x^2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(ii) 该阴影部分的  $y$ -型区域如下

$$\{(x, y) \mid 0 \leq y \leq 1, -1 \leq x \leq -\sqrt{y}\}$$

$$\cup \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq 1, \sqrt{y} \leq x \leq 1\} \quad (2 \text{分})$$

$$\Rightarrow f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$$

$$= \begin{cases} \int_{-1}^{-\sqrt{y}} \frac{3}{2} dx + \int_{\sqrt{y}}^1 \frac{3}{2} dx, & 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 3 - 3\sqrt{y}, & 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (3 \text{分})$$

$$(iii) f_{X|Y}(x, y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$$

当  $0 < y < 1$  时,

$$f_{X|Y}(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2-2\sqrt{y}}, & -1 < x < -\sqrt{y}, \\ & \text{或 } \sqrt{y} < x < 1 \text{ 时} \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

(5分)