

Funktion

Eine **Funktion** f ist eine Vorschrift, die *jedem* Element ihrer **Definitionsmenge** D *genau* ein Element aus ihrer **Zielmenge** Z zuordnet.

Kurz schreiben wir dafür auch: $f: D \rightarrow Z$

Wenn f dem Element 42 das Element 23 zuordnet, schreiben wir dafür kurz: $f(42) = 23$


Sprechweisen: „Der **Funktionswert** von 42 ist 23.“ bzw. „ f von 42 ist gleich 23.“

Im Bild rechts oben muss also von *jedem* Element der Definitionsmenge *genau* ein Pfeil nach rechts in die Zielmenge starten.

Wie im Beispiel rechts oben dürfen verschiedene Pfeile auf das gleiche Element der Zielmenge zeigen.



Wie im Beispiel rechts oben darf es auch Elemente in der Zielmenge geben, auf die kein Pfeil zeigt.

Wenn auf *jedes* Element der Zielmenge *genau* ein Pfeil zeigt, dann hat die Funktion f eine sogenannte **Umkehrfunktion**.



Relationen

Erkläre, warum die dargestellten Zuordnungen *keine* Funktionen $\{1, 2, 4\} \rightarrow \{1, 2, 5, 6\}$ sind.




Wertetabelle

Jedes Paar $(x | g(x))$ heißt **Wertepaar** der Funktion g .

Vervollständige die folgende **Wertetabelle** der Funktion g .

x	1	2	4
$g(x)$			



Funktionsgraph


Die Definitions- und Zielmenge einer Funktion können auch *unendlich* viele Elemente enthalten.

Bei der folgenden **Funktion** f sind die **Definitionsmenge** D und die **Zielmenge** Z alle reellen Zahlen. Grafisch ist $D = \mathbb{R}$ durch die **waagrechte Achse** und $Z = \mathbb{R}$ durch die **senkrechte Achse** dargestellt.

An jeder **Stelle** x gibt es *genau einen* zugehörigen **Funktionswert** $f(x)$.

Die eingezeichnete Kurve heißt **Funktionsgraph**.

Der Funktionsgraph besteht aus allen Wertepaaren $(x | f(x))$, zum Beispiel:











- Links gilt: $f(6) = 3$ und $f(-3) = -2$.
Der Graph enthält die Punkte $(6 | 3)$ und $(-3 | -2)$.
- Der Funktionsgraph schneidet die waagrechte Achse an der Stelle $x = 2$.
Es gilt also: $f(\boxed{}) = \boxed{}$
Die Zahl 2 heißt daher **Nullstelle** von f .
- Der Funktionsgraph schneidet die senkrechte Achse bei $y = -3$.
Es gilt also: $f(\boxed{}) = \boxed{}$

Vertical line test



Entscheide jeweils, ob der Graph einer Funktion $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ dargestellt ist. Falls ja, gib D an.



Lineare Funktionen



Du läufst mit der konstanten Geschwindigkeit $v = 4 \text{ m/s}$.


Zwischen der konstanten Geschwindigkeit v , dem zurückgelegten Weg s und der dafür benötigten Zeit t gilt dann folgender Zusammenhang: $v = \frac{s}{t}$

1) Dein zurückgelegter Weg s hängt von t ab.

Forme $4 = \frac{s}{t}$ nach s um und vervollständige die **Funktionsgleichung**:

$s(t) =$

2) Zeichne rechts den Funktionsgraphen ein.




Quadratische Funktionen



r in cm	$A(r)$ in cm^2
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Der **Flächeninhalt** A eines Kreises hängt von seinem **Radius** r ab: $A(r) = \pi \cdot r^2$



1) Vervollständige links die Wertetabelle.

2) Skizziere rechts den Funktionsgraphen.

